

ナシ(殺虫剤)					使用条件		使用回数		注)日本の値に比べて輸出相手国の値が低い場合は赤色。 注)※の国の数値は、湾岸協力会議標準化機構(GSO)が定めるGSO基準を記載。																		2016/7/15 現在				
薬品名	有効成分	有効成分	種類	対象病害虫	希釈倍率	収穫前日数	本剤	有効成分	日本 (ppm)	Codex (ppm)	USA (ppm)	EU (ppm)	Canada (ppm)	Hong Kong (ppm)	Taiwan (ppm)	Singapore (ppm)	Indonesia (ppm)	Malaysia (ppm)	Thailand (ppm)	Vietnam (ppm)	Russia (ppm)	UAE (ppm)※	Saudi Arabia (ppm)※	Bahrain (ppm)※	Kuwait (ppm)※	Oman (ppm)※	Qatar (ppm)※				
トクチオン水和剤	プロチオホス32%	Prothiofos	有機リン	コナカイガラムシ類、ハマキムシ類	800	60日前	5回	5	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
ノーモルト乳剤	テフルベンズロン5%	Teflubenzuron	IGR(キチン合成阻害剤)	ナシチビガ、ナシホソガ	2000	収穫前日まで	2回	2	1	1	－	0.5	－	1	1	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	1	1				
				シンクイムシ類	1000～2000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
ハチハチフロアブル	トルフェンピラド15%	Tolfenpyrad	電子伝達系Ⅰ阻害剤	シンクイムシ類	1000	14日前	2回	2	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
				アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類	2000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
				クワコナカイガラムシ	1000～2000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
バリアード顆粒水和剤	チアクロプリド30%	Thiacloprid	ネオニコチノイド	アブラムシ類、シンクイムシ類	2000～4000	収穫前日まで	3回	3	2	0.7	0.3	0.3	0.3	1	1	－	－	－	－	－	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7				
				カメムシ類	2000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
				クワコナカイガラムシ	4000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
パロックフロアブル	エトキサゾール10%	Etoxazole	殺ダニ(キチン合成阻害)	ハダニ類	2000	14日前	2回	2	0.5	0.07	0.2	0.07	0.2	0.2	0.2	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				
ピラニカ水和剤	テブフェンピラド10%	Tebufenpyrad	殺ダニ(電子伝達系Ⅰ阻害剤)	ハダニ類	1000～2000	14日前	1回	1	0.5	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－				
				ニセナシサビダニ	1000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド20%	Flubendiamide	ジアミド	ハマキムシ類、シンクイムシ類、ケムシ類	4000	収穫前日まで	2回	2	1	0.8	1.5	0.8	0.8	1	0.8	－	－	－	－	－	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8				
ベストガード水溶剤	ニテンピラム10%	Nitenpyram	ネオニコチノイド	アブラムシ類	1000～2000	14日前	3回	3	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
				カメムシ類、チュウゴクナシキジラミ	1000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
マイトコーネフロアブル	ビフェナゼート20%	Bifenazate	殺ダニ	ハダニ類	1000～1500	収穫前日まで	1回	1	2	0.7	0.7	0.7	－	－	2	－	－	－	－	－	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7				
マトリックフロアブル	クロマフェノジド5%	Chromafenozide	IGR(脱皮ホルモン様活性物質)	ハマキムシ類	1000～2000	収穫前日まで	3回	3	1	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
				ケムシ類	2000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
マブリックEW乳剤	フルバリネート19%	Fluvalinate	ピレスロイド	ナシグンバイ、カメムシ類、ハマキムシ類、ナシホソガ、モモシクイガ	2000	30日前	2回	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
				アブラムシ類	2000～4000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
マブリックナック水和剤	NAC(カルバリル)30%	Carbaryl	カーバメイト	アブラムシ類	1000～2000	45日前	2回	3	1	－	12	0.01	5	12	1	5	－	－	－	5	0.05	－	－	－	－	－	－				
				シンクイムシ類、ハマキムシ類、ナシチビガ、カメムシ類	1000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	フルバリネート10%	Fluvalinate	ピレスロイド	アブラムシ類	1000～2000			2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
				シンクイムシ類、ハマキムシ類、ナシチビガ、カメムシ類	1000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
マブリック水和剤20	フルバリネート20%	Fluvalinate	ピレスロイド	シンクイムシ類、ナシチビガ、ハダニ類、ナシホソガ、カメムシ類、ナシグンバイ、ハマキムシ類、ニセナシサビダニ	2000	30日前	2回	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
マブリック水和剤20	フルバリネート20%	Fluvalinate	ピレスロイド	アブラムシ類	2000～4000	30日前	2回	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
ミクロナデボン水和剤85	NAC(カルバリル)85%	Carbaryl	カーバメイト	アブラムシ類、ナシグンバイ	1000～2000	45日前	3回	3	1	－	12	0.01	5	12	1	5	－	－	－	5	0.05	－	－	－	－	－	－				
ミクロナデボン水和剤85	NAC(カルバリル)85%	Carbaryl	カーバメイト	クワコナカイガラムシ	1000～1500	45日前	3回	3	1	－	12	0.01	5	12	1	5	－	－	－	5	0.05	－	－	－	－	－	－				
				シンクイムシ類、ナシミハバチ	1200				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
				ナシチビガ	1000				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
モスピラン顆粒水和剤	アセタミプリド20%	Acetamiprid	ネオニコチノイド	カメムシ類、アブラムシ類、シンクイムシ類、カイガラムシ類、カキノヒメヨコバイ	2000～4000	収穫前日まで	3回	3	2	0.8	1	0.8	1	1	1	－	－	－	－	－	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8				
モスピラン水溶剤	アセタミプリド20%	Acetamiprid	ネオニコチノイド	アブラムシ類、カイガラムシ類、カメムシ類、カキノヒメヨコバイ、シンクイムシ類	2000～4000	収穫前日まで	3回	3	2	0.8	1	0.8	1	1	1	－	－	－	－	－	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8				

ナシ(殺虫剤)					使用条件		使用回数		注)日本の値に比べて輸出相手国の値が低い場合は赤色。 注)※の国の数値は、湾岸協力会議標準化機構(GSO)が定めるGSO基準を記載。																			
薬品名	有効成分	有効成分	種類	対象病害虫	希釈倍率	収穫前日数	本剤	有効成分	日本 (ppm)	Codex (ppm)	USA (ppm)	EU (ppm)	Canada (ppm)	Hong Kong (ppm)	Taiwan (ppm)	Singapore (ppm)	Indonesia (ppm)	Malaysia (ppm)	Thailand (ppm)	Vietnam (ppm)	Russia (ppm)	UAE (ppm)※	Saudi Arabia (ppm)※	Bahrain (ppm)※	Kuwait (ppm)※	Oman (ppm)※	Qatar (ppm)※	
ラービン水和剤75	チオジカルブ75%	Thiodicarb	カーバメイト	ナシチビガ、シンクイムシ類	1000～1500	7日前	3回	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
				ハマキムシ類	1000																							
				ケムシ類	1500																							
ルビゲン水和剤	フェナリモル12%	Fenarimol	DMI	うどんこ病	3000	21日前	3回	3	1	0.3	0.1	0.1	－	0.3	0.5	－	－	－	－	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
ロディー水和剤	フェンプロバトリン 10%	Fenpropathrin	ピレスロイド	シンクイムシ類、アブラムシ類、 ハマキムシ類	1000～1500	収穫前日まで	2回	2	5	5	5	0.01	5	5	0.5	－	－	－	－	－	5	5	5	5	5	5	5	
				カメムシ類、ハダニ類	1000																							