

赤かび病に適用がある主な農薬とその使用基準 (2019年3月現在)

剤名	有効成分	作物名	使用時期	使用回数	有効成分を含む剤の使用回数	FRACコード	
トップジンM 水和剤	チオファネートメチル	小麦	収穫14日前まで	3回以内 (出穂期以降は2回以内)	4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内)	1	
		大麦	収穫30日前まで	3回以内(出穂期以降は1回以内)	3回以内(種子1回、出穂期以降は1回以内)	1	
トップジンM ゾル		小麦	収穫14日前まで	3回以内 (出穂期以降は2回以内)	4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内)	1	
		大麦	収穫21日前まで (ヘリ散布)	3回以内(出穂期以降は1回以内)	3回以内(種子1回、出穂期以降は1回以内)	1	
トップジンM 粉剤		小麦	収穫14日前まで	3回以内 (出穂期以降は2回以内)	4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内)	1	
		大麦	収穫14日前まで	3回以内(出穂期以降は1回以内)	3回以内(種子1回、出穂期以降は1回以内)	1	
スミトップM		MEP (フェントロチオン) / チオファネートメチル	小麦	収穫14日前まで	1回	MEPを含む農薬：1回 チオファネートメチルを含む農薬：4回以内(種子への処理は1回、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内)	1B、1
			大麦	収穫14日前まで	1回	MEPを含む農薬：1回 チオファネートメチルを含む農薬：3回以内(種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内)	1B、1
ベフトップジンフロアブル (北海道限定)		イミノクタジン酢酸塩/チオファネートメチル	小麦	収穫14日前まで	3回以内(出穂期以降は1回以内)	イミノクタジンを含む農薬：4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内) チオファネートメチルを含む農薬：4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内)	M07、1
シルバキュアフロアブル		テブコナゾール	小麦	収穫7日前まで	2回以内	3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内)	3
	大麦		収穫14日前まで	2回以内	2回以内	3	
ワークアップ粉剤 ワークアップ乳剤 ワークアップフロアブル	メトコナゾール	麦類	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	3	
オーソサイド水和剤	キャプタン	小麦	収穫14日前まで	4回以内	4回以内	M04	
バラライカ水和剤	キャプタン/ テブコナゾール	小麦	収穫14日前まで	2回以内	キャプタンを含む農薬：4回以内テブコナゾールを含む農薬：3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内)	M04、3	
ブライア水和剤 (北海道限定)	ジエトフェンカルブ/ ベノミル	小麦	収穫21日前まで	2回以内	ジエトフェンカルブを含む農薬：2回以内ベノミルを含む農薬：4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)	10、1	
ベルコート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸	小麦	収穫21日前まで	3回以内 (但し、出穂期以降は1回以内)	4回以内 (但し、種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内)	M07	
ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ	小麦	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	11	
ナティーボフロアブル	テブコナゾール/ トリフロキシストロビン	小麦	収穫21日前まで	2回以内	テブコナゾール：3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内)トリフロキシストロビン：3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内)	3、11	
イントレックスフロアブル	フルキサピロキサド	小麦	収穫7日前まで	3回以内	4回以内(融雪後は3回以内)	7	
チルト乳剤	プロピコナゾール	小麦	収穫7日前まで (ヘリ散布) 収穫3日前まで (散布)	3回以内	5回以内 (根雪前は2回以内、春期以降は3回以内)	3	
		大麦	収穫21日前まで	1回	1回	3	
ストロビーフロアブル	クレソキシムメチル	小麦	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	11	
		大麦					
ペフラン液剤	イミノクタジン酢酸塩	小麦	収穫14日前まで	3回以内 (出穂期以降は1回以内)	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内)	M07	
イオウフロアブル	硫黄	麦類	適用規制なし	適用規制なし	適用規制なし	M02	
石灰硫黄合剤	多硫化カルシウム	麦類	適用規制なし	適用規制なし	適用規制なし	-	
トリフミン水和剤	トリフルミゾール	麦類	収穫14日前まで	3回以内	3回以内(種子粉衣は1回)	3	
トリフミン乳剤	トリフルミゾール	小麦	収穫3日前まで	3回以内	3回以内(種子粉衣は1回)	3	