

品名	製造販売業者		承認年月日	規制区分	
牛白血病エライザキット	チッソ株式会社		H20.12.8	-	
製剤区分(薬効分類)	生物学的製剤(生物学的診断用製剤類)				
主成分	省略				
対象動物	牛				
効能及び効果	牛血清中の牛白血病ウイルスに対する抗体の検出				
用法及び用量	省略				
使用禁止期間/休業期間	-				
剤型	反芻動物由来物質有無	由来物質名	由来物質動物	由来物質原産国	由来物質臓器名等
(動生剤) その他 (診断液を含む)	有	① スキムミルク ② 指示陰性血清 ③ 指示陽性血清	①～③ 牛	①～③ 日本	① 乳 ② 及び ③ 血清

品名	製造販売業者		承認年月日	規制区分	
エスブラインAインフルエンザ	富士レビオ株式会社		H20.12.12	-	
製剤区分(薬効分類)	生物学的製剤(生物学的診断用製剤類)				
主成分	省略				
対象動物	鶏				
効能及び効果	ニワトリの気管スワブ及び総排泄腔(クローカ)スワブからのA型インフルエンザウイルス抗原の検出				
用法及び用量	省略				
使用禁止期間/休業期間	-				
剤型	反芻動物由来物質有無	由来物質名	由来物質動物	由来物質原産国	由来物質臓器名等
(動生剤) その他 (診断液を含む)	有	① ウシ血清アルブミン ② 不活化アルカリホスファターゼ	① ② ウシ	① アメリカ、ニュージーランド ② 日本、ニュージーランド	① 血清 ② 小腸

品名	製造販売業者		承認年月日	規制区分												
モメタオティック	日本全薬工業株式会社		H20.12.15	指定医薬品・劇薬												
製剤区分(薬効分類)	抗菌性物質製剤・一般医薬品															
主成分	本品1g中 ゲンタマイシン硫酸塩 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 (モメタゾンフランカルボン酸エステルとして0.97mg) クロトリマゾール		3mg (力価) 1mg 10mg													
対象動物	犬															
効能及び効果	有効菌種 : 本剤感受性のスタフィロコッカス属及び <i>Malassezia pachydermatis</i> 適応症 : 犬の感染性外耳炎															
用法及び用量	本剤の下記量を、犬の耳道内に、片耳当たり1日1回滴下する。 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">犬の体重</td> <td style="text-align: center;">7.5g、 15g、 30g</td> <td style="text-align: left;">ボトル</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">15kg未満</td> <td style="text-align: center;">4滴</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">15～24kg未満</td> <td style="text-align: center;">6滴</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">24kg以上</td> <td style="text-align: center;">8滴</td> <td></td> </tr> </table> <p>なお、投与するにあたり以下について注意すること。(1) 耳道内の異物、汚物、痂皮化した滲出物は非刺激性の洗浄液で取り去り、治療部位に生えている余分な毛は引き抜くこと。(2) 耳道内における薬液の拡散を図るため、本剤の投与後は耳道に沿ってマッサージすること。</p>				犬の体重	7.5g、 15g、 30g	ボトル	15kg未満	4滴		15～24kg未満	6滴		24kg以上	8滴	
犬の体重	7.5g、 15g、 30g	ボトル														
15kg未満	4滴															
15～24kg未満	6滴															
24kg以上	8滴															
使用禁止期間/休業期間	-															
剤型	反芻動物由来物質有無	由来物質名	由来物質動物	由来物質原産国	由来物質臓器名等											
懸濁剤	無															