

○ 飼料配合舎内・鶏舎脇等でネコを確認。堆肥加工施設内でネコの餌も確認された。



飼料配合舎内のネコ



鶏舎脇のネコ



堆肥加工施設内のネコの餌

野生動物の侵入防止のためのネット等の設置 <基準25>

○ 家きん舎・飼料保管庫・堆肥舎等でネットの破れや壁面の隙間等が散見。野生動物の侵入の形跡も確認された。



防鳥ネットの破れ



鶏舎の隙間



家きん舎の金網の破損



家きん舎の壁面の隙間

野生動物の侵入防止のためのネット等の設置 <基準25>

○ 家きん舎・飼料保管庫・堆肥舎等でネットの破れや壁面の隙間等が散見。野生動物の侵入の形跡も確認された。



入気口の隙間



クーリングパットの隙間




除糞ベルトの床面開口部の蓋の隙間



配水口の蓋の破損

野生動物の侵入防止のためのネット等の設置 <基準25>

○ 家きん舎・飼料保管庫・堆肥舎等でネットの破れや壁面の隙間等が散見。野生動物の侵入の形跡も確認された。



堆肥舎内のスズメ・糞



堆肥舎壁面の破損



野生動物による食害



堆肥舎内のネコの足跡

ネズミ及び害虫の駆除 <基準27>

○ 生きたネズミや死体を確認された。



除糞ベルト下のネズミ死体



断熱材くずとネズミ糞



インレット内のネズミの巣



断熱材のかじり跡

衛生管理区域内の整理整頓 <基28>

○ 衛生管理区域内に不要な資材が放置され、野生動物の隠れられる場所が認められた。



衛生管理区域内に放置された不要な資材

疫学調査時に農場で確認された症状

- 鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、沈うつ等の特定症状が確認できた。
- あひる（あいがも）では、神経症状が認められた。



ケージ内でまとまって死亡



鶏冠のチアノーゼ



沈うつ



神経症状

発生農場の周辺で見られた注意すべき環境

- 二番穂や果実の実等、野鳥を誘引しやすい環境が確認された。
- 野生動物の足跡や糞が確認された。



稲刈り後の葉や茎が伸びた水田



取り残された柿の実



イタチ科の野生動物と思われる足跡

発生農場の周辺で見られた注意すべき環境

○ 農場周辺にため池等の水場があり、野鳥が多数確認された。



池から飛び出したのカモ類の群れ



近隣の池のカモ類



野鳥の古巣




低地の水田で採食するオオハクチョウとオオハクチョウの糞



オオハクチョウに混じり採食するカラス

発生農場に設置した無人カメラの解析結果※

○ 鶏舎前室、発生鶏舎や飼料庫内でねずみやネコが確認された。




飼料庫内

ネコ数匹とアナグマが撮影された。ネコはムクドリを捕獲していた。



発生鶏舎のケージの裏
複数のネコやネズミが撮影された。



前室内（2か所）

ネコや多くのネズミが撮影された。

※発生農場のうち、4農場に設置。
疫学調査時から、約1週間設置。
防疫作業により鶏舎入口等が開放されていることに留意。

発生農場に設置した無人カメラの解析結果※

○ 農場敷地内でタヌキ、キツネ等の野生動物が確認された。



発生鶏舎外壁脇の排水口


ネズミ、ネコが撮影された。

ネズミは奥が塞がっている様子で、入るとすぐに出てくる。



農場境界

タヌキ、キツネが撮影された。



飼料タンク周辺（2か所）

キツネや複数のネコが撮影された。



※発生農場のうち、4農場に設置。

疫学調査時から、約1週間設置。

防疫作業により鶏舎入口等が開放されていることに留意。