

有効成分ブタクロールを含有する農薬の使用方法

1. 登録番号 20131 : マーシエット乳剤（ブタクロール 32.0%乳剤）

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ブタクロールを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ	植代直後 (移植 7 日前まで) 又は 移植後 1 日～ ルビエ 1 葉期 ただし、 移植後 30 日まで	300~500 mL/10 a	—	1 回	原液 湛水 散布	2 回以内
直播水稻	一年生雑草	乾田直播のは種直後～ 稲出芽前 (雑草発生前) (入水 15 日前まで)	1000~1500 mL/10 a	通常 散布 50~100 L/10 a 少量 散布		全面 土壌 散布	
	一年生雑草 マツバイ ホタルイ	乾田直播 の入水 10~2 日前	500 mL/10 a	25~50 L/10 a			

2. 登録番号 20603 : アークエース粒剤（ブタクロール 2.5%・ACN 4.5%粒剤）

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ブタクロールを含む農薬の総使用回数	ACNを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植時	2~3 kg/10 a	1回	田植同時 散布機で 施用	2回以内	3回以内
		移植直後~ ノビエ1葉期 ただし、移植後30日 まで	2 kg/10 a		湛水散布		
		移植直後~ ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日 まで	3 kg/10 a				

3. 登録番号 20822 : クミアイサキドリ EW、
登録番号 22742 : シンウチ EW
(ブタクロール 12.0%・ペントキサゾン 4.0%乳剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及びマツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ クログワイ コウキヤガラ	植代後~移植前 7 日 または 移植直後~ノビエ 1 葉期 ただし、移植後 30 日まで	500 mL/10 a	1 回	原液湛水散布
		移植時			田植同時散布機で施用
		植代時 (移植 7 日前まで)			植代時に原液のまま散布し混和する
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ	湛水直播の代かき時 (は種 7 日前まで)	300 mL/10 a		代かき時に原液のまま散布し混和する
		湛水直播の代かき後 ~は種前 7 日			原液湛水散布

ブタクロールを含む 農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内

4. 登録番号 20825 : マーシェットジャンボ (ブタクロール 20.0%粒剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ブタクロールを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	植代後~移植前 7 日 または移植後 1 日~ノビエ 1 葉期 ただし、移植後 30 日まで	小包装(パック)10 個 (500g)/10a	1 回	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	2 回以内

5. 登録番号 20826 : マーシェット 1 キロ粒剤 (ブタクロール 10.0%粒剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ブタクロールを含む農薬の総使用回数
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	移植時	1 kg/10 a	1 回	田植同時散布 機で施用	2 回以内
		植代後~移植前 7 日 又は移植直後~ ^{ノビエ} 1 葉期 ただし、移植後 30 日まで			湛水散布	

6. 登録番号 21065 : クサカリン粒剤 3 5 (ピラゾレート 8.0%・ブタクロール 3.5%粒剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植 水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ヒルムシロ	移植後 1~10 日 (^{ノビエ} 1.5 葉期 まで)	砂壤土 ~埴土	3~4 kg/10 a (但し 砂壤土 は 3 kg)	1 回	湛水散布	北海道 東北 北陸
		移植後 1~10 日 (^{ノビエ} 2.0 葉期 まで)		3 kg/10a			関東以西の 普通期 及び早期栽 培地帯

ピラゾレートを含む 農薬の総使用回数	ブタクロールを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内

7. 登録番号 21066：クサカリン粒剤 25（ピラゾレート 6.0%・ブタクロール 2.5%粒剤）

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ヒルムシロ オモダカ (関東・東山・東海)	移植直後~移植後 10 日(但し九州の普通期は移植後 7 日まで)(ノビエ 1.5 葉期まで)	砂壤土~埴土	3~4 kg/10 a	1 回	湛水散布	全域の普通期及び早期栽培地帯

ピラゾレートを含む農薬の総使用回数	ブタクロールを含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内

**8. 登録番号 21403：クミアイサキドリ 1 キロ粒剤、
登録番号 22743：シンウチ 1 キロ粒剤
(ブタクロール 5.0%・ペントキサゾン 1.5%粒剤)**

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ クログワイ コウキヤガラ	植代後~移植前 7 日 または 移植直後~ノビエ 1 葉期 ただし、移植後 30 日まで	1 kg/10 a	1 回	湛水散布
		移植時			田植同時散布機で施用

ブタクロールを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内

9. 登録番号 21459 : マーシェット粒剤 5 (ブタクロール 5.0%粒剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ブタクロールを含む農薬の総使用回数
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	植代後～ 移植 7 日前まで	2~3 kg/10 a	1 回	湛水散布	2 回以内
		移植後 3 日～ ルビエ 1.5 葉期 ただし、 移植後 30 日まで	3 kg/10 a			

10. 登録番号 21835 : アークエース 1 キロ粒剤 (ブタクロール 7.5%・ACN9.0%粒剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ブタクロールを含む農薬の総使用回数	ACN を含む農薬の総使用回数
移植 水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ アオミドロ・ 藻類による 表層はく離	植代後～移植7日前 または 移植直後～ルビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで	1 kg/10 a	1 回	湛水散布 又は 無人航空機 による 散布	2 回以内	3 回以内
		移植時			田植同時 散布機で施 用		

1 1. 登録番号 22430 : デルカット乳剤 (オキサジアゾン 8.0%・ブタクロール 12.0%乳剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	オキサジアゾンを含む農薬の総使用回数	ブタクロールを含む農薬の総使用回数
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ クログワイ コウキヤガラ	植代時 (移植 4 日前まで)	500 mL/10 a	1 回	植代時に原液のまま散布し混和する。 または、 植代直後原液のまま散布し、ただちに整地板で均平作業を行う。	1 回	2 回以内
	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ		250~350 mL/10 a (少量散布)				
いぐさ	水田一年生雑草 スズメノテッポウ	植付後~ スズメノテッポウ 3 葉期 または ヒエ 1.5 葉期	300~500 mL/10 a		原液湛水散布		1 回

1 2. 登録番号 23099 : イネゼットEW (ブタクロール 12.0%・ペントキサゾン 4.0%乳剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ クログワイ コウキヤガラ	植代後~移植前 7 日 または 移植直後~ ¹ / ₁₀ 葉期 ただし、移植後 30 日まで	500 mL/10 a	1 回	原液湛水散布
		移植時			田植同時散布機で施用
		植代時 (移植 7 日前まで)			植代時に原液のまま散布し混和する
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ	湛水直播の代かき時 (は種 7 日前まで)	300 mL/10 a		代かき時に原液のまま散布し混和する
		湛水直播の代かき後 ~は種前 7 日			原液湛水散布

ブタクロールを含む 農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内

1 3. 登録番号 23507 : クラールEW (ジメタメトリン 0.50%・ブタクロール 20.0%乳剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ アオミドロ・藻類による表層はく離	植代後~移植 7 日前 又は 移植直後~ ¹ / ₁₀ 葉期 但し、 移植後 30 日まで	500 mL/10 a	1 回	原液湛水散布

ジメタメトリンを含む 農薬の総使用回数	ブタクロールを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内

1 4. 登録番号 23820 : クラール 1 キロ粒剤

(ジメタメトリン 0.30%・ブタクロール 7.5%粒剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植時	1 kg/10 a	1 回	田植同時散布機で施用
		植代後~移植 7 日前 又は 移植直後~ ルビエ 1.5 葉期 ただし、 移植後 30 日まで			湛水散布又は 無人航空機 による散布

ジメタメトリンを含む 農薬の総使用回数	ブタクロールを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内

15. 登録番号 23987：アネシス 1 キロ粒剤

(ピラゾスルフロンエチル 0.30%・ブタクロール 10.0%・ベンゾビシクロン 2.0%粒剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植 水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ	移植時	1 kg/10 a	1 回	田植同時散布機で 施用
		移植直後～ ¹ / ₁₀ 2.5 葉期 ただし、 移植後 30 日まで			湛水散布又は 無人航空機による 散布
直播 水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ¹ / ₁₀ 2.5 葉期 ただし、 収穫 90 日前まで			

ピラゾスルフロンエチルを含む 農薬の総使用回数	ブタクロールを含む 農薬の総使用回数	ベンゾビシクロンを含む 農薬の総使用回数
1 回	2 回以内	3 回以内

16. 登録番号 24384：イネサポート B 1 キロ粒剤

(ブタクロール 10.0%・フロルピラウキシフェンベンジル 1.5%粒剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植 水稻	一年生雑草及び ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ セリ	移植後 5 日～ビエ 2.5 葉期 ただし、 移植後 30 日まで	1 kg/10 a	1 回	湛水散布

ブタクロールを含む 農薬の総使用回数	フロルピラウキシフェンベンジルを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	3 回以内