

有効成分チオベンカルブ（別名ベンチオカーブ）を含有する農薬の使用方法

1. 登録番号 11044 : サターン乳剤

(ベンチオカーブ 50.0%乳剤)

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用方法	ベンチオカーブを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈 水量			
直播水稻	一年生雑草 マツバゴイ	は種直後~稻出芽前 (入水 15 日前まで)	600~ 1200 mL /10 a	50~100 L /10 a	1 回	乾田・ 落水状態で 全面 土壤散布	1 回
		稻出芽揃期~ ハビエ 1.5 葉期、 但し、収穫 90 日前 まで (入水 15 日前まで)	1000~ 1500 mL /10 a				
稻(箱育苗)	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草発生)	育苗箱 (30×60 cm) 1 箱当たり 0.13 mL	育苗箱 (30×60 cm) 1 箱当たり 13 mL	1 回	育苗箱の 土壤に 均一に 散布する	1 回
レタス(春播移植栽培) レタス(トネル・マルチ栽培) 非結球レタス(春播移植栽培) 非結球レタス(トネル・マルチ栽培)	一年生雑草	定植前、マルチ前 (雑草発生前)	800~ 1000 mL /10 a	60~100 L /10 a	3 回 以内	土壤 全面処理	
すぎ(床替床) ひのき(床替床) えぞまつ(床替床) とどまつ(床替床)		床替活着後 雑草発生前	600~ 800 mL /10 a	200~300 L /10 a (200~300 mL/m ²)		所定薬量を 所定量の 水にうすめ 噴霧機 などで 土壤面に むらなく 散布する	3 回以内

2. 登録番号 12967 : サターンバアロ乳剤

(プロメトリン 5.0%・ベンチオカーブ 50.0%乳剤)

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	プロメトリンを 含む農薬の 総使用回数	ベンチオカーブ を 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈 水量				
直播水稻	一年生雑草 マツバゴ	は種直後～ 稻出芽前 (ハビエ 1 葉期 まで) (入水 15 日前 まで)	600～800 mL/10 a			乾田・ 落水状態 で全面 土壌散布	1 回	1 回
はとむぎ	一年生雑草	は種直後 (雑草発生前)	500 mL/10 a	70～100 L/10 a	1 回	全面 土壌散布		
にんじん			600～1000 mL/10 a				2 回以内	
とうもろこし		は種後出芽前	800～1000 mL/10 a				1 回	
らっかせい			600～800 mL/10 a				2 回以内	1 回
いんげんまめ			600～1000 mL/10 a				1 回	
だいいず		は種直後～ 麦出芽前	500～750 mL/10 a				2 回以内	
麦類								

3. 登録番号 14298 : サターンバアロ粒剤

(プロメトリン 0.80%・ベンチオカーブ 8.0%粒剤)

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用 回数	使用方法	プロメトリンを 含む農薬の 総使用回数	ベンチオカーブ を 含む農薬の 総使用回数
直播水稻	一年生雑草 マツハイ	は種直後～ 稲出芽前 (ハビエ発生始期まで) (入水 15 日前まで)	4~6 kg/10 a	1 回	乾田・ 落水状態で 全面土壤散布	1 回	1 回
小麦		は種後～出芽前 (雑草発生前)	3~6 kg/10 a		2 回以内	1 回	1 回
大麦		生育初期 (小麦の 4 葉期まで、 スズメノテッポウ 1.5 葉期 まで)	3~5 kg/10 a				
とうもろこし		は種後～出芽前 (雑草発生前)	4~6 kg/10 a			1 回	
だいいず		は種直後	4~6 kg/10 a			2 回以内	
らっかせい		は種後～出芽前 (雑草発生前)	4~6 kg/10 a		1 回	3 回以内	3 回以内
にんじん		は種直後 (雑草発生前)	4~6 kg/10 a				
たまねぎ		定植直後 (雑草発生始期まで)	4~5 kg/10 a				
ねぎ		植付後 (雑草発生前)	4~6 kg/10 a	3 回 以内			
つつじ類 つばき類		春期発芽前 又は夏切後 (雑草発生前)	5~6 kg/10 a	2 回 以内			
桑							

4. 登録番号 18606 : クリアターン乳剤

(ベンチオカーブ 50.0%・ペンディメタリン 5.0%・リニュロン 7.5%乳剤)

作物名	適用 雑草名	使用 時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	ベンチオカーブ を 含む農薬の 総使用回数	ペンディメタリンを 含む農薬の 総使用回数	リニュロンを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈 水量					
だいじ えだまめ	一年生 雑草	は種直後 (雑草発生前)	500~800 mL/10 a	70~100 L/10 a	1回	全面 土壌 散布	1回	1回	2回以内 (全面土壌 散布は 1回以内、 雑草茎葉兼 土壌散布は 1回以内)
		定植 3日前ま で(雑草発生 前)	500~700 mL/10 a						
		は種直後 (雑草 発生前)	400~700 mL/10 a						1回
			500~700 mL/10 a						
			500~800 mL/10 a						
		植付後 ~萌芽期 (雑草発生前)	600~800 mL/10 a						
		は種直後 (雑草発生前)	500~700 mL/10 a						2回以内 (は種直後は 1回以内、 にんじん 3~5葉期は 1回以内)
らっかせい				100 L/10 a					1回

5. 登録番号 18859 : クリアターン細粒剤F

(ベンチオカーブ 8.0%・ペンディメタリン 0.80%・リニュロン 1.2%粉粒剤)

作物名	適用 雑草名	使用 時期	使用量	本剤の 使用 回数	使用 方法	ベンチオカーブを 含む農薬の 総使用回数	ペンディメタリンを 含む農薬の 総使用回数	リニュロンを含む 農薬の 総使用回数					
小麦	一年生 雑草	は種直後 (雑草発生前)	4~5 kg/10 a	1 回	全面土壤 散布	1 回	1 回	1 回					
大麦													
飼料用とうも ろこし													
だいす えだまめ								2 回以内 (全面土壤散布は 1 回以内、雑草 茎葉兼土壤散布 は 1 回以内)					
にんじん													
ばれいしょ		植付後 ~萌芽前 (雑草発生前)						2 回以内 (は種直後は 1 回 以内、にんじん 3~5 葉期は 1 回 以内)					
さといも													

6. 登録番号 23572 : ゲキテツ 1 キロ粒剤

(ピラゾスルフロンエチル 0.30%・ベンチオカーブ 21.0%・ペントキサゾン 4.0%粒剤)

作物名	適用 雑草名	使用時 期	適用 土壤	使 用 量	本剤 の 使 用 回 数	使 用 方 法	適用地帯	ピラゾスル フロンエチル を含む 農薬の 総使 用回 数	ベンチオカーブ を含む農 薬の總使 用回数	ペントキサゾンを 含む農薬の總 使用回数
移植水 稻	水田 一年生 雜草 マツハイ ホタルイ カリカワ ミズガヤツ リ ヘラオモダカ (東北) ヒルムシロ セリ	移植直 後 ~ハピエ 2葉期 但し、 移植後 30日ま で	砂壌土 ~埴土	1kg /10a	1回	湛水 散布	東北	1回	1回	2回以内
			壤土~ 埴土				北陸、関東・東山・東 海の普通期及び早期 栽培地帯、近畿・中 国・四国、九州の普通 期栽培地帯			
		移植時	砂壌土 ~埴土		1回	田植 同時 散布 機で 施用	東北			
			壤土~ 埴土				北陸、関東・東山・東 海の普通期及び早期 栽培地帯、近畿・中 国・四国、九州の普通 期栽培地帯			