

有効成分フェンメディファムを含有する農薬の使用法

1. 登録番号 22019：ベタナール乳剤
(フェンメディファム 14.7%乳剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フェンメディファムを含む農薬の総使用回数
			薬量	水量			
てんさい (移植栽培)	一年生 及び 多年生雑草	移植活着後、 中耕後 (雑草発生揃期) 但し、 収穫 60 日前まで	500~600 mL/10 a	50~80 L/10 a	3 回 以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	3 回 以内
		育苗期の 本葉展開後 (雑草発生初期)	1.5 mL/ ペーパーポット 6 冊 (0.75 mL/m ²)	300 mL/ ペーパーポット 6 冊 (150 mL/m ²)			
てんさい (直播栽培)		第 2 本葉展開後、 中耕後 (雑草発生揃期) 但し、 収穫 60 日前まで	500~600 mL/10 a	50~80 L/10 a			
		子葉展開期~ 本葉抽出期 (雑草発生揃期) 但し、 収穫 60 日前まで	150~200 mL/10 a				
とうき	一年生 広葉雑草	定植活着後 (雑草発生揃期) 但し、 収穫 60 日前まで	600 mL/10 a	80 L/10 a	2 回 以内		2 回 以内
		生育期、中耕後 (雑草発生揃期) 但し、 収穫 60 日前まで					

2. 登録番号 22820：ベタダイヤS乳剤

(デスメディファム 2.3%・フェンメディファム 10.0%・S-メトラクロール 7.5%乳剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	デスメディファムを含む農薬の総使用回数	フェンメディファムを含む農薬の総使用回数	S-メトラクロールを含む農薬の総使用回数
			薬量	水量					
てんさい (移植栽培)	一年生雑草	移植活着後の 雑草発生揃期 但し、収穫 90 日前まで	500 mL/10 a	50~100 L/10 a	1 回	雑草茎 葉散布 又は全 面散布	2 回 以内	3 回 以内	2 回 以内
		てんさい 7 葉期以降の 中耕後 (雑草発生揃期) 但し、収穫 90 日前まで							
てんさい (直播栽培)									

3. 登録番号 23041 : ベタハーブフロアブル

登録番号 23042 : ホクサンベタハーブフロアブル

(フェンメディファム 9.0%・メタミトロン 27.0%水和剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フェンメディファムを含む農薬の総使用回数	メタミトロンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
てんさい (移植栽培)	一年生 広葉雑草	移植活着後 (雑草発生揃期) 但し、収穫 60日前まで	500~700 mL/10 a	50~100 L/10 a	3回 以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	3回 以内	5回 以内
てんさい (直播栽培)		第2本葉展開後 (雑草発生揃期) 但し、収穫 60日前まで	400~600 mL/10 a					
とりかぶと (薬用)		とりかぶと 生育期、 雑草発生揃期 但し、収穫 30日前まで	500~700 mL/10 a	100 L/10 a	2回 以内			

4. 登録番号 23802 : ビートアップフロアブル

登録番号 23803 : ホドガヤユーピーエルビートアップフロアブル

(フェンメディファム 16.0%水和剤)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フェンメディファムを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
てんさい (移植栽培)	一年生 広葉雑草	育苗期の本葉展開後 (雑草発生初期)	0.5~0.75 mL/m ²	150 mL/m ²	3回 以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	3回 以内
			1.0~1.5 mL/ペーパーポット 6冊(0.5~0.75 mL/m ²)	300 mL/ペーパーポット 6冊(150 mL/m ²)			
てんさい (直播栽培)		移植活着後、中耕後 雑草発生揃期 但し、収穫 60 日前まで	400~600 mL/10 a	50~100 L/10a			
	第2本葉展開後、 中耕後 雑草発生揃期 但し、収穫 60 日前まで						
		子葉展開期~ 本葉抽出期 雑草発生揃期 但し、収穫 60 日前まで	150~350 mL/10 a				