

有効成分フェリムゾンを含む農薬の使用法

1. 登録番号17948：ブラシン粉剤DL、
 登録番号17949：ホクコーブラシン粉剤DL
 （フェリムゾン2.0%・フサライド1.5%粉剤）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	内穎褐変病 稲こうじ病 もみ枯細菌病	4 kg/10 a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内
	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 穂枯れ(すじ葉枯病菌) 変色米(カーブリア菌) 変色米(エビコッカム菌)	3~4 kg/10 a					

2. 登録番号17951：ブラシンバリダ粉剤DL
 （バリダマイシン0.30%・フェリムゾン2.0%・フサライド1.5%粉剤）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) 変色米(アルタリア菌) 変色米(カーブリア菌) 変色米(エビコッカム菌)	3~4 kg/10 a	収穫14日前まで	2回以内	散布	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)	2回以内	3回以内

3. 登録番号17954：ノンブラス粉剤DL
 （トリシクラゾール0.50%・フェリムゾン2.0%粉剤）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 穂枯れ(すじ葉枯病菌) 変色米(カーブリア菌)	3~4 kg/10 a	収穫7日前まで	2回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内)	2回以内
	内穎褐変病 もみ枯細菌病 稲こうじ病	4 kg/10 a					

4. 登録番号 17955 : ノンブラスバリダ粉剤DL

(トリシクラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %・フェリムゾン 2.0 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) 変色米(カーブリア菌)	3~4 kg/10 a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への 処理は 1 回以内、 本田では 3 回以内)	6 回以内 (育苗箱 灌注は 1 回以内、 本田では 5 回以内)	2 回以内

5. 登録番号 18170 : ブラシントレボン粉剤DL、

登録番号 18171 : ホクコーブラシントレボン粉剤DL

(エトフェンプロックス 0.50 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 変色米(カーブリア菌) ツマグロヨコバイ ウカ類	3~4 kg/10 a	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	散布	3 回以内	2 回以内	3 回以内
	カメムシ類	4 kg/10 a						

6. 登録番号 18173 : ノンブラストレボン粉剤DL

(エトフェンプロックス 0.50 %・トリシクラゾール 0.50 %・フェリムゾン 2.0 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) ツマグロヨコバイ ウカ類	3~4 kg/10 a	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	散布	3 回以内	4 回以内 (育苗箱への 処理は 1 回以内、 本田では 3 回以内)	2 回以内
	カメムシ類	4 kg/10 a						

7. 登録番号 18174 : ブラシントレバリダ粉剤DL、
 登録番号 18175 : ホクコーブラシントレバリダ粉剤DL
 (エトフェプロックス 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェプロックスを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 変色米(アルナリア菌) 変色米(カーブリア菌) 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) ツマグロヨコバイ ウカ類 イコ類	3~4 kg/10 a	収穫 14日前 まで	2回 以内	散布	3回以内	6回以内(育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)	2回以内	3回以内
	カメシ類	4 kg/10 a							

8. 登録番号 18177 : ノンブラストレバリダ粉剤DL
 (エトフェプロックス 0.50 %・トリシクラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %・フェリムゾン 2.0 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェプロックスを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 変色米(カーブリア菌) ツマグロヨコバイ ウカ類 コブノメイガ	3~4 kg/10 a	収穫 14日前 まで	2回 以内	散布	3回以内	4回以内 (育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)	2回以内
	カメシ類	4 kg/10 a							

9. 登録番号 18232 : ブラシントレボン水和剤

(エトフェプロックス 5.0 %・フェリムゾン 15.0 %・フサライド 10.0 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェプロックスを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) ツマグロヨコバイ ウカ類 カメムシ類	500 倍	60~150 L/10 a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内	散布	3 回以内	2 回以内	3 回以内

10. 登録番号 18235 : ブラシントレバリダ水和剤

(エトフェプロックス 5.0 %・バリダマイシン 2.5 %・フェリムゾン 15.0 %・フサライド 10.0 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) ツマグロヨコバイ ウカ類 カメムシ類	500 倍	60~150 L/10 a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布

エトフェプロックスを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
3 回以内	6 回以内(育苗箱灌注は 1 回以内、本田では 5 回以内)	2 回以内	3 回以内

11. 登録番号 18526 : タケブラス

(フェリムゾン 30.0 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内

1 2. 登録番号 18755 : ホクコーブラシンゾル、
登録番号 18756 : ブラシンゾル

(フェリムゾン 20.0 %・フサライド 15.0 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	フェリムゾン を含む農薬の 総使用回数	フサライド [®] を含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病	原液	120 mL/10 a	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	空中散布	2 回以内	3 回以内
		30 倍	3 L/10 a					
	いもち病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 もみ枯細菌病	8 倍	800 mL/10 a			無人ヘリコプター による散布		

1 3. 登録番号 19023 : ブラシンバリダゾル

登録番号 19024 : ホクコーブラシンバリダゾル

(バリダマイシン 5.0 %・フェリムゾン 20.0 %・フサライド 15.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	バリダマイシンを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾン を含む農薬の 総使用回数	フサライド [®] を含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	30 倍	3 L/10 a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内	空中散布	6 回以内(育苗 箱灌注は 1 回 以内、本田で は 5 回以内)	2 回以内	3 回以内
		8 倍	800 mL/10 a			無人ヘリコプター による散布			

1 4. 登録番号 19165 : ブラシンフロアブル

登録番号 19166 : ホクコーブラシンフロアブル

(フェリムゾン 15.0 %・フサライド 15.0 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	フェリムゾン を含む農薬 の総使用 回数	フサライド [®] を含む農薬 の総使用 回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 褐条病 変色米(カーブリア菌) 変色米(エビコッカム菌) 変色米(アルタリア菌) 稲こうじ病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 墨黒穂病	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	散布	2 回以内	3 回以内
		300 倍	25 L/10 a					
		30 倍	3 L/10 a			空中散 布		
		8 倍	800 mL/10 a			無人航 空機に よる散 布		

1 5. 登録番号 19352 : ブラシンバリダフロアブル

登録番号 19353 : ホクコーブラシンバリダフロアブル

(バリダマイシン 5.0 %・フェリムゾン 15.0 %・フサライド 15.0 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 変色米(カーブリア菌)	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	6 回以内 (育苗箱灌注は 1 回以内、本田では 5 回以内)	2 回以内	3 回以内
	疑似紋枯症(赤色菌核病菌)	30 倍	3 L/10 a			空中散布			
	疑似紋枯症(褐色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) 内穎褐変病 ごま葉枯病 もみ枯細菌病	8 倍	800 mL/10 a			無人航空機による散布			

1 6. 登録番号 20090 : ノンブラスフロアブル

(トリシクラゾール 8.0 %・フェリムゾン 15.0 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 変色米(アルタナリア菌) 変色米(エビコッカム菌) 変色米(カーブリア菌) もみ枯細菌病 内穎褐変病 稲こうじ病	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理は 1 回以内、本田では 3 回以内)	2 回以内
	いもち病	300 倍	25L/10a			空中散布		
		原液	120 mL/10 a					
		8 倍	800 mL/10 a					
		30 倍	3L/10a					
8 倍	800 mL/10 a	無人航空機による散布						

17. 登録番号 20804 : ハスラー粉剤DL

(カルタップ 2.0 %・クロチアニジン 0.15 %・バリダマイシン 0.30 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	ウカ類 ツマグロヨコバイ ニカメチユウ イネツトシ フタバヒコヤガ いもち病	3~4 kg/10 a	収穫 21 日前まで	2 回以内	散布
	コブノメカ カメシ類 紋枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 変色米(カーブリア菌) 内穎褐変病	4 kg/10 a			

カルタップを含む農薬の総使用回数	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
6 回以内(浸種前は 1 回以内、浸種後から直播では種時又は移植時までの処理は 1 回以内)	4 回以内(直播では種時又は移植時までの処理は 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計 3 回以内)	6 回以内(育苗箱灌注は 1 回以内、本田では 5 回以内)	2 回以内	3 回以内

18. 登録番号 21186 : ブラシダントツ粉剤DL

(クロチアニジン 0.15 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類 フタバヒコヤガ	3~4 kg/10 a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	4 回以内(直播では種時又は移植時までの処理は 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人機散布は合計 3 回以内)	2 回以内	3 回以内

19. 登録番号 21218 : ブラシندانトツH粉剤DL

(クロチアニジン 0.50%・フェリムゾン 2.0%・フサライド 1.5%粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロチアニジンを含む 農薬の総使用回数	フェリムゾンを含 む農薬の 総使用回数	フサライドを含 む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) ウカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタヒコヤガ イネツトムシ カメムシ類	3~4 kg/10 a	収穫 7日前 まで	2回 以内	散布	4回以内(直播での は種時又は移植時 までの処理は 1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人ヘリ散布は 合計3回以内)	2回以内	3回以内

20. 登録番号 21702 : ブラシندانトツフロアブル

(クロチアニジン 6.6%・フェリムゾン 15.0%・フサライド 15.0%水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロチアニジンを含 む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを含 む農薬の 総使用回数	フサライドを含 む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウカ類 カメムシ類	8倍	800 mL/10 a	収穫 7日前 まで	2回 以内	無人ヘリコプター による散布	4回以内(直播 での種時 又は移植時 までの処理は 1回以内、本田 での散布、空中 散布、無人ヘリ 散布は合計3回 以内)	2回以内	3回以内
		30 倍	3 L/10 a			空中散布			
		300 倍	25 L/10 a			散布			
	いもち病 穂枯れ(ごま 葉枯病菌) ごま葉枯病 ウカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類	1000 倍	60~150 L/10 a						

21. 登録番号 21889 : ブラシンキラップ粉剤DL

登録番号 22964 : ホクコーブラシンキラップ粉剤DL

(エチプロール 0.50%・フェリムゾン 2.0%・フサライド 1.5%粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	エチプロールを含 む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを含 む農薬の 総使用回数	フサライドを含 む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま 葉枯病菌) カメムシ類 ウカ類	3~4 kg/10 a	収穫 14日前 まで	2回 以内	散布	2回以内(は種時 (直播)又は移植時 までの処理は 1回以内)	2回以内	3回以内

2 2. 登録番号 22257 : ノンブラスダントツフロアブル

(クロチアニジン 6.6 % ・ トリシクラゾール 8.0 % ・ フェリムゾン 15.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希積 倍数	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
稲	いもち病 ウカ類 カメシ類	8 倍	800 mL/10 a	収穫 7 日前まで	2 回以内	空中散布 無人航空機に よる散布
	いもち病 カメシ類	300 倍	25 L/10 a			散布
	いもち病 ウカ類 カメシ類	1000 倍	60~150 L/10 a			

クロチアニジンを含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の 総使用回数
4 回以内 (直播では種時又は移植時までの 処理は 1 回以内、本田での散布、 空中散布、無人航空機散布は 合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理は 1 回以内、 本田では 3 回以内)	2 回以内

2 3. 登録番号 22568 : トルファン

登録番号 24421 : 住化トルファン

(バリダマイシン 5.0 % ・ フェリムゾン 30.0 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	使用量		使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	バリダマイシンを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の 総使用回数
		薬量	希積 水量					
日本芝	ヘルミトスポリウム葉枯病 カーブリア葉枯病 葉腐病(ラージパッチ)	0.5~1 g/m ²	1 L/m ²	発病 初期	8 回 以内	散布	8 回以内	8 回以内
西洋芝 (ベントグラス)	ヘルミトスポリウム葉枯病 カーブリア葉枯病 葉腐病(ブ라운パッチ) 炭疽病	0.5~1 g/m ²	1 L/m ²	発病 初期	8 回 以内	散布	8 回以内	8 回以内
	タラースポット病	0.5 g/m ²	0.5~1 L/m ²					
	ヒシム病 赤焼病 葉腐病(ブ라운パッチ)		0.2 L/m ²					

24. 登録番号 22891 : ノンプラスバリダダントツフロアブル

(クロチアニジン 6.6 %・トリシクラゾール 8.0 %・バリダマイシン 5.0 %・フェリムゾン 15.0 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 ウカ類 カメシ類	8 倍	800 mL/10 a	収穫 14 日前 まで	2 回以内	無人航空機 による散布
		300 倍	25 L/10 a			散布
	穂枯れ(ごま葉枯病菌) イゴ類	1000 倍	60~150 L/10a			

クロチアニジンを含む 農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む 農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む 農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む 農薬の総使用回数
4 回以内(直播では種時 又は移植時までの処理は 1 回以内、本田での散布、 空中散布、無人航空機散布は 合計 3 回以内)	4 回以内(育苗箱への処理は 1 回以内、 本田では 3 回以内)	6 回以内(育苗箱灌 注は 1 回以内、本田 では 5 回以内)	2 回以内

25. 登録番号 22927 : ブラシキラップフロアブル

登録番号 22963 : ホクコーブラシキラップフロアブル

(エチプロール 5.0 %・フェリムゾン 15.0 %・フサライド 15.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	エチプロールを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 カメシ類	300 倍	25 L/10 a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内	散布	2 回以内 (は種時(直 播)又は移 植時まで の処理は 1 回以内)	2 回以内	3 回以内
	いもち病 カメシ類 ウカ類	1000 倍	60~150 L/10 a						
		8 倍	800 mL/10 a						

26. 登録番号 23602 : ハスラー R X 粉剤 D L

(クロチアニジン 0.50%・メトキシフェノジド 0.50%・バリダマイシ 0.30%・フェリムゾン 2.0%・フサライド 1.5% 粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) ウカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ イネトムシ フタホシコヤカ コメイチュウ カメムシ類	3~4 kg/10 a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布
	内穎褐変病 変色米(アルナリア菌) 変色米(カーバラリア菌) 稲こうじ病	4 kg/10 a			

クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	メキシフェノジドを含む農薬の総使用回数	バリダマイシを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
4 回以内(直播での種時又は移植時までの処理は 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計 3 回以内)	3 回以内	6 回以内(育苗箱灌注は 1 回以内、本田では 5 回以内)	2 回以内	3 回以内

27. 登録番号 23690 : ノンブラスバリダフロアブル

(トリシクラゾール 8.0%・バリダマイシ 5.0%・フェリムゾン 15.0% 水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布
	紋枯病 もみ枯細菌病	8 倍	800 mL/10 a			無人航空機による散布
	いもち病 紋枯病	300 倍	25 L/10 a			散布

トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数	バリダマイシを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数
4 回以内(育苗箱への処理は 1 回以内、本田では 3 回以内)	6 回以内(育苗箱灌注は 1 回以内、本田では 5 回以内)	2 回以内

28. 登録番号 24346 : ブレードスタークルゾル

(ジノテフラン 10.0 %・フェリムゾン 15.0 %・フサライド 15.0 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 稲こうじ病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 変色米(カーブリア菌) 変色米(アルナリア菌) ウカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内	散布
		300 倍	25 L/10 a			
		8 倍	800 mL/10 a			無人航空機による 散布

ジノテフランを含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の 総使用回数	フサライドを含む農薬の 総使用回数
4 回以内(育苗箱への処理及び側条施用は 合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、 無人航空機散布は合計 3 回以内)	2 回以内	3 回以内

29. 登録番号 24347 : ブレードスタークル粉剤DL

(ジノテフラン 0.35 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ウカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	3~4 kg/10 a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布

ジノテフランを含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の 総使用回数	フサライドを含む農薬の 総使用回数
4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は 合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、 無人航空機散布は合計 3 回以内)	2 回以内	3 回以内

30. 登録番号 24608 : ブレードスタークルRゾル

(ジノテフラン 9.0 %・フェリムゾン 13.5 %・フサライド 13.5 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ウカ類 カメシ類 ツマグロヨコバイ	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布
		300 倍	25 L/10 a			
		8 倍	800 mL/10 a			無人航空機による散布

ジノテフランを含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の 総使用回数	フサライドを含む農薬の 総使用回数
4 回以内(育苗箱への処理及び側条施用は 合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、 無人航空機散布は合計 3 回以内)	2 回以内	3 回以内