

有効成分プロパモカルブ塩酸塩を含有する農薬の使用法

1. 登録番号 17197：プレビクールN液剤、
 登録番号 17198：日曹プレビクールN液剤
 （プロパモカルブ塩酸塩 64.0 %液剤）

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	プロパモカルブ塩酸塩を 含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	赤焼病	400~600 倍	1 L/m ²	発病初期	8 回以内	散布	8 回以内
	ピシウム病	500 倍	0.5 L/m ²				

2. 登録番号 21945：ターフシャワー
 （プロパモカルブ塩酸塩 66.7 %液剤）

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	プロパモカルブ塩酸塩を 含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	赤焼病	400~600 倍	1 L/m ²	発病初期	8 回以内	散布	8 回以内
	ピシウム病	500 倍	0.5 L/m ²				

3. 登録番号 22098：リライアブルフロアブル
 （フルオピコリド 5.5 %・プロパモカルブ塩酸塩 55.5 %水和剤）

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	フルオピコリドを 含む農薬の 総使用回数	プロパモカルブ塩酸塩 を含む農薬の 総使用回数
ばれいしょ	疫病	200~250 倍	25 L/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回 以内	散布	3 回以内	3 回以内
		800~1000 倍	100~300 L/10 a					
		16 倍	1.6~4 L/10 a			無人 航空機 による 散布		
		20~25 倍	3~5 L/10 a					
		40~50 倍	5~10 L/10 a					
		100 倍	10~20 L/10 a					
たまねぎ	べと病	500 倍	100~300 L/10 a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内	散布	2 回以内	