

有効成分プロスルホカルブを含有する農薬の使用法

1. 登録番号 22775：ボクサー

(プロスルホカルブ 78.4 %乳剤)

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	プロスルホカルブを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈 水量			
小麦	一年生 雑草	秋播栽培のは種後 ～麦 2 葉期 (雑草発生前～ 発生始期)	400～500 mL/10 a	50～100 L/10 a	2 回 以内	雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	2 回以内
		秋播栽培の麦 2～4 葉期 (雑草発生前～ 発生始期)		70～100 L/10 a			
		春播栽培のは種後 出芽前～出芽揃期 (雑草発生前～ 発生始期)		100 L/10 a			
大麦		秋播栽培のは種後 ～麦 2 葉期 (雑草発生前～ 発生始期)	500 mL/10 a	70～100 L/10 a	1 回	雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	1 回
麦類(大麦、 小麦を除く)							
とうもろこし		は種後出芽前 (雑草発生前)	400～500 mL/10 a	100 L/10 a			
飼料用 とうもろこし		植付後萌芽前 (雑草発生前)					
ばれいしょ		定植後又は中耕後 (雑草発生前) 但し、収穫 45 日 前まで		100～200 L/10 a	2 回 以内		2 回以内
たまねぎ							

2. 登録番号 22776 : ムギレンジャー乳剤

(プロスルホカルブ 46.0 %・リニュロン 11.5 %乳剤)

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	プロスルホカルブを 含む農薬の 総使用回数	リニュロンを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量				
小麦 大麦	一年生 雑草	春播栽培の は種後出芽前 (雑草発生前)	400~600 mL/10 a	通常散布 50~100 L/10 a 少量散布 25~50 L/10 a	1 回	全面 土壌散布	2 回以内	1 回
		秋播栽培の は種後出芽前 (雑草発生前)	300~600 mL/10 a					
ばれい しよ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	400~600 mL/10 a			雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	1 回	
		植付後萌芽前 (雑草発生前)	300~600 mL/10 a					

3. 登録番号 23013 : キックボクサー細粒剤 F

(プロスルホカルブ 7.0 %・リニュロン 1.75 %粒剤)

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用 回数	使用 方法	プロスルホカルブを 含む農薬の 総使用回数	リニュロンを 含む農薬の 総使用回数
小麦 (秋播)	一年生 雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	3~4 kg/10 a	1 回	全面 土壌散布	2 回以内	1 回
大麦 (秋播)							