

資料7（類似するものとの比較）

加糖加熱処理大豆油かす

1 暫定値申請

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維		TDN
加糖加熱処理大豆油かす	11.0	45.4	2.0	31.7	3.5	6.4									93	76	96	99	80.4	大豆油かすに1.5～2.0%のビートシロップを加え、90～105℃で20～45分間加熱処理したものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
試料数	21	21	21	21	21	21														
標準偏差	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	0.3														
最大値	12.3	47.1	3.0	33.0	4.7	7.1														
最小値	9.7	43.9	1.2	30.5	2.3	5.9														

2 類似する飼料の既存の日本標準飼料成分表及び暫定値

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維		TDN
加糖加熱処理大豆油かす	10.2	47.5	1.2	31.8	3.3	6.1		—	—	—	—	—	—	—	94	58	98	100	80.6	大豆油かすに1.5～2%のコーンシロップを加え、90～105℃で20～45分間加熱処理したものであること。

資料7（類似するものとの比較）

加糖加圧蒸煮処理大豆油かす

1 暫定値申請

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維		TDN
加糖加圧蒸煮処理大豆油かす	8.5	45.8	1.7	32.9	5.0	6.1									92	58	99	93	81.6	大豆油かすに0.5～2.0%のぶどう糖を加え、120～140℃で5～30分間蒸煮処理したものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
試料数	20	20	20	20	20	20														
標準偏差	0.9	0.6	0.3	0.4	0.2	0.1														
最大値	9.9	46.8	2.2	33.5	5.4	6.3														
最小値	7.4	44.8	1.1	32.3	4.5	6.0														

2 類似する飼料の既存の日本標準飼料成分表及び暫定値

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維		TDN
加湿加熱処理大豆油かす	10.3	45.0	1.3	31.9	5.1	6.4		—	—	—	—	—	—	—	93	97	99	100	81.4	脱皮大豆油かすに大豆皮を3%程度混合したもの又は大豆油かすに、30%程度加水した上で90℃以上で3時間程度加熱処理したものであること。
加糖加熱処理大豆油かす	10.2	47.5	1.2	31.8	3.3	6.1		—	—	—	—	—	—	—	94	58	98	100	80.6	大豆油かすに1.5～2%のコーンシロップを加え、90～105℃で20～45分間加熱処理したものであること。

資料7（類似するものとの比較）

ひまわり油かす

1 暫定値申請

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維		TDN
ひまわり油かす	10.4	37.8	0.5	29.4	14.5	7.4									91	42	87	31	64.9	溶媒抽出で得られた搾油かすであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
試料数	20	20	20	20	20	20														
標準偏差	0.2	0.4	0.1	0.6	0.5	0.1														
最大値	10.7	38.5	0.7	30.8	15.5	7.7														
最小値	10.1	37.1	0.4	28.2	13.4	7.2														

2 類似する飼料の既存の日本標準飼料成分表及び暫定値

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維		TDN
ひまわり油かす	10.2	32.0	1.2	28.0	22.4	6.2		37.8	1,590	77	50	41	20	42.0	83	86	36	22	43.9	

資料7（類似するものとの比較）

油ヤシ搾油副産物

1 暫定値申請

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維		TDN
油ヤシ搾油副産物	4.7	8.6	39.8	27.3	11.7	7.8		48.3	2,920											油ヤシ空果房を発生後速やかに搾油して得られた油及びパーム油搾油で発生するソリュブルを油ヤシ果実繊維に吸着させ乾燥したもの。栄養価は、暫定的に定めたものである。
試料数	20	20	20	20	20	20														
標準偏差	0.7	0.3	0.8	0.6	0.5	0.6														
最大値	6.0	9.3	41.4	28.3	12.6	8.8														
最小値	3.8	8.2	38.3	27.3	11.7	7.8														

2 類似する飼料の既存の日本標準飼料成分表及び暫定値

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維		TDN
油ヤシ空果房抽出物	53.6	4.0	10.2	24.4	0.1	7.7		59.7	1,420	8	85	68	—	36.4	97	100	88	100	48.4	油ヤシ空果房を糖化、発酵、固液分離し、その液体分を濃縮し、粗脂肪含量がおおむね10%のものであること。 栄養価は、暫定的に定めたものである。
パーム核油かす	11.5	15.7	1.1	56.4	11.5	3.8		34.7	1,370	65	52	77	48	60.4	82	80	88	50	70.2	

資料7（類似するものとの比較）

脂肪酸カルシウム

1 暫定値申請 単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考
	水分	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	粗灰分	G E	鶏		豚					牛					
								代謝率	M E	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	
脂肪酸カルシウム （アマニ油） 試料数 標準偏差 最大値 最小値	2. 3 20 0. 4 3. 4 1. 9	— — — — —	84. 6 20 0. 7 85. 7 83. 1	— — — — —	— — — — —	24. 2 20 1. 2 25. 5 22. 6		86. 4	6, 780	—	—	—	—	—	—	100	—	—	190	アマニ油の脂肪酸を80%以上含む脂肪酸であること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
脂肪酸カルシウム （オレイン酸） 試料数 標準偏差 最大値 最小値	2. 4 20 0. 8 4. 9 2. 3	— — — — —	83. 6 20 5. 0 40. 8 26. 2	— — — — —	— — — — —	23. 7 20 0. 1 0. 7 0. 4		—	—	—	—	—	—	—	—	99. 6	—	—	187	オレイン酸を60%以上含む脂肪酸であること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
脂肪酸カルシウム 試料数 標準偏差 最大値 最小値	3. 5 20 0. 2 4. 9 2. 3	— — — — —	84. 2 20 0. 8 40. 8 26. 2	— — — — —	— — — — —	22. 8 20 0. 3 0. 7 0. 4		82. 6	6, 480	—	89	—	—	168. 6	—	96	—	—	181. 9	大豆油の脂肪酸となたね油の脂肪酸を4:6～7:3で混合した脂肪酸であること。 栄養価は、暫定的に定めたものである。

2 類似する飼料の既存の日本標準飼料成分表及び暫定値 単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維	粗灰分	G E	鶏		豚					牛					
								代謝率	M E	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維	T D N	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維		T D N
脂肪酸カルシウム	3.5	—	84.2	—	—	22.8		—	—	—	89	—	—	168.6	—	96	—	—	181.9	大豆油の脂肪酸となたね油の脂肪酸を4:6～7:3で混合した脂肪酸であること。 栄養価は、暫定的に定めたものである。

資料7（類似するものとの比較）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考
	水分	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維	粗灰分	G E	鶏		豚					牛					
								代謝率	M E	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維	T D N	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維	T D N	
中鎖脂肪酸カルシウム	4.8	—	79.0	—	—	29.8		—	—	—	97	—	—	172.4	—	98	—	—	174.2	カプリル酸、カプリン酸及びラウリル酸を混合した脂肪酸であること。 栄養価は、暫定的に定めたものである。

資料7（類似するものとの比較）

2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニン

1 暫定申請値 単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考
	水分	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維	粗灰分	G E	鶏		豚					牛					
								代謝率	M E	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維	T D N	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維	T D N	
2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニン	10.9	—	—	89.1	—	—	4,995	79.9	3,991	—	—	100	—	89.1	—	—	100	—	89.1	飼料添加物であること。
試料数	25	—	—	25	—	—														
標準偏差	0.1	—	—	0.1	—	—														
最大値	11.1	—	—	89.4	—	—														
最小値	10.6	—	—	88.9	—	—														

2 類似する飼料の既存の日本標準飼料成分表及び暫定値 単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考
	水分	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維	粗灰分	G E	鶏		豚					牛					
								代謝率	M E	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維	T D N	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗組織維	T D N	
D L－メチオニン	0.5	57.5	0.0	0.0	0.0	1.0		99.5	4,920	100	－	－	－	57.5	－	－	－	－	－	飼料添加物であること。