

製油副産物・糖化副産物混合ふすま

1 暫定値申請															単位：％（GE、MEはMcal／kg）									
原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考				
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛									
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN					
製油・糖化副産物 混合ふすま	12.1	12.9	24.6	35.1	4.4	10.9	4.78	60.1	2.87	78	88	63	20	80.2	—	—	—	—	—	ふすま並びに食用油及び糖化製品のそれぞれの精製工程で発生する副産物を混合、乾燥したものであって、CPがおおむね13%、粗脂肪含量がおおむね25%のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。				
試料数	20	20	20	20	20	20																		
標準偏差	1.1	0.4	0.8	0.7	0.4	0.5																		
最大値	13.5	13.9	26.6	36.2	5.3	11.8																		
最小値	9.9	12.2	22.9	33.5	3.7	10.0																		

2 類似、関連する飼料の既存の日本標準飼料成分表又は暫定値																			単位：％（GE、MEはMcal／kg）	
原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	
ふすま	13.2	15.7	4.3	52.2	9.5	5.1	－	48.6	1.94	76	74	72	21	58.6	76	74	76	42	62.7	乾燥したものであること。
大豆油さい	15.5	－	－	－	－	－	－	86.0	5.35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	大豆油の製造工程で発生するアルカリ性油さいを中和したものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
なたね油さい	9.6	0.6	75.5	0.7	0.1	13.4	7.36	93.2	6.08	75	88	20	0	133.9	－	－	－	－	－	なたね油の製造工程で発生するアルカリ性油さいを中和したものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。

甘蔗茎粉末

1 暫定値申請

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考
	水分	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	粗灰分	G E	鶏		豚					牛					
								代謝率	M E	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	
甘蔗茎粉末（さとうきびミール（仮））	12.4	0.7	0.4	63.6	21.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	71	46	54.1	甘蔗の茎を粉砕し、発生する汁を戻して加熱乾燥したもの。栄養価は、暫定的に定めたものである。
試料数	20	20	20	20	20	20														
標準偏差	1.0	0.1	0.1	1.0	0.7	0.1														
最大値	13.9	1.1	0.6	65.2	22.3	2.0														
最小値	10.9	0.5	0.3	61.7	19.8	1.7														

2 類似、関連する飼料の既存の日本標準飼料成分表

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考
	水分	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	粗灰分	G E	鶏		豚					牛					
								代謝率	M E	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	
バガス	15.5	1.6	0.8	40.7	39.3	2.1	－	－	－	－	－	－	－	－	0	29	34	36	29.5	甘蔗から糖をとった残りものであること。
甘蔗梢頭部（ケイントップ）	9.8	4.2	1.6	43.7	32.2	8.5	－	－	－	－	－	－	－	－	54	52	62	60	50.6	