

なたね皮

1 暫定値申請										単位：％（GE、MEはMcal／kg）										
原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価										備考		
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE		粗繊維	TDN
なたね皮	13.0	13.4	15.1	27.0	26.9	4.6	4.65	45.1	2.06	30	92	37	25	50.0	36	99	48	41	57.7	栄養価は、暫定的に定めたものである。
試料数	20	20	20	20	20	20														
標準偏差	1.4	0.9	3.0	4.2	2.1	0.2														
最大値	15.0	15.3	21.2	31.9	31.4	4.8														
最小値	10.4	12.0	11.0	18.5	23.0	4.1														

2 類似する飼料の既存の日本標準飼料成分表及び暫定値																			単位：％（GE、MEはMcal／kg）	
原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維		TDN
大豆皮	10.3	15.8	5.0	36.1	28.4	4.4	4.31	26.7	1.15	45	61	67	40	49.5	48	76	75	72	63.7	

脱皮なたね油かす

1 暫定値申請 単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考
	水分	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	粗灰分	G E	鶏		豚					牛					
								代謝率	M E	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	
脱皮なたね油かす	10. 0	44. 3	2. 5	30. 7	5. 7	6. 8	4. 36	54. 4	2. 33	87	79	84	72	71. 9	90	79	90	43	73. 9	栄養価は、暫定的に定めたものである。
試料数	20	20	20	20	20	20														
標準偏差	1. 6	1. 5	0. 6	1. 9	1. 3	0. 4														
最大値	14. 1	45. 8	4. 7	32. 6	8. 6	7. 1														
最小値	8. 6	40. 3	1. 8	24. 8	4. 4	5. 9														

2 類似する飼料の既存の日本標準飼料成分表及び暫定値 単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考
	水分	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	粗灰分	G E	鶏		豚					牛					
								代謝率	M E	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	
ナタネ粕	11. 8	37. 3	2. 9	31. 9	9. 4	6. 6	4. 24	40. 9	1. 74	79	64	71	46	60. 7	86	89	72	51	65. 8	カノラ主体。
ナタネ粕（粗粒）	12. 1	37. 1	2. 6	31. 5	10. 2	6. 5	4. 21	42. 7	1. 80	82	49	84	44	64. 3	83	92	84	46	67. 4	おおむね50メッシュ篩上のもの。
ナタネ粕（細粒）	11. 7	44. 4	2. 9	28. 7	5. 1	7. 2	4. 26	47. 0	2. 00	88	64	91	63	72. 6	90	91	94	72	76. 6	おおむね50メッシュ篩を通過したもの。

パーム核油かす

1 暫定値申請																			単位：％（GE、MEはMcal／kg）	
原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	
パーム核油かす	8.5	16.6	7.7	52.8	10.7	3.9	4.44	25.8	1.14	46	80	70	8	60					圧搾により得られた油かすであって、粗脂肪含量がおおむね8％のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。	
試料数	20	20	20	20	20	20														
標準偏差	0.7	0.4	0.4	1.1	0.7	0.1														
最大値	9.6	17.4	8.4	54.3	11.9	4.1														
最小値	7.4	16.1	6.7	50.4	9.4	3.7														

2 類似する飼料の既存の日本標準飼料成分表及び暫定値																			単位：％（GE、MEはMcal／kg）	
原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価												備考
	水分	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	粗灰分	GE	鶏		豚					牛					
								代謝率	ME	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	粗たん白質	粗脂肪	NFE	粗繊維	TDN	
パーム核粕	11.5	15.7	1.1	56.4	11.5	3.8	3.96	34.7	1.37	65	52	77	48	60.4	82	80	88	50	70.2	油ヤシの核の採油粕。
パーム核粕（圧搾・EE10%）	8.2	15.6	10.0	43.1	18.8	4.3									79	98	77	76	81.9	EEがおおむね10%のもの。