




21生産第9081号

平成22年3月4日

農業資材審議会会長 殿

農林水産大臣 赤松 広隆



種苗法第2条第7項の規定に基づく重要な形質の指定について（諮問）

種苗法（平成10年法律第83号）第2条第7項の規定に基づき、別紙のとおり農林水産植物についての重要な形質を指定したいので、貴審議会の意見を求める。

種苗法第二条第七項の規定に基づく重要な形質を定める件の一部を改正する農林水産省告示新旧対照表(案)
 ○平成二十年四月一日農林水産省告示第五百三十四号(種苗法第二条第七項の規定に基づく重要な形質を定める件)

(傍線の部分は改正部分)

新 規 種		既 有 種	
重 要 な 形 質		重 要 な 形 質	
区 分		区 分	
エオニウム	草丈、ロゼットの径、ロゼットの葉の数、ロゼットの側面の形、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の形、葉の先端の形、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の光沢の強弱、葉の表面の毛の有無、葉の周縁の毛の有無、葉の白粉の有無、葉の表面の主な色、葉の表面の覆輪の有無、葉の表面の条状斑の有無、葉の表面の先端爪斑の有無、葉の表面の白斑の有無、葉の表面の斑の色、花の色	エオニウム	一 樹姿及び樹高 二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晩性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあっては、接ぎ木特性
らつきよう	草姿、草丈、葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の横断面の形、葉のねじれの強弱、葉の緑色の濃淡、葉のろう質の多少、葉しよ部部長さ、葉しよ部の太さ、葉しよ部のアントシアニン着色の強弱、花茎の数、花茎の長さ、花房の直径(観賞用品種に限る。)、小花の数(観賞用品種に限る。)、小花の色(観賞用品種に限る。)、分球数(食用品種に限る。)、一株球重、りん茎の縦径、りん茎の横径、りん茎の首の太さ、りん茎の縦断面の形、りん茎の内部分球の数、りん茎の一球重、りん茎の外皮の色、りん茎の辛味の強弱、りん茎の数の数、りん茎の表皮の色、ほう芽期、開花期(観賞用品種に限る。)、葉の枯れ上がり、の早晩、収穫期(食用品種に限る。)、抽だいの早晩	らつきよう	草姿、草丈、葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の横断面の形、葉のねじれの強弱、葉の緑色の濃淡、葉のろう質の多少、葉しよ部部長さ、葉しよ部の太さ、葉しよ部のアントシアニン着色の強弱、花茎の数、花茎の長さ、花房の直径、小花の数、小花の色、分球数、一株球重、りん茎の縦径、りん茎の横径、りん茎の首の太さ、りん茎の縦断面の形、りん茎の内部分球の数、りん茎の一球重、りん茎の外皮の色、りん茎の辛味の強弱、りん茎の数の数、りん茎の表皮の色、ほう芽期、開花期、葉の枯れ上がり、の早晩、収穫期、抽だいの早晩

アロエ ノビ リス	草丈、株の幅、葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、新葉の色、葉の色、葉の斑の有無、葉の斑の色
-----------------	--

アルク トテイ ス	草型、草丈、株の幅、葉の形、葉の周縁の鋸歯の深さ、葉の長さ、葉の幅、葉の表面の色、花卉の重なりが強弱、花卉の開度、頭花の最大径、舌状花の形、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の表面の色、舌状花の表面の脈の色、舌状花の表裏の色の違いの有無、舌状花の裏面の色、舌状花の脈の色、舌状花の数、花芯部の大きさ、花芯部の色、柱頭の色、やくの色、花柄の長さ、花柄の太さ、花の香りの有無、ねん性の有無
-----------------	---

ヤーガ レット	草型、草丈、分枝の粗密、茎のアントシアニンの着色の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉柄の長さ、葉の周縁の鋸歯の形、葉の周縁の鋸歯の粗密、葉の表面の色、葉片の長さ、葉片の幅、葉片の欠刻の深さ、花柄の長さ、花型、頭花の直径、舌状
------------	--

アロエ ノビ リス	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。） 四 品質特性 五 早晩性、ねん性（ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性
-----------------	---

アルク トテイ ス	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。） 四 品質特性 五 早晩性、ねん性（ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性
-----------------	---

ヤーガ レット	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三 花房の形、花形、花の大きさ、舌状花数、管状花部の大き
------------	--

花の数（一重品種を除く。）、舌状花の向き、舌状花の形、舌状花の反り、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の色数、舌状花の表面の色の分布状態、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の複色の色、舌状花の裏面の主な色、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）、丁字状花の色（丁字状品種に限る。）、花の中心部の色（八重品種及びボンボン咲品種に限る。）、花の芳香の有無、開花期（秋植）、開花期（夏植）

草丈、葉身の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の緑色の濃淡、葉身の表面の光沢の強弱、葉身の先端のねじれの強弱、葉身の白粉の多少、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の鋸歯の粗密、葉身の中ろくの色、中ろくの緑色の濃淡、葉柄の長さ、葉柄の幅、葉柄の基部のアントシアニン着色の有無、鋭裂葉の発生時期、鋭裂葉の周縁の切れ込みの強弱、根茎の縦断面の形、根茎の曲り、根茎の上部の太さ、根茎の下部の太さ、根茎の重さ、根茎の表面の粗滑、根茎の内部の色、根茎の肉色の褐変の強弱、根茎の上部における側根の発生密度、根茎の下部における根の発生密度、根茎のほう芽数

胚軸の着色の有無、子葉の大きさ、茎の長さ、茎の太さ、短節間の有無、短節間と第一花までの節間数（短節間のある品種に限る。）、節間長（短節間のない品種に限る。）、節のアントシアニン着色の有無、節のアントシアニン着色の強弱、節の毛の強弱、草丈、葉身の長さ、葉身の幅、葉の緑色の濃淡、葉の形、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の凹凸の強弱、葉の横断面の反り、葉の光沢の強弱、花の色、花柄の向き、やくのアントシアニン着色の有無、未熟果の色、未熟果の色の濃淡、果実のアントシアニン着色の有無、果実の着生、果実の着生の向き、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の縦断面の形、果実の横断面の形、果実基部の果皮の波打ちの強弱、果皮の

さ、管状花数、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花の中心部の色、総ほうの大きさ、一花茎の花数及び花の香り
四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

- 一 草姿及び草丈
二 茎の形状及び葉の形状
三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）
四 品質特性
五 早晚性、ねん性（不ねん現象のあるものに限る。）
六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにおいて
は根の形状

胚軸の着色の有無、子葉の大きさ、茎の長さ、茎の太さ、短節間の有無、短節間と第一花までの節間数（短節間のある品種に限る。）、節間長（短節間のない品種に限る。）、節のアントシアニン着色の有無、節のアントシアニン着色の強弱、節の毛の強弱、草丈、葉身の長さ、葉身の幅、葉の緑色の濃淡、葉の形、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の凹凸の強弱、葉の横断面の反り、葉の光沢の強弱、花の色、花柄の向き、やくのアントシアニン着色の有無、未熟果の色、未熟果の色の濃淡、果実のアントシアニン着色の有無、果実の着生、果実の着生の向き、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の縦断面の形、果実の横断面の形、果実基部の果皮の波打ちの強弱、果皮の

波打ちの強弱、果実の表面の粗滑、成熟果の色、成熟果の色の濃淡、果実の光沢の強弱、果実のこうあの有無、果実のこうあの深さ、果実の先端の形、果実の条溝の深さ、果実の心室数、果肉の厚さ、果柄の長さ、果柄の太さ、がくの形、一果当たり種子数、胎座のカブサイシンの有無、辛味の強弱、開花期、成熟期、トバモウイルス抵抗性、ジャガイモユウイルス抵抗性、疫病抵抗性、キユウリモザイクウイルス抵抗性、トマト黄化えそウイルス抵抗性、斑点細菌病抵抗性、青枯病抵抗性

ハバパイ ヤ 幼木の幹の色、花序、一番果結実部位の高さ、分枝の有無、幹の直径、一番果までの幹の節数、幹の中央部の節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の三次裂片の有無、葉身のろう質の有無、葉身の裏面の毛じの有無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の有無、葉柄のアントシアニン着色の強弱、一花序当たりの花の数、花序の主軸の長さ、花序の主軸の色、両性花の花冠の長さ、両性花の花冠の色、花柄の長さ、果実の長さ、果実の幅、果実の長さ／幅、果実の形、果梗部の形、果頂部の形、果皮の色、果実の表面の粗滑、果実の稜線の有無、果実の稜線の強弱、果皮の厚さ、果肉の色、果実の硬さ、果実の甘味、果実の香りの強弱、果実の胎座組織の粗密、果実の空洞の最大径、果実の赤道面の空洞断面の形、種子の数、種子の色、種子の長さ、種子の幅、種子の長さ／幅、種子の形、種子の表面のゼラチン状物質の多少

けいと う	草丈、茎の太さ、茎の基部のアントシアニン着色の有無、茎の基部のアントシアニン着色の強弱、茎の基部の色、茎の上部の色、茎の横断面の形、茎の稜の有無、開花側枝の有無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の色、葉脈のアントシアニン着色の有無、葉身の表面の凹凸の強弱、葉身の周縁の波打ちの有無、葉身の縦軸の曲がり、花序の形、主枝の花序の長さ、主枝の花序の幅、花序の色（とさか状態種を除く。）と
----------	---

波打ちの強弱、果実の表面の粗滑、成熟果の色、成熟果の色の濃淡、果実の光沢の強弱、果実のこうあの有無、果実のこうあの深さ、果実の先端の形、果実の条溝の深さ、果実の心室数、果肉の厚さ、果柄の長さ、果柄の太さ、がくの形、一果当たり種子数、胎座のカブサイシンの有無、辛味の強弱、開花期、成熟期、タバコモザイクウイルス抵抗性、トウガラシウイルス抵抗性、キユウリモザイクウイルス抵抗性、トマト黄化えそウイルス抵抗性、斑点細菌病抵抗性

ハバパイ ヤ 一 樹姿、樹の大きさ及び樹勢
二 幹の太さ、幹の節間長、幹の色、葉形、葉の大きさ、葉色、着葉数、葉柄の長さ及び葉柄の太さ
三 花らいの大きさ、花形、花の大きさ、花色、花卉の数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雄ずいの数及び初着花位置
四 果形、果実の大きさ、果皮の色、果肉の厚さ、果肉の色、肉質、甘味、酸味、香氣、種子の形、種子の色及び種子の多少
五 開花期、成熟期、着花習性、結果性、雌雄異株性、ねん性、貯蔵性、果実の生理障害の多少、耐寒性、耐風性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

けいと う	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の横断面の形、茎の色、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉脈の色及び葉の着生角度 三 花穂の形、花穂の大きさ、花穂の色、花首の長さ、花首の太さ及び花首の色 四 開花期、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
----------	---

さか頂部の縁の色（とさか状品種に限る。）、とさか先端部の色（とさか状品種に限る。）、花序のうねりの強弱（とさか状品種に限る。）、花被片の形、花被片の中央部の色、花糸の色、花柱の色、柱頭の色、開花の早晚

草型、草丈、株の幅、茎の太さ、花茎の長さ、茎のアントシアニン着色の有無、葉の毛の有無、一次分枝の数、二次分枝の数、節間長、茎の節数、葉の形、葉の周縁部の欠刻の形、葉の長さ、葉の幅、葉の数、変形葉の数、葉序、着らいの形、着らいの数、花の形、花の直径、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の数、舌状花の全体の形、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色、舌状花の裏面の色、管状花部の大きさ、管状花部の色、花柄の長さ、花柄の太さ、総ぼうの大きさ、花柄のアントシアニン着色の有無、花の香りの有無、開花の早晚

ダリア

草姿、草丈、茎の色、葉の型、葉軸の翼の強弱、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の色、葉の光沢の強弱、葉の表面のしわの強弱、葉脈の隆起の高低、小葉の形、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の基部の形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）、小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）、花柄の長さ、花柄の色、葉群に対する頭花の位置、頭花の向き、頭花の型、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）、頭花の副弁の有無、副弁の頭花に対する長さ、頭花の直径、頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）、頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の長さ／幅、舌状花の表面の形状、舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）、舌状花の中間部の横断

クリサンセマム
ルチコーレ

- 一 草姿及び草丈
- 二 茎の形状及び葉の形状
- 三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）
- 四 品質特性
- 五 早晩性、ねん性（ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
- 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

ダリア

- 一 草型及び草丈
- 二 塊根の形、塊根の大きさ、塊根の色、茎の太さ、茎の色、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少及び葉の着生角度
- 三 花の向き、花形、花の大きさ、舌状花の重ねの程度、舌状花数、管状花部の大きさ、管状花の分布、管状花の形、管状花数、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花の中心部の色、花盤の色、花たくの形、花たくの大きさ、総ぼうの大きさ、花首の長さ及び花首の太さ
- 四 発芽期、開花期、耐暑性、繁殖性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

面の形、舌状花の基部から四分の三地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。））、舌状花の周縁部の巻き方、舌状花の周縁が巻く部分の位置、舌状花の縦断面の形、舌状花の縦方向の湾曲する位置、舌状花の湾曲の強弱、舌状花のねじれの強弱、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色数、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色、舌状花の表面の三次色の分布位置、舌状花の表面の二次色の型、舌状花の表面の三次色、舌状花の表面の三次色の分布位置、舌状花の表面の三次色の型、舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色、舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。））、頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。））、花盤の開やく前の色（ダイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。））、花盤の開やく時の色（ダイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。））、管状花の色（アネモネ型品種に限る。））、副弁の色（コラレット型品種に限る。））、頭花の花色の變化

ダイアスキア
草型、草丈、株の幅、分枝の粗密、茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の光沢の強弱、葉身の斑の有無、葉身の色、葉身の斑の色、花序の粗密、小花柄の長さ、小花柄の着生角度、小花柄のアントシアニン着色の強弱、花冠の長さ、花冠の幅、花冠の主な色、上唇弁の切れ込みの深さ、下唇弁の側弁の反りの強弱、下唇弁の下弁の縦横比、下唇弁の下弁の湾曲の強弱、下唇弁の下弁周縁の波打ちの強弱、下唇弁の腺状突起の有無、腺状突起の密度、花冠の中央部の目の色、距の長さ、距の色、距の湾曲の強弱、距の先端の向き

オーチャードグラス	【略】
デロス	樹型、樹高、株の幅、枝の長さ、枝の太さ、節間長、葉の形、

--	--

ダイアスキア
草型、草丈、株幅、分枝の粗密、茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の光沢の強弱、葉身の斑の有無、葉身の色、葉身の斑の色、花序の粗密、小花柄の長さ、小花柄の着生角度、小花柄のアントシアニン着色の強弱、花冠の長さ、花冠の幅、花冠の主な色、上唇弁の切れ込みの深さ、下唇弁の側弁の反り、下唇弁の下弁の縦横比、下唇弁の下弁の湾曲の強弱、下唇弁の下弁周縁の波打ちの強弱、下唇弁の腺状突起の有無、腺状突起の密度、上唇弁の中央部の目の色、距の長さ、距の色、距の湾曲の強弱、距の先端の向き

オーチャードグラス	【略】
	【新設】

ペルマ	葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の色、葉の表面の突起の有無、葉の表面の突起の形、花の形、花の大きさ、花柄の長さ、花の中心部の色、花弁の幅、花弁の表面の主な色、花弁の表面の複色の有無、花弁の表面の二次色、花弁の数、花の香りの有無、開花習性
-----	---

まさき	樹姿、樹高（無摘心）、樹高（摘心）、新しいの太さ、枝の着化性の有無、新しいの太さ、節間長、葉身の全体の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉の周縁の形状、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、幼葉の表面の色、幼葉の斑の有無、幼葉の斑の模様、幼葉の斑の色、幼葉の斑の割合、葉の表面の色、葉の斑の有無、葉の斑の模様、葉の斑の色、葉の斑の模様の色の割合、葉の斑の模様の色の移行性、葉の斑の模様の色の移行後の色、ほう芽期
ユーホ ルピア ヒペ リシ オリア （おと ぎりば にしき そう）	草型、草丈、分枝の数、茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の強弱、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉柄の長さ、葉柄の色、花房の幅、小花房の幅、花序の幅、ほう葉の長さ、ほう葉の幅、ほう葉の形、ほう葉の色

ポイン セチア	分枝の有無、分枝の数、樹高、樹の幅、茎の中間部の緑色の濃淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱、茎の上部のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の基部の形、葉身の表面の色数、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）、葉身の主な色（複色葉品種に限る。）、葉身の二次色（複色葉品種に限る。）、葉身の三次色（複色葉品種に限る。）、葉身の表面の主脈の色、葉身の切れ込みの数、葉
------------	--

まさき	一 樹姿及び樹高 二 枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三 花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ及び果実の色 四 発芽期、開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
-----	---

ユーホ ルピア ヒペ リシ オリア （おと ぎりば にしき そう）	一 樹姿及び樹高 二 枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三 花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ及び果実の色 四 発芽期、開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
---	---

ポイン セチア	一 樹姿及び樹高 二 枝の太さ、枝の色、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ、葉柄の長さ及び葉柄の色 三 花房の大きさ、花形、ほうの形、ほうの大きさ、ほうの色、ほうの数、花の大きさ、雌雄ずいの色、花柄の長さ、花柄の色、一花房当たりの花数及び花の香り 四 開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵
------------	--

身の切れ込みの深さ、葉身の主脈の曲がりの強弱、葉柄の長さ、葉柄の表面の緑色の濃淡、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱、部分着色葉の数、完全着色葉の数、着色葉の切れ込みの強弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱、ほうの数、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）、最大ほうの幅、最大ほうの形、ほうの表面の色数、ほうの表面の色（単色品種に限る。）、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）、ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）、ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）、ほうの表面の斑点の強弱、ほうの表面の斑点の色、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）、ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）、ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）、ほうの裏面の斑点の色（斑点模様のある品種に限る。）、ほうの主脈の巻き込みの有無、ほうのねじれの有無、ほうの葉脈間の縮れの強弱、集散花序の幅、蜜腺の大きさ、蜜腺の色、蜜腺の変形の有無、開花の早晚

草丈、茎の節数、分枝の位置、葉の着き方、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉のろう粉の多少、葉の表面の緑色の濃淡、花らしいの数、花型、花卉の数（八重品種に限る。）、花の直径、花の形、花卉の長さ、花卉の幅、花卉の先端の形、花卉の周縁の波打ちの強弱、花卉の周縁のフリンジ、花卉の色数、花卉の表面の色（単色品種に限る。）、花卉の表面の主な色（複色品種に限る。）、花卉の表面の二次色の面積の大きさ（複色品種に限る。）、花卉の表面の模様（複色品種に限る。）、花卉の裏面の色、花卉の表面の基部の色、がくの長さ、がくのアントシアニン着色の有無、花柄の長さ、雌ずいの形、開花始期

いちご 草姿、葉の粗密、草勢、分けつの多少、開花位置、ランナーの

抗性

- 一 草型及び草丈
- 二 茎の太さ、茎の長さ、茎の色、茎の強さ、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉のろう質の程度及び葉の着生角度
- 三 花形、花の大きさ、花色、花卉の形、花卉数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、花柄の太さ、花柄の長さ、花柄の折れの難易、一花茎の花数及び花の香り
- 四 開花の間隔、開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

いちご 一 草姿、草勢、草丈、分けつ性、ランナーの形状、葉色その

数、ランナーのアントシアニン着色の強弱、ランナーの毛の粗密、葉の大きさと、葉の表面の色、葉の表面の凹凸の強弱、葉の表面の光沢の強弱、葉の表面の斑の有無、頂小葉の大きさと、頂小葉の縦横比、頂小葉の基部の形、頂小葉の鋸歯の形、頂小葉の横断面の形、葉柄の長さ、葉柄の毛じの向き、たく葉のアントシアニン着色の強弱、花の数、果柄の長さ、小果柄の毛じの向き、花の直径、花弁の重なり、花冠に対するがく片の大きさと、雄しべの有無、花弁の縦横比、花弁の表面の色、花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）、花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）、花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）、花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）、果実の大きさ、果実の縦横比、果実の形、第一番果と第二番果の果形の差、果皮の色、果皮の着色のむらの強弱、果実の光沢の強弱、果実の表面の凹凸の強弱、果実の無種子帯、果実のネックの有無、そう果の落ち込み、そう果の密度、そう果のアントシアニン着色の強弱、果実のがくの着生位置、果実のがく片の付き方、果径に対するがくの大きさ、果実からのへた離れの難易、果実の硬さ、果肉の色、果心の色、果実の空洞、開花始期、果実の成熟期、季性、可溶性固形物含量、酸度、果実の香りの強弱、休眠性、炭そ病抵抗性、萎黄病抵抗性

グロキ
シニア
シル
パティ
カ

草丈、茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の有無、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の色、一茎当たりの花の数、花柄の長さ、花冠の長さ、花冠筒の直径、花冠先端の直径、花冠裂片の色、花冠外面の色、花冠内面の色、花冠内面の模様（斑点）の明瞭度、開花始期

他葉の形状、葉数、葉柄の形状、果皮の色、果実の断面の形状その他果実の形状、花の形状、花柄の形状、果実の硬さ、無種子帯、そう果の落ち込み、そう果数、へた離れ性、がくの形状及び果房当たり果数

二 季性、早晩性、開花位置、耐高低温性、耐干性、休眠性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

三 品質、成分、日持ち及び輸送性

グロキ
シニア
シル
パティ
カ

一 草姿及び草丈

二 茎の形状及び葉の形状

三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）

四 品質特性

五 早晩性、ねん性（ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにおいて

グレコ マヘ デラケ ア	株の幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の斑の有無、葉身の斑の模様、花の長さ、花の幅、花の色、花冠における着色部の色、下唇弁における斑紋の有無、下唇弁における斑紋の色

グラブ トペタ ルム	草型、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の形、葉の縦断面の形、葉の横断面上面の形、葉の横断面下面の形、葉の先端の形、葉の緑色部の有無、葉の緑色部の色、葉の白粉の強弱、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の部位、葉のアントシアニン着色の強弱、葉の模様の有無、葉の先端の芒（剛毛）の有無、葉の先端の芒（剛毛）の色、花序の型、つばみの形、がくの長さ、花の直径、花の形、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花の地色、花の模様の有無、花の模様、花の模様の色
まいいた け	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の周縁部の形状、菌叢の厚さ、菌叢の表面の着色の有無、菌叢の表面の形状、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度（ $10^{\circ}\text{C}/\text{日}$ ）、菌糸体の温度別生長速度（ $15^{\circ}\text{C}/\text{日}$ ）、菌糸体の温度別生長速度（ $20^{\circ}\text{C}/\text{日}$ ）、菌糸体の温度別生長速度（ $25^{\circ}\text{C}/\text{日}$ ）、菌糸体の温度別生長速度（ $30^{\circ}\text{C}/\text{日}$ ）、子実体株の径、菌糸の大きさ、菌糸の厚さ、菌糸の形状、菌糸の縁部の切れ込み、菌糸の断面の形、菌糸の表面の色、菌糸の肉質、菌糸の表面の環紋の形状、管孔発達の部位、子実体株基部の形、培養菌床の表面被（皮）膜の形成、培養菌床の表面被（皮）膜の色の有無、原基形成までの期間、発生最盛期までの期間

	は根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性
--	--

【新設】

グラブ トペタ ルム	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。） 四 品質特性 五 早晚性、ねん性（ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性
まいいた け	一 菌糸の性状、菌糸の形、菌糸の大きさ、菌糸の色、菌糸の厚さ、菌糸の肉質、子実層たぐの形状、子実層たぐの色及び子実層たぐの菌柄へのつき方 二 菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の菌糸へのつき方、菌柄の肉質、菌柄の毛の色及び菌柄の毛の多少 三 子実体の発生時期、子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間及び培地適応性又は原木適応性 四 乾物率及び収量性

(種菌接種から収穫適期までの期間)、子実体の生育最適温度、収量性、対峙培養(帯線形成)	
グズヤニア	草丈、株の幅、葉の数、葉しよの長さ、葉しよの幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色の有無、葉身の表面の二次色の模様、葉身の表面の二次色の主な色、葉身の裏面の主な色、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無、葉身の裏面のアントシアニン着色の分布、花序の型、花序の位置、花序の長さ、花序の着花部の長さ、花序の着花部の直径、花序のほうの数、花序の一ほう内の小花の数、花序の一ほう内的小花の総数(一ほう内的小花の数が複数の品種に限る。)、ほうの長さ、ほうの幅、ほうの先端の幅、ほうの先端の形、ほうの表面の色、ほうの裏面の色、前出葉の長さ、前出葉の幅、前出葉の色、がくの色、花冠の色、子房の色、花柱の色、柱頭の色
はすのはぎり	樹姿、樹高、枝の色、葉身の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の色数、葉身の地色、葉身の斑の有無、葉身の斑の型、葉身の斑の最も濃い色、葉身の斑の二番目に濃い色、葉身の斑の三番目に濃い色、葉身のアントシアニン着色の有無
ひまわり	胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、葉の大きさ、葉の緑色の濃淡、葉の表面の凹凸の強弱、葉の鋸歯の粗密、葉の横断面の形、葉の先端の形、葉の葉耳の大きさ、葉の翼の発達の強弱、葉の最下位側脈の角度、葉柄の基部に対する葉身先端の位置、茎の先端の毛の粗密、開花期、花型、舌状花の粗密、舌状花の形、舌状花の形状、舌状花の

グズヤニア	一 草型及び草丈 二 葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉の厚さ、葉質、葉の硬さ、葉面の白粉の程度、葉縁のとげの形状及び吸枝の発 生程度 三 花穂の形、花穂の大きさ、花穂の色、ほうの毛の多少、ほうのとげの有無、花卉の形、花卉の大きさ、花卉の色、一花ほうの花数、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色及び花柄の毛の多少 四 開花期、花柄の分岐性、耐寒性、繁殖性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
はすのはぎり	一 樹姿及び樹高 二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晩性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあつては、接ぎ木特性
ひまわり	胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、葉の大きさ、葉の色、葉の表面の凹凸の強弱、葉の鋸歯の粗密、葉の横断面の形、葉の先端の形、葉の葉耳の大きさ、葉の翼の発達の強弱、葉の最下位側脈の角度、葉柄の基部に対する葉身先端の位置、茎の先端の毛の粗密、開花期、舌状花の粗密、舌状花の形、舌状花の形状、舌状花の長さ、舌状花の

長さ、舌状花の主な色、筒状花の色、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の有無、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の強弱、筒状花の花粉の有無、ほう葉の形、ほう葉の先端の長さ、ほう葉の外面の緑色の濃淡、ほう葉の頭花に対する抱えの強さ、草丈、分枝の有無、株の分枝の型（栽培条件による分枝を除く。）、主茎頂花に対する最上側枝の頂花の位置、頭花の向き、頭花の直径、頭花の成熟種子が着生した面の形、種子の大きさ、種子の形、種子の厚さ、種子の主な色、種子の周縁のしま模様、種子の胴部のしま模様、種子のしま模様の色

ヒロケ
レウス
ウン
ダツス
（ドラ
ゴンフ
ルーツ
）

葉状茎の長さ、葉状茎の幅、葉状茎の横断面の形、葉状茎の色、葉状茎の周縁の起伏、とげの長さ、とげの主な色、とげ座の間隔、とげの多少、つばみのりん片先端の着色の有無、一葉状茎当たりの着花数、花の長さ、花被の色、自家結実性、果実の重さ、果実の縦断面の形、果実のりん片の大きさ、果実のりん片の数、果実のりん片の先端の形、果実のりん片の先端の向き、果皮の厚さ、果実の表面の色の均一性、果実の表面の主な色、果実の表面のとげの有無、果肉の色の均一性、果肉の色、果実の糖度、成熟種子の数、種子の大きさ、開花始期、開花の回数、収穫始期

そよご

樹姿、樹高、葉の最大幅の位置、葉の先端の形、葉の基部の形、当年葉の反りの強弱、前年葉の反りの強弱、当年葉の波打ちの強弱、前年葉の波打ちの強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、当年葉の表面の緑色の濃淡、前年葉の表面の緑色の濃淡、新葉のアントシアニン着色の有無、葉の斑の有無、花の直径、花弁の形、花柄の長さ、房成りの有無、果実の形、果実の大きさ、果実の色

主な色、筒状花の色、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の有無、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の強弱、筒状花の花粉の有無、ほう葉の形、ほう葉の先端の長さ、ほう葉の外面の緑色の濃淡、ほう葉の頭花に対する抱えの強さ、草丈、分枝の有無、株の分枝の型（栽培条件による分枝を除く。）、主茎頂花に対する最上側枝の頂花の位置、頭花の向き、頭花の直径、頭花の成熟種子が着生した面の形、種子の大きさ、種子の形、種子の厚さ、種子の主な色、種子の周縁のしま模様、種子の胴部のしま模様、種子のしま模様の色

ヒロケ
レウス
ウン
ダツス
（ドラ
ゴンフ
ルーツ
）

一 草姿及び草丈
二 茎の形状及び葉の形状
三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）
四 品質特性
五 早晩性、ねん性（ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

そよご

一 樹姿及び樹高
二 枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ
三 花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ及び果実の色
四 発芽期、開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及

び虫害抵抗性

イレシ ネ リ ンデニ ー	一 草姿及び草丈
	二 茎の形状及び葉の形状
	三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）
	四 品質特性
	五 早晩性、ねん性（ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
	六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

レタス

種子の色、子葉の大きさ、子葉の形、幼苗のアントシアニン着色の有無、草姿、葉身の切れ込みの型、株の幅、結球性、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る。）、球のしまり、球の大きさ、球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）、球の縦断面の形、葉の厚さ、収穫期の草姿、葉の形、葉身の先端の形、葉の色相、外葉の色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニンの分布、葉のアントシアニン分布の種類、葉の光沢の強弱、葉の凹凸の強弱、葉の凹凸の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の先端部の切れ込みの有無、葉身の先端部の切れ込みの深さ、葉身の先端部の切れ込みの粗密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）、葉脈の型、腋芽の発生の強弱、収穫期、抽だい始期、草丈、帯化の有無、帯化発生の強弱、べと病抵抗性、レタスモザイクウイルス抵抗性、アブラムシ耐性

草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の有無、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の横断面の形、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の表面の主な色、葉身の表面の斑の有無、葉身の斑の位置、葉身の斑の色数、葉身の斑の主な色、葉身の光沢の強弱、葉身の基部の形、葉身の先端の形、葉柄の長さ、葉柄の色

レタス

種子の色、子葉の大きさ、子葉の形、幼苗のアントシアニン着色の有無、草姿、葉身の切れ込みの型、株の幅、結球性、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る。）、球のしまり、球の大きさ、球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）、球の縦断面の形、葉の厚さ、収穫期の草姿、葉の形、葉身の先端の形、葉の色相、外葉の色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニンの分布、葉のアントシアニン分布の種類、葉の光沢の強弱、葉の凹凸の強弱、葉の凹凸の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の先端部の切れ込みの有無、葉身の先端部の切れ込みの深さ、葉身の先端部の切れ込みの粗密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）、葉脈の型、腋芽の発生の強弱、収穫期、抽だい始期、草丈、帯化の有無、帯化発生の強弱、べと病抵抗性、レタスモザイクウイルス抵抗性、レタスピッグベイン病抵抗性、アブラムシ耐性

くろみのうぐいすかぐら(ハスカップ)	【略】
--------------------	-----

ほんしめじ	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の表面の色、菌叢の裏面中央部の色、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度(10℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(15℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(20℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(25℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(30℃/日)、菌さんの断面の形、菌さんの表面のいぼの有無、菌さんの大きさ、菌さんの中央部の色、菌さんの周縁部の色、菌さんの表面の模様の有無、菌さんの厚さ、菌さんの直径/菌柄の長さ、子実層たぐの色、子実層たぐの並び方、子実層たぐの密度、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、菌柄の最大直径/菌さん下の菌柄の直径、子実体の発生型、最適培養期間(種菌接種後覆土までの培養期間)、覆土の必要性の有無、発生最盛期までの期間(発生処理後から収穫適期までの期間)、原基形成最適温度、子実体の生育最適温度、収量、有効基数、対峙培養(帯線形成)
-------	---

りんご	樹勢、樹の型(生食用品種に限る。)、枝の数(台木用品種に限る。)、樹姿(生食用の分枝型品種に限る。)、結実の型(生食用品種に限る。)、新しいの姿勢(台木用品種に限る。)、新しいの伸長状態(台木用品種に限る。)、枝の毛じの多少(台木用品種に限る。)、枝の表面の光沢の強弱(台木用品種に限る。)、えき花芽の着生(台木用品種に限る。)、枝の太さ、節間長、枝の色(生食用品種に限る。)、枝の毛じの粗密、皮目の多少、皮目の大きさ(台木用品種に限る。)、皮
-----	--

くろみのうぐいすかぐら(ハスカップ)	【略】
--------------------	-----

ほんしめじ	一 菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの紋様、菌さんの肉質、子実層たぐの形状及び子実層たぐの色 二 菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色及び菌柄の肉質 三 子実体の発生時期、子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間及び培地適応性又は原木適応性 四 乾物率及び収量性
-------	---

りんご	一 樹姿、樹の大きさ及び樹勢 二 枝しようの太さ、節間長、皮目の大きさ、皮目の多少、枝しようの毛じの多少、短花枝の着生、えき花芽の着生、芽の形、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛じの多少、たく葉の形、たく葉の大きさ、葉柄の長さ及び葉柄の太さ 三 一花そうの花数、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の色、花弁の数、雄ずいの数、やくの色及び花粉の多少 四 果形、果実の大きさ、果皮の色、果面毛じの多少、果点の
-----	--

目の形 (台木用品種に限る。)、枝の陽光面の色 (台木用品種に限る。)、芽の大きさ (台木用品種に限る。)、芽の先端の形 (台木用品種に限る。)、芽の姿勢 (台木用品種に限る。)、芽の支持部の大きさ (台木用品種に限る。)、枝の先端の色 (台木用品種に限る。)、若葉のアントシアニン着色の有無 (台木用品種に限る。)、若葉のアントシアニン着色の濃度 (台木用品種に限る。)、若葉の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の横断面の形 (台木用品種に限る。)、葉身の先端突起の長さ (台木用品種に限る。)、葉身の緑色の濃淡 (生食用品種に限る。)、葉身の周縁の鋸歯の形、葉身の裏面の毛の粗密、葉脈のアントシアニン着色の強弱 (台木用品種に限る。)、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の広がり (生食用品種に限る。)、葉身の長さ／葉柄の長さ (台木用品種に限る。)、たく葉の大きさ (台木用品種に限る。)、つぼみの色 (生食用品種に限る。)、花の大きさ (生食用品種に限る。)、花弁の重なり (生食用品種に限る。)、花柱の位置 (生食用品種に限る。)、幼果のアントシアニン着色の広がり (生食用品種に限る。)、果実の大きさ (生食用品種に限る。)、果実の長さ (生食用品種に限る。)、果実の幅 (生食用品種に限る。)、果実の長さ／幅 (生食用品種に限る。)、果実の形 (生食用品種に限る。)、果実の角張りの強弱 (生食用品種に限る。)、果実の王冠の強弱 (生食用品種に限る。)、果実のがくの閉 (生食用品種に限る。)、果実のがくの長さ (生食用品種に限る。)、果粉の多少 (生食用品種に限る。)、果皮のろう質の多少 (生食用品種に限る。)、果面の粗滑 (生食用品種に限る。)、果皮の地色 (生食用品種に限る。)、果皮を被う色の面積 (生食用品種に限る。)、果皮を被う色 (生食用品種に限る。)、果皮を被う色の濃淡 (生食用品種に限る。)、果皮を被う色の型 (生食用品種に限る。)、果皮のしまの幅 (生食用品種に限る。)、果皮のしま模様の明瞭度 (生食用品種に限る。)、梗あ周辺のさびの量 (生食用品種に限る。)、果実側面のさびの量 (生食用品種に限る。)、がくあ周辺のさびの量

形、果点の大きさ、果点の密度、果面の粗滑、果面のさびの発生、スカーフスキンの多少、果こうの長さ、果こうの太さ、肉こうの有無、果心の形、果心の大きさ、心室の数、果肉の色、肉質、甘味、酸味、渋味、香氣、果汁の多少、種子の形、種子の大きさ及び種子数

五 発芽期、開花期、落葉期、収穫期、結果性、果実着色の難易、生理落果の多少、果実の生理障害の多少、果実の貯蔵性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあつては接ぎ木の難易、実生のそろい、栄養繁殖の難易、接ぎ木後の樹勢、台木の根の発育、耐干性及び耐湿性

(生食用品種に限る。)、果点の数(生食用品種に限る。)、果点の大きさ(生食用品種に限る。)、スカーフスキンの多少(生食用品種に限る。)、果柄の長さ(生食用品種に限る。)、果柄の太さ(生食用品種に限る。)、梗あいの深さ(生食用品種に限る。)、梗あいの幅(生食用品種に限る。)、がくあいの深さ(生食用品種に限る。)、がくあいの幅(生食用品種に限る。)、果肉の硬さ(生食用品種に限る。)、果肉の色(生食用品種に限る。)、果実の甘味(生食用品種に限る。)、果実の酸味(生食用品種に限る。)、果実の蜜の多少(生食用品種に限る。)、果心の形(生食用品種に限る。)、果実の子室の型(生食用品種に限る。)、ほう芽期(台木用品種に限る。)、開花始期(生食用品種に限る。)、収穫期(生食用品種に限る。)、普通貯蔵の貯蔵性(生食用品種に限る。)、冷蔵貯蔵の貯蔵性(生食用品種に限る。)、斑点落葉病抵抗性(生食用品種に限る。)

ネメシ
ア

草姿、草丈、株の幅、分枝の粗密、茎の太さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の周縁の欠刻の数、葉身の周縁の欠刻の深さ、葉身の斑の有無、葉身の主な色、葉身の二次色、花序の花の着生の粗密、花の香りの強弱、花冠の長さ、花冠の幅、花冠の長さ／幅、花冠の下唇弁に對する上唇弁の長さ、上唇弁の中央裂片の重なり、上唇弁の側裂片の向き、上唇弁の中央裂片に對する側裂片の位置、上唇弁の側裂片の先端の形、上唇弁の主な色、上唇弁の条の長さ、上唇弁の脈の明瞭度、上唇弁の脈の色、上唇弁の基部のゾロツチの大きさ、上唇弁の基部のゾロツチの明瞭度、上唇弁の基部のゾロツチの色、上唇弁の裏面の色、下唇弁の反りの強弱、下唇弁の横断面の湾曲の強弱、下唇弁の波打ちの強弱、下唇弁の切れ込みの強弱、下唇弁の主な色、下唇弁の二次色、下唇弁の二次色の分布、下唇弁の裏面の色、下唇弁の基部の突起の下唇弁に對する相対的な大きさ、下唇弁の基部の突起の色、下唇弁の基部の突起の毛の有無、下唇弁の基部の突起の毛の粗密、距の

ネメシ
ア

- 一 草姿及び草丈
- 二 茎の形状及び葉の形状
- 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)&及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)
- 四 品質特性
- 五 早晚性、ねん性(ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
- 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

下唇弁に対する相対的な長さ、花色の変化、花序のさく果の結実の粗密

バジル	草姿、草丈、分枝性、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の有無、花茎の数、葉身の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面のアントシアニン着色の有無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニン分布の程度、葉身の緑色の濃淡（アントシアニン着色のない品種に限る。）、葉身の光沢の強弱、葉の凹凸の強弱、葉身の横断面の形、葉身の周縁部の鋸歯の有無、葉身の周縁部の鋸歯の深さ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉柄の長さ、花茎の平均節間長、花茎の長さ、ほう葉の毛の有無、花冠の色、花柱の色、開花期
-----	--

オノセリスヒソピフオリア	[略]
じやのひげ	草型、草丈、株の幅、葉序、葉の形、葉の先端の形、葉の長さ、葉の幅、葉の色、葉の表面の光沢の有無、葉の湾曲の程度、葉の周縁部の鋸歯の有無、葉の裏面のすじの有無、葉の斑の有無、葉の斑の型、葉の斑の色
ちぢみざさ	草丈、分枝の数、茎の太さ、茎の色、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の表面のアントシアニン着色の有無、葉の表面のアントシアニン着色の強弱、葉の表面の斑の有無、新葉の表面の緑色の濃淡、成葉の表面の緑色の濃淡、新葉の表面の斑の色、成葉の表面の斑の色、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の表面の毛の有無、葉しよの長さ、葉しよの毛の多少、花序の形

バジル	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。） 四 品質特性 五 早晩性、ねん性（不ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
-----	--

オノセリスヒソピフオリア	[略]

[新設]

ちぢみざさ	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。） 四 品質特性 五 早晩性、ねん性（不ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
-------	--

六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにおいて
は根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として
使用するものにあつては収量性、台木用品種にあっては接
ぎ木特性

ペラル ゴニウ ム グ ランデ イフロ ラム	一 草型及び草丈	二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、茎の白粉の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少、たく葉の形、たく葉の大きさ、たく葉の色、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の色、葉柄の毛の多少及び葉の香り	三 花房の形、花の向き、花形、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の厚さ、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がく片の距の大きさ、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花柄の毛の多少、一花房の花数及び花の香り	四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
ゼラニ ウム	一 草型及び草丈	二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、茎の白粉の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少、たく葉の形、たく葉の大きさ、たく葉の色、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の色、葉柄の毛の多少及び葉の香り	三 花房の形、花の向き、花形、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の厚さ、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がく片の距の大きさ、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花柄の毛の多少、一花房の花数及び花の香り	四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

ペラル ゴニウ ム グ ランデ イフロ ラム	植物体の高さ、植物体の幅、茎の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の基部の重なり、葉の切れ込みの有無、葉の切れ込みの長さ、葉の周縁の欠刻の深さ、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、小花柄の色、がく片の長さ、がく片の幅、がく片外側のアレントシアニン着色の有無、花の直径、花弁の波打ちの有無、花弁の波打ちの強弱、上部花弁の幅、上部花弁の模様の有無、上部花弁の模様の形、上部花弁の模様の大きさ、上部花弁の表面の周縁部の色、上部花弁の表面の周縁部と模様間の色、上部花弁の表面の中間部の色（模様のない品種に限る。）、上部花弁の模様の色、上部花弁の裏面の色、下部花弁の模様の有無、下部花弁の模様の形、下部花弁の模様の大きさ、下部花弁の表面の周縁部の色、下部花弁の表面の周縁部と模様間の色、下部花弁の表面の中間部の色、下部花弁の模様の色、下部花弁の裏面の色、開花始期	草姿、茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）、茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）、株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）、茎の色（アレントシアニンを除く。）、茎のアレントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の切れ込みの深さ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の基部の重なり、葉身の斑の有無、葉身の主な色（環状紋を除く。）、葉身の二次色（環状紋を除く。）、葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）、葉身の表面の環状紋の明瞭度、葉身の環状紋の位置、葉身の環状紋の相対的な大きさ、花柄の長さ、花柄の中央部のアレントシアニン着色の強弱、花序の長さ、花序の幅、一花序の開花数、最大花の長さ、最大花の幅、小花柄の長さ、小花柄上部のアレントシアニン着色の強弱、小花柄の突起の有無、花型、下部花弁の上部花弁に對
ゼラニ ウム	草姿、茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）、茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）、株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）、茎の色（アレントシアニンを除く。）、茎のアレントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の切れ込みの深さ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の基部の重なり、葉身の斑の有無、葉身の主な色（環状紋を除く。）、葉身の二次色（環状紋を除く。）、葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）、葉身の表面の環状紋の明瞭度、葉身の環状紋の位置、葉身の環状紋の相対的な大きさ、花柄の長さ、花柄の中央部のアレントシアニン着色の強弱、花序の長さ、花序の幅、一花序の開花数、最大花の長さ、最大花の幅、小花柄の長さ、小花柄上部のアレントシアニン着色の強弱、小花柄の突起の有無、花型、下部花弁の上部花弁に對	草姿、茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）、茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）、株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）、茎の色（アレントシアニンを除く。）、茎のアレントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の切れ込みの深さ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の基部の重なり、葉身の斑の有無、葉身の主な色（環状紋を除く。）、葉身の二次色（環状紋を除く。）、葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）、葉身の表面の環状紋の明瞭度、葉身の環状紋の位置、葉身の環状紋の相対的な大きさ、花柄の長さ、花柄の中央部のアレントシアニン着色の強弱、花序の長さ、花序の幅、一花序の開花数、最大花の長さ、最大花の幅、小花柄の長さ、小花柄上部のアレントシアニン着色の強弱、小花柄の突起の有無、花型、下部花弁の上部花弁に對

する配置（一重品種に限る。））、花卉の数（八重品種に限る。））、横から見た花の断面の形、花卉の不規則な条や斑点の有無、花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。））、花卉の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。））、がくの反転の強弱、最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱、上部花卉の幅、上部花卉の形、上部花卉の先端の形、上部花卉の表面の周縁部の色、上部花卉の表面の中央部の色、上部花卉の裏面の色、上部花卉の模様の明瞭度、上部花卉の模様の形、上部花卉の最大の斑点の大きさ、上部花卉の斑点の色、上部花卉の基部の複色部の有無、上部花卉の基部の複色部の大きさ、上部花卉の表面の中央部の色、下部花卉の裏面の色、下部花卉の色、下部花卉の模様の明瞭度、下部花卉の模様の形、下部花卉の最大の斑点の大きさ、下部花卉の基部の複色部の有無、下部花卉の基部の複色部の大きさ、下部花卉の基部の複色部の色、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。））、開花始期

ペンタス
草姿、草丈、茎の節間長、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の毛の粗密、葉身の波打ちの強弱、花序の花の数、花序の長さ、花序の短径、花序の高さ、花序の上部の形、花型、花冠の直径、花筒の長さ、花筒の色、花喉部の内面の毛の色、花冠裂片の向き、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色（単色品種を除く。））、花冠裂片の表面の二次色の分布（単色品種を除く。））、やくの花喉部上部に対する位置、花粉の色、花柱の長さ、柱頭の大きさ、柱頭の色

フオルミウム	草姿、草丈、分枝の数、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の反り、葉身の横断面の形、葉身のねじれの有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の色数、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色の模様、葉身の表面の二次色、葉身の表面の三
--------	--

--	--

くささんだんか	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、とげの有無、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ及び葉柄の長さ 三 花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花卉の形、花卉数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
---------	---

ニューサイラシ	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を
---------	---

次色の模様、形の形、葉身の表面の三次色、葉身の表面の色の安定度、葉身の裏面の色数、葉身の裏面の主な色、葉身の裏面の二次色、葉身の裏面の三次色、葉身の表面の光沢の有無

葉の持続性、樹姿、つばみの形、新葉のろう質粉の多少、新葉の色、新葉のアントシアニン着色の強弱、成葉の表面の色、成葉の裏面の色、成葉の長さ、成葉の幅、成葉の形、成葉の表面の毛の粗密、成葉の横断面の形、成葉の表面の光沢の強弱、一花序当たりの着花数、花序の形（一花序当たりの着花数が六以上の品種に限る。）、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの有無、がくの長さ、花の形、花の直径、花の香りの強弱、花型、花冠裂片の数（八重品種に限る。）、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の裏面の主な色、花冠裂片の表面の二次色の分布、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度、花冠裂片の花喉部の斑点の型、花冠裂片の花喉部の斑点の色、花冠裂片の花喉部の色の濃淡、やくの色、雌ずいの長さ、柱頭の色、開花始期、成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の形（常緑の品種に限る。）、成葉（秋葉）の表面の毛の粗密（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）、

さとう 草型、葉しよの包含度、発芽性、ほう芽性、初期伸長性、分

食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。

- 四 品質特性
- 五 早晩性、ねん性（ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
- 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

- 一 樹姿及び樹高
- 二 枝の太さ、枝の色、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉の厚さ、葉の毛の多少、葉の毛の色、葉質及び葉の着生角度
- 三 花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花冠片数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの長さ、雌雄ずいの色、雄ずいの長さ、やくの色、がくの有無、がくの形、がくの色、がくの毛の多少、花柄の長さ、花柄の太さ、一花房の花数及び花の香り
- 四 発芽期、開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

さとう 一 草型

きび

げつ性、遅発莖数、葉群の疎密、葉群の緑色の濃淡、仮莖長、節間長、節間部の長径、節間部の形、節間部の横断面の形、節間部のずい孔率、節間部の複合色、節間部の基本色、節間部の生長亀裂の深さ、節間部の稲妻屈曲の強弱、節間部の茎皮硬度、節間部の茎皮表面の粗滑、節間部のろう質物の多少、根帯の幅、根帯の色、ろう帯の幅、芽子の形（芽翼を除く。）、芽子の大きさ（芽翼を除く。）、芽子の突出度（第二老化葉着生節）芽溝の深さ、芽溝の長さ、芽子先端部の生長帯に対する位置、芽子の毛の有無、芽子の毛の位置、芽子基部と葉しよう痕の間の広さ、芽翼の幅、葉しようの長さ、葉しようの毛群の多少、葉しようの毛群の長さ、葉しようの毛群の分布、葉舌の形、葉舌の幅、葉舌の毛群の長さ、葉舌の毛群の粗密、葉しようの包含部下面の葉耳の形、葉しようの包含部下面の葉耳の大きさ、葉しようの包含部上面の葉耳の形、葉しようの包含部上面の葉耳の大きさ、肥厚帯の色、葉身の反り、葉身の幅、中肋の幅、葉身の幅に対する中肋の幅の比、葉身の長さ、葉身の周縁の毛の疎密、葉身の周縁の鋸歯の有無、しよう頭部の長さ、しよう頭部の横断面の形、しよう頭部の色、しよう頭部のろう質物の多少、原料莖の長さ、莖径、一莖重、原料莖の多少、脱葉性、出穂性、登熟の早晩性、糖分含量、耐干性、黒穂病抵抗性

シユル
ンベル
ゲラ (旧ジゴ
カクタ
ス)

草姿、三次葉状莖の数、葉状莖の長さ、葉状莖の最大幅、葉状莖の色、葉状莖の周縁部の鋸歯の形、葉状莖の鋸歯の深さ、葉状莖の横断面の湾曲の強弱、葉状莖の周縁部の波打ちの強弱、1 cm長のつばみの先端の色、1 cm長のつばみの色の濃淡、1.5 cm長のつばみの先端の形、花の形、花の直径、花の長さ、花被片の花筒開口部に対する姿勢、花被片の幅、花被片の基部に淡色部の大きさ、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）、花被片の中間部の色の違いの有無、花被片の中間部の色、花被片の色の境界の明瞭度（花被片の中間部に色の違いのある品種に限る。）、花被片の周縁部の色が占める割合（花被片の中間部に色の違いのある品種に限る。）、

きび

二 葉の形状、しよう莖の形状及び原料莖の形状
三 発芽性、分けつ性、地域適応性、出穂性、登熟性、環境耐性、耐倒伏性、脱葉性、収量性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

シユル
ンベル
ゲラ (旧ジゴ
カクタ
ス)

一 草型
二 葉状莖の形、葉状莖の大きさ、葉状莖の色、葉状莖数、葉状莖の毛の多少及び分枝性
三 花形、花の大きさ、花色、花卉の形、花卉の大きさ、雌雄ずいの形、雌雄ずいの大きさ、雌雄ずいの色、一葉状莖当たりの着花数及び花の香り
四 開花期、耐寒性、耐暑性、日長感応性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

る。)、花被片の周縁部の色、花筒の開口部の形、花筒の開口部の輪状着色の有無、花筒の開口部の輪状着色部の幅、花筒の外面の色、雄ずいの長さ、花糸の色、やくの色、雌ずいの長さ、柱頭の色、子房の色、開花始期、開花期間

なす (胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、草姿、草丈、第一花着生節の子葉からの長さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛じの粗密、茎のとげの有無、葉身の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の凹凸の強弱、葉身のとげの有無、葉身の緑色の濃淡 (觀賞用品種を除く。)、葉身の色の数 (觀賞用品種に限る。)、葉身の主な色 (觀賞用品種に限る。)、葉身の二次色 (觀賞用品種に限る。))、葉身の三次色 (觀賞用品種に限る。))、花の数、花の大きさ、花の紫色の濃淡、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ/直径、果実の形、果実の花こん部の大きさ、果実の先端の形、果実の花こん部のへこみの深さ、果実の曲がりの強弱 (円筒形の品種に限る。))、収穫時の果皮の主な色、果皮の主な色の濃淡 (果皮色が紫色白または緑色の品種に限る。))、果実の光沢の強弱、果実の斑紋の有無、果実の条斑の有無、果実の条斑の明瞭度、果実の条斑の粗密、果実の肋の凹凸の強弱、果実の長さ、へた下のアントシアニン着色の有無、へた下のアントシアニン着色の有無、へたのアントシアニン着色の有無、へたのアントシアニン着色の強弱、へたのとげの多少、へたの縦じわの強弱、果肉の色、成熟時の果皮の色、開花始期、完熟期、単為結果性の有無

はなびらたけ 菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の周縁部の形状、菌叢の表面の着色の有無、菌叢の裏面の着色の有無、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度 (15℃/30日)、菌糸体の温度別生長速度 (20℃/30日)、菌糸体の温度別生長速度 (25℃/30日)、子実体の径、子実体の高さ、菌柄の色、菌柄の厚さ、菌柄の肉質、子実体の枝の多少、子実体の花弁

なす (胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、草姿、草丈、第一花着生節の子葉からの長さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛じの粗密、葉身の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の凹凸の強弱、葉身の緑色の濃淡、花の数、花の大きさ、花の紫色の濃淡、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ/直径、果実の形、果実の花こん部の大きさ、果実の曲がりの強弱 (円筒形の品種に限る。))、収穫時の果皮の主な色、果皮の主な色の濃淡 (果皮色が紫色白または緑色の品種に限る。))、果実の光沢の強弱、果実の斑紋の有無、果実の条斑の有無、果実の条斑の明瞭度、果実の条斑の粗密、果実の肋の凹凸の強弱、果実の長さ、へた下のアントシアニン着色の有無、へた下のアントシアニン着色の有無、へたのアントシアニン着色の有無、へたのアントシアニン着色の強弱、へたのとげの多少、へたの縦じわの強弱、果肉の色、成熟時の果皮の色、開花始期、完熟期

はなびらたけ 一 菌糸の性状及び子実体の大きさ
二 菌柄の色、菌柄の厚さ、菌柄の肉質、菌柄の枝の多少、菌柄の枝の形、菌柄の枝の色、菌柄の枝の厚さ及び菌柄の枝の肉質
三 子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間及び培地適応性

はなびらたけ 一 菌糸の性状及び子実体の大きさ
二 菌柄の色、菌柄の厚さ、菌柄の肉質、菌柄の枝の多少、菌柄の枝の形、菌柄の枝の色、菌柄の枝の厚さ及び菌柄の枝の肉質
三 子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間及び培地適応性

状片の形、子実体の枝の色、子実体の枝の厚さ、子実体の枝の
 肉質、子実体の発生型、原基形成発生最適温度、子実体の生育
 最適温度、発生最盛期までの期間（種菌接種から収穫適期まで
 の期間）、発生操作から収穫期までの期間、収量、対峙培養（
 帯線形成）

四 乾物率及び収量性

ソルガム	幼苗の子葉しやうのアントシアニン着色の強弱、幼苗の第一葉の裏面のアントシアニン着色の強弱、幼苗の第一葉の葉しやうのアントシアニン着色の強弱、葉身のアントシアニン着色の強弱、出穂期、出穂期の葉の高さ、出穂期の葉身の緑色の濃淡、出穂期の止め葉の主脈の変色の強弱、止め葉の主脈の緑色の濃淡（出穂期に変色しない場合。）、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡、開花時の苞葉の色、開花時の苞葉のアントシアニン着色の強弱、開花時の苞葉の毛じのアントシアニン着色の強弱、開花時の護苞の芒の着生の強弱、開花時の柱頭のアントシアニン着色の強弱、開花時の柱頭の黄色の着色の強弱、柱頭の長さ、小花の小花柄を含む長さ、開花終期の穂の粒着の粗密、開花終期の雄ずいの色、成熟期の草丈、稈の直径、成熟期の先端から三番目の葉の長さ、成熟期の葉の幅、成熟期の穂の長さ、成熟期の穂の分枝の長さ、成熟期の穂の粗密、成熟期の穂首の長さ、成熟期の穂首の色、成熟期の苞葉の長さ、脱穀後の穎果の色、子実の千粒重、正面向から見た子実の形、側面から見た子実の形、子実の胚痕の大きさ、子実の種皮によって覆われた割合、子実のタンニン含量、胚乳の質（縦断面）、胚乳のガラス質の色、茎の甘味、紫斑点病抵抗性
------	---

ソルガム	幼苗の子葉しやうのアントシアニン着色の強弱、幼苗の第一葉の裏面のアントシアニン着色の強弱、幼苗の第一葉の葉しやうのアントシアニン着色の強弱、葉身のアントシアニン着色の強弱、出穂期、出穂期の葉の高さ、出穂期の葉身の緑色の濃淡、出穂期の止め葉の主脈の変色の強弱、止め葉の主脈の緑色の濃淡（出穂期に変色しない場合。）、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡、開花時の苞葉の色、開花時の苞葉のアントシアニン着色の強弱、開花時の護苞の毛じのアントシアニン着色の強弱、開花時の護苞の芒の着生の強弱、開花時の柱頭のアントシアニン着色の強弱、開花時の柱頭の黄色の着色の強弱、柱頭の長さ、小花の小花柄を含む長さ、開花終期の穂の粒着の粗密、開花終期の雄ずいの色、成熟期の草丈、稈の直径、成熟期の先端から三番目の葉の長さ、成熟期の葉の幅、成熟期の穂の長さ、成熟期の穂の分枝の長さ、成熟期の穂の粗密、成熟期の穂の形、成熟期の穂首の長さ、成熟期の穂首の色、成熟期の穂首の長さ、脱穀後のえい果の色、子実の千粒重、正面向から見た子実の形、側面から見た子実の形、子実の胚痕の大きさ、子実の種皮によって覆われた割合、子実のタンニン含量、胚乳の質（縦断面）、胚乳のガラス質の色
------	---

あかクローバ	【略】
しろクローバ	草高、株張り、草姿、節間長、茎の太さ、葉柄の長さ、葉柄の太さ、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の大きさ、小葉の長さ／幅、小葉の形、小葉の先端の形、変葉の多少、平均小葉数、葉の

あかクローバ	【略】
しろクローバ	一 茎の形状、葉の形状、頭花数及び植物体の広がり 二 ほう芽性、開花期、越冬性、越冬性及び病害抵抗性 三 乾物率

密度、葉の緑色の濃淡、葉の主な色（複色品種に限る。）、葉の二次色（複色品種に限る。）、葉の三次色（複色品種に限る。）、葉の斑の型、葉の斑の鮮明度、花の色、花柄の長さ、花柄の太さ、頭花の数、頭花の直径、開花性、開花期、青酸配糖体含有個体割合（飼料用品種に限る。）

樹形、樹冠の形、樹高、枝の翼の有無、分枝の粗密、葉の形、葉の先端の形、葉の基部の形、葉の鋸歯の形、葉身の長さ、葉身の幅、若葉の春季の色、成葉の夏季の色、成葉の秋季（紅葉）の色、成葉の斑の有無、成葉の斑の模様、斑のある葉の割合、成葉の斑の色

ぶどう

ほう芽期、幼しうの先端の葉の開度、幼しうの先端の綿毛の密度、幼しう先端の綿毛のアントシアニン着色の強弱、幼しう先端の絨毛の密度、若葉の表面の色、若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度、若葉裏面の主脈上の絨毛の密度、新しうの向き、新しうの節間の上面の色、新しうの節間の下面の色、新しうの節の上面の色、新しうの節の下面の色、新しうの節間の絨毛の密度、新しうの巻きひげの長さ、花穂の長さ、花性、成葉の大きさ、成葉の形、成葉の表面の凹凸の強弱、成葉の裂片数、成葉の上裂刻の深さ、成葉の上裂片の重なり（裂刻のある品種に限る。）、成葉の葉柄側裂刻の重なり、成葉の鋸歯の長さ、成葉の鋸歯の長さ／基部幅、成葉の鋸歯の形、成葉表面の主脈のアントシアニン着色の強弱、成葉裏面の主脈間の綿毛の密度、成葉裏面の主脈上の絨毛の密度、成葉の主脈に対する葉柄の長さ、成熟始期、果房の大きさ、果房の着粒密度、穂梗の長さ、穂梗の色、果粒の大きさ、果粒の形

樹姿及び樹高

二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状

三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）

四 品質特性

五 早晚性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあつては、接ぎ木特性

ぶどう

一 樹の大きさ及び樹勢

二 枝しうの太さ、枝しうの色、枝しうの毛じの多少、節間断面の形、着房数、巻きひげの着生、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛じの多少、葉柄の長さ及び葉柄の太さ

三 花房の形、花房の大きさ、穂こうの長さ、穂こうの色、つばみの大きさ、子房の形、雄ずいの形及び花粉の多少

四 果房の形、果房の大きさ、粒着の粗密、果こうの色、小果こうの太さ、果粒の形、果粒の大きさ、果皮の色、果粉の多少、果皮の厚さ、果肉分離の難易、果肉の色、肉質、甘味、酸味、渋味、香氣、果汁の多少、種子の形、種子の大きさ及び種子数

五 発芽期、展葉期、開花期、落葉期、成熟期、結果性、果実の着色の難易、裂果性、脱粒性、日持ち、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあつては、接ぎ

木の難易、繁殖の難易、接ぎ木後の樹勢、台木の根の發育、耐干性及び耐湿性

ライデ イア アンチ デイス ンテリ カ	一 樹姿及び樹高 二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）
ザルジ アンス キア オウア タ	四 品質特性 五 早晚性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあつては、接ぎ木特性
	〔略〕

とうもろこし	一 かん ¹ の形状、葉の形状、仮根 ² 發生の程度、雌穗 ³ の形状、雄穗 ⁴ の形状、穀粒 ⁵ の形状、穀粒 ⁶ の粒重及び穀粒 ⁷ の品質 二 初期 ⁸ の生育性、分けつ性、熟性、ねん性、密植条件下での不ねん ⁹ 個體發生程度、耐倒伏性、耐折損性、收量性、乾物率、養分割合、食味、病害抵抗性及び虫害抵抗性
--------	---

色の強弱、雄穂の主軸と一次枝梗の角度、雄穂の一次枝梗の反り、雄穂の一次枝梗の数、絹糸の抽出期、絹糸のアントシアニン着色の強弱、絹糸の色、仮根のアントシアニン着色の強弱、雄穂の小穂の粗密、葉しやうのアントシアニン着色の強弱、節間のアントシアニン着色の強弱、雄穂の最下枝梗着生部からの主軸の長さ、雄穂の最上枝梗着生部からの主軸の長さ、雄穂の一次枝梗の長さ、草丈、草丈と雌穂着生位置の比、葉身の幅、穂柄の長さ、雌穂の長さ、雌穂の直径、雌穂の芯の直径、雌穂の数、雌穂の重さ、雌穂の形、雌穂の粒列数、雌穂の粒の色数（スイートコーン及びピクシーコーン品種に限る。）、粒の黄色の濃淡（スイートコーン品種に限る。）、粒の長さ（スイートコーン品種に限る。）、粒の幅（スイートコーン品種に限る。）、雌穂の粒の型、雌穂の粒の縮みの強弱、雌穂の粒の先端部の主な色、雌穂の粒の側面の色（スイートコーン品種を除く。）、ポップコーンの形（ポップコーン品種に限る。）、雌穂のほう葉のアントシアニン着色の強弱、粒の甘味、倒伏抵抗性

委員の担当植物一覧

委員の専門分野	担 当 植 物	
食用作物（０） 桃木委員(BT) 佐藤専門委員(BT) 山岸専門委員		
野菜（８） 篠原委員 北専門委員	いちご とうもろこし バジル せいようわさび	なす(ばれいしょを除く)* らっきょう* とうがらし* レタス*
果樹（４） 小池委員 谷本専門委員	ぶどう りんご パパイヤ	ヒメレウス ウンダツス(ドラゴンフルーツ)
飼料作物（３） 近藤専門委員	とうもろこし しろクローバ	ソルガム*
草花・観賞樹 （３４） 小竹委員 神田専門委員 宮崎専門委員	ペンタス（くささんだんか） グズマニア けいとう シュルンベルゲラ(旧ジゴカクタス) ゼラニウム ダリア トルコギキョウ ネメシア ペラルゴニウム グランディフロラム ポインセチア マーガレット ロードデンドロン グレコマ ヘデラケア ザミオカス ザミフォリア じゃのひげ デロスペルマ あきにれ アルクトティス	アロエ ノビリス イレシネ リンデニー エオニウム グラプトペタルム クリサンセマム ムルチコレ グロキシニア シルバティカ そよご ちぢみざさ はすのはぎり フォルミウム まさき ユーフォルビア ヒペリスフォリア(おとぎ りばにしきそう) ライティア アンティイセンテリカ ディアスキア* ひまわり* なす(ばれいしょを除く)*
工芸作物（１） 小松専門委員	さとうきび	
林木（０） 近藤専門委員		
きのこ（３） 増野専門委員	はなびらたけ ほんしめじ	まいたけ

水産植物（〇） 鬼頭専門委員		
育成者側委員 野原委員 西田専門委員		
生産者側委員 前島委員		

注：＊印は一部を見直す種類。