	一次枝梗の長さ、小穂の長さ（毛、芒を除く。）、小穂の毛の長さ、小穂の毛の色、苞穎の色、芒の有無、芒の長さ、出穂期	
ツルレイシ	胚軸の緑色の濃淡、主づるの節間長、主づるの太さ、側枝数、葉身の大きさ、葉身の緑色の濃淡、葉身裂片の長さ／幅、葉身裂片の先端部の形、葉身裂片の数、葉身の切れ込みの深さ、葉柄の長さ、主枝第１雌花の着生節位、子房の長さ、雄花の着生の多少、柱頭の緑色の濃淡、果実の長さ、果実の太さ、果実の縦断面の形、果実の果皮色、果実の肩部の形、果実の尻部の形、果実のこぶ状突起の多少、果実のこぶ状突起の大きさ、果実のこぶ状突起の先端部の形、果実のこぶ状突起のとげの有無、果実の条状突起の長さ、果実の完熟期の果皮の色、果実の苦味の有無、果実の苦味の強弱、種子の大きさ、種皮の褐色の濃淡、種皮の稜の突起の大小、着果習性、完熟期	
タイマツバナ	草姿、草丈、茎の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
クワ	倍数性、樹勢、樹姿、枝の数、枝の揃い、側枝数、矮小枝の数（飼料用品種に限る。）、枝の長さ、不発芽部位の長さ、枝の太さ、枝の屈曲の強弱（飼料用品種に限る。）、枝の色、節間長、新しょう割合（飼料用品種に限る。）、芽の大小、芽の形、芽の色、副芽の多少（飼料用品種に限る。）、葉序、葉の着生角度、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の欠刻の有無、葉身の欠刻の深さ、葉身の鋸歯の形、葉身の表面の色、葉身の表面の光沢の強弱、葉柄の長さ、葉のこき取りの難易（飼料用品種に限る。）、花性、雌花穂の多少、果実の縦径（飼料用品種を除く。）、果実の横径（飼料用品種を除く。）、果実の重さ（飼料用品種を除く。）、果実の形（飼料用品種を除く。）、果実の色（飼料用品種を除く。）、果柄の長さ（飼料用品種を除く。）、糖度（飼料用品種を除く。）、酸度（飼料用品種を除く。）、発芽期、再発芽力（飼料用品種に限る。）、開花期（飼料用品種を除く。）、成熟期（飼料用品種を除く。）、枝の伸長停止期（飼料用品種に限る。）、さし木の発根性（飼料用品種に限る。）、葉の硬化の早晩（飼料用品種に限る。）、枝の先枯れの多少（飼料用品種に限る。）	さし木の発根性（飼料用品種に限る。）
ミューレンベッキア	樹姿、分枝の多少、分枝の長さ、分枝の太さ、分枝の稲妻型屈曲の強弱、分枝のろう質の多少、分枝の基部の主な色、分枝の先端部の主な色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身のベタシアニン着色の強弱、葉身の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の主な色、葉柄の長さ	
ムサ　アクミナタ	倍数性、吸芽の数、偽茎の長さ、偽茎の直径、偽茎の葉しょうの重なりの強弱、偽茎の先細り、偽茎の色、偽茎のアントシアニンの着色、偽茎の基部の葉しょうの内側の色、偽茎の頂部の葉柄の粗密、草姿、葉柄の基部の翼の状態、葉柄の長さ、葉身の裏面の中肋の色、葉身の基部の形、葉身の裏面のワックス、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の表面の光沢の有無、果軸の長さ、果軸の直径、果軸の毛の有無、果軸の湾曲、果房の長さ、果房の幅、果房の形、果房の果実の向き、果房の粗密、果房の果段の数、花軸の雄花部の向き、花軸の苞の痕の隆起の強弱、花軸の苞の宿存性、花軸の中性花の宿存性、果実の湾曲、果実の稜、果実の長さ、果実の幅、果柄の長さ、果実の先端の形、果皮の厚さ、未熟果の果皮の色、果皮の色、果皮の剝皮の難易、果実の花器官の宿存性、果肉の色、果肉の硬さ、雄花序の宿存性、雄花序の形、雄花序の苞の開き具合、苞の内側の色、苞の先端の形	
ぶなはりたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
ワスレナグサ	草型、草姿、草丈、茎のアントシアニン着色の有無、茎の毛の粗密、基部葉の長さ、基部葉の幅、基部葉の長さ／幅、基部葉の形、基部葉の先端の形、基部葉の表面の緑色の濃淡、基部葉の表面の光沢、基部葉の表面の毛の粗密、基部葉の裏面の毛の粗密、茎葉の長さ、茎葉の幅、茎葉の長さ／幅、茎葉の形、茎葉の先端の形、茎葉の表面の緑色の濃淡、茎葉の表面の光沢、茎葉の表面の毛の粗密、茎葉の裏面の毛の粗密、葉の斑の有無、葉の斑の型、葉の斑の色、花の数、花の大きさ、がくの主な色、がくの切れ込みの深さ、がくの毛の粗密、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の色の変化の有無、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、副花冠の有無、副花冠の開花直後の色、副花冠の開花盛期の色、開花始期	
くりたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、菌さんの表面の粘出物の多少、子実層たくの色、りん皮の多少、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
ナンテン	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	

スイセン	草型、草丈、球根の形、球根の大きさ、球根の色、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の長さ、一花房の花数、花の香り、開花期	
ハス	葉の形状、葉柄の形状、花の形状、主幹ふく枝の長さ、ふく枝の分布の広さ、れん根分布の深さ、肥大茎の形状、早晩性	
モズク	軸の長さ、軸の太さ、分枝の粗密、軸の褐色の濃淡、軸の硬さ、ぬめりの多少、収穫期の早晩、高水温適応性	
ネメシア	草姿、草丈、株の幅、分枝の粗密、茎の太さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の周縁の欠刻の数、葉身の周縁の欠刻の深さ、葉身の斑（ふ）の有無、葉身の主な色、葉身の二次色、花序の花の着生の粗密、花の香りの強弱、花冠の長さ、花冠の幅、花冠の長さ／幅、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さ、上唇弁の中央裂片の重なり、上唇弁の側裂片の向き、上唇弁の中央裂片に対する側裂片の位置、上唇弁の側裂片の先端の形、上唇弁の主な色、上唇弁の脈の長さ、上唇弁の脈の明瞭度、上唇弁の脈の色、上唇弁の基部のブロッチの大きさ、上唇弁の基部のブロッチの明瞭度、上唇弁の基部のブロッチの色、上唇弁の裏面の色、下唇弁の反りの強弱、下唇弁の横断面の湾曲の強弱、下唇弁の波打ちの強弱、下唇弁の切れ込みの強弱、下唇弁の主な色、下唇弁の二次色、下唇弁の二次色の分布、下唇弁の裏面の色、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさ、下唇弁の基部の突起の色、下唇弁の基部の突起の毛の有無、下唇弁の基部の突起の毛の粗密、距の下唇弁に対する相対的な長さ、花色の変化、花序のさく果の結実の粗密	
ネモフィラ	草丈、株の幅、葉の長さ、葉の幅、葉の主な色、葉の切れ込みの先端の形、花柄のアントシアニンの着色、花冠の直径、花冠の主な色、花冠の二次色（二次色のある品種に限る。）、花冠の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）、花冠の三次色（三次色のある品種に限る。）、花冠の小斑点の有無、花冠の小斑点の主な色、花冠の脈の着色の有無、花冠の脈の主な色	
フウラン	草型、草丈、茎又はぎ球茎の形、茎の太さ、ぎ球茎の大きさ、茎の毛の多少、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の厚さ、一花茎の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の色、花茎の抽出角度、花茎の分枝性、花芽の発生位置、花の香り、開花期	
ネリネ	草丈、葉の長さ、葉の幅、葉の先端の形、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎のアントシアニン着色の有無、花茎のアントシアニン着色の部位、花茎のアントシアニン着色の強弱、苞（ほう）のアントシアニン着色の有無、花序の小花の数、外側の小花の小花柄の長さ、小花柄のアントシアニン着色の有無、花茎と小花柄との角度、花の直径、花被の高さ、花被片の長さ、花被片の幅、花被片の反りの部位、花被片の反りの強弱、花被片の周縁の波打ちの強弱、花被片の周縁の波打ちの形状、花被片の先端のねじれ、花被片の色数、花被片の主な色、花被片の基部の主な色、花被片の先端の主な色、花被片の主な色に対する中央部の色の明暗、花糸の長さ、花糸の色、花糸の主な色に対する基部の色の明暗、やくの色、花柱の長さ、花柱の色、花柱の色の分布、出葉時期	
キョウチクトウ	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
タバコ	草姿、草丈、主茎の色、主茎の葉の数、植物体のわき芽の多少、葉の形状、葉の着生角度、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉身の基部の幅（無柄の品種に限る。）、葉脈の厚さ、葉の支脈の中肋（ろく）に対する角度、葉身の形、葉の先端の形、葉の横断面の形、葉の縦断面の反転の強弱、葉の凹凸の強弱、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の翼（よく）の発達の強弱、葉の色、葉の裏面中肋（ろく）の色、開花期、花の長さ（観賞用品種に限る。）、花筒の直径（観賞用品種に限る。）、花筒の膨らみの強弱（観賞用品種に限る。）、花冠の大きさ（観賞用品種に限る。）、花冠の先端の尖り（観賞用品種に限る。）、花冠の色、雄ずいの発達の状態、雄ずいに対する雌ずいの長さ、花序の形、花序の上位葉に対する位置、花序の粗密、果実の形、立枯病抵抗性、疫病抵抗性、ＰＶＹ抵抗性、黒根病抵抗性、ＴＭＶ抵抗性、うどんこ病抵抗性	立枯病抵抗性、疫病抵抗性、ＰＶＹ抵抗性、黒根病抵抗性、ＴＭＶ抵抗性、うどんこ病抵抗性
アマモドキ（ニーレンベルギア）	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	
クロタネソウ	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、	

	花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数、花の香り、開花期	
ノラナ	草姿、草丈、茎の形状、葉の形状、花の形状、品質特性	
スイレン（ヒツジグサ）	花の咲く位置、株の広がり、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の周縁の形、葉身の基部裂片の重なり、新葉のアントシアニン着色の有無、新葉のアントシアニン着色の強弱、葉身の表面の色数、葉身の表面の地色、葉身の表面の二次色、葉身の表面の二次色の大きさ、葉身の裏面の色数、葉身の裏面の地色、葉身の裏面の二次色、葉身の裏面の二次色の大きさ、葉柄の色、花の数、花の大きさ、花の形、花型、花の色数、花の濃色花弁の分布状態、花柄の色、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の形、がく片の表面の色、がく片の裏面の色、がく片の裏面の条斑の有無、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の数、花弁の形、花弁の色の数、花弁の先端の形、花弁の表面の主な色、花弁の表面の模様、花弁の表面の二次色、花弁の色の変化の有無、雄ずいの数、雄ずい先端の色、花の香りの有無、一日当たりの開花の長さ（昼咲き品種に限る。）	
バジル	草姿、草丈、分枝性、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の有無、花茎の数、葉身の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面のアントシアニン着色の有無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニン分布の程度、葉身の緑色の濃淡（アントシアニン着色のない品種に限る。）、葉身の光沢の強弱、葉の凹凸の強弱、葉身の横断面の形、葉身の周縁部の鋸歯の有無、葉身の周縁部の鋸歯の深さ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉柄の長さ、花茎の平均節間長、花茎の長さ、苞葉の毛の有無、花冠の色、花柱の色、開花期	
セリ	草姿、草丈、葉数、葉色その他葉の形状、葉柄の形状、早晩性	
マツヨイグサ	草丈、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の基部のアントシアニン着色の有無、茎の毛の基部のアントシアニン着色の強弱、ロゼット葉の長さ、ロゼット葉の幅、ロゼット葉の緑色の濃淡、ロゼット葉の葉縁の波打ちの強弱、ロゼット葉の表面の凹凸の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉縁の形、葉縁の切れ込みの深さ、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の模様（斑のある品種に限る。）、花らいの大きさ、花らいのアントシアニン着色の有無、花の大きさ、花弁の有無、花弁の先端の形、花弁の地色、花弁の模様、花弁の模様の色、花弁のしぼんだ時の地色の変化の有無、柱頭の位置、花糸の色、さく果の長さ、さく果のアントシアニン着色の有無、さく果の着生密度、抽だいの早晩、開花の早晩、昼咲き性の有無	
オリーブ	樹勢、樹姿、枝の粗密、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身表面の緑色の濃淡、葉身の縦断面の曲がり、葉身のねじれ、花序の長さ、花序の幅、花弁の姿勢、果実の長さ、Ｂ面における果実の幅、果実の重さ、Ａ面における果実の形、Ａ面における果実の長さ／幅、未成熟果の緑色の濃淡、未成熟果の果点の大きさ、未成熟果の果点の数、果皮を覆う色、Ａ面における果実の対称性、Ａ面における果実先端の形、果実の突起、Ａ面における果実基部の形、果実表面の果粉の強弱、Ｂ面における核の形、核の長さ、Ｂ面における核の幅、核の長さ／幅、核の重さ、Ａ面における核の対称性、Ｂ面における核の対称性、核基部の溝の数、核基部の溝の分布、Ａ面における核先端の形、核の突起の有無、Ａ面における核基部の形、核表面のしわの強弱	
オンシジウム	植物体の大きさ、葉の向き、ぎ球茎の大きさ、ぎ球茎の縦断面の形、ぎ球茎の横断面の形、ぎ球茎の下位葉の数、ぎ球茎の上位葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の横断面の形、葉の表面の緑色の濃さ、花序の型、花序の長さ、花序の幅、花序の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎のアントシアニンの着色、花のセパルの湾曲、花のペタルの湾曲、花の縦径、花の横径、花の香り、ドーサルセパルの長さ、ドーサルセパルの幅、ドーサルセパルの形、ドーサルセパルの縦断面の形、ドーサルセパルの横断面の形、ドーサルセパルの周縁の波打ち、ドーサルセパルの地色、ドーサルセパルの覆色のぼかしの色、ドーサルセパルの斑点の数、ドーサルセパルの斑点の大きさ、ドーサルセパルの斑点の色、ドーサルセパルの横縞の数、ドーサルセパルの横縞の分布、ドーサルセパルの横縞の色、ドーサルセパルの縦縞の色、ドーサルセパルの覆輪の幅、ドーサルセパルの覆輪の色、ドーサルセパルの基部斑の大きさ、ドーサルセパルの基部斑の色、ラテラルセパルの長さ、ラテラルセパルの幅、ラテラルセパルの形、ラテラルセパルの縦断面の形、ラテラルセパルの横断面の形、ラテラルセパルのねじれ、ラテラルセパルの周縁の波打ち、ラテラルセパルの地色、ラテラルセパルの覆色のぼかしの色、ラテラルセパルの斑点の数、ラテラルセパルの斑点の大きさ、ラテラルセパルの斑点の色、ラテラルセパルの横縞の数、ラテラルセパルの横縞の分布、ラテラルセパルの横縞の色、ラテラルセパルの縦縞の色、ラテラルセパルの覆輪の幅、ラテラルセパルの覆輪の色、ラテラルセパルの基部斑の大きさ、ラテラルセパルの基部斑の色、ペタルの長さ、ペタルの幅、ペタルの形、ペタルの縦断面の形、ペタルの横断面の形、ペタルのねじれ、ペタルの周縁の波打ち、ペタルの地色、ペタルの覆色のぼかしの色、ペタルの斑点の数、ペタルの斑点の大きさ、ペタルの斑点の色、ペタルの横縞の数、ペタルの横縞の分布、ペタルの横縞の色、ペタルの縦縞の色、ペタルの覆輪の幅、ペタルの覆輪の色、ペタルの基部斑の大きさ、ペタルの基部斑の色、リップの長さ、リップの幅、リップの側裂片の中央裂片に対する相対的な大きさ、リップの周縁の波打ち、リップの中	

	央裂片の形、リップの中央裂片の切れ込み、リップの中央裂片の縦断面の形、リップの中央裂片の横断面の形、リップの中央裂片の地色、リップの中央裂片の覆色のぼかしの色、リップの中央裂片の斑点の色、リップの中央裂片の横縞の色、リップの中央裂片の覆輪の色、リップの側裂片の地色、リップのカルスの色、リップのカルス周辺の色	
オノセリス　ヒソピフォリア	草姿、草丈、茎の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
ジャノヒゲ	草型、草丈、株の幅、葉序、葉の形、葉の先端の形、葉の長さ、葉の幅、葉の色、葉の表面の光沢の有無、葉の先端の下垂の強弱、葉の周縁部の鋸歯の有無、葉の裏面のすじの有無、葉の斑の有無、葉の斑の型、葉の斑の色	
チヂミザサ	草丈、分枝の数、茎の太さ、茎の色、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の表面のアントシアニン着色の有無、葉の表面のアントシアニン着色の強弱、葉の表面の斑の有無、新葉の表面の緑色の濃淡、成葉の表面の緑色の濃淡、新葉の表面の斑の色、成葉の表面の斑の色、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の表面の毛の有無、葉しょうの長さ、葉しょうの毛の多少、花序の形	
オリガヌム　ロツンディフォリウム	草姿、茎の長さ、分枝の数、最長分枝の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の表面の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の型、葉の向き、花穂の数、花穂の長さ、花穂の幅、苞葉の数、苞葉の長さ、苞葉の幅、苞葉のアントシアニン着色の強弱、一苞葉当たりの小花数、小花の長さ、小花の雄ずいの露出の有無、小花の主な色、花穂の香りの強弱、開花期	
オーニソガラム	草姿、草丈、茎の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
稲	しょう葉のアントシアニン着色の強弱、基部葉の葉しょうの色、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の分布、葉しょうのアントシアニン着色の有無、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身表面の毛じ、葉耳のアントシアニン着色の有無、葉の襟のアントシアニン着色の有無、葉舌の形、葉舌の色、葉身の長さ、葉身の幅、初期の止め葉の姿勢、後期の止め葉の姿勢、稈の向き、稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）、出穂期、雄性不稔性、初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱、初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱、初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱、柱頭の色、稈の太さ、稈の長さ（浮稲品種を除く。）、稈の節のアントシアニン着色の有無、稈の節のアントシアニン着色の強弱、稈の節間のアントシアニン着色の有無、穂の主軸の長さ、穂数、芒の有無、初期の芒の色、芒の分布、最長芒の長さ、外穎の毛じ、外穎先端の色、後期の芒の色、穂の主軸の湾曲度、穂の二次枝梗の有無、穂の二次枝梗の型、穂型、穂の抽出度、成熟期、葉の枯れ上がりの時期、穎の色、穎の模様、後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱、後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱、後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱、護穎の長さ、護穎の色、籾の千粒重、籾の長さ、籾の幅、外穎のフェノール反応の有無、外穎のフェノール反応による着色の強弱、玄米の千粒重、玄米の長さ、玄米の幅、玄米の形、玄米の色、胚乳の型、胚乳のアミロース含量、胚乳の色、精米のアルカリ崩壊性の強弱、玄米の香り、低温発芽性（陸稲品種に限る。）、障害型耐冷性、穂発芽性、耐倒伏性、脱粒性、いもち病抵抗性推定遺伝子型、葉いもちほ場抵抗性、穂いもちほ場抵抗性、白葉枯病抵抗性品種群別、白葉枯病ほ場抵抗性、しま葉枯病抵抗性品種群別、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）、グルテリン含量、カドミウム吸収性、高温登熟性、着粒密度、ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性、セシウム吸収性	外穎のフェノール反応による着色の強弱、胚乳のアミロース含量、精米のアルカリ崩壊性の強弱、低温発芽性（陸稲品種に限る。）、障害型耐冷性、穂発芽性、耐倒伏性、いもち病抵抗性推定遺伝子型、葉いもちほ場抵抗性、穂いもちほ場抵抗性、白葉枯病抵抗性品種群別、白葉枯病ほ場抵抗性、しま葉枯病抵抗性品種群別、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型、グルテリン含量、カドミウム吸収性、高温登熟性、ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性、セシウム吸収性
オステオスペルマム	草姿、草丈、葉の長さ、葉の幅、葉の周縁の切れ込みの深さ、葉の斑の有無、葉の緑色の濃淡、開花初期の頭花の舌状花の主な色、副花冠の有無、舌状花の数、頭花の直径、花盤の型、花盤の直径、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）、優勢な管状花の型（花盤がアネモネ型の品種に限る。）、漏斗状の管状花の花筒の外側の主な色、花弁状の管状花の表面の主な色、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の長さ／幅、舌状花の先端の形、舌状花の横断面の内巻きの有無、舌状花の周縁の内巻き部分の比率、舌状花の基部の目の幅（花盤がデイジー型の品種に限る。）、舌状花の基部の目の色、舌状花の下部の主な色、舌状花の中央部の主な色、舌状花の上部の主な色、舌状花の縦縞の明瞭度、舌状花の先端の色、舌状花の裏面の色の区分	
オキザリス	草型、草丈、球根の形、球根の大きさ、球根の色、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の数、がくの形、がく	

	の大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の長さ、一花房の花数、花の香り、開花期	
ルリトウワタ	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	
オゾタムヌス ディオスミフォリウス	樹姿、樹高、樹幅、枝の太さ、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の光沢の強弱、花序の数、花序の高さ、花序の幅、一花序当たりの花の数、つぼみの色、花の長さ、花の幅、総苞の色、柱頭の色、開花始期	
パキラ　アクアティカ	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
シャクヤク	ほう芽期、芽の形、芽の色、草型、草丈、茎の数、茎の太さ、節間長、分枝の多少、茎葉の毛の多少、葉の大きさ、複葉の形、頂小葉の形、葉の緑色の濃淡、葉縁の波打ちの有無、葉の光沢の強弱、葉の厚さ、葉の垂れ、抽だいの難易（薬用品種に限る。）、花首の長さ、花首の太さ、花首のアントシアニン着色の強弱、開花始めの花色、満開時の花色、花の大きさ、花の形、内弁の色（翁咲品種に限る。）、花弁数（一重・金しべ・翁咲品種を除く。）、花弁のぼかしの有無、花弁の絞りの多少、花弁先端の形、花弁の長さ、花弁の幅、雄しべの多少、雌しべの多少、雌しべの状態、柱頭の先端の形、柱頭の色、子房の毛の多少、開花期、枯れ上がり期（薬用品種に限る。）、乾燥根の重量（薬用品種に限る。）、乾燥根の横断面の色（薬用品種に限る。）、ペオニフロリン含量（薬用品種に限る。）	ペオニフロリン含量（薬用品種に限る。）
ボタン	樹姿又は草型、樹高又は草丈、枝又は茎の太さ、枝又は茎の色、新しょう又は茎の毛の多少、発芽期の芽の形、発芽期の芽の色、芽立ち数、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉の厚さ、葉の毛の多少、葉の着生角度、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、やくの色、花首の長さ、花首の太さ、花の香り、発芽期、開花期	
オタネニンジン	茎の数、茎の長さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の位置、葉の数、葉柄の長さ、葉柄の花柄に対する姿勢、葉の表面の凹凸の強弱、葉の緑色の濃淡、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の形、小葉の横断面の形、小葉の周縁の鋸歯の強弱、開花期、花柄の長さ、花序の型、散形花序の最外周の小花の向き、果実の成熟期、果実の色、果実の形、紅葉した葉の色、主根の長さ、主根の太さ、主根の皮色、ほふく茎の有無、オタネニンジンエキス含量、サポニンの有無	オタネニンジンエキス含量、サポニンの有無
むきたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さん表面の毛の多少、菌さん表皮下のゼラチン質の多少、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の菌さんへのつき方、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
パニカム	草状、かんの形状、葉の形状、穂の形状、種子の形状、年生の別、生殖様式の別、草勢、出穂期、出穂性、初期の生育性、再生性、分けつ性、耐倒伏性、脱ぷ性、休眠性、乾物率	
キビ	止め葉の葉しょうの毛、止め葉の姿勢、止め葉のアントシアニン着色の有無、止め葉のアントシアニン着色の強弱、止め葉の長さ、止め葉の幅、稈の節数、稈の上部の節間の長さ、稈の節間の太さ、出穂期、草高、稈の長さ、穂首の長さ、穂の分枝（枝梗）の開度、穂の姿勢、穂の型、穂の長さ、穂の幅、穂の粗密、穂のアントシアニン着色の有無、穂の枝梗の湾曲、穂の枝梗の基部の肥大構造の数、穂の一次枝梗の長さ、小穂の外形、小穂の黄色味の濃淡、穎のアントシアニンの着色、柱頭の色、穎果の大きさ、穎果の形、穎果の色、穎果の斑点の有無、穎果の斑点の大きさ、穎果の千粒重、玄穀粒の色（無精白）、玄穀粒のへその色の濃淡、胚乳の型	
ダリスグラス	草型、茎の形状、葉の形状、穂の形状、やくの色、草勢、分けつ性、出穂期、出穂性、再生性、越冬性、乾物率	
バヒアグラス	草型、茎の形状、葉の形状、穂の形状、種子の粒重、草勢、分けつ性、出穂期、出穂性、再生性、越冬性、乾物率	
トケイソウ（パッションフルーツを除く。）	つるの色、つるの横断面の形、葉の型、葉の長さ、葉の幅、葉の蜜腺の有無、葉の蜜腺の分布、葉身の基部の形、葉身の中央小葉の形（葉身の型が複葉の品種に限る。）、小葉の数（葉身の型が複葉の品種に限る。）、葉身の切れ込みの強弱（葉身の型が分裂葉の品種に限る。）、葉身の切れ込みの数（葉身の型が分裂葉の品種に限る。）、新葉の葉身の表面の色、葉身の表面の色、葉身の裏面の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の分布、葉身の斑の色、葉身の周縁の形、葉身の凹凸、葉身の光沢、花序の型、花の直径、花柄の長さ、苞葉の有無、苞葉の長さ、苞葉の幅、苞葉の形、苞葉の外面の色、がく片の向き、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の形、がく片の縦断面の形、がく片の先端の形、がく片の表面の主な色、がく片の芒の有無、花筒の有無、花筒の長さ、花筒の太さ、花弁の有無、	

	花弁の向き、花弁の長さ、花弁の幅、がくに対する花弁の長さ、花弁の形、花弁の縦断面の形、花弁の先端の形、花弁の表面の主な色、花弁の表面の二次色、花弁の表面の二次色の分布、花弁の表面の二次色のパターン、副花冠の型、副花冠の向き（副花冠が糸状の品種に限る。）、副花冠の長さ、副花冠の太さ（副花冠の型が糸状の品種に限る。）、副花冠の厚さ（副花冠の型が筒状の品種に限る。）、副花冠の数（副花冠の型が糸状の品種に限る。）、副花冠の主な色、副花冠の二次色、副花冠の三次色、副花冠の輪の多少（副花冠の型が糸状の品種に限る。）、副花冠の斑点の多少、副花冠の縮れ（副花冠の型が糸状の品種に限る。）、第二副花冠の有無、花糸の色、花糸の斑点の有無、花糸の斑点の色、花柱の色、花柱の斑点の有無、花柱の斑点の色、子房の色	
パッションフルーツ	つるの色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身先端裂片の幅、葉身の切れ込みの深さ、葉身の緑色の濃淡、葉身の凹凸の有無、葉身の凹凸の強弱、葉柄の長さ、蜜腺の位置、苞（ほう）葉の長さ、がく片の長さ、がく片の幅、花弁の長さ、花弁の幅、喉部の環状斑の色の濃淡、副花冠の直径、副花冠の環状紫斑の有無、副花冠の環状紫斑の幅、副花冠の環状紫斑の色の濃淡、副花冠の先端部の斑点の有無、果実の大きさ、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果皮の色、果点の明瞭さ、果皮の厚さ、種子の大きさ、珠柄の色、果肉の色、果汁の多少、果実の甘味、果実の酸味、収穫始期、収穫期	
サギソウ	草丈、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の色、葉の斑（ふ）の有無、葉の斑（ふ）の主な型、葉の斑（ふ）の主な色、葉の斑（ふ）の二次色、花序の長さ、花序の幅、花序の花数、花穂の密度、花の縦径、花の横径、ドーサルセパルの長さ、ドーサルセパルの幅、ドーサルセパルの長さ／幅、ラテラルセパルの長さ、ラテラルセパルの幅、ラテラルセパルの長さ／幅、ドーサルセパルの裏面の主な色、ドーサルセパルの裏面の斑（ふ）の有無、ドーサルセパルの裏面の斑（ふ）の色、ラテラルセパルの裏面の主な色、ラテラルセパルの裏面の斑（ふ）の有無、ラテラルセパルの裏面の斑（ふ）の色、ペタルの長さ、ペタルの幅、ペタルの長さ／幅、ペタルの縦断面の形、ペタルの横断面の形、ペタルの主な色、ペタルの二次色（二次色のある品種に限る。）、リップの長さ、リップの側裂片の幅、リップの側裂片の切れ込みの深さ、リップの側裂片の色、リップの側裂片に対する中央裂片先端の位置、リップの中央裂片の色、リップの距の曲がり、リップの距の長さ、開花の早晩	
ペラルゴニウム（ペラルゴニウム　グランディフロラム及びゼラニウムを除く。）	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少、たく葉の形、たく葉の大きさ、たく葉の色、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の色、葉柄の毛の多少、葉の香り、花房の形、花の向き、花形、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の厚さ、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がく片の距の大きさ、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花柄の毛の多少、一花房の花数、花の香り、開花期	
ペラルゴニウム　グランディフロラム	草丈、株幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の基部の重なり、葉身の切れ込み、葉身の周縁部の切れ込み、葉身の斑（ふ）の有無、葉身の緑色の濃淡、花の長さ、花の幅、がく片の長さ、がく片の幅、小花柄のアントシアニンの着色、上部花弁の周縁部の波打ち、上部花弁の周縁部の主な色、上部花弁の周縁部と中間部の間の主な色、上部花弁の中間部の主な色、上部花弁の中央の模様、上部花弁の基部の複色部、上部花弁の基部の複色部の色、下部花弁の周縁部の主な色、下部花弁の周縁部と中間部の間の主な色、下部花弁の中間部の主な色、下部花弁の中央の模様、下部花弁の基部の複色部、下部花弁の基部の複色部の色	
ゼラニウム	草姿、茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）、茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）、株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）、茎の色（アントシアニンを除く。）、茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の切れ込みの深さ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の基部の重なり、葉身の斑（ふ）の有無、葉身の主な色（環状紋を除く。）、葉身の二次色（環状紋を除く。）、葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）、葉身の表面の環状紋の明瞭度、葉身の環状紋の位置、葉身の環状紋の相対的な大きさ、花柄の長さ、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱、花序の長さ、花序の幅、一花序の開花数、最大花の長さ、最大花の幅、小花柄の長さ、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱、小花柄の突起の有無、花型、下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）、花弁の数（八重品種に限る。）、横から見た花の断面の形、花弁の不規則な条や斑点の有無、花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）、花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）、がくの反転の強弱、最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱、上部花弁の幅、上部花弁の形、上部花弁の先端の形、上部花弁の表面の周縁部の色、上部花弁の表面の中央部の色、上部花弁の裏面の色、上部花弁の模様の明瞭度、上部花弁の模様の形、上部花弁の最大の斑点の大きさ、上部花弁の斑点の色、上部花弁の基部の複色部の有無、上部花弁の基部の複色部の大きさ、上部花弁の基部の複色部の色、下部花弁の表面の周縁部の色、下部花弁の表面の中央部の色、下部花弁の裏面の色、下部花弁の模様の明瞭度、下部花弁の模様の形、下部花弁の最大の斑点の大きさ、下部花弁の基部の複色部の有無、下部花弁の基部の複色部の大きさ、下部花弁の基部の複色部の色、内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）、開花始期	
ペンニセツム　セタケウム	草型、葉群の高さ、株幅、分げつ数、稈（かん）の長さ、葉の数、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の緑色の濃淡、葉身の表面の斑（ふ）の有無、葉身の表面の	

	斑の模様、葉身の表面の斑の色、葉身の表面のアントシアニン着色の有無、葉身の表面のアントシアニン着色の面積、葉身の表面のアントシアニン着色部の主な色、葉身の裏面の主な色、葉身の裏面の二次色の有無、葉身の裏面の二次色、穂の長さ、穂の幅、穂のアントシアニン着色の有無、穂のアントシアニン着色の面積、小穂の着生の粗密、花柱の色、出穂期	
ペンステモン	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	
ペンタス	草姿、草丈、茎の節間長、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の毛の粗密、葉身の波打ちの強弱、花序の花の数、花序の長径、花序の短径、花序の高さ、花序の上部の形、花型、花冠の直径、花筒の長さ、花筒の色、花喉部の内面の毛の色、花冠裂片の向き、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色（単色品種を除く。）、花冠裂片の表面の二次色の分布（単色品種を除く。）、やくの花喉部上部に対する位置、花粉の色、花柱の長さ、柱頭の大きさ、柱頭の色	
ペペロミア	草型、草丈、株幅、葉の数（ロゼット型の品種に限る。）、茎の長さ（ロゼット型の品種を除く。）、茎の太さ（ロゼット型の品種を除く。）、節数（ロゼット型の品種を除く。）、節間長（ロゼット型の品種を除く。）、茎の緑色の濃淡（ロゼット型の品種を除く。）、茎のアントシアニン着色の有無（ロゼット型の品種を除く。）、茎のアントシアニン着色の面積（ロゼット型の品種を除く。）、葉序（ロゼット型の品種を除く。）、葉の着き方、葉の向き（ロゼット型の品種に限る。）、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の横断面の形、葉身の表面の光沢、葉身の表面の凹凸、葉身の毛の多少、新葉の表面の主な色、新葉の表面の二次色（２色以上の品種に限る。）、新葉の表面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、成葉の表面の色数、成葉の表面の主な色、成葉の表面の二次色（２色以上の品種に限る。）、成葉の表面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、成葉の表面の三次色（３色以上の品種に限る。）、成葉の表面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、成葉の裏面の色数、成葉の裏面の主な色、成葉の裏面の二次色（２色以上の品種に限る。）、成葉の裏面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、葉柄の長さ、葉柄の毛の多少、葉柄の色	
ヒメツルソバ	草丈、茎の長さ、茎の太さ、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の周縁の波打ち、葉の表面の主な色、葉の表面の斑の有無、葉の表面の斑の主な模様、葉の表面の斑の色数、葉の表面の斑の主な色、葉の表面の斑の二次色（２色以上の品種に限る。）、葉の表面の斑の三次色（３色以上の品種に限る。）、葉の表面の帯状紋の明瞭度、葉の裏面のアントシアニンの着色、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、頭状花序の長さ、頭状花序の幅、頭状花序の主な色	
シソ	胚軸のアントシアニン着色、幼苗の色、植物体の高さ、側枝の数、茎の断面の形、茎の毛、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の横断面の形、葉身の表面の色、葉身の表面の色の濃淡、葉身の光沢の強弱、葉身の裏面の色、葉身の裏面の紫色の濃淡、葉身の山脈状の凹凸の強弱、葉身の水ほう状の凹凸の強弱、葉身の周縁部の波打ちの強弱、葉身の周縁部の切れ込みの型、葉身の周縁部の切れ込みの密度、葉身の周縁部の切れ込みの深さ、葉身の周縁部の小型鋸歯、葉柄の長さ、花穂の位置、花穂の数、花穂の長さ、小花の型、小花の大きさ、小花の色、小花の赤紫色の濃淡、がくの大きさ、がくのアントシアニン着色、苞の大きさ、開花期、種子の大きさ、種子の色、乾燥種子の重さ	
フキ	葉色その他葉の形状、葉数、葉柄の大きさ、葉柄横断面の形、葉柄の色、花らいの大きさ、花らい発生数、苞のアントシアンの着色、早晩性、ほう芽性、葉柄の硬さ	
パセリ	草丈、株の幅、葉の粗密、葉の数、草姿、葉身の縮みの有無、葉身の縮みの強弱、草冠の粗密（縮みのある品種に限る。）、葉裂片の反転の有無（縮みのある品種に限る。）、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の縦／横、葉身の緑色の濃淡、小葉の形、第一小葉対と第二小葉対間の長さ、小葉の周縁の波打ちの強弱、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、主根の肥厚の有無、根の長さ（根パセリ品種に限る。）、根の太さ（根パセリ品種に限る。）、根の長さ／太さ（根パセリ品種に限る。）、根の分岐性（根パセリ品種に限る。）	
ペチュニア	草姿、草丈、茎の長さ、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の先端の形、葉の斑の有無、葉の主な色、小花柄の長さ、小花柄のアントシアニンの着色、がく片の長さ、がく片の幅、花型、花の粗密（八重品種に限る。）、花の幅、花の切れ込み、花の波打ち、花の脈、花の脈の色、花の主な色、花の二次色（二次色のある品種に限る。）、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）、花の三次色（三次色のある品種に限る。）、開花初	

	期の花の主な色、開花後期の花の主な色、花冠裂片の先端の形、花筒の幅（一重品種に限る。）、花筒の内面の主な色、花筒の内面の脈、花筒の外面の主な色、やくの花粉の色（一重品種に限る。）	
ファレノプシス	植物体の長さ、植物体の花序の数、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の最大幅の位置、葉の先端の形、葉の先端の対称性、葉の向き、葉の斑の有無、葉の表面の斑点の有無、葉の表面の主な色、葉の表面のアントシアニンの着色、花序の型、花序の長さ、花序の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎のアントシアニンの着色、花の側面の形、花の縦径、花の横径、花のペタルの配列、花の香り、ドーサルセパルの長さ、ドーサルセパルの幅、ドーサルセパルの形、ドーサルセパルの最大幅の位置、ドーサルセパルの縦断面の形、ドーサルセパルの横断面の形、ドーサルセパルのねじれの有無、ドーサルセパルの周縁の波打ち、ドーサルセパルの表面の地色、ドーサルセパルの覆色、ドーサルセパルの斑点の数、ドーサルセパルの斑点の大きさ、ドーサルセパルの斑点の色、ドーサルセパルの縞斑の数、ドーサルセパルの縞斑の色、ドーサルセパルの網斑の密度、ドーサルセパルの網斑の色、ラテラルセパルの表面の地色、ラテラルセパルの覆色、ラテラルセパルの斑点の数、ラテラルセパルの斑点の色、ラテラルセパルの縞斑の数、ラテラルセパルの縞斑の色、ラテラルセパルの網斑の密度、ラテラルセパルの網斑の色、ペタルの長さ、ペタルの幅、ペタルの正面の形、ペタルの最大幅の位置、ペタルの縦断面の形、ペタルの横断面の形、ペタルのねじれの有無、ペタルの周縁の波打ち、ペタルの表面の地色、ペタルの覆色、ペタルの覆色の面積、ペタルの斑点の数、ペタルの斑点の大きさ、ペタルの斑点の色、ペタルの縞斑の数、ペタルの縞斑の色、ペタルの網斑の密度、ペタルの網斑の色、リップの中央裂片の長さ、リップの中央裂片の幅、リップの中央裂片の形、リップのヒゲの有無、リップのヒゲの長さ、リップの中央裂片の突起又は稜、リップの側裂片の形、リップの側裂片の巻き込み、リップの側裂片の大きさ、中央裂片の地色、中央裂片の覆色、中央裂片の斑点の数、中央裂片の斑点の大きさ、中央裂片の斑点の色、中央裂片の縞斑の数、中央裂片の縞斑の色、中央裂片の網斑の密度、中央裂片の網斑の色、側裂片の地色、側裂片の覆色、側裂片の斑点の数、側裂片の斑点の色、側裂片の縞斑の数、側裂片の縞斑の色、側裂片の網斑の密度、側裂片の網斑の色、リップのカルス、カルスの色、カルスの毛の有無、ずい柱の色	
ベニハナインゲン	胚軸のアントシアニン着色の有無、草型、草丈（矮性品種に限る。）、つるの伸長開始期（つる性品種に限る。）、つる伸長の速さ（つる性品種に限る。）、葉の地色、葉の色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）、葉の凹凸の強弱、先端小葉の大きさ、先端小葉の形、先端小葉の先端の形、旗弁の色、翼弁の色、さやの長さ、さやの幅、さやの緑色の濃淡、さやの縫合部のすじの有無、さやの曲がりの強弱、さやの曲がり方、さやの先端の形、さやの表面の粗滑、さやの嘴の長さ、さやの嘴の曲がりの強弱、さやのくびれ、一さや内粒数、百粒重、種子の縦断面の形、種子の横断面の形、種子の色数、種子の主な色、種子の二次色（種子が複色の品種に限る。）、種子の二次色の分布（種子が複色の品種に限る。）、種子の脈模様（種子の主な色が白の品種に限る。）、種子の環色、開花期、成熟期	
いんげん豆	草性、茎の形状、葉の形状、花の形状、さやの形状、子実の形状、子実の粒重、子実の品質、熟性	
キリンソウ	分枝性、草姿、冬期の草丈、草丈、冬期の株の幅、株の幅、冬期の茎の長さ、茎の長さ、冬期の茎の太さ、茎の太さ、冬期の茎の色、茎の色、越冬芽の有無、越冬芽の展葉の早晩、冬期の葉の数、葉の数、葉の向き、冬期の葉の長さ、葉の長さ、冬期の葉の幅、葉の幅、冬期の葉の厚さ、葉の厚さ、冬期の葉の形、葉の形、冬期の葉の基部の形、葉の基部の形、葉の先端部の形、葉の横断面の反り、葉の縦断面の反り、冬期の葉のアントシアニン着色の強弱、冬期の葉のアントシアニン分布、冬期の葉の主な色、葉の主な色、葉の斑の有無、葉の斑の色、葉の斑の模様、葉の鋸歯の形、葉の鋸歯の大きさ、葉の鋸歯の分布、花序の長さ、花序の幅、花の直径、がくのアントシアニン着色の有無、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片の表面の色、やくの色、開花期	
ヒロデンドロン	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	
チモシー	草型、茎の形状、葉の形状、穂の形状、種子の形状、種子の粒重、植物体の広がり、草勢、出穂期、出穂性、ねん性、再生性、越冬性、耐倒伏性、乾物率	
ぬめりすぎたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さん表面の粘質物の多少、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄表面の粘質物の多少、菌柄のりん皮の多少、菌柄の肉質、つばの状態、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	

なめこ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの表面の粘質物の多少、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
フロックス（フロックス　パニキュラータを除く。）	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	
フロックス　パニキュラータ	草丈、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の強弱、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の最大幅の位置、葉の横断面の形、葉の先端の形、葉の斑の有無、葉の表面のアントシアニン着色の強弱、葉の周縁の波打ちの強弱、花の数、小花柄の長さ、小花柄のアントシアニン着色の強弱、がくの長さ、がくのアントシアニン着色の強弱、花の直径、花被の有無、花筒の長さ、花筒の直径、花筒の色、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片表面の主な色（目を除く。）、花冠裂片表面の二次色、花冠の目の有無、花冠の目の色、やくの色、花柱の色	
フォルミウム	草姿、草丈、分枝の数、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の反り、葉身の横断面の形、葉身のねじれの有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の色数、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色の模様の形、葉身の表面の二次色、葉身の表面の三次色の模様の形、葉身の表面の三次色、葉身の表面の色の安定度、葉身の裏面の色数、葉身の裏面の主な色、葉身の裏面の二次色、葉身の裏面の三次色、葉身の表面の光沢の有無	
カナメモチ	樹姿、樹高、新しょうの色、枝の皮目の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、新葉の主な色、葉身の斑の有無、葉身の斑の模様、葉身の斑の色、葉縁の鋸歯の深さ、葉柄の長さ、葉身の長さ／葉柄の長さ、花序の型、花序の大きさ、花の大きさ、花弁の主な色	
イワダレソウ	草姿、草丈、茎の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
ホオズキ	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、分枝性、節間長、節数、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花の大きさ、花色、第一花着生節位、花喉部の斑点の有無、がくの形、がくの大きさ、がくの色、がくの着色始期、一花房の花数、果実の大きさ、果実の色、開花期	
テマリシモツケ	樹姿、樹高、樹幅、新梢のアントシアニン着色の強弱、枝の主な色、枝の横断面の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の鋸歯の形、葉身の切れ込みの深さ、幼葉の表面の主な色、幼葉の裏面の主な色、成葉の表面の主な色、成葉の裏面の主な色、成葉の表面の斑の有無、成葉の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）、葉身の裏面の毛の有無、葉身の裏面の毛の粗密（毛のある品種に限る。）、葉柄の長さ、葉柄の色、花の直径、花弁の表面の主な色	
カクトラノオ	草丈、茎の太さ、茎の色、節数、節間長、側枝の多少、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の波打ち、葉身の色、葉身の斑の有無、花穂の数、花穂の長さ、花穂の幅、がくの主な色、花の長さ、花冠の幅、花冠の縦径、花冠筒部の幅、花冠筒部の縦径、花冠筒部外面の側部の色、花冠筒部の内面の模様の有無、花冠筒部の内面の模様の分布、上唇弁の外面の主な色、下唇弁中央裂片の反りの強弱、下唇弁中央裂片の内面の主な色、下唇弁中央裂片の内面の模様の色、開花始期	
アセビ	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
ピレア　デプレッサ	草丈、側枝の粗密、側枝の長さ、側枝の太さ、側枝の毛の有無、側枝のアントシアニンの着色、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉柄の長さ、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の周縁の鋸歯の有無、葉身の周縁の鋸歯の分布、葉身の周縁の鋸歯の深さ、葉身の表面の色、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の主な色、葉身の裏面の色	
ニヨウマツ	樹形、樹冠形、樹の高さ、樹の太さ、樹幹の曲がり、幹の横断面中央部の色（製材用品種のみ）、幹の横断面中央部を除く色（製材用品種のみ）、樹皮の色、樹皮の厚さ、樹皮の亀裂の有無、樹皮の亀裂の型、枝の長さ、枝の太さ、枝の着生角度、輪生枝の数、葉束の針葉の数、針葉の長さ、針葉の幅、針葉の先端部の形、夏季の針葉の色、冬季の針葉の色、針葉のねじれ、針葉の曲がり、針葉の斑の有無、針葉の斑の分布、針葉の斑の色、針葉の色の季節変化、雌花の主な色、雄花の主な色、球果の形、球果の長さ、球果の色、冬芽の形、冬芽の色、冬芽の鱗片の反転の有無、種鱗先端の突起の大きさ、種子の翼の褐色の濃淡、種子の色、種子の千粒重	
ゴヨウマツ	樹型、樹冠の形、樹高、枝の太さ、枝の着生角度、枝の着生密度、針葉束当たりの針葉の数、針葉の長さ、針葉の幅、針葉の先端の形、針葉の先端の	

	屈曲の有無、針葉のねじれの多少、針葉の曲りの強弱、針葉の夏の主な色、針葉の斑の有無、針葉の斑の色（斑のある品種に限る。）、針葉の斑の型（斑のある品種に限る。）、針葉の冬の主な色、針葉の色の季節変化、雄花の色、雌花の色、球果の長さ、球果の幅、球果の形、球果の色、種子の長さ、種子の幅、種子の形、種子の色、種子に対する種翼の長さ、種翼の色	
ボタンウキクサ	草姿、草丈、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
エンドウ	草性、茎の形状、葉の形状、花の形状、さやの形状、子実の形状、子実の粒重、子実の品質、熟性、着花習性	
クロバトベラ	樹姿、樹皮の色、当年枝の長さ、当年枝の節間の長さ、当年枝の色、当年枝の毛の有無、新葉の葉身のアントシアニンの着色、新葉の葉身の色数、新葉の葉身の主な色、新葉の葉身の二次色、新葉の葉身の二次色の分布、新葉の葉身の三次色、新葉の葉身の三次色の分布、新葉の葉身周縁の波打ち、成葉の葉身の長さ、成葉の葉身の幅、成葉の葉身の形、成葉の葉身のアントシアニンの着色、成葉の葉身の主な色、成葉の葉身の二次色、成葉の葉身の二次色の分布、成葉の葉身の三次色、成葉の葉身の三次色の分布、成葉の葉身周縁の波打ち、成葉の葉身の光沢、成葉の葉身の裏面の毛の有無	
ピティロディア　テルミナリス	草姿、草丈、開花枝の長さ、開花枝の太さ、節数、節間長、開花枝の毛の多少、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の先端の形、葉の縦断面の形、葉の横断面の形、葉の毛の多少、着花節部の長さ、着花節数、花数、花冠の縦径、花冠の横径、花冠筒部の長さ、花冠筒部の外面の色、花冠筒部の内面の斑点の有無、花冠筒部の内面の斑点の色、花冠裂片の色、花冠裂片の模様の有無、花冠裂片の毛の多少、がくの長さ、がくのアントシアニン着色の有無、がくの毛の多少	
コノテガシワ	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
プレクトランツス	草姿、茎の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
たもぎたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、子実層たくの菌柄のつき方、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の菌さんへのつき方、菌柄の毛の色、菌柄の毛の多少、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
おおひらたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、乾物率、子実体の平均乾燥重量	
くろあわびたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、子実層たくの菌柄へのつき方、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の菌さんへのつき方、菌柄の毛の色、菌柄の毛の多少、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
エリンギ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの紋様、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄表面の形質、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、乾物率、子実体の平均乾燥重量	
ひらたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、子実層たくの菌柄へのつき方、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の菌さんへのつき方、菌柄の毛の色、菌柄の毛の多少、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
うすひらたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、子実層たくの菌柄へのつき方、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の菌さんへのつき方、菌柄の毛の色、菌柄の毛の多少、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、乾物率、子実体の平均乾燥重量	
キキョウ	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	
チューベロース	草丈、葉群の姿勢、葉群の高さ、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の色、苞葉の長さ、苞葉の幅、苞葉の長さ／幅、苞葉裏面の色、花序の長さ、１花序の花らい数、花序軸の屈曲、花序軸のアントシアニンの着色、つぼみの主な色、花型、花の向き、花の直径、花被筒部	

	の長さ、花被筒部の直径、花被筒部の湾曲、花被筒部の主な色、花被片の数、中央外花被片の長さ、中央外花被片の幅、中央外花被片の長さ／幅、中央外花被片の先端部の形、中央外花被片の主な色、中央外花被片の複色の有無、中央外花被片の複色、花の香り	
アマドコロ	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	
タイワンモミジ	樹高、株幅、葉の粗密、葉の型、葉の長さ、葉の幅、葉軸の主な色、新葉の表面の色、葉の表面の色、葉の斑（ふ）の有無、葉の斑（ふ）の主な色、葉の斑（ふ）の分布、羽片の多少、羽片の長さ、羽片の幅、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の形、小葉の先端部の形、小葉の基部の形、小葉の切れ込みの多少、小葉の切れ込みの深さ、小葉の鋸歯（きょし）の多少	
ポリスキアス スクテラリア	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
ケンタッキーブルーグラス	草型、茎の形状、葉の形状、穂の形状、地下ほふく茎の形状、種子の形状、種子の粒重、アントシアンの着色、草勢、茎葉の緑度の維持、出穂期、出穂性、再生性、生育期間、越冬性、越夏性、乾物率	
イヌマキ	樹姿、幹の通直性、幹の完満性、幹の真円性、材の色、樹脂の多少、材の比重、樹皮の色、樹皮の厚さ、樹皮のき裂紋様、枝の太さ、枝の長さ、枝角、枝付き密度、枝の色、葉形、葉の大きさ、葉色、花色、果実の形、果実の大きさ、果実の色、成長性、発根性、結実性	
たまちょれいたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、りん皮の付着部位、りん皮の色、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の菌さんへのつき方、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
カラタチ	樹姿、樹の大きさ、樹勢、枝しょうの太さ、節間長、枝しょうの色、枝しょうのとげの多少、葉形、葉の大きさ、網脈の鮮明度、翼葉の形、翼葉の大きさ、葉柄の長さ、葉柄の太さ、花序、花の大きさ、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の数、花糸の数、花糸の分離、子房の形、子房の大きさ、花粉の多少、果形、果実の大きさ、果皮の色、油胞の大きさ、果面の粗滑、果皮の厚さ、はく皮の難易、じょうのう膜の硬さ、砂じょうの形、砂じょうの大きさ、砂じょうの色、果汁の多少、甘味、酸味、苦味、種子数、はいの色、はいの数、発芽期、開花期、収穫期	
ウチョウラン	草型、草丈、茎又はぎ球茎の形、茎の太さ、ぎ球茎の大きさ、茎の毛の多少、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の厚さ、一花茎の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の色、花茎の抽出角度、花茎の分枝性、花芽の発生位置、花の香り、開花期	
ハコヤナギ（ポプラ）	樹姿、幹の通直性、幹の完満性、幹の真円性、材の色、繊維配列、繊維の長さ、もくの形、材の比重、樹皮の色、樹皮の厚さ、樹皮の紋様、枝の太さ、枝の長さ、枝角、枝付き密度、枝の毛の多少、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少、葉の毛の形、葉の毛の色、花房の形、花形、花の大きさ、花色、一花房の花数、果実の形、果実の大きさ、果実の色、種子の形、種子の大きさ、種子の色、発芽期、開花期、落葉性、成長性、ほう芽性、発根性、結実性、枝の樹脂の分泌の有無、冬芽の樹脂の分泌の有無、葉の樹脂の分泌の有無	
マツバボタン	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数、花の香り、開花期	
スベリヒユ	草姿、草丈（草姿が半直立の品種に限る。）、株の幅、茎の数、茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の斑（ふ）の有無、葉身の斑（ふ）の色（斑（ふ）のある品種に限る。）、葉身の周縁のアントシアニン着色の有無、葉柄の有無、仮雄ずいの弁化の有無、弁化した仮雄ずいの主な色、花の側面の形（弁化した仮雄ずいのない品種に限る。）、花の大きさ、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の目の有無、花弁の目の色、花弁の色数（目を除く。）、花弁の主な色（目を除く。）、花弁の二次色（目を除く。）（２色以上の品種に限る。）、花弁の二次色の分布（目を除く。）（２色以上の品種に限る。）、花弁の三次色の分布（目を除く。）（３色以上の品種に限る。）、花弁の先端の切れ込みの深さ、がくのアントシアニン着色の有無、花柱のアントシアニン着色の強弱、開花始期	
オヘビイチゴ	ほふく枝の数、ほふく枝の長さ、葉柄の長さ、葉の大きさ、葉の長さ／幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑（ふ）の有無、頂小葉の長さ、頂小葉の幅、花の数、花型、花の直径、花弁の重なり（一重品種に限る。）、花弁の先端部の形、花弁の色、開花始期	

プラティア　ペダンキュラータ	草姿、草丈、茎の形状、葉の形状、花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）、品質特性、早晩性	
プリムラ（在来サクラソウを除く。）	草丈、花序の数、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の長さ／葉柄の長さ、葉身の最大幅の位置、葉身の表面の主な色、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無、葉身の切れ込みの深さ、葉身の切れ込みの粗密、葉身の周縁の波打ち、葉身の表面の毛の多少、葉身の裏面の白粉、花序の型、花序の段差の明瞭度、花の向き、花柄の抽出、花柄の長さ、花柄のアントシアニンの着色、花柄の毛の多少、がくの長さ、がくの幅、がくの白粉、花型、花の大きさ、花冠裂片の数、花冠裂片の向き、花冠裂片の重なり（一重品種に限る。）、花冠裂片の主な色、花冠裂片の裏面の主な色、花色の移行性、花冠の目の有無、花冠の目の大きさ（一重品種に限る。）、花冠の目の色、花冠の蛇の目の有無、花冠の蛇の目の色、花冠の覆輪の有無、花冠の覆輪の大きさ、花冠の覆輪の色、花冠の縞斑の有無、花冠の縞斑の色、花冠裂片の切れ込み、花冠裂片の波打ち、花の香り、開花始期	
在来サクラソウ	草型、草丈、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、葉の着生角度、葉の裏面の白粉の多少、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の厚さ、花弁数、雌雄ずいの長さ、雄ずいの着生位置、がくの形、がくの大きさ、がくの毛の多少、がくの内面の白粉の程度、一花房の花数、花柄の太さ、花柄の長さ、花柄の毛の多少、花柄の白粉の多少、花の香り、開花期	
プロスタンテラ	樹姿、樹高、株幅、茎のアントシアニンの着色、茎の毛の多少、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の横断面の形、新葉の色、葉身の色、葉身の斑の有無、新葉の斑の色、葉身の斑の色、葉身の先端の形、葉身の毛の多少、葉身の凹凸、葉身の周縁の形、葉柄の有無、がくの長さ、がくの色、花冠の長さ、花冠の幅、花筒の内面の模様の有無、花筒の内面の模様の色、花筒の外面の主な色、唇弁の色、下唇弁の中央裂片の形、下唇弁の側裂片の形、葉の香り、開花始期	
プロテア　キナロイデス	樹姿、樹高、株の幅、葉の発生密度、花基部からの側枝の発生の有無、木質塊茎の有無、主茎の太さ（木質塊茎のない品種に限る。）、主茎の色（木質塊茎のない品種に限る。）、直立葉の有無、葉の着生角度、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉の横断面の形、葉色、葉の毛じの有無、葉の毛じの密度、葉上面の主脈の明瞭度、葉上面の主脈の色、葉の周縁の波打ちの有無、葉の周縁の色、葉柄の有無、葉柄の長さ、花枝の長さ、花枝の太さ、花枝の硬さ、花枝の毛じの有無、花枝の毛じの密度、花枝の色、花基部の狭窄部の有無、花基部の狭窄部の長さ、花の厚さ、花の直径、花の厚さ／直径、花序の直径、総苞の形状、花の主な色、外側総苞片の見かけの長さ、外側総苞片の長さ、外側総苞片の幅、外側総苞片の先端部の形、外側総苞片の周縁の乾燥組織の有無、外側総苞片の周縁の乾燥組織の幅、外側総苞片の周縁の乾燥組織下部の色、外側総苞片中央部の色、内側総苞片の数、内側総苞片の見かけの長さ、内側総苞片の長さ、内側総苞片の幅、内側総苞片の形、内側総苞片の先端部の形、内側総苞片の先端部の内曲の強弱、内側総苞片外側の先端部の色、内側総苞片内側の先端部の色（キナロイデス種に限る。）、内側総苞片外側の先端下部の色、内側総苞片内側の先端下部の色（キナロイデス種に限る。）、内側総苞片外側の毛じの有無、内側総苞片外側の毛じの密度、内側総苞片外側のろう質の有無、内側総苞片の周縁のフリンジの有無、内側総苞片の先端のタフトの有無、内側総苞片の先端のタフトの色、内側総苞片の先端のタフトの長さ、総苞片の樹脂の有無、総苞片の着生密度指数、総苞片に対する花序の位置、花序の先端の形、花序の色、花被の長さ、花柱の長さ、二次的花粉表出部の接合部の明瞭度、二次的花粉表出部の長さ、開花期	
ツタ	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
サクラ	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、新しょうの毛の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少、葉柄の長さ、葉柄の毛の多少、葉柄のみつせんの形、葉苞の形、葉苞の大きさ、花房の形、つぼみの色、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の厚さ、花弁数、雌雄ずいの長さ、雌雄ずいの色、雄ずいの数、子房の毛の有無、がくの形、がくの大きさ、がくの色、がくの毛の多少、がく片の数、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、一花房の花数、花の香り、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、着果性	
スモモ（ニホンスモモを除く。）	樹姿、樹の大きさ、樹勢、枝しょうの太さ、節間長、枝しょうの色、芽の形、葉形、葉の毛じの多少、葉の大きさ、葉色、蜜腺の形、花形、花の大きさ、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の数、雌ずいの数、雌ずいの健否、雄ずいの色、花粉の多少、がく筒内壁の色、がくの形、がくの色、花柄の長さ、果形、果実の大きさ、果皮の色、果粉の多少、果肉の色、肉質、果汁の多少、甘味、酸味、核と果肉の粘離、核の形、核の大きさ、核の色、核の紋、開花期、発芽期、落葉期、成熟期、結果性、裂果性	

アンズ	樹勢、樹姿、枝の発生の強弱、花芽の着生部位、新しょうのアントシアニン着色の強弱、枝の陽光面の色、芽の座の大きさ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の緑色の濃淡、葉身の基部の形、葉身の先端の角度、葉身の先端突起の長さ、葉身の鋸歯の形、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の横断面の形、葉柄の長さ、葉身の長さ／葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、蜜腺の数、蜜腺の大きさ、花の直径、柱頭のやくに対する位置、花弁の形、花弁の裏面の色、果実の大きさ、果実の横面の形、果実の正面の形、果実の高さ、果実の横面の幅、果実の正面の幅、果実の高さ／正面の幅、果実の横面の幅／正面の幅、果実の正面の対称性、果実の縫合線の深さ、果実の梗あの深さ、果頂部の形、果頂部の小突起の有無、果面の粗滑、果皮の毛じの有無、果皮の光沢の強弱（毛じのない品種に限る。）、果実の地色、果実の着色部の面積、果皮を覆う色、果実の着色の濃淡、果実の着色の分布、果肉の色、果肉の粗密、果肉の硬さ、果実の重さ／核の重さ、核と果肉の粘離の強弱、核の横面の形、仁の苦味、開花始期、成熟始期	
オウトウ（甘果）	樹勢、樹姿、分枝の発生の強弱、新しょうのアントシアニン着色の強弱、新しょうの先端の毛じの粗密、節間長、枝の皮目の数、枝の太さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の緑色の濃淡、葉柄の長さ、葉身の長さ／葉柄の長さ、蜜腺の有無、蜜腺の色、花の直径、花弁の形、花弁の重なり、果実の大きさ、果実の形、果頂部の形、果実の縫合線の明瞭度、果柄の長さ、果柄の太さ、果実と果柄の間の離層の有無、果皮の色、果皮の皮目の大きさ、果皮の皮目の数、果皮の厚さ、果肉の色、果汁の色、果実の硬さ、果実の酸味、果実の甘味、果汁の多少、核の大きさ、核の形、果実の大きさ／核の大きさ、開花始期、収穫始期	
ウメ	樹姿、樹勢、花芽の着生部位、枝の太さ、節間長、枝の色、新葉の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の先端突起の長さ、葉身の基部の形、葉身の毛じの粗密、たく葉の形、花型、花の大きさ、花弁の形、花弁の重なり、花の色、花粉の稔性、がく先端の反りの強弱、がくの色、果実の大きさ、果実の縦断面の形、果頂部の形、果実の縫合線の深さ、果実の非対称性、果皮の色、果皮のアントシアニン着色の強弱、果肉の色、肉質、核の形、核の頂端の形、核の大きさ／果実の大きさ、核の表面の粗滑、核と果肉の粘離、開花期、ほう芽期、成熟期、落葉期、生理落果の多少、ゴム質果の発生割合、自家和合性	
モモ及びネクタリン	樹の大きさ、樹勢、樹姿、枝の太さ、節間長、着花枝のアントシアニン着色の有無、着花枝のアントシアニン着色の強弱、着花枝の花芽の粗密、花芽の着き方、花の咲き型、がく筒の内側の色、花冠の表面の色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の数、雄ずいの花弁に対する位置、柱頭のやくに対する位置、花粉の有無、子房の毛じの有無、新しょうのたく葉の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の横断面の形、葉身の先端の反りの有無、葉身の基部の形、葉身の先端の角度、葉身の色、葉身の裏面主脈の着色の有無、葉柄の長さ、蜜腺の有無、蜜腺の形、蜜腺の数、果実の大きさ、果実の形、果頂部の形、果実の対称性、縫合線の強弱、梗あの深さ、梗あの幅、果実の地色、果実の着色の有無、果実の着色の色、果実の着色の型、果実の着色面積、果実の毛じの有無、果実の毛じの粗密、果皮の厚さ、果皮の付着性、果肉の硬さ、果肉の地色、果皮直下のアントシアニン着色の強弱、果肉のアントシアニン着色の強弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱、果実の肉質、果実の甘味、果実の酸味、核の大きさ、核の横面の形、核の褐色の濃淡、核の表面の紋様、核割れの多少、核と果肉の粘離の有無、核と果肉の粘離の強弱、葉芽のほう芽期、開花始期、開花期間、収穫期、後期落果性	
ニホンスモモ	樹勢、樹冠の粗密、枝の発生の向き、枝の色の濃淡、短果枝の長さ、芽の大きさ、芽の形、葉芽の着き方、葉身の着生の向き、葉身の形、葉身の先端の角度、葉身の緑色の濃淡、葉身の光沢の強弱、葉身の毛の粗密、葉身の鋸歯の形、葉柄の長さ、葉柄の毛の粗密、葉柄の溝の深さ、蜜腺の位置、花柄の長さ、一年枝の着花の有無、八重咲花の出現頻度、花の大きさ、花弁の重なり、がく片の形、花弁の大きさ、花弁の形、花弁の波打ちの強弱、柱頭のやくに対する位置、果実の大きさ、果実の形、果実の対称性、果頂部の形、梗あの深さ、果皮の地色、果皮を覆う色、果肉の色、果肉の硬さ、果汁の多少、果実の酸味、果実の甘味、核の粘離、核の大きさ、核の横面の形、核の正面の形、核の基部から見た形、核の横面の対称性、核の最大幅の位置、核の表面の粗滑、核の基部の幅、核の基部の角度、核の頂部の形、開花始期、成熟期	
ユスラウメ	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、新しょうの毛の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少、葉柄の長さ、葉柄の毛の多少、葉柄のみつせんの形、葉苞の形、葉苞の大きさ、花房の形、つぼみの色、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の厚さ、花弁数、雌雄ずいの長さ、雌雄ずいの色、雄ずいの数、子房の毛の有無、がくの形、がくの大きさ、がくの色、がくの毛の多少、がく片の数、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、一花房の花数、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期	
カリン	樹姿、樹の大きさ、樹勢、枝しょうの太さ、節間長、皮目の大きさ、皮目の多少、枝しょうの毛じの多少、短花枝の着生、えき花芽の着生、芽の形、	

	葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛じの多少、たく葉の形、たく葉の大きさ、葉柄の長さ、葉柄の太さ、一花そうの花数、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の色、花弁の数、雄ずいの数、やくの色、花粉の多少、果形、果実の大きさ、果皮の色、果面毛じの多少、果点の形、果点の大きさ、果点の密度、果面の粗滑、果面のさびの発生、果こうの長さ、果こうの太さ、肉こうの有無、果心の形、果心の大きさ、心室の数、果肉の色、肉質、甘味、酸味、果汁の多少、種子の形、種子の大きさ、種子数、発芽期、開花期、落葉期、収穫期	
シカクマメ	草性、茎の形状、葉の形状、花の形状、さやの形状、子実の形状、子実の粒重、子実の品質、塊根の形状、生態型、熟性、着花習性	
アサクサノリ	糸状体の色、葉形、葉長、葉色、葉の厚さ	
スサビノリ	糸状体の色、葉形、葉長、葉色、葉の厚さ	
セイヨウナシ	樹勢、分枝性、樹姿、枝の伸び方、節間長、枝の主な色、皮目の数、葉芽の先端の形、葉芽の着き方、芽の着生部の大きさ、新しょう先端のアントシアニン着色の強弱、新しょうの毛じの粗密、葉身の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の基部の形、葉身の先端の形、葉身の先端突起の長さ、葉身の鋸歯の形、葉身の鋸歯の深さ、葉身の曲がりの強弱、葉柄の長さ、たく葉の有無、葉柄の基部からたく葉までの長さ、花芽の着生位置、花芽の長さ、がく片の長さ、がく片の着き方、花弁の重なり、柱頭の雄ずいに対する位置、花弁の大きさ、花弁の形、花弁の基部の形、花弁の爪の長さ、幼果のがくの色、果実の長さ、果実の最大径、果実の長さ／最大径、果実の最大径の位置、果実の大きさ、果実の対称性、果実の輪郭、果皮の地色、果実の着色部の割合、果実の着色部の色、がくあのさびの割合、果実の横面のさびの割合、梗あのさびの割合、果柄の長さ、果柄の太さ、果柄の曲がりの強弱、果柄の向き、梗あの深さ、果実のがく片の向き、ていあの有無、ていあの深さ、ていあの広さ、ていあの盛り上がりの強さ、果肉の粗密、果肉の硬さ、果汁の多少、種子の形、開花始期、成熟期	
ニホンナシ	樹姿、樹勢、枝の長さ、枝の太さ、枝の色、節間長、皮目の数、皮目の大きさ、枝の毛じの粗密、短果枝の多少、葉芽の先端の形、葉芽の着き方、腋花芽の数、花芽の大きさ、花芽の形、花芽のりん片の色、どん葉の色、どん葉の毛じの有無、どん葉の毛じの粗密、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の鋸歯の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉柄の長さ、葉柄の長さ／葉身の長さ、花序の花の数、つぼみの色、花弁の主な色、花弁の大きさ、花弁の形、花弁の切れ込みの数、花弁の数、小花柄の毛じの粗密、雄ずいの数、やくの赤色の濃淡、花粉の有無、果実の形、梗あの深さ、梗あの幅、がくあの深さ、がくあの幅、がく片の宿存の強弱、果実の大きさ、果皮の色、果点の大きさ、果点の粗密、果面の粗滑（赤なし品種に限る。）、果面のさびの多少（青なし品種に限る。）、果柄の長さ、果柄の太さ、肉梗の有無、果芯の形、果芯の大きさ、心室の数、果肉の色、果肉の硬さ、果肉の粗密、果肉の切り口の褐変の強弱、果実の甘味、果実の酸味、果実の渋味の有無、果汁の多少、種子の大きさ、種子の形、種子の数、ほう芽始期、開花始期、成熟期、自家和合性、芯腐れの発生の多少、みつ症状の発生の多少、裂果の発生の有無、黒斑病抵抗性	黒斑病抵抗性
ラナンキュラス	草型、草丈、球根の形、球根の大きさ、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の厚さ、花弁数、雌雄ずいの形、やくの色、がくの形、がくの色、一花柄の花数、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花柄の毛の多少、発芽期、開花期	
ダイコン	倍数性（Ｎタイプ品種に限る。）、葉群着生部の幅（Ｎタイプ品種に限る。）、葉群着生部の幅（Ｓタイプ品種に限る。）、成葉の数（Ｎタイプ品種に限る。）、葉の姿勢、葉の長さ（Ｎタイプ品種に限る。）、葉の長さ（Ｓタイプ品種に限る。）、葉の幅（Ｎタイプ品種に限る。）、葉身の先端の形、葉身の色、葉身の切れ込み、葉身の小葉の数、葉身の小葉の粗密、葉柄のアントシアニン着色、葉柄のアントシアニン着色部の大きさ（葉柄のアントシアニン着色が無又は極弱の品種を除く。）、ダイコンの土壌中の位置（Ｎタイプ品種に限る。）、ダイコンの長さ（Ｎタイプ品種に限る。）、ダイコンの長さ（Ｓタイプ品種に限る。）、ダイコンの直径（Ｎタイプ品種に限る。）、ダイコンの直径（Ｓタイプ品種に限る。）、ダイコンの重さ（Ｎタイプ品種に限る。）、ダイコンの形、ダイコンの肩の形、ダイコンの先端の形、ダイコンの表皮の色数、ダイコンの葉側の表皮の色、ダイコンの表皮の赤色模様の有無（Ｎタイプ品種に限る。）、ダイコンの表皮の白色の大きさ（ダイコンの表皮の色数が２色以上の品種に限る。）、ダイコンの表面の隆起（Ｎタイプ品種に限る。）、ダイコンの肉の主な色、ダイコンの肉の二次色、根の色、収穫期、ダイコンの空洞、雄性不稔性	ダイコンの空洞、雄性不稔性
ジオウ	萌芽期、草姿、株の高さ、葉の長さ、葉の幅、葉の数、葉の形、葉の切れ込みの深さ、葉縁の鋸歯の形、葉の基部の形、葉の先端の形、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の濃淡、葉の表面の凹凸の大きさ、葉の毛の粗密、抽だい性、根の長さ、根の紐状部分の長さ、根の太さ、肥大部の長さ、根の形、根の色、根の数、根の分岐の数、開花期、花茎の長さ、花の粗密、花の数、花冠の長さ、花冠の色、花冠周辺の色、花柱の色、花柱の毛の多少、花糸の色、エタノールエキス含有率、乾物率	エタノールエキス含有率、乾物率

シャリンバイ	樹姿、樹高、分枝の多少、枝の太さ、枝の色、新葉の主な色、新葉の鋸歯の有無、新葉の毛の粗密、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の横断面の形、葉身の表面の緑色の濃淡、葉身の表面の光沢の有無、葉身の鋸歯の有無、葉身の表面の毛の有無、葉柄の長さ、葉柄の毛の有無、花序の形、花序の長さ、花序の幅、一花序当たりの花数、つぼみの色、花型、花の直径、花の香りの有無、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、花弁の先端の形、花弁の表面の色数、花弁の表面の色の濃淡の分布、花弁の表面の主な色、花弁の表面の二次色、花弁の表面の二次色の分布、花弁の周縁の切れ込みの有無、花弁の周縁の波打ちの有無、雄ずいの数、雌ずいの長さに対する雄ずいの長さ、がく片の形、がく片の色、小花柄の長さ、開花始期、果実の形、果実の直径、果実の色、成熟期	
カンノンチク	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
ダイオウ	草丈、茎の高さ、茎の表面の色、茎の断面の色、葉の形、葉の先端の形、葉の大きさ、葉縁の形、毛の有無、葉身の色、葉柄のアントシアニンの有無と程度、根茎の太さ、根茎の横断面の色、根茎の外面の色、花序の形、花序の粗密、花の色、翼果の形状、翼果の大きさ、翼果の色、株張り、ほう芽の早晩性、開花期、初期の葉数、エタノールエキス含有率（薬用品種に限る。）、センノサイドＡ含有率（薬用品種に限る。）、乾物率（薬用品種に限る。）	エタノールエキス含有率（薬用品種に限る。）、センノサイドＡ含有率（薬用品種に限る。）、乾物率（薬用品種に限る。）
リプサリドプシス	草姿、二次葉状茎の数、葉状茎の長さ、葉状茎の幅、葉状茎の色、葉状茎の縁部の赤色の強弱、葉状茎の翼の発達の強弱、葉状茎の翼の大きさ、葉状茎の毛の密度、１㎝長のつぼみの先端の色、１㎝長のつぼみの先端の色の濃淡、1.5㎝長のつぼみの先端の形、花の直径、花被片の幅、花被片の基部の斑の大きさ、花被片の斑の色、花被片の中間部の色の違いの有無、花被片の中間部の色、花被片の色の境界の明瞭度（花被片の中間部に色の違いのある品種に限る。）、花被片の周縁部の色が占める割合（花被片の中間部に色の違いのある品種に限る。）、花被片の周縁部の色、雄ずいの長さ、花糸の色、花柱の長さ、柱頭の色、子房の色、開花始期、開花期間	
ハナカンザシ（ローダンセ）	草姿、草丈、株幅、分枝の粗密、茎の太さ、茎の色、茎のアントシアニン着色の有無、葉の着生、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の縦方向の反り、葉の色、葉の斑の有無、葉の毛の粗密、花の着き方、花らいの形、花らいの長さ、花らいの色、頭花の側面の形、頭花の直径、花盤の直径、花盤の色、総苞片の数、総苞片の長さ、総苞片の幅、総苞片の形、総苞片の先端の形、総苞片の色数、総苞片の主な色、総苞片の二次色、総苞片の二次色の分布	
ローダンセマム	草型、草丈、株の幅、茎の太さ、節間長、節数、一次分枝の数、葉の長さ、葉の幅、葉の色、葉片の幅、葉の表面の毛の密度、花の直径、花盤の直径、花盤の主な色、舌状花の向き、舌状花の数、舌状花の形、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色（複色品種に限る。）、舌状花の裏面の主な色、舌状花の裏面の二次色（複色品種に限る。）、花粉の有無、開花始期	
ツツジ	葉の持続性、樹姿、つぼみの形、新葉のろう質粉の多少、新葉の色、新葉のアントシアニン着色の強弱、成葉の表面の色、成葉の裏面の色、成葉の斑の有無、成葉の斑の模様、成葉の斑の色、成葉の長さ、成葉の幅、成葉の形、成葉の表面の毛じの粗密、成葉の横断面の形、成葉の表面の光沢の強弱、一花序当たりの着花数、花序の形（一花序当たりの着花数が６以上の品種に限る。）、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの有無、がく片の長さ、花の形、花の直径、花の香りの強弱、花型、花冠裂片の数（八重品種に限る。）、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の裏面の主な色、花冠裂片の表面の二次色の分布、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度、花冠裂片の花喉部の斑点の型、花冠裂片の花喉部の斑点の色、花冠裂片の花喉部の色の濃淡、やくの色、雌ずいの長さ、柱頭の色、開花始期、成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）	
ロードヒポクシス	草型、草丈、球根の形、球根の大きさ、球根の色、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の長さ、一花房の花数、花の香り、開花期	
イヌノハナヒゲ	草型、草高、茎の太さ、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉の斑の色（斑のある品種に限る。）、花穂の幅、苞の長さ、苞の幅、苞の白色部の有無、苞の白色部の長さ、そう果の形	

リベス　サングイネウム	樹姿、側枝の粗密、芽のアントシアニンの着色、新しょうのアントシアニンの着色、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、花序の長さ、花の数、花の粗密、花の色、花の大きさ、花柄の長さ、着果の有無	
トウゴマ	若葉のアントシアニンの着色、開花始期、草丈、葉柄の長さ、葉柄のろう質、葉柄のアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の切れ込みの深さ、葉身の鋸歯の粗細、葉身の色、葉身の葉脈の色、花序の型、花序の形、雌花の柱頭の色、さく果の大きさ、さく果の色、さく果のとげ、さく果の裂開の有無、種子の長さ、種子の幅、種子の長さ／幅、種子の主な色、種子の二次色、種子の種枕	
ジュズサンゴ	樹高、枝のベタシアニン着色の有無、枝のベタシアニン着色の強弱（枝のベタシアニン着色がある品種に限る。）、枝の毛の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉縁の波打ちの有無、葉の毛の粗密、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、がくの主な色、果房の長さ、一果房当たりの果実の数、果実の直径、果実の色、開花から成熟するまでの早晩	
バラ	植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）、新しょうのアントシアニン着色の有無、新しょうのアントシアニン着色の強弱、茎のとげの数、とげの主な色、葉の大きさ、葉の表面の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、葉の表面の光沢の強弱、小葉の周縁の波打ちの強弱、先端小葉の葉身の形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る。）、先端小葉の葉身先端の形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有しない品種に限る。）、開花枝の開花側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、花弁の数、花色の分類、花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る。）、花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る。）、花の直径、花の形、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る。）、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る。）、花の香りの強弱、がくの変形の強弱、花弁一枚ごとの展開の有無、花弁の形、花弁の切れ込みの強弱、花弁の周縁の反りの強弱、花弁の波打ちの強弱、花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、花弁の長さ（切り花用品種に限る。）、花弁の幅（切り花用品種に限る。）、花弁の表面の色数、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る。）、花弁の表面の主な色、花弁の表面の二次色、花弁の表面の三次色、花弁の表面の二次色の分布、花弁の表面の三次色の分布、花弁の表面の基部の目の有無、花弁の表面の基部の目の大きさ、花弁の表面の基部の目の色、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る。）、外側の雄ずいの花糸の主な色、花床の大きさ（庭園用品種に限る。）、果実の縦断面の形（庭園用品種に限る。）、果実の色（庭園用品種に限る。）	
ロスマリヌス（ローズマリー）	樹姿、樹高、株幅、葉群の粗密、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、展開直後の新葉表面の色、葉の表面の色、葉の表面の斑の有無、葉の表面の斑の種類、葉の表面の斑の色、葉の表面の光沢の有無、葉の表面の粗滑、葉の湾曲の向き、葉の湾曲の強弱、葉の周縁部の反転の強弱、がくの大きさ、がくの形、がくのアントシアニン着色の有無、花の着き方、花冠の長さ、花冠の幅、花冠の下唇弁の地色、花冠の下唇弁の濃色模様の色、花柱の長さ、雄ずいと比較した花柱の長さ、花柱の色、開花習性、開花期	
キイチゴ類（ラズベリーを除く。）	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）、種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）、品質特性、早晩性	
ラズベリー	樹姿、新梢の多少、若枝先端部のアントシアニン着色の有無、若枝先端部のアントシアニン着色の強弱、新梢の白粉の多少、新梢のアントシアニン着色の強弱、新梢の節間長、新梢の葉芽の長さ、前年枝の長さ（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、新梢の長さ（秋に新梢に結実する品種に限る。）、前年枝の色（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、とげの有無、とげの多少（とげのある品種に限る。）、とげの基部の大きさ（とげのある品種に限る。）、とげの長さ（とげのある品種に限る。）、とげの色（とげのある品種に限る。）、葉の表面の緑色の濃淡、小葉の数、小葉の横断面の形、葉のしわの強弱、側小葉の重なり、頂小葉の長さ、頂小葉の幅、小花柄のとげの数、花柄のアントシアニン着色の有無、花柄のアントシアニン着色の強弱、花の大きさ、結果枝の向き（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、結果枝の長さ（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、果実の長さ、果実の幅、果実の長さ／幅、果実の形、小核果数、果実の小核果の大きさ、果実の色、果実の光沢の強弱、果肉の硬さ、果床の大きさ、小核果の果床への接着の強弱、結実期、葉芽の萌芽期（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、新梢の発生時期（秋に新梢に結実する品種に限る。）、前年枝の開花始期（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、新梢の開花始期（秋に新梢に結実する品種に限る。）、前年枝の果実の成熟期（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、新梢の果実の成熟期（秋に新梢に結実する品種に限る。）、前年枝の果実の収穫期間（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、新梢の果実の収穫期間（秋に新梢に結実する品種に限る。）	