	縦横比、果実の形、第一番果と第二番果の果形の差、果皮の色、果皮の着色のむらの強弱、果実の光沢の強弱、果実の表面の凹凸の強弱、果実の無種子帯、果実のネックの有無、そう果の落ち込み、そう果の密度、そう果のアントシアニン着色の強弱、果実のがくの着生位置、果実のがく片の付き方、果径に対するがくの大きさ、果実からのへた離れの難易、果実の硬さ、果肉の色、果心の色、果実の空洞、開花始期、果実の成熟期、季性、可溶性固形物含量、酸度、休眠性、炭そ病抵抗性、萎黄病抵抗性	
フリージア	草丈、分枝の数、葉の向き、花茎の長さ、花茎の太さ、茎の表面の粗さ、葉の幅、花序の長さ、花序の花の数、第一花と第二花の花間長、第二花と第三花の花間長、花軸の屈曲の強弱、花軸の曲がりの有無、花の並ぶ角度、花序の角度、つぼみの長さ／幅、花型、内花被の着生角度、外花被の形、内花被の形、内花被の横断面の形、内花被の周縁の巻き込みの有無、側方外花被の表面の主な色、中央外花被の表面の主な色、側方内花被の表面の色、中央内花被の表面の色、中央外花被の表面の斑紋の大きさ、中央外花被の表面の斑紋の色、喉部の大きさ、喉部外側の主な色、喉部内側の主な色、喉部内側の条線の強弱、花筒の長さ、花糸の主な色、やくの主な色、花柱の主な色、柱頭のやくに対する位置、柱頭の裂片の長さ、柱頭の裂片の粗密、柱頭の色、球茎の長さ／直径、開花期	
フリージア　ラクサ	草姿、草丈、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
フクシア	草姿、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の斑の有無、葉身の表面の色、葉身の表面の凹凸の強弱、葉身の周縁の切れ込みの深さ、花柄のアントシアニン着色の強弱、花らいの長さ、花らいの幅、花らいの形、花型、花弁の数（八重品種に限る。）、子房のアントシアニン着色の有無、子房のアントシアニン着色の強弱、がく筒の形、がく筒の色、がく片の展開の方向、がく片の先端部の曲がり、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の外面の色数、がく片の外面の主な色、がく片の外面の二次色（２色以上の品種に限る。）、がく片の外面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、がく片の外面の三次色（３色以上の品種に限る。）、がく片の外面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、がく片の内面の色数、がく片の内面の主な色、がく片の内面の二次色（２色以上の品種に限る。）、がく片の内面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、がく片の内面の三次色（３色以上の品種に限る。）、がく片の内面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、花の直径、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、花弁の色の変化の有無、開花直後の花弁の外面の主な色、花弁の外面の色数、花弁の外面の主な色、花弁の外面の二次色（２色以上の品種に限る。）、花弁の外面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、花弁の外面の三次色（３色以上の品種に限る。）、花弁の外面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、花弁の内面の色数、花弁の内面の主な色、花弁の内面の二次色（２色以上の品種に限る。）、花弁の内面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、花弁の内面の三次色（３色以上の品種に限る。）、花弁の内面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、花糸の色、花柱の色、開花始期	
テンニンギク	草姿、草丈、株幅、茎の緑色の濃淡、茎中央部の毛の粗密、茎上部の毛の粗密、葉の長さ、葉の幅、葉縁の切れ込みの多少、葉縁の切れ込みの深さ、葉の表面の毛の粗密、葉の表面の緑色の濃淡、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の毛の粗密、総苞の直径、総苞のアントシアニン着色の有無、頭花の数、頭花の型、頭花の直径、頭花の舌状花数、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の形、舌状花先端の切れ込みの数、舌状花先端の切れ込みの深さ、舌状花の色数、舌状花先端部の色、舌状花中央部の色、舌状花基部の色、花盤の直径（一重及び半八重品種に限る。）、花盤周縁部の色（一重及び半八重品種に限る。）、花盤周縁部の色の幅（一重及び半八重品種に限る。）、花盤中央部の色（一重及び半八重品種に限る。）、開花期	
まんねんたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの多少、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の菌さんへのつき方、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
クチナシ	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
ヤマモモソウ	草丈、株幅、草丈／株幅、茎の粗密、花数、茎の傾き、分枝数、葉数、葉の着生位置、新しょうのアントシアニン着色の強弱、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の最大幅の位置、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の分布（斑のある品種に限る。）、葉の斑の割合（斑のある品種に限る。）、葉の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニン着色の分布、葉のアントシアニン着色の割合、花柄のアントシアニン着色の強弱、花柄のアントシアニン着色の分布、つぼみの色、花の幅、上弁の形、上弁の長さ、上弁の幅、上弁の長さ／幅、上弁の表面の主な色、上弁の表面の二次色（脈を除く。）、上弁の表面の二次色の分布（脈を除く。）、上弁の脈の明瞭度、花柱の色、花糸の色、花色の変化	

ガザニア	草姿、草丈、株の幅、茎の太さ（ロゼット型の品種を除く。）、茎の色（ロゼット型の品種を除く。）、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）、茎の分枝性（ロゼット型の品種を除く。）、節間長（ロゼット型の品種を除く。）、葉序（ロゼット型の品種を除く。）、葉の長さ、葉の幅、葉身の形、深裂葉の割合、葉の表面の色、葉の表面の毛の有無、頭花の直径、舌状花の数、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の形、舌状花の表面の色数、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色、舌状花表面基部の模様の有無、舌状花表面基部の模様の色、花盤の直径、花盤の色、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花柄の毛の粗密	
リンドウ	草姿、茎の長さ、茎の太さ、茎の横断面の形、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の有無、茎の節数、節間長、側枝の有無、茎の一節側枝発生数、茎の二節以上の側枝発生数、最長葉の着生位置、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の横断面の形、葉の縦断面の形、葉のねじれの有無、葉脈の数、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、花序の型、花序の着生位置、頂部の花の数（群生する品種に限る。）、着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る。）、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る。）、花型、花冠の長さ、花筒部の直径、花冠の形、花冠の先端の直径、花冠の先端の反り、花冠裂片の表面の色、花冠の内面上部の色、花冠の外面上部の色、花冠裂片の表面の斑点の粗密、花冠の内面上部の斑点の粗密、花冠の外面上部の斑点の粗密、花冠の外面のしま模様の有無、花冠の外面のしま模様の色、花冠裂片の数、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片の先端の形、花冠の副裂片の有無、花冠の副裂片の先端の形、がくの緑色の濃淡、がくのアントシアニン着色の有無、がく筒の長さ、がく筒の直径、がく筒の形、がく裂片の形、やくの発達の状態、やくの形、開花期、弱光下における閉花性	
フウロソウ	草姿、草丈、茎の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
ガーベラ	葉の長さ、葉の幅、葉身の凹凸の強弱、葉身の毛じの粗密、葉身の中央部の切れ込みの深さ、葉身の緑色の濃淡、葉身の先端の形、花柄の長さ、花柄の基部のアントシアニン着色の強弱、花柄の頂部のアントシアニン着色の有無、花柄の総苞下の苞葉の有無、頭花の型、頭花の直径、頭花に対する内部舌状花の直径の大きさ（半八重又は八重品種に限る。）、頭花の内部舌状花の集まりの境界の規則性（半八重又は八重品種に限る。）、総苞の高さ、総苞の直径、外部舌状花と苞葉先端部の位置、内部苞葉の先端のアントシアニン着色の有無、内部苞葉の先端のアントシアニン着色の強弱、総苞頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置、外部舌状花弁の形、外部舌状花弁の縦断面の形、内部舌状花弁の縦断面の形、外部舌状花弁の横断面の形、外部舌状花弁の長さ、外部舌状花弁の幅、外部舌状花弁の先端の形、外部舌状花弁の切れ込みの深さ、外部舌状花弁の長い自由花弁を形成する傾向の有無、外部舌状花弁の表面の色、外部舌状花弁の色数、外部舌状花弁の色の分布（単色品種に限る。）、外部舌状花弁のしまの有無、外部舌状花弁の下部の二次色の有無、外部舌状花弁の上部の二次色の有無、外部舌状花弁の周縁の二次色の有無、外部舌状花弁の先端の二次色の有無、外部舌状花弁の二次色、外部舌状花弁の裏面の主な色、花盤の直径（一重又は半八重品種に限る。）、黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る。）、花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（一重品種に限る。）、花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（半八重又は八重品種に限る。）、花盤の両性花の花被片の主な色、花柱の上部の主な色、柱頭の主な色、やくの主な色、やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡、やくの縦しまの有無、冠毛の頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡、未開花の花盤管状花に対する冠毛の頂部の位置	
グラジオラス	草丈、葉群の高さ、葉の幅、葉の上半分の曲がりの強弱、花序の側枝の有無、花穂の長さ、一花穂の花数、一花穂の同時開花数、花穂の節間の長さ、花穂の花の配列、苞の先端の形、苞のアントシアニン着色の強弱、花の正面の形、花の向き、花の幅、花の主な色、花の主な色の濃淡の変化、花被筒部の長さ、花被筒部の内面の斑点の数、花被筒部の内面の斑点の分布、花被喉部の外面の斑点の数、花被喉部の外面の斑点の色、外花被片の形、外花被片の周縁部の波打ちの強弱、内花被片の周縁部の波打ちの強弱、内花被片の条線の有無、内花被片の条線の長さ、内花被片の条線の幅、内花被片の条線の色、内花被片の斑紋の有無、内花被片の斑紋の位置、内花被片に占める斑紋の大きさ、内花被片の斑紋の形、内花被片の斑紋の主な色、内花被片の斑紋の二次色、内花被片の斑紋の周縁の形、内花被片の周縁部の複色の有無、内花被片の周縁部の複色の幅、内花被片の周縁部の複色の境界の形、内花被片の周縁部の色、中央内花被片の向き、中央内花被片の先端の向き、花糸の主な色、花糸の基部の小斑点の有無、花糸の主な色と比較した先端部の色、やく隔の色、やくの口辺細胞の色、花柱の主な色、花柱の基部の色、花柱の分枝の色、球茎の肉の色、開花始期	
シュンギク	草姿、子葉の形状、はい軸の形状、分枝性、茎の形状、葉数、葉色その他葉の形状、種子の形状、早晩性	
グロブラリア アラビカ	樹形、樹高、分枝の位置、茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の形、葉の先端部の形、葉の基部の形、葉の横断面の形、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の表面の毛の有無、花序の型、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花柄の毛の粗密、頭花の色、頭花の形、頭花の直径、小花の長さ、小花の幅、小花の下唇弁の切れ込みの深さ、小花の対称性、小花の色、花の香りの有無	

グロリオサ	草型、草丈、球根の形、球根の大きさ、球根の色、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、やくの色、花柄の長さ、一花房の花数、花の香り、開花期	
グレコマ　ヘデラケア	株の幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の斑の有無、葉身の斑の模様、花の長さ、花の幅、花の色、花冠における着色部の色、下唇弁における斑紋の有無、下唇弁における斑紋の色	
ダイズ	胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、伸育型、分枝の数、草姿、茎の毛じの色、茎の長さ、茎の節数、葉の表面の凹凸の強弱、小葉の数、側小葉の形、側小葉の大きさ、葉の緑色の濃淡、花の色、最下着きょう節位の高さ、着きょう密度（枝豆用品種に限る。）、若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）、若さやの幅（枝豆用品種に限る。）、湯煮（ブランチング）後の若さやの色（枝豆用品種に限る。）、多粒さや率（枝豆用品種に限る。）、さやの数、裂きょうの難易、熟さやの色の濃淡、子実の大きさ、子実の形、種皮の色数、種皮の地色、種皮の二次色（２色以上の品種に限る。）、種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無、子実のへその色、胎座残の色、子実の子葉の色、開花始期、成熟期、生態型、粗タンパク含有率、７Ｓタンパク質サブユニットの有無、リポキシゲナーゼアイソザイムの有無、へそ周辺の着色抵抗性、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ａ系統）、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ａ２系統）、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ｂ系統）、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ｃ系統）、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ｄ系統）、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ｅ系統）、ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース１）、ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース３）、ハスモンヨトウ抵抗性（抗生性）、ハスモンヨトウ抵抗性（非選好性）	種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無、粗タンパク含有率、７Ｓタンパク質サブユニットの有無、リポキシゲナーゼアイソザイムの有無、へそ周辺の着色抵抗性、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ａ系統）、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ａ２系統）、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ｂ系統）、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ｃ系統）、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ｄ系統）、ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ｅ系統）、ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース１）、ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース３）、ハスモンヨトウ抵抗性（抗生性）、ハスモンヨトウ抵抗性（非選好性）
カンゾウ	草姿、草丈、根の数、根の太さ、根の表皮の色、根の横断面の黄色系着色の強弱、茎の多少、茎の太さ、茎の節の多少、茎基部のアントシアニン着色の強弱、茎中間部のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の粗密、側枝の数、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の波打ちの多少、小葉の多少、小葉の葉身の長さ、小葉の葉身の幅、小葉の葉身の長さ／幅、葉柄の長さ、花序の多少、花序の長さ、花序の幅、花序の小花の多少、小花の長さ、小花の幅、花の色、さやの幅、さや内粒数、ほう芽の早晩、開花の早晩、枯れ上がりの早晩、乾燥根の重量、グリチルリチン酸含量	乾燥根の重量、グリチルリチン酸含量
ゴンフレナ（センニチコウ）	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数、花の香り、開花期	
アジアワタ	草姿、草丈、最下結果枝の着生位置、結果枝の長さ、結果枝の節数、結果枝の節間長、茎のアントシアニン着色の強弱、茎上部の毛の多少、葉の粗密、葉身の長さ、葉身の幅、葉の裂片の深さ、葉の緑色の濃淡、葉の裏面の毛の強弱、葉の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱、葉身の蜜腺の有無、花の着き方、花弁の色、花弁のスポットの有無、花粉の色、やくに対する柱頭の位置、柱頭基部のアントシアニン着色の有無、果柄の長さ、さく果に対する苞葉の大きさ、苞葉の鋸歯の細かさ、苞葉のアントシアニン着色の有無、さく果の大きさ、さく果の縦断面の形、さく果の表面のくぼみの細かさ、さく果の先端の突出の強弱、さく果の開じよの強弱、百粒重、種子の地毛の色、種子の地毛の粗密、繊綿の実綿に対する重さの割合、繊維の色、繊維の長さ（繊維用品種に限る。）、開花始期、さく果の開じよ期、繊維の長さの一様性（繊維用品種に限る。）、繊維の強さ（繊維用品種に限る。）、繊維の伸長率（繊維用品種に限る。）、繊維の細かさ（繊維用品種に限る。）	繊維の長さの一様性（繊維用品種に限る。）、繊維の強さ（繊維用品種に限る。）、繊維の伸長率（繊維用品種に限る。）、繊維の細かさ（繊維用品種に限る。）
ケブカワタ	草姿、葉の粗密、草丈、結果枝の長さ、最下結果枝の着生位置、結果枝の節数、結果枝の節間長、茎の色、葉身の大きさ、葉の形、葉の裂片の有無、葉の裂片の深さ、葉の緑色の濃淡、葉の裏面の毛の粗密、葉身の蜜腺の有無、茎上部の毛の粗密、苞葉の大きさ、苞葉の鋸歯の細かさ、果柄の長さ、柱頭のやくに対する位置、花の着き方、花弁の色、花粉の色、花弁のスポットの強弱、さく果の開じよの強弱、さく果の大きさ、さく果の縦断面の形、さく果の表面のくぼみの細かさ、さく果の先端の突出の強弱、百粒重、種子の地毛の有無、種子の地毛の色、種子の地毛の粗密、繊綿の実綿に対する重さの割合、繊維の長さ（繊維用品種に限る。）、繊維の長さの一様性（繊維用品種に限る。）、繊維の色、繊維の強さ（繊維用品種に限る。）、繊維の伸長率（繊維用品種に限る。）、繊維の細かさ（繊維用品種に限る。）、さく果の開じよ期	繊維の長さの一様性（繊維用品種に限る。）、繊維の強さ（繊維用品種に限る。）、繊維の伸長率（繊維用品種に限る。）、繊維の細かさ（繊維用品種に限る。）
グラプトペタルム	草型、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の形、葉の縦断面の形、葉の横断面の形、葉の横断面上面の形、葉の横断面下面の形、葉の先端の形、葉の白粉の強弱、葉の緑色部の色、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の部位、葉のアントシアニン着色の強弱、葉の模様の有無、葉の先端の芒（剛毛）の有無、葉の先端の芒（剛毛）の色、花序の型、つぼみの形、がくの長さ、花の直径、花冠裂片の形、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花の地色、花の模様の有無、花の模様、花の模様の色	

まいたけ	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の周縁部の形状、菌叢の厚さ、菌叢の表面の着色の有無、菌叢の表面の形状、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度（10℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（15℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（20℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（25℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（30℃／日）、子実体株の径、菌さんの大きさ、菌さんの厚さ、菌さんの形状、菌さんの縁部の切れ込み、菌さんの断面の形、菌さんの表面の色、菌さんの肉質、菌さんの表面の環紋の形状、管孔発達の部位、子実体株基部の形、培養菌床の表面被（皮）膜の形成、培養菌床の表面被（皮）膜の色の有無、原基形成までの期間、発生最盛期までの期間（種菌接種から収穫適期までの期間）、子実体の生育最適温度、子実体の平均乾燥重量	
グズマニア	草丈、株の幅、葉の数、葉しょうの長さ、葉しょうの幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色の有無、葉身の表面の二次色の模様、葉身の表面の二次色の主な色、葉身の裏面の主な色、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無、葉身の裏面のアントシアニン着色の分布、花序の型、花序の位置、花序の長さ、花序の着花部の長さ、花序の着花部の直径、花序の苞の数、花序の一苞内の小花の数、花序の一苞内の小花の総数（一苞内の小花の数が複数の品種に限る。）、苞の長さ、苞の幅、苞の先端の幅、苞の先端の形、苞の表面の色、苞の裏面の色、前出葉の長さ、前出葉の幅、前出葉の色、がくの色、花冠の色、子房の色、花柱の色、柱頭の色	
カスミソウ	植物体の基部の分枝の有無、草姿、草丈、茎の節数、節間長、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の色、葉の形、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の縦方向の反りの強弱、葉の横断面の形、葉の先端部の向き、葉の表面の色、花序の毛の有無、花の着生位置、花序の上部の形、花序の主茎に対する側枝の角度、花序の側枝の曲りの強弱、一茎当たりの花の総数、花型、花の直径、花弁の数、花の上部の形、やくの有無、小花柄の長さ、花弁の縦方向の湾曲、花弁の先端の形、花弁の色数、花弁の主な色、花弁の二次色、がく裂片の数、がくのアントシアニン着色の強弱、がくの縦断面の形、がく裂片の大きさ、開花始期	
マンサク	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
ハーデンベルギア	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
ハワーシア　ムチカ	草姿、草丈、葉の形状、品質特性	
ハワーシア　モーガニー	草姿、草丈、葉の形状、品質特性	
ヘーベ	樹姿、樹高、葉の粗密、幼しょうのアントシアニンの着色、幼しょうの毛の有無、幼しょうの毛の粗密、新しょうの枝の色、枝の節間長、枝の節間のアントシアニンの着色、葉芽の隙間の有無、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉の着生角度、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の最大幅の位置、葉身の先端の形、葉身の横断面の形、葉身の周縁の鋸歯の有無、葉身の主な色、葉身の二次色の分布、葉身の二次色、葉身の二次色の面積、葉身の三次色の分布、葉身の三次色、葉身の光沢、葉身のろう質、花序の着生位置、花序の形、花序の長さ、花序の幅、花序の花の粗密、花冠の色の変化の強弱、花冠の幅、花冠裂片の表面の色、花筒部のがくに対する長さ、花筒部の外面の色、花序の数	
ヘデラ	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
ヘレボルス（クリスマスローズ）	草丈、株幅、花の位置、花数、葉身の長さ、葉身の幅、葉身のアントシアニン着色の強弱、葉身の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉身の光沢の有無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、一花茎の花数、花の向き、花の形、花型、花の大きさ、がく片の数、がく片の形、がく片の周縁部の波打ちの強弱、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の先端の形、がく片の表面の色数、がく片の表面の主な色、がく片の表面の模様の有無、がく片の表面の模様の型、がく片の表面の模様の色、がく片の裏面の主な色、がく片の裏面の二次色、がく片の色の変化の有無、開花終期のがく片の表面の色（がく片の色の変化がある品種に限る。）、開花終期のがく片の裏面の色（がく片の色の変化がある品種に限る。）、蜜腺の主な色（蜜腺のある品種に限る。）、花糸の色、雌ずいの色、花首のしわの有無、開花期	
ヘメロカリス	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	

明治三十二年五月三十一日郵便物認可

明治二十五年三月三十一日 第三種郵便物認可

ヘミジギア	草姿、草丈、株幅、茎の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の横断面の形、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、葉身の斑の分布、葉身の周縁の鋸歯の形、葉身の葉脈間の凹凸の強弱、葉柄の長さ、花序の長さ、花序の幅、花序の形、小花柄の長さ、がくの長さ、がくの主な色、花冠の縦径、花冠の横径、花冠筒部の長さ、花冠筒部の縦径、花冠筒部の形、上唇弁の色、上唇弁の反り、下唇弁の色、下唇弁の斑点の有無、雄ずいの下唇弁に対する位置、花柱の下唇弁に対する位置、開花始期	
やまぶしたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生時期、子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間、培地適応性又は原木適応性、乾物率、子実体の平均乾燥重量	
ハスノハギリ	樹姿、樹高、枝の色、葉身の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の色数、葉身の地色、葉身の斑の有無、葉身の斑の型、葉身の斑の最も濃い色、葉身の斑の二番目に濃い色、葉身の斑の三番目に濃い色、葉身のアントシアニン着色の有無	
ホイヘラ（ツボサンゴ）	草丈、株幅、葉の粗密、若葉の葉身の色、若葉の葉身の色の分布、若葉の葉身の色の模様、若葉の葉身の色の面積、葉柄の長さ、葉柄の毛の粗密、葉柄の主な色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の先端部の形、葉身裂片の切れ込みの深さ、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）、葉身の周縁部の欠刻の数、葉身の周縁部の欠刻の深さ、葉身の周縁部の波打ちの強弱、葉身のしわ、葉身の光沢、葉身の毛の粗密、葉身の裏面の毛の粗密、葉身の色、葉身の色の分布、葉身の色の模様、葉身の色の面積、葉身の裏面の色、花茎の向き、花茎の長さ、花茎の主な色、花茎の花の着生する部位の長さ、花茎の花の着生する部位の幅、花茎の花の着生する部位の長さ／幅、花茎の花の粗密、つぼみの色、花の向き、花の長さ、花の幅、花の外面の色、花弁の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）	
ハイビスカス（クサフヨウ及びムクゲを除く。）	樹姿、樹高、枝の色、枝の皮目、分枝性、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉の毛の多少、葉柄の太さ、葉柄の長さ、葉柄の色、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、花柄の形、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花数、花の香り、開花期	
クサフヨウ	草姿、草丈、分枝の粗密、茎の太さ、茎の色、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の切れ込みの深さ、葉身の表面の色、葉身の裏面の色、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉身の表面の光沢の有無、葉身の表面の毛の有無、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の色、つぼみの色、花型、花冠の直径、一茎当たりの着花数、花冠の向き、花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）、花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）、花冠の形（八重品種に限る。）、花冠の高さ（八重品種に限る。）、花冠の目の有無、花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）、花冠の目の色（目のある品種に限る。）、花の香りの有無、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、花弁の切れ込みの有無、花弁のねじれの有無、花弁の周縁の波打ちの有無、花弁の表面の色数、花弁の表面の主な色、花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が２以上の品種に限る。）、花弁の表面の三次色（花弁の表面の色数が３以上の品種に限る。）、花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が２以上の品種に限る。）、花弁の表面の三次色の模様（花弁の表面の色数が３以上の品種に限る。）、がく筒の長さ、がく筒の太さ、がく筒の形、がく筒の色、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の形、小苞片の長さ、小苞片の幅、小苞片の形、小苞片の色、ずい柱の長さ、ずい柱の太さ、柱頭の色、やくの色、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、開花始期	
ムクゲ	樹姿、樹高、側枝の粗密、当年枝の色、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の基部の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の切れ込み、葉身の波打ち、葉縁の鋸歯の数、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、花柄の長さ、花型、花弁化した雄しべの数（一重品種を除く。）、花の最外周の花弁の向き、花の最外周の花弁の重なり（八重品種を除く。）、花の直径、花の目の有無、目の大きさ、目の伸長部の長さ、目の主な色、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、花弁の内面の主な色、花弁の内面の二次色（二次色のある品種に限る。）、花弁の内面の二次色の分布、花弁の切れ込み、花弁の波打ち、ずい柱の長さ（八重品種を除く。）	
ヒッペアストルム（アマリリス）	葉の幅、葉のアントシアニン着色の有無、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の基部のアントシアニン着色の有無、花序の花の数、花型、弁化した雄ずいの形（八重品種に限る。）、小花柄の長さ、小花柄のアントシアニン着色の有無、花の正面の形、花の長さ、花の直径、花被片の重なりの強弱、外花被片の形、内花被片の切れ込みの有無、花の内面の主な色、花の斑の模様、花被片のしわの強弱、雄ずいの色、やくの色、雌ずいの色、柱頭の大きさ	

ヘリクリスム	草姿、草丈、茎の太さ、茎の色、茎のアントシアニンの着色の強弱、茎の毛の多少、側枝の有無、側枝数、節間長、葉身の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の毛の多少、葉柄の有無、葉身の表面の色、葉身の裏面の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の型、葉身の斑の色、頭花の単生・複生の別、花らいの形、花の形、露芯の難易、一花房当たりの花数、花の直径、総苞片の単色・複色の別、総苞片の表面の主な色、総苞片の表面の二次色、総苞片の表面の二次色の分布、総苞片の裏面の主な色、総苞片の裏面の二次色、総苞片の全体の形、総苞片の先端の形、総苞片の長さ、総苞片の幅、総苞片の数、筒状花部の直径、筒状花部の色、花の香りの有無、開花始期	
ヒマワリ	胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、葉の大きさ、葉の緑色の濃淡、葉の表面の凹凸の強弱、葉の鋸歯の粗密、葉の横断面の形、葉の先端の形、葉の葉耳の大きさ、葉の翼の発達の強弱、葉の最下位側脈の角度、葉柄の基部に対する葉身先端の位置、茎の先端の毛の粗密、開花期、花型、舌状花の粗密、舌状花の形、舌状花の形状、舌状花の長さ、舌状花の主な色、筒状花の色、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の有無、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の強弱、筒状花の花粉の有無、苞葉の形、苞葉の先端の長さ、苞葉の外面の緑色の濃淡、苞葉の頭花に対する抱えの強さ、草丈、分枝の有無、株の分枝の型（栽培条件による分枝を除く。）、主茎頂花に対する最上側枝の頂花の位置、頭花の向き、頭花の直径、頭花の成熟種子が着生した面の形、種子の大きさ、種子の形、種子の厚さ、種子の主な色、種子の周縁のしま模様、種子の胴部のしま模様、種子のしま模様の色	
ヘリオプシス	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数、花の香り、開花期	
ニオイムラサキ	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
オオムギ	草姿、稈の長さ、葉しょうの毛の有無、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱、植物体の反曲した止め葉の多少、止め葉の葉しょう表面のろう質の多少、出穂期、芒の先端のアントシアニン着色の強弱、開閉花受粉性、穂のろう質の多少、穂の向き、草丈、穂の条数、穂の形、穂の粒着の粗密、穂の長さ、芒の長さ、穂軸の長さ、穂軸の曲がりの強弱、穂の不稔小穂の発育、不稔小穂の向き、穀粒に比べた中央小穂の芒を含む護穎の長さ、穀粒の小穂軸の毛の型、穀粒の稃の有無、穀粒の外穎のアントシアニン着色の強弱、穀粒の外穎背面内側面の脈沿いの突起の多少、穀粒の縦溝の毛の有無、穀粒のりん皮の着き方、穀粒の糊粉層の色、うるち・もちの別、穂発芽性、千粒重（原麦粒）、まき性、穀粒硬度、麦芽エキスの多少（ビール用品種に限る。）、コールバッハ数（ビール用品種に限る。）、ジアスターゼ力（ビール用品種に限る。）、穀粒のプロアントシアニジンの有無、穀粒のリポキシゲナーゼ（lox）活性の有無、βグルカン含量、Ｄ－ホルデインのHor－３座の対立遺伝子の構成、Ｃ－ホルデインのHor－１座の対立遺伝子の構成、Ｂ－ホルデインのHor－２座の対立遺伝子の構成	麦芽エキスの多少（ビール用品種に限る。）、コールバッハ数（ビール用品種に限る。）、ジアスターゼ力（ビール用品種に限る。）、穀粒のプロアントシアニジンの有無、穀粒のリポキシゲナーゼ（lox）活性の有無、βグルカン含量、Ｄ－ホルデインのHor－３座の対立遺伝子の構成、Ｃ－ホルデインのHor－１座の対立遺伝子の構成、Ｂ－ホルデインのHor－２座の対立遺伝子の構成
ギボウシ	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	
ヘスペロジギス	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
ホップ	主茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の大きさ、葉身の表面の凹凸の強弱、葉身の表面の色、葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）、開花期、草型、草姿、植物体の上部の大きさ、主茎中央部の側枝の長さ、主茎上部の側枝の長さ、主茎中央部の側枝の葉の密度、主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数、主茎中央部の側枝の総きゅう果数、主茎上部の側枝の総きゅう果数、きゅう果の摘果期、きゅう果の大きさ、きゅう果の形、きゅう果の苞の開く程度、きゅう果の緑色の濃淡、苞の大きさ、苞の幅／長さ、外苞先端の長さ、α酸含量、β酸／α酸、α酸中のフムロン含量、α酸中のコフムロン含量	α酸含量、β酸／α酸、α酸中のフムロン含量、α酸中のコフムロン含量
ヒアシンス	草型、草丈、球根の形、球根の大きさ、球根の色、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の長さ、一花房の花数、花の香り、開花期	
アジサイ	生育型、樹型、樹高、樹幅に対する樹高、茎の節間長、茎の帯化の有無、茎の色、茎の皮目の数、茎の皮目の大きさ、茎の皮目の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の切れ込みの有無、葉身の形、葉身の先端部の突出部分の長さ、葉身の先端部の形、	

	葉身の基部の形、葉縁の鋸歯の深さ、葉身のアントシアニンの着色、葉身のアントシアニン着色の分布、葉身の斑の有無、葉身の主な色、葉身の二次色、葉身の光沢、葉身のしわ、葉身の横断面の形、葉柄の色、花序の型、花序の高さ、花序の幅、花序の両性花の明瞭度、花序の装飾花の配列、花序の装飾花の粗密、花序の装飾花の数、装飾花の直径、装飾花のがく片の数、装飾花のがく片の姿勢、装飾花のがく片間の節間伸長、装飾花のがく片の長さ、装飾花のがく片の幅、装飾花のがく片の形、装飾花のがく片の先端の形、装飾花のがく片のしわ、装飾花のがく片の横断面の形、装飾花のがく片周縁の内曲、装飾花のがく片の重なり、装飾花のがく片の波打ち、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無、装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ、装飾花の花色の変化性の有無、装飾花のがく片の色数、装飾花のがく片の主な色、装飾花のがく片の二次色、装飾花のがく片の二次色の分布、装飾花のがく片の二次色の型、装飾花のがく片の二次色の割合、装飾花の小花柄の色、両性花の花弁の色、花序の老化による桃又は赤の着色、開花始期	
ヒロケレウス ウンダツス（ドラゴンフルーツ）	葉状茎の長さ、葉状茎の幅、葉状茎の横断面の形、葉状茎の色、葉状茎の周縁の起伏、とげの長さ、とげの主な色、とげ座の間隔、とげの多少、つぼみのりん片先端の着色の有無、一葉状茎当たりの着花数、花の長径、花被の色、自家結実性、果実の重さ、果実の縦断面の形、果実のりん片の大きさ、果実のりん片の数、果実のりん片の先端の形、果実のりん片の先端の向き、果皮の厚さ、果実の表面の色の均一性、果実の表面の主な色、果実の表面のとげの有無、果肉の色の均一性、果肉の色、果実の糖度、成熟種子の数、種子の大きさ、開花始期、開花の回数、収穫始期	
ヒペリクム	樹姿、樹高、樹幅、枝のアントシアニン着色の有無、枝のアントシアニン着色の強弱、節間長、新葉のアントシアニン着色の有無、新葉のアントシアニン着色の強弱、葉の着生角度、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の色、葉の斑の模様、葉の横断面の形、葉の先端の形、葉の基部の形、葉の香りの有無、花型、花の大きさ、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、花弁の色、花弁の開き方、花弁の重なり、花弁の湾曲、やくの色、花柱の長さ、果序の長さ、果序の幅、果序の形、がく片の長さ、がく片の幅、がく片のアントシアニン着色の有無、がく片のアントシアニン着色の強弱、がく片の反り、果序の果実の数、果実の長さ、果実の幅、果実の縦断面の形、果実の横断面の形、果実の先端のくぼみの有無、果実の表面の粗滑（先端部を除く。）、果実の色の区分、果実の主な色、果実の二次色の有無、果実の二次色、果実の基部の白又は緑色部の幅、果実の光沢の強弱、開花期	
ぶなしめじ	菌傘表面の着色の有無、菌傘裏面の着色の有無、菌糸体の成長最適温度、菌糸体の温度別成長量（10℃）、菌糸体の温度別成長量（15℃）、菌糸体の温度別成長量（20℃）、菌糸体の温度別成長量（25℃）、菌糸体の温度別成長量（30℃）、菌さんの縦断面の形、菌さんの直径、菌さんの高さ、菌さんの直径／高さ、菌さん中央部の色、菌さん周縁部の色、菌さん表面の斑紋の大きさ、菌さん表面の斑紋の分布、菌さん表面の斑紋の明瞭度、菌さんの硬さ、ひだの並び方、ひだの密度、ひだの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌さんの直径／菌柄の長さ、菌柄の最大径、菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径、菌柄の色、菌柄の毛羽の有無、菌柄の硬さ、子実体の平均乾燥重量、発生処理までの期間、菌掻きから子実体収穫までの期間	
しろたもぎたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さん表面のはん紋の多少、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の毛の多少、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
イベリス	草姿、草丈、株幅、茎の太さ、茎のアントシアニンの着色、茎の毛の有無、側枝の数、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の形、葉の切れ込みの有無、葉の切れ込みの深さ、葉の毛の有無、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉柄の有無、花柄の長さ、花序の型、花序の高さ、花序の直径、花の数、花の縦径、花の横径、花弁の色、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の波打ちの有無、花弁の重なり、花弁の先端の形	
イヌツゲ	樹姿、樹勢、枝葉の粗密、新しょうの毛、新しょうの樹皮の色、新葉の主な色、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の主な色、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、葉身の斑の分布、葉身の光沢、葉身の縦方向の反り、葉身の横断面の形、葉身の基部の形、葉身の先端部の形、花の数、花性、雄花の大きさ（雄株品種に限る。）、雄花の色（雄株品種に限る。）、雌花の大きさ（雌株品種に限る。）、雌花の色（雌株品種に限る。）、果実の大きさ（雌株品種に限る。）、果実の色（雌株品種に限る。）、果実の数（雌株品種に限る。）	
アマミヒイラギモチ	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
ソヨゴ	樹姿、樹高、葉の最大幅の位置、葉の先端の形、葉の基部の形、当年葉の反りの強弱、前年葉の反りの強弱、当年葉の波打ちの強弱、前年葉の波打ちの強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、当年葉の表面の緑色の濃淡、前年葉の表面の	

	緑色の濃淡、新葉のアントシアニン着色の有無、葉の斑の有無、花の直径、花弁の形、花柄の長さ、房成りの有無、果実の形、果実の大きさ、果実の色	
シキミ	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
ホウセンカ（ニューギニアインパチェンス及びアフリカホウセンカを除く。）	草型、草丈、株幅、茎の太さ、茎の長さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花序の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、距の形、距の長さ、距の色、花柄の長さ、一茎の花数、開花期、開花習性	
ニューギニアインパチェンス	葉部の高さ、株幅、茎のアントシアニン着色の強弱、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の色、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱、葉身の裏面の葉脈間の色、葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱、葉身の裏面の葉脈の色、小花柄の長さ、小花柄のアントシアニン着色の強弱、花型、花の幅、花の色数、花の表面の主な色、花の表面の二次色（２色以上の品種に限る。）、花の表面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、花の目の有無、花の目の大きさ、花の目の主な色、花の上弁の幅（一重品種に限る。）、花の側弁の幅（一重品種に限る。）、花の下弁の長さ（一重品種に限る。）、花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）、距の曲がりの強弱	
アフリカホウセンカ	葉部の高さ、株の幅、茎のアントシアニン着色の強弱、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の斑の有無、葉の表面の主な色（斑入り品種に限る。）、葉の表面の二次色（斑入り品種に限る。）、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱、花型、花の幅、花の色数、花の主な色、花の二次色（複色の品種に限る。）、花の二次色の分布（複色の品種に限る。）、花の目の有無（一重品種に限る。）、花の目の大きさ（一重品種に限る。）、花の目の色（一重品種に限る。）、上弁の幅（一重品種に限る。）、側弁の幅（一重品種に限る。）、開花始期（種子繁殖品種に限る。）	
チガヤ	草姿、草丈、葉群の高さ、分枝の数、地下茎の長さ（薬用品種に限る。）、地下茎の太さ（薬用品種に限る。）、稈の太さ、節の毛の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の色、葉身のアントシアニン着色の強弱、穂の数、穂の長さ、穂の幅、穎果の長さ、出穂の難易、出穂期、紅葉の早晩（紅葉する品種に限る。）	
かんしょ	草姿、茎の一次側枝の長さ、節間長、茎の太さ、茎のアントシアニンの着色、茎の先端のアントシアニンの着色、節のアントシアニンの着色、茎の先端の毛の粗密、葉身の大きさ、葉身の裂片の数、葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）、葉身の裂片の深さ、葉身の表面の色、葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）、葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）、葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）、葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）、葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱、葉身の蜜腺のアントシアニンの着色、新葉の表面の主な色、新葉の裏面の主な色、葉柄のアントシアニンの着色、葉柄の長さ、花冠の直径、花冠の色、塊根の形、塊根の長さ／幅、塊根の数、塊根の大きさ、塊根の直径に対する皮層の厚さ、塊根の表皮の主な色、塊根の表皮の二次色、塊根の肉の主な色、塊根の肉の主な色の濃淡、塊根の肉の二次色、塊根の目の深さ、蒸しいもの肉の色、でん粉の歩留、黒斑病抵抗性、つる割病抵抗性、ネコブセンチュウ抵抗性	でん粉の歩留、黒斑病抵抗性、つる割病抵抗性、ネコブセンチュウ抵抗性
コダチアサガオ	樹高、茎の太さ、茎の色、茎の木質化、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の基部の形、葉身の緑色の濃淡、葉柄の長さ、葉柄の色、花の大きさ、花の長さ、花冠裂片の主な色、花冠裂片の二次色の有無、花冠裂片の二次色、花冠の曜の色、花冠の喉部の色、花冠周縁の凹みの深さ、花冠周縁部の鋸歯の深さ、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱、花冠裂片のひだの強弱、花筒の長さ、花筒の幅、花筒の外面の色、花筒の内面基部の色、花柄の長さ、小花柄の長さ、開花始期	
アサガオ	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数、花の香り、開花期	
イレシネ	草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の有無、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の横断面の形、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の表面の主な色、葉身の表面の斑の有無、葉身の斑の位置、葉身の斑の色数、葉身の斑の主な色、葉身の光沢の強弱、葉身の基部の形、葉身の先端の形、葉柄の長さ、葉柄の色	
アイリス（ビアデッドアイリス）	草型、草丈、球根又は根茎の形、球根又は根茎の大きさ、球根又は根茎の色、茎の太さ、茎の色、分枝性、節間長、葉形、葉色、葉の厚さ、新芽の色、花形、花の大きさ、花色、花被片の形、花被片の大きさ、花被片の色、花被片の数、花柱の形、花柱の大きさ、花柱の色、雄ずいの色、やくの色、	

	しょう包の形、しょう包の長さ、しょう包の色、一しょう包内の花数、一茎のしょう包数、外花被片のひげの多少、ひげの色、花軸の中空、花の香り、発芽期、開花期	
アイリス（球根アイリス）	葉の幅、葉の色、葉の横断面の形、花柄の長さ、花柄の太さ、つぼみの色、花の大きさ、花の色数、花筒の長さ、外花被の幅、外花被の形、外花被の反りの強弱、外花被の表面の地色、外花被の円鋸歯の強弱、外花被の表面の脈の明瞭度、外花被の斑点の大きさ、外花被の斑点の色、外花被の斑点先端の形、外花被の基部の幅、外花被の表面基部の地色、内花被の長さ、内花被の幅、内花被の形、内花被の色、内花被の先端の形、内花被の周縁の波打ちの強弱、花糸の色、やくの色、花粉の黄色の濃淡、花柱の幅、花柱の色、ずい片の長さ、ずい片の幅、ずい片の表面の色、ずい片の切れ込みの深さ、柱頭の色	
アイリス（ビアデッドアイリス、球根アイリス及びカキツバタを除く。）	草型、草丈、球根又は根茎の形、球根又は根茎の大きさ、球根又は根茎の色、茎の太さ、茎の色、分枝性、節間長、葉形、葉色、葉の厚さ、新芽の色、花形、花の大きさ、花色、花被片の形、花被片の大きさ、花被片の色、花被片の数、花柱の形、花柱の大きさ、花柱の色、雄ずいの色、やくの色、しょう包の形、しょう包の長さ、しょう包の色、一しょう包内の花数、一茎のしょう包数、外花被片のひげの多少、ひげの色、花軸の中空、花の香り、発芽期、開花期	
カキツバタ	草型、草丈、球根又は根茎の形、球根又は根茎の大きさ、球根又は根茎の色、茎の太さ、茎の色、分枝性、節間長、葉形、葉色、葉の厚さ、新芽の色、花形、花の大きさ、花色、花被片の形、花被片の大きさ、花被片の色、花被片の数、花柱の形、花柱の大きさ、花柱の色、雄ずいの色、やくの色、しょう包の形、しょう包の長さ、しょう包の色、一しょう包内の花数、一茎のしょう包数、外花被片のひげの多少、ひげの色、花軸の中空、花の香り、発芽期、開花期	
イソトマ　アキシラリス	草姿、草丈、茎の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
ジャカランダ	樹姿、樹高、分枝性、枝の太さ、枝の色、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉軸の表面のアントシアニンの着色、羽片の数、羽片の長さ、羽片の幅、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の形、小葉の先端の形、小葉の基部の形、葉縁の形、葉の表面の色、葉の斑の有無、葉の斑の色、葉の毛の有無、花序の着生位置、花序の長さ、花序の幅、花序の形、花の数、花の向き、花の直径、がくの長さ、がくの色、花冠筒部の長さ、花冠筒部の太さ、花冠筒部の形、花冠筒部の外面の色、花冠筒部の内面の色、花冠裂片の形、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の表面の色、やくの色、花柱の主な色、花の香りの有無、開花習性、開花始期	
ソケイ（ヤスミヌム）	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
クルミ	樹勢、樹姿、枝の粗密、花芽の着生位置、枝の色、小葉の形、雄花の穂数、かく果の大きさ、かく果の横面の形、かく果の正面の形、かく果の横断面の形、かく果の球形指数、かく果の基部の形、かく果の頂部の形、かく果の頂部の突起の強弱、かく果の縫合縁の位置、かく果の縫合縁の突出の大きさ、かく果の縫合縁の幅、かく果の溝の深さ、かく皮の表面の構造、かく皮の厚さ、かく皮の固着性、かく果の一次と二次隔膜の厚さ、仁皮のはく皮性、果仁の色の濃淡、果仁の大きさ、果仁のかく果に対する重量の割合、成熟期、落葉期、葉軸の脱落の難易、果梗の離脱性、ほう芽期、雄花の開花期、雌花の開花期、雌花に対する雄花の開花期	
いぐさ	草型、葉しょう長、茎の長さ、茎の太さ、茎の色、茎の節間長、一株茎数、一株の長茎数、一メートル茎重、長茎重、有効茎乾物重、長茎の乾物重率、花房の大きさ、花房の多少、花被の色、開花始期、茎の硬さ、先枯の程度	
イブキ	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
ハイネズ	樹高、樹幅、樹幅／樹高、枝の先端部の向き、枝の長さ、枝の色、小枝の長さ、小枝の幅、小枝の葉の粗密、新葉の主な色、新葉の冬季の主な色、葉の着生角度、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／葉の幅、葉の先端の形、葉の主な色、葉の斑の有無、葉の斑の色、葉の気孔条の幅	
コエビソウ	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
カランコエ（カランコエ　ブロスフェルディアナを除く。）	草型、草丈、葉部の高さ、株幅、茎の木質化の程度、茎の毛の多少、分枝性、節間長、不定芽の発生位置、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花軸の色、花軸の白粉の程度、花冠の毛の多少、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、一花茎の花数、開花期	
カランコエ　ブロスフェルディアナ	草丈（花序を含む。）、株幅、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の斑の有無、葉の表面の緑色の濃淡、葉の表面のアントシアニン着色の強弱、葉の横断面の形、葉の周縁の鋸歯の数、葉の周縁の鋸歯の深さ、葉の先端の向き、開花枝の最頂部の多散花序の花数、開花枝の最頂部の多散花序の幅、開花初期の花冠裂片の表面の色数、開花初期の花冠裂片の表面の主な色、開花初期の花冠表面の二次色、花型、花冠裂片の数、花の直径、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）、花冠裂片の周縁の巻き込みの有無、花冠裂片の周縁の切れ込みの有無、花冠	

	裂片の先端の形、花冠裂片の長さ（一重品種に限る。）、花冠裂片の幅（一重品種に限る。）、花冠裂片の長さ／幅（一重品種に限る。）、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の二次色の分布位置、花冠裂片の裏面の淡色部の色（一重品種に限る。）、花冠裂片の裏面の濃色部の色（一重品種に限る。）、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）、外側花冠裂片の表面の二次色（八重品種に限る。）、外側花冠裂片の表面の二次色の分布位置（八重品種に限る。）、開花始期	
カルミア	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
クニフォフィア	草丈、葉の展開状態、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の表面の色、葉の横断面の形、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の色、花序の葉に対する位置、花序の長さ、花序の幅、花序の形、花序の花の粗密、未熟なつぼみの主な色、開花直前のつぼみの主な色、花被の色の変化の有無、花被の向き、花被の長さ、花被の筒部の直径、花被の長さ／花被の筒部の直径、花被の筒部の外面の色、花被の裂片の湾曲、花糸の色、花被の長さに対する雄ずいの長さ	
レタス	種子の色、子葉の大きさ、子葉の形、株の幅、株の葉上部の重なり、葉数、葉の姿勢、葉の裂片の数、葉の形、葉の先端部の形、葉の縦断面、葉の裂片の幅、葉のアントシアニン着色、葉のアントシアニンの色相、葉のアントシアニン着色の面積、葉の色、葉の緑色の濃淡、葉の光沢、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の凹凸、葉の凹凸の大きさ、葉の周縁部の波打ち、葉の周縁部の切れ込みの型、葉の周縁部の切れ込みの深さ、葉の周縁部の二次切れ込みの深さ、葉の周縁部の切れ込みの粗密、葉脈の型、球の大きさ、球の縦断面の形、球のしまり、芯の大きさ、茎の長さ、茎の太さ、茎の縦断面の形、茎の色、茎の内部の色、収穫期、抽だい始期、腋芽の発生、帯化の発生、べと病レースBl：16ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：17ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：20ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：21ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：22ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：23ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：24ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：25ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：26ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：29ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：30ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：31ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：33ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：35ＥＵ抵抗性、レタスモザイクウイルス抵抗性、根腐病菌レース１抵抗性、根腐病菌レース２抵抗性、レタスビッグベイン病抵抗性、アブラムシ耐性	べと病レースBl：16ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：17ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：20ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：21ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：22ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：23ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：24ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：25ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：26ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：27ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：29ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：30ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：31ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：33ＥＵ抵抗性、べと病レースBl：35ＥＵ抵抗性、レタスモザイクウイルス抵抗性、根腐病菌レース１抵抗性、根腐病菌レース２抵抗性、レタスビッグベイン病抵抗性、アブラムシ耐性

ユウガオ	草姿、子葉の形状、はい軸の大きさ、主づるの形状、側枝の形状、葉色その他葉の形状、葉柄の形状、根の形状、雌花の形状、雄花の形状、未熟果の色、果実の大きさ、果実の色、果実断面の形状その他果実の形状、種子の形状、早晩性、着果習性	
サルスベリ	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
ラミウム　マクラツム	草姿、茎の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
ランタナ	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
カラマツ	樹姿、幹の通直性、幹の完満性、幹の真円性、材の色、繊維配列、繊維の長さ、もくの形、樹脂の多少、材の比重、樹皮の色、樹皮の厚さ、樹皮のき裂紋様、枝の太さ、枝の長さ、枝角、枝付き密度、葉長、葉色、きゅう果の形、きゅう果の大きさ、きゅう果の色、雌花の色、種子の羽根の色、種子の羽根の紋様、黄葉期、成長性、発根性、結実性	
スイトピー	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの数、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数、花の香り、開花期	
ゲッケイジュ	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）、品質特性、早晩性	
ラウァンドゥラ	樹姿、株の大きさ、葉の緑色の濃淡、葉の灰色の強弱、花茎の伸長方向、株の枝の粗密、葉の長さ、葉の幅、葉の周縁の切れ込み、葉の斑の有無、葉の斑の分布、葉の斑の色、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の緑色の濃淡、花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）、花茎の毛の粗密（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）、花茎	

	の分枝の有無、花茎の分枝数、花茎の最長分枝の長さ、花穂の最大幅、花穂の長さ、花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）、花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）、花穂の輪生花間の距離（Lavandula節に限る。）、花穂の形、花穂の花の数、花穂の最上位輪生花の花の数（Lavandula節に限る。）、苞葉の幅、苞葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）、小苞葉の有無（Lavandula節に限る。）、小苞葉の長さ（Lavandula節に限る。）、先端苞葉の有無、先端苞葉の長さ（Stoechas節に限る。）、先端苞葉の形（Stoechas節に限る。）、先端苞葉の主な色（Stoechas節に限る。）、先端苞葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）、がくの色、がくの毛の粗密、花冠の色数、花冠の主な色、花冠の二次色、花冠の二次色の分布、開花始期	
レケナウルティア（ハツコイソウ）	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
しいたけ	菌糸密度、菌叢表面の着色の有無、菌糸体の成長最適温度、菌糸体の温度別成長速度（10℃／日）、菌糸体の温度別成長速度（15℃／日）、菌糸体の温度別成長速度（20℃／日）、菌糸体の温度別成長速度（25℃／日）、菌糸体の温度別成長速度（30℃／日）、菌さんの縦断面の形、菌さんの直径、菌さんの表面の地色、菌さんの厚さ、菌さんの直径／厚さ、菌さんの硬さ、りん皮の付着部位、りん皮の大きさ、りん皮の着色の有無、ひだの有無、ひだの形、ひだの並び方、ひだのちぢれの割合、ひだの幅、ひだの密度、ひだの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の表面の着色の有無、菌柄の毛羽の密度、菌柄の毛羽の着色の有無、菌柄の硬さ、菌柄の色、菌さんの直径／菌柄の長さ、子実体の平均乾燥重量、発生処理までの期間、発生処理から収穫最盛期までの期間	
むらさきしめじ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
こむらさきしめじ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
シャスターデージー	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	
イワナンテン	樹姿、樹高、株幅、冬期の葉群のアントシアニンの着色、新しょうの枝の色、新しょうの葉の主な色、新しょうの葉の斑の有無、新しょうの葉の斑の色、節間長、枝の太さ、枝のアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の主な色、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、葉身の斑の分布、葉身の毛の有無、葉身の鋸歯の深さ、葉身の凹凸、葉身のねじれ、葉柄の長さ、花序の長さ、苞の色、苞の毛の多少、がくの色、花冠の長さ、花冠筒部の幅、花冠筒部の開口部の幅、花冠筒部の幅／開口部の幅、花冠裂片の反りの強弱、花冠の色、開花始期	
ルイシア　コティレドン	草姿、草丈、茎の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
リアトリス	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	
ネズミモチ	樹姿、樹高、樹幅、枝の太さ、枝の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉縁の波打ち、新葉の表面の主な色、成葉の表面の主な色、葉身の斑の有無、花序の長さ、花序の幅、花冠裂片の表面の色、果実の長さ、果実の直径、果実の色	
リグストルムシネンセ	樹姿、樹高、樹幅、枝の太さ、枝の色、葉の長さ、葉の幅、葉身の地色、葉身の斑の有無、葉身の主な斑の色（斑の有る品種に限る。）、葉身の主な斑の分布（斑の有る品種に限る。）、葉身の二次的な斑の色（二次的な斑の有る品種に限る。）、葉身の二次的な斑の分布（二次的な斑の有る品種に限る。）、葉身の光沢、葉縁の波打ち、花序の長さ（開花した品種に限る。）、花序の幅（開花した品種に限る。）、花冠裂片の主な色（開花した品種に限る。）、開花始期（開花した品種に限る。）	
ユリ	草丈、茎のアントシアニン着色の強弱、葉の数、葉序、葉の長さ、葉の幅、葉の斑の有無、葉の表面の光沢の強弱、葉の横断面の形、つぼみの主な色、花序の型、花序の花数、花序の毛の強弱、花型、花被の向き（小花柄を除く。）、花被の形（小花柄を除く。）、花の香り、花被片の長さ、花被片の幅、花被片の肋状組織の強弱、花被片の周縁の波打ちの強弱、花被片の周縁の波打ちの型、花被	

	片の外反の強弱、花被片の中央部の主な色、花被片の基部の主な色、花被片の蜜腺に接する部分の色、花被片の先端部分の主な色、花被片の縁部の主な色、花被片の外面の主な色、花被片の蜜腺の色、花被片の乳頭突起又は斑点の数、花被片の乳頭突起又は斑点の範囲の大きさ、花被片の乳頭突起又は斑点の色、雄ずいの長さ、花糸の主な色、やくの色、花粉の色、花柱の主な色、柱頭の色、開花期	
リモニウム	草丈、花序の数、葉の長さ、葉の幅、葉身の形、葉の緑色の濃淡、葉の光沢の強弱、葉の毛の有無、葉の表面の毛の密度、葉の周縁の毛の密度、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の切れ込みの有無、葉の切れ込みの強弱、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、茎出葉の有無、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の毛の密度、花茎の色、花茎の翼の幅、花茎の翼の波打ちの強弱、一次分枝部のたく葉の長さ、花序の型、一次分枝の長さ、花序の分枝性、分枝の方向、花序の花数、がくの長さ、がくの直径、がくの形、がくの主な色、がくの中肋の色、花冠の大きさ、花冠の型、花冠の色、やくに対する柱頭の位置、柱頭の形、花の香りの有無、開花始期	
リナリア	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数、花の香り、開花期	
リンデルニア クレイスタンドラ	草姿、草丈、株の幅、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の横断面の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の周縁部の鋸歯、葉身の腺毛、小花柄の長さ、花冠の縦径、花冠の横径、花冠の縦径／横径、花冠筒部の長さ、花喉部の内面の主な色、下唇弁の中央裂片の長さ／幅、下唇弁の中央裂片表面の主な色	
ヤブラン	草姿、葉群の高さ、株の幅、葉の長さ、葉の幅、葉の先端の形、葉の外曲の強弱、葉の緑色の濃淡、葉の表面の斑の有無、葉の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉の表面の斑の分布（斑のある品種に限る。）、花茎の長さ、花茎の色、葉に対する花序の位置、花序の形、花序の長さ、花序の幅、花序の花の粗密、小花柄の長さ、つぼみの色、花被片の表面の色、開花始期	
リトドラ ディッフサ	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
ローベリア（ローベリア エリヌスを除く。）	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、とげの有無、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、	

	がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数、花の香り、開花期	
ローベリア エリヌス	草姿、草丈、側枝の長さ、節間長、側枝の太さ、側枝の緑色の濃淡、側枝のアントシアニンの着色、側枝の毛、葉の長さ、葉の幅、葉縁の鋸歯の深さ、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の裏面のアントシアニンの着色、葉の表面の毛、花型、花の直径（八重品種に限る。）、花の色（八重品種に限る。）、花冠の長さ、上唇弁の裂片の形、上唇弁の表面の色、下唇弁の長さ、下唇弁の幅、下唇弁の中央裂片の幅、下唇弁の表面の主な色、下唇弁の表面の二次色（白色部を除く。二次色のある品種に限る。）、下唇弁の表面の白色部、下唇弁の表面の白色部の形、下唇弁の斑紋の有無、下唇弁の斑紋の大きさ、下唇弁の裏面の色、下唇弁の裂片の重なり、花筒の外面の色	
ロブラリア	草丈、株幅、茎の分枝の粗密、茎の基部の太さ、茎の色、茎の毛の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の横断面の形、葉の周縁の形、葉の先端の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の有無、花序の直径、花序の小花数、小花の直径、小花柄の長さ、小花柄の緑色の濃淡、小花柄のアントシアニン着色の有無、がく片の形、がく片の緑色の濃淡、がく片のアントシアニン着色の有無、がく片の毛の有無、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、開花初期の花弁の色、開花盛期の花弁の色	
ハイブリッドライグラス	草型、茎の形状、葉の形状、穂の形状、種子の形状、種子の粒重、アントシアンの着色、出穂期、出穂性、ねん性、再生性、けい光反応性、越冬性、乾物率	
イタリアンライグラス	倍数性、種子の千粒重、春化前の草姿、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、春化後の株幅、春化後の草姿、春化後の草高、春化前の出穂性、春化後の出穂期、出穂期の草高、出穂期の株幅、止め葉の長さ、止め葉の幅、止め葉の長さ／幅、最長稈の長さ、上部の節間長、穂の長さ、穂の小穂の数、穂の粗密、穂の基部の小穂の包頴の長さ、穂の基部の小穂の長さ、けい光反応性、雄性不稔性、硝酸態窒素の濃度、耐倒伏性、冠さび病抵抗性、いもち病抵抗性	けい光反応性、硝酸態窒素の濃度、冠さび病抵抗性、いもち病抵抗性
ペレニアルライグラス	倍数性、春の草勢、秋の草勢、春化前の草姿、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、春化後の株幅、春化後の草姿、春化後の草高、春化前の出穂性、春化後の出穂期、出穂期の草高、出穂期の株幅、止め葉の長さ、止め葉の幅、止め葉の長さ／幅、最長稈の長さ、上部の節間長、穂の長さ、穂の小	けい光反応性

	穂の数、穂の粗密、穂の基部の小穂の包穎の長さ、穂の基部の小穂の長さ、けい光反応性、雄性不稔性、越夏性	
ロマンドラ	草姿、葉群の高さ、葉群の粗密、葉の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉の横断面の形、葉の先端の型、葉の先端の中央歯状突起の長さ、葉の平滑度、葉の表面のろう質の強弱、葉の表面の主な色、葉の表面の二次色（二次色のある品種に限る。）、葉の表面の光沢、葉の硬さ、葉しょう基部の周縁部の切れ込み、葉しょう基部の褐色の着色の濃淡、花序の位置、花序の側枝の多少、花穂の長さ、花柄の長さ、花柄の色、苞葉の長さ、がくの色	
クロミノウグイスカグラ（ハスカップ）	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）、種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）、品質特性、早晩性	
ロフォミルツス	樹姿、樹高、樹幅、枝の太さ、葉身の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、夏季の葉身の表面の主な色、夏季の葉身の表面の二次色、夏季の葉身の表面の二次色の分布、夏季の葉身の表面の三次色、夏季の葉身の表面の三次色の分布、夏季の葉身の裏面の主な色、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色、葉身の表面の二次色の分布、葉身の表面の三次色、葉身の表面の三次色の分布、葉身の裏面の主な色、葉身の葉脈間の膨らみの強弱、葉身の表面の光沢の強弱、葉身の基部の形	
トキワマンサク	樹姿、樹高、樹幅、側枝の粗密、成葉の葉身の長さ、成葉の葉身の幅、若葉の主な色、若葉の斑の有無、若葉の斑の型、若葉の斑の色、成葉の主な色、成葉の斑の有無、成葉の斑の型、成葉の斑の色、秋季の若葉の主な色、秋季の若葉の斑の有無、秋季の若葉の斑の型、秋季の若葉の斑の色、秋季の成葉の主な色、秋季の成葉の斑の有無、秋季の成葉の斑の型、秋季の成葉の斑の色、一花序の花数、花序の直径、がくの色、花の長さ、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の反り、花弁の主な色、花弁の二次色の有無、花弁の二次色	
レプトスペルムム	樹姿、樹高、枝の着生の向き、枝の先端の向き、株の幅、新しょうの主な色、新しょうの毛の粗密、新葉の主な色、葉身の茎に対する着生の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の横断面の形、葉身の先端の形、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の主な色、葉身の表面の斑の色、葉身の表面の光沢の強弱、葉身の裏面の毛の粗密、つぼみの毛の粗密、つぼみの主な色、花弁の輪生の数、花弁の重なり、雄ずいの数、花の直径、花の直径に対する花盤の大きさ、花盤の色、花弁の長さに対するがく片の長さ、がく先端の形、がくの主な色、がくの毛の粗密、花弁の長さ／幅、花弁の表面の色数、花弁の表面の二次色の模様、花弁の開	
	花後の花色の移行の有無、花弁の表面の主な色、花弁の表面の二次色、花弁の周縁の波うちの強弱、花弁の開花二週間後の表面の主な色、花弁の開花二週間後の表面の二次色、花盤の開花二週間後の主な色、花弁の長さに対する雄ずいの長さ、花糸の主な色、開花始期	
ルクリア	樹姿、樹高、樹姿の幅、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、節間長、葉全体の形、葉身先端部の形、葉身基部の形、葉縁の形、葉身の曲がり、葉縁の波打ち、葉身の長さ、葉身の幅、葉の表面の色、葉の裏面の色、葉の光沢、成葉表面の毛の有無、成葉裏面の毛の有無、成葉裏面の脈の毛の有無、葉柄の長さ、葉柄の色、つぼみの色、花序の形、花房の長径、花房の高さ、一花房の花数、花形、花のタイプ、花の大きさ、花弁表面の色、花筒中間部の太さ、花筒の長さ、花筒の色、花弁全体の形状、花弁先端の形、花弁の曲がり、花弁のしわ、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の裂片数、副花冠の形、がくの長さ、がく全体の形、がくの色、柱頭のタイプ、花の香り、開花始期	
リカステ	草型、草丈、茎又はぎ球茎の形、茎の太さ、ぎ球茎の大きさ、茎又はぎ球茎の色、茎の毛の多少、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の厚さ、一花茎の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の色、花茎の抽出角度、花茎の分枝性、花芽の発生位置、花の香り、開花期	
センノウ	草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期	
リコリス	草型、草丈、球根の形、球根の大きさ、球根の色、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の長さ、一花房の花数、花の香り、開花期	
はたけしめじ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
ほんしめじ	菌叢の表面の色、菌叢の裏面中央部の色、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度（10℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（15℃／日）、菌糸	

	体の温度別生長速度（20℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（25℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（30℃／日）、菌さんの断面の形、菌さんの表面のいぼの有無、菌さんの大きさ、菌さんの中央部の色、菌さんの周縁部の色、菌さんの表面の模様の有無、菌さんの厚さ、菌さんの直径／菌柄の長さ、子実層たくの色、子実層たくの並び方、子実層たくの密度、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、菌柄の最大直径／菌さん下の菌柄の直径、最適培養期間（種菌接種後覆土までの培養期間）、発生最盛期までの期間（発生処理後から収穫適期までの期間）、子実体の平均乾燥重量、有効茎数	
オカトラノオ	草丈、茎の太さ、茎の横断面の形、茎の色、茎の節のアントシアニンの着色、茎の毛の多少、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の表面の色、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面のアントシアニンの着色、葉身の表面のアントシアニン着色の分布、葉身の裏面の色、葉柄の長さ、花序の長さ、花序の幅、花序の形、花序の向き、苞葉の長さ、苞葉の色、苞葉のアントシアニンの着色、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの先端の色、がくの基部の色、小花の直径、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の表面の色、花糸の色、花柱の色	
リシマキア　コンゲスティフロラ	草型、草丈、株幅、茎の太さ、茎の横断面の形、茎の色、茎のアントシアニンの着色、茎の毛の多少、節間長、新葉の色数、新葉の主な色、新葉の二次色（２色以上の品種に限る。）、新葉の三次色（３色以上の品種に限る。）、葉の色数、葉の主な色、葉の二次色（２色以上の品種に限る。）、葉の三次色（３色以上の品種に限る。）、葉の裏面のアントシアニン着色の有無、葉の先端の形、葉の表面の毛の多少、葉の裏面の毛の多少、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉柄の長さ、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの色、がくのアントシアニンの着色、花冠の直径、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の表面の色、花喉部の主な色、花糸の色、花柱の色	
におうしめじ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
マグノリア　スーランジアナ	樹高、株幅、枝の長さ、枝の太さ、枝の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の表面の光沢、葉身の表面の色、葉身の表面の斑の有無、葉身の裏面の色、花の高さ、花の直径、花の形、花被片の数、花被片の長さ、花被片の幅、花被片の形、花被片の縦断面の形、花被片の横断面の形、花被片の表面の色、花被片の裏面の上部の色、花被片の裏面の基部の色、やくの色、花糸の色、雌ずいの色、花の香り、開花期	
マルコミア　マリティマ	草姿、草丈、株幅、分枝の粗密、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の多少、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉表面の緑色の濃淡、葉身の形、葉縁の切れ込みの深さ、葉身の長さ、葉身の幅、がくの色、花の直径、花の目の有無、花弁の形、花弁先端の切れ込みの深さ、花弁表面の主な色、花弁表面の二次色、開花後期の花弁表面の主な色、開花後期の花弁表面の脈の明瞭度	
アセロラ	樹姿、樹勢、枝の発生密度、節間長、枝の太さ、新しょうの毛じの粗密、葉身の長さ、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の先端の形、葉身の表面の緑色の濃淡、やくに対する柱頭の位置、花柱の湾曲、花弁の周縁の波打ちの強弱、花弁の桃色の濃淡、果実の長さ、果実の幅、果実の長さ／幅、果実の重さ、果実の形、果実の条溝の深さ、果頂部のくぼみの深さ、果頂部のくぼみの幅、梗あ部の深さ、梗あ部の幅、果柄の長さ、果皮の主な色、果肉の色、果実の酸味、果汁の多少、核の大きさ、核の褐色の濃淡	
リンゴ	樹勢、樹の型（生食用品種に限る。）、枝の数（台木用品種に限る。）、樹姿（生食用の分枝型品種に限る。）、結実の型（生食用品種に限る。）、新しょうの姿勢（台木用品種に限る。）、新しょうの伸長状態（台木用品種に限る。）、枝の毛じの多少（台木用品種に限る。）、枝の表面の光沢の強弱（台木用品種に限る。）、えき花芽の着生（台木用品種に限る。）、枝の太さ、節間長、枝の色（生食用品種に限る。）、枝の毛じの粗密、皮目の多少、皮目の大きさ（台木用品種に限る。）、皮目の形（台木用品種に限る。）、枝の陽光面の色（台木用品種に限る。）、芽の大きさ（台木用品種に限る。）、芽の先端の形（台木用品種に限る。）、芽の姿勢（台木用品種に限る。）、芽の支持部の大きさ（台木用品種に限る。）、枝の先端の色（台木用品種に限る。）、若葉のアントシアニン着色の有無（台木用品種に限る。）、若葉の着色の色相（台木用品種に限る。）、葉身の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の横断面の形（台木用品種に限る。）、葉身の先端突起の長さ（台木用品種に限る。）、葉身の緑色の濃淡（生食用品種に限る。）、葉身の周縁の鋸歯の形、葉身の裏面の毛じの粗密、葉脈のアントシアニン着色の強弱（台木用品種に限る。）、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の広がり（生食用品種に限る。）、葉身の長さ／葉柄の長さ（台木用品種に限る。）、たく葉の大きさ（台木用品種に限る。）、つぼみの色（生食用品種に限る。）、花の大きさ（生食用品種に限る。）、花弁の重なり（生食用品種に限る。）、花柱の位置（生食用品種に限る。）、幼果のアントシアニン着色の広がり（生食用品種に限る。）、果実の大きさ（生食用品種に限る。）、果実の長さ（生食用品種に限る。）、果実の幅（生食用品種に限る。）、果実の長さ／幅（生	斑点落葉病抵抗性（生食用品種に限る。）

	食用品種に限る。）、果実の形（生食用品種に限る。）、果実の角張りの強弱（生食用品種に限る。）、果実の王冠の強弱（生食用品種に限る。）、果実のがくの開閉（生食用品種に限る。）、果実のがくの長さ（生食用品種に限る。）、果粉の多少（生食用品種に限る。）、果皮のろう質の多少（生食用品種に限る。）、果面の粗滑（生食用品種に限る。）、果皮の地色（生食用品種に限る。）、果皮を被う色の面積（生食用品種に限る。）、果皮を被う色（生食用品種に限る。）、果皮を被う色の濃淡（生食用品種に限る。）、果皮を被う色の型（生食用品種に限る。）、果皮のしまの幅（生食用品種に限る。）、果皮のしま模様の明瞭度（生食用品種に限る。）、梗あ周辺のさびの量（生食用品種に限る。）、果実側面のさびの量（生食用品種に限る。）、がくあ周辺のさびの量（生食用品種に限る。）、果点の数（生食用品種に限る。）、果点の大きさ（生食用品種に限る。）、スカーフスキンの多少（生食用品種に限る。）、果柄の長さ（生食用品種に限る。）、果柄の太さ（生食用品種に限る。）、梗あの深さ（生食用品種に限る。）、梗あの幅（生食用品種に限る。）、がくあの深さ（生食用品種に限る。）、がくあの幅（生食用品種に限る。）、果肉の硬さ（生食用品種に限る。）、果肉の色（生食用品種に限る。）、果実の甘味（生食用品種に限る。）、果実の酸味（生食用品種に限る。）、果実の蜜の多少（生食用品種に限る。）、果心の形（生食用品種に限る。）、果実の子室の型（生食用品種に限る。）、ほう芽期（台木用品種に限る。）、開花始期（生食用品種に限る。）、収穫期（生食用品種に限る。）、斑点落葉病抵抗性（生食用品種に限る。）	
チリソケイ	葉群の粗密、つるの数、若茎の緑色の濃淡、若茎のアントシアニンの着色、節間長、茎の毛の有無、葉序、葉柄の長さ、葉柄の緑色の濃淡、葉柄のアントシアニンの着色、葉柄の毛の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の主な色、葉身の二次色、葉身の二次色の模様、葉身の表面の光沢、葉身の葉脈間の凹凸、葉身の表面の毛の有無、葉身の裏面の緑色の濃淡、葉身の裏面の毛の有無、葉身の横断面の形、葉縁の波打ち、小花柄の長さ、小花柄の緑色の濃淡、小花柄のアントシアニンの着色、小花柄の毛の有無、つぼみの形、花型、がくの長さ、がくの下部の主な色、がくの上部の主な色、花冠の直径、花筒の長さ、花筒の外面の色、花喉部の長さ、花喉部の先端部の幅、花喉部の形、花喉部の外面下部の色、花喉部の外面上部の色、花喉部の内面下部の色、花喉部の内面上部の色、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の対称性、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の重なり、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色の有無、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の表面の二次色の分布、花冠裂片の表面の二次色の模様、花冠裂片の周縁の反り、花冠裂片の周縁の波打ち、花冠裂片の先端部の縦断面の形、花糸の色、やくの色、子房の色	

マンゴー	樹姿、幼葉のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の色、葉身のねじれの有無、葉身の二次葉脈の間隔、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の基部の形、葉身の先端の形、葉柄の着生角度、葉柄の長さ、花穂の長さ、花穂の直径、花穂の長さ／直径、花穂の一次分枝の数、花穂の軸のアントシアニン着色の強弱、果実の長さ、果実の幅、果実の長さ／幅、果実の縦断面の形、果実の横断面の形、果皮の色、果実の皮目の密度、果実の皮目と果皮色の対比、果実の皮目の大きさ、果実の表面のコルク化の有無、果実のこうあの深さ、果実のネックの有無、果実のネックの長さ、果実の腹面肩部の形、果実の背面肩部の形、果実の腹面肩部の溝の長さ、果実の腹面肩部の溝の深さ、果実の腹面肩部のふくらみの有無、果実の凹みの有無、果実の凹みの深さ、果嘴のふくらみの程度、果嘴の大きさ、果柄の直径、完熟果の果皮の主な色、完熟果の果皮の斑点の程度、完熟果の果皮の厚さ、完熟果の果皮のはく皮性の難易、完熟果の果肉の主な色、完熟果の果肉の硬さ、完熟果の果汁の多少、完熟果の果肉の粗密、完熟果の核への繊維付着の多少、完熟果の果皮への繊維付着の多少、果実の松脂臭の有無、核表面の維管束の隆起、胚の形、胚の数、開花始期、成熟期	
ストック	胚軸のアントシアニン着色の有無、草型、草丈、開花側枝の発生位置、開花側枝の数、茎の硬さの強弱、葉数、上位葉の向き、下位葉の切れ込みの深さ、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の凹凸、葉の毛の有無、八重株と比較した一重株の葉の緑色の類似性、葉の緑色の濃淡、花柄の長さ、花穂の長さ、花穂の形、花穂の上部の伸長、花穂の花の数、小花柄の長さ、花の直径、花弁の数、八重花と一重花の花色の違いの有無、花の香り、がくのアントシアニン着色の有無、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の内曲、花弁のちりめん状のしわ、花弁の主な色、花弁の基部の複色部の有無、花弁の基部の複色部の色、花弁の基部の複色部の大きさ、内花弁の色、一重花の花弁の長さ、一重花の花弁の幅、一重花の花弁の内曲、一重花の花弁の主な色、一重花の花弁の基部の複色部の有無、一重花の花弁の基部の複色部の色、一重花の花弁の基部の複色部の大きさ、開花始期、八重率、種子の色による八重鑑別の難易	
ハリツルマサキ	樹姿、枝の長さ、枝の太さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の周縁の形、葉身の横断面の形、新葉の表面の主な色、新葉の表面の斑の有無、新葉の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、新葉の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉身の表面の主な色、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉柄の長さ	

メカルドニア	草姿、草丈、茎の長さ、茎の太さ、茎の色、茎の毛の有無、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の色、葉の斑の有無、葉の周縁部の形、葉の周縁部の鋸歯の粗密、花柄の長さ、花の長さ、花の幅、がくの形、がくの色、上唇弁の長さ、上唇弁の幅、上唇弁の形、上唇弁の先端の形、上唇弁の主な色、上唇弁の二次色の有無、上唇弁の二次色の型、上唇弁の二次色、下唇弁の中央裂片の長さ、下唇弁の中央裂片の幅、下唇弁の中央裂片の形、下唇弁の先端の形、下唇弁の主な色、下唇弁の二次色の有無、下唇弁の二次色の型、下唇弁の二次色、開花始期	
アルファルファ	は種年の秋の草型（秋分の二週間前）、は種後最初の秋分の二週間後の草丈（秋分の二週間前に刈り取り）、は種後最初の秋分の六週間後の草丈(秋分の二週間後に刈り取り)、春の草丈（は種翌年の成長開始から一ヶ月後）、開花始期、非常に濃い青紫色の花を持つ個体の出現頻度、複色花を持つ個体の出現頻度、クリーム色、白色又は黄色の花を持つ個体の出現頻度、開花盛期の最長茎の長さ、一番刈り後三週間後の草丈、二番刈り後三週間後の草丈、三番刈り後三週間後の草丈、四番刈り後三週間後の草丈、は種後二回目の秋分の二週間後の草丈（秋分の二週間前に刈り取り）、は種後二回目の秋分の六週間後の草丈（秋分の二週間後に刈り取り）、冬季の生育状況、バーティシリウム萎凋病抵抗性、茎の線虫抵抗性、炭そ病抵抗性、フィトフトラ根腐病抵抗性、コンドウヒゲナガアブラムシ抵抗性、アルファルファアブラムシ抵抗性	バーティシリウム萎凋病抵抗性、茎の線虫抵抗性、炭そ病抵抗性、フィトフトラ根腐病抵抗性、コンドウヒゲナガアブラムシ抵抗性、アルファルファアブラムシ抵抗性
メラレウカ　ブラクテアタ	樹姿、樹高、樹幅、枝の毛の粗密、葉序、葉の姿勢、葉の先端部の形、葉の長さ、葉の幅、葉の縦方向の湾曲、葉の横方向のねじれ、新葉の毛の有無、新葉の夏季の色、新葉の冬季の色、成葉の夏季の色、成葉の冬季の色、葉柄の有無	
メランポディウム　パルドスム	草姿、草丈、茎の形状、葉の形状、花の形状、品質特性、早晩性	
ノボタン	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数,花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ、果実の色、発芽期、開花期、落葉性	
センダン	樹姿、樹高、幹の形状、枝の形状、葉の形状、花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）、品質特性、早晩性	
ハッカ	草姿、草丈、茎の色、茎の長さ、茎の太さ、茎の断面の形、茎の毛じの多少、分枝数、節数、葉の色１、葉の色２、葉の形、葉の大きさ、葉の厚さ、葉縁の形、葉のしわ、脂腺の大きさ、油腺の密度、葉の毛じの多少、葉の基部の形、葉柄の長さ、花序、花色、花の大きさ、雄ずいの形、根茎の形、根茎の太さ、根茎の多少、ほう芽期、着らい始期、開花始期、収油率、メントール含有率、カルボン含有率	メントール含有率、カルボン含有率
とんぴまいたけ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの紋様、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	
メセンブリアンテムム　クリスタリヌム	草丈、株幅、一次側枝の長さ、一次側枝の太さ、二次側枝の長さ、ブラッダー細胞の突出の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の最大幅の位置、葉の周縁の波打ちの強弱、葉のベタシアニンの着色、葉の緑色の濃淡	
メタセコイア	樹姿、幹の通直性、幹の完満性、幹の真円性、材の色、繊維配列、繊維の長さ、もくの形、樹脂の多少、材の比重、樹皮の色、樹皮の厚さ、樹皮のき裂紋様、枝の太さ、枝の長さ、枝角、枝付き密度、葉形、葉の大きさ、葉色,きゅう果の形,きゅう果の大きさ、きゅう果の色、雌花の色、ほう芽性、黄葉期、落葉期、成長性、発根性、結実性	
ミルトニア	草型、草丈、茎又はぎ球茎の形、茎の太さ、ぎ球茎の大きさ、茎の毛の多少、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の厚さ、一花茎の花数、花茎の長さ、花茎の太さ,花茎の色、花茎の抽出角度、花茎の分枝性,花芽の発生位置、花の香り、開花期	
オシロイバナ	草型、株の高さ、茎の太さ、節間長、茎の緑色の濃淡、茎の節部の着色の有無、茎の毛の多少、一次側枝の型、一次側枝の数、葉序、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の先端部の形、葉の基部の形、葉の緑色の濃淡、葉の毛の多少、葉柄の長さ、葉柄の太さ、花の数、花柄の長さ,花の直径、苞の長さ、苞の幅、苞の形、苞の着色の有無、がく片の色、がく片の模様の有無、がく片の模様の種類、がく片の模様の色、がく筒の長さ、雄ずいの色、雌ずいの色、花の香りの有無、開花始期	
ススキ	草姿、草丈、葉群の高さ、茎の数、稈の長さ、節数、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身の形、葉身の反りの位置、葉身の横断面の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）、中肋の色、穂の形、穂の長さ、穂の一次枝梗の数、穂の	