

畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格

制 定	昭和60年 4月20日 農林水産省告示第 531号
改 正	昭和63年12月 9日 農林水産省告示第1973号
改 正	平成 2年 9月29日 農林水産省告示第1225号
改 正	平成 6年 3月 1日 農林水産省告示第 435号
改 正	平成 6年 8月 9日 農林水産省告示第1130号
改 正	平成 6年12月26日 農林水産省告示第1741号
改 正	平成 8年 4月 4日 農林水産省告示第 424号
改 正	平成 9年 2月17日 農林水産省告示第 248号
改 正	平成16年 4月 6日 農林水産省告示第 895号
改 正	平成18年 4月 6日 農林水産省告示第 538号
改 正	平成20年 8月29日 農林水産省告示第1351号
確 認	平成24年 7月17日 農林水産省告示第1680号
改 正	平成28年 2月24日 農林水産省告示第 489号
改 正	平成29年10月20日 農林水産省告示第1574号
最終改正	令和元年 6月27日 農林水産省告示第 475号

(適用の範囲)

第1条 この規格は、畜産物缶詰及び畜産物瓶詰のうち、食肉缶詰及び食肉瓶詰、ソーセージ缶詰及びソーセージ瓶詰、コールドミート缶詰及びコールドミート瓶詰、コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰並びに家きん卵水煮缶詰及び家きん卵水煮瓶詰に適用する。

(定義)

第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用 語	定 義
畜産物缶詰又は畜産物瓶詰	食肉鳥卵又はその加工品（調味、ばい焼又は塩漬したものを含む。）に調味液を加え又は加えないで、缶又は瓶に密封し、加熱殺菌したものをいう。
食肉缶詰又は食肉瓶詰	畜産物缶詰又は畜産物瓶詰のうち、食肉に調味液を加えたものを詰めたものをいう。
ソーセージ缶詰又はソーセージ瓶詰	畜産物缶詰又は畜産物瓶詰のうち、家畜、家兎若しくは家きんの肉を塩漬し又は塩漬しないで、ひき肉したものに、家畜、家兎若しくは家きんの臓器及び可食部分を塩漬し若しくは塩漬しないで、ひき肉し、若しくはすりつぶしたもの又は魚肉若しくは鯨肉を塩漬し若しくは塩漬しないで、ひき肉し、若しくはすりつぶしたもの（魚肉及び鯨肉の原材料及び添加物（調味液の原材料及び添加物を除く。以下この項において同じ。）に占める重量の割合が15%未満であるものに限る。）を加え又は加えないで、調味料、香辛料等を加え、結着材料（結着材料の原材料及び添加物に占める重量の割合が15%未満であるものに限る。）を加え又は加えないで、練り合わせたもの（グリーンピース、パプリカその他の種ものを加えたものを含む。）をケーシング等に充てんした後、くん煙し又はくん煙しないで、加熱し、又は乾燥したものをブロック、スライス若しくはその他の形状に切断し、又はそのまま詰めたものをいう。

コーンドミート缶詰 又はコーンドミート 瓶詰	畜産物缶詰又は畜産物瓶詰のうち、食肉を塩漬 ^{せき} し、煮熟した後、ほぐし 又はほぐさないで、食用油脂、調味料、香辛料等を加え又は加えないで 詰めたものをいう。
コンビーフ缶詰又は コンビーフ瓶詰	コーンドミート缶詰又はコーンドミート瓶詰のうち、原料の食肉として 牛肉のみを使用したものをいう。
家きん卵水煮缶詰又 は家きん卵水煮瓶詰	畜産物缶詰又は畜産物瓶詰のうち、家きんの卵を煮熟し、殻を除去して 、水及び食塩とともに詰めたものをいう。
食 肉 鳥 卵	食肉、食用に供される獣鳥（海獣を除く。）の臓器及び可食部分並びに 卵をいう。
食 肉	食用に供される獣鳥（海獣を除く。）の肉（骨付肉を含む。）をいう。
家 き ん	鶏、うずら、あひる、七面鳥、ほろほろ鳥その他の食用又は採卵用に飼 育される鳥をいう。
家 畜	牛、豚、馬、めん羊及び山羊をいう。
臓器及び可食部分	肝臓、腎臓、心臓、肺臓、脾臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、 尾、横隔膜、血液及び脂肪層をいう。
塩 ^{せき} 漬	食塩及び発色剤に香辛料等を加え又は加えないで調製したものに食肉を 漬け込むことをいう。
結 着 材 料	でん粉、小麦粉、コーンミール、パン粉、植物性たん白、卵たん白、乳 たん白、粉乳、ゼラチンその他の結着性を高めるため用いるものをいう。

（食肉缶詰又は食肉瓶詰の規格）

第3条 食肉缶詰又は食肉瓶詰の規格は、次のとおりとする。

区 分	基 準
香 味	香味が良好であり、かつ、異味異臭がないこと。
肉 質	肉締り及び硬軟が良好であること。
形 態	小肉片、ほぐし肉及びひき肉を詰めたもの以外のものにあつては、肉片 のそろい及び切り方が適当であること。
色 沢	色沢が良好であること。
液 汁	1 水及び食用油脂を使用した調味液とともに詰めたものにあつては、 液がおおむね清澄であること。 2 その他のものにあつては、液量がおおむね適当であること。
そ の 他 の 事 項	1 毛その他のきょう雑物がないこと。 2 筋、血管及び膜がほとんどなく、脂肪部分の重量が固形量の20%以

	<p>下であること。</p> <p>3 骨付の食肉を原料としたものにあつては、骨の重量が固形量の15%（骨付の家きん肉にあつては20%）以下であること。</p> <p>4 薄切りにしたものにあつては、肉の厚さが4mm以上であること。</p>
原 材 料	食肉については、牛肉、豚肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、家兔肉及び家きん肉以外のものを使用していないこと。
添 加 物	<p>1 国際連合食糧農業機関及び世界保健機関合同の食品規格委員会が定めた食品添加物に関する一般規格（CODEX STAN 192-1995, Rev. 7-2006）3.2の規定に適合するものであつて、かつ、その使用条件は同規格3.3の規定に適合していること。</p> <p>2 使用量が正確に記録され、かつ、その記録が保管されているものであること。</p> <p>3 1の規定に適合している旨の情報が、一般消費者に次のいずれかの方法により伝達されるものであること。ただし、業務用の製品に使用する場合にあつては、この限りでない。</p> <p>(1) インターネットを利用し公衆の閲覧に供する方法</p> <p>(2) 冊子、リーフレットその他の一般消費者の目につきやすいものに表示する方法</p> <p>(3) 店舗内の一般消費者の目につきやすい場所に表示する方法</p> <p>(4) 製品に問合せ窓口を明記の上、一般消費者からの求めに応じて当該一般消費者に伝達する方法</p>
内 容 量	表示重量に適合していること。
容 器 の 状 態	<p>1 密封が完全で、かつ、適当な真空度を保持していること。</p> <p>2 外観が良好であること。</p> <p>3 缶詰のものにあつては、缶の内面の状態が良好であること。</p> <p>4 瓶詰のものにあつては、瓶及び蓋の品質及び型体並びにパッキングの材質が良好であること。</p>

（ソーセージ缶詰又はソーセージ瓶詰の規格）

第4条 ソーセージ缶詰又はソーセージ瓶詰の規格は、次のとおりとする。

区 分	基 準
香 味	前条の規格の香味と同じ。
肉 質 等	肉質及び結着が良好であること。
色 沢	前条の規格の色沢と同じ。
原 材 料	<p>次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。</p> <p>1 食肉 豚肉、牛肉、馬肉及び鶏肉（セミドライソーセージにあつては豚肉、牛肉及び馬肉に限る。）</p> <p>2 豚の脂肪層</p> <p>3 結着材料</p>

	でん粉及び植物性たん白 4 調味料 5 香辛料
添 加 物	前条の規格の添加物と同じ。
内 容 量	前条の規格の内容量と同じ。
容 器 の 状 態	前条の規格の容器の状態と同じ。

(コンビーフを詰めたもの以外のコーンドミート缶詰又はコーンドミート瓶詰の規格)

第5条 コンビーフを詰めたもの以外のコーンドミート缶詰又はコーンドミート瓶詰の規格は、次のとおりとする。

区 分	基 準
香 味	第3条の規格の香味と同じ。
肉 質 等	1 硬軟が良好であること。 2 配合状態が良好であること。
色 沢	第3条の規格の色沢と同じ。
そ の 他 の 事 項	筋、血管及び膜がほとんどないこと。
粗 た ん 白 質	17%以上であること。
原 材 料	次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。 1 食肉 牛肉及び馬肉（牛肉の重量が牛肉及び馬肉の合計重量の20%以上のものに限る。） 2 食用油脂 3 調味料 食塩、砂糖類その他調味料として使用するもの 4 ゼラチン 5 寒天 6 香辛料
添 加 物	第3条の規格の添加物と同じ。
内 容 量	第3条の規格の内容量と同じ。
容 器 の 状 態	第3条の規格の容器の状態と同じ。

(コンビーフ缶詰又はコンビーフ瓶詰の規格)

第6条 コンビーフ缶詰又はコンビーフ瓶詰の規格は、次のとおりとする。

	基 準
--	-----

区 分	上 級 標 準	
	香 味	香味が優良であり、かつ、異味異臭がないこと。
肉 質 等	1 硬軟が良好であること。 2 配合状態が良好であること。	
色 沢	第3条の規格の色沢と同じ。	
そ の 他 の 事 項	筋、血管及び膜がほとんどないこと。	
粗 た ん 白 質	21%以上であること。	17%以上であること。
原 材 料	次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。 1 食肉 牛肉 2 食用油脂 3 調味料 食塩、砂糖類その他調味料として使用するもの 4 ゼラチン 5 寒天 6 香辛料	
添 加 物	第3条の規格の添加物と同じ。	
内 容 量	第3条の規格の内容量と同じ。	
容 器 の 状 態	第3条の規格の容器の状態と同じ。	

(家きん卵水煮缶詰又は家きん卵水煮瓶詰の規格)

第7条 家きん卵水煮缶詰又は家きん卵水煮瓶詰の規格は、次のとおりとする。

区 分	基 準
香 味	第3条の規格の香味と同じ。
肉 質	硬軟が良好であること。
形 態	形が整っていること。
色 沢	第3条の規格の色沢と同じ。
そ の 他 の 事 項	1 液が清澄であること。 2 卵黄の露出がないこと。 3 損傷がほとんどないこと。 4 内皮の除去が良好であること。

原 材 料	次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。 1 家きん卵 2 食塩
添 加 物	使用していないこと。
内 容 量	第3条の規格の内容量と同じ。
容 器 の 状 態	第3条の規格の容器の状態と同じ。

(測定方法)

第8条 第3条、第4条及び前条の規格における固形量並びに第5条及び第6条の規格における粗たん白質の測定方法は、次のとおりとする。

事 項	測 定 方 法
固 形 量	<p>1 缶詰の場合 缶詰を切り開き、2分間缶詰を傾斜して放置し、液を流出させた後に測定した重量から、缶の重量を差し引いた重量とする。</p> <p>2 瓶詰の場合 蓋を開き、2分間容器を傾斜して放置し、液を流出させた後に測定した重量から、容器の重量を差し引いた重量とする。</p>
粗 た ん 白 質	<p>ケルダール法により全窒素を定量し、これに6.25を乗じて粗たん白質の量とする。</p> <p>1 測定の手順</p> <p>(1) 試料の調製 試料をフードプロセッサー等で均一にする。</p> <p>(2) 分解</p> <p>ア 出力可変電熱式分解台（ビーカーに沸石2～3個と水100mlを入れ、最大出力で10分間予熱した熱源にのせたとき、5分以内に沸騰する能力を有するものであること。）を用いた方法</p> <p>(イ) 試料約1gを正確に薬包紙に量りとり、500mlケルダール分解フラスコに薬包紙ごと入れ、分解促進剤（硫酸カリウムと硫酸銅（Ⅱ）五水和物を9：1の割合で粉碎混合して調製する。以下同じ。）約10g及び硫酸約15mlを加え、あらかじめ保温しておいた分解台の熱源の上に設置する。</p> <p>(ロ) はじめ、弱出力で加熱し、泡立ちが収まったら、出力を徐々に最大にする。分解液が青色透明になっているのを確認後、約90分間そのまま加熱する。</p> <p>(ハ) 加熱終了後、室温まで放冷し水を約50ml加えて、分解物を溶解する。</p> <p>(ニ) (イ)から(ロ)までの操作を空試験試料（薬包紙のみ）についても同様に行う。</p> <p>イ 加熱ブロック分解装置（分解チューブに沸石2～3個と水50mlを入れ、あらかじめ400℃に設定した加熱ブロックにチューブをのせたとき、2分30秒以内に沸騰する能力を有するものであること。）を用いた方法</p> <p>(イ) 試料約1gを正確に薬包紙に量りとり、250mlケルダール分</p>

解チューブに薬包紙ごと入れ、分解促進剤約10 g 及び硫酸約15 mlを加え、あらかじめ保温しておいた加熱ブロック分解装置に設置する。

- (イ) はじめ、200℃で加熱し、30～40分経過して泡立ちが収まったら400℃にする。分解液が青色透明になっているのを確認後、約90分間そのまま加熱する。
- (ウ) 加熱終了後、室温まで放冷する。
- (エ) (ア)から(ウ)までの操作を空試験試料（薬包紙のみ）についても同様にを行う。

(3) 蒸留

ア 水蒸気蒸留装置を用いた方法 ((2)のアと組み合わせて用いる。)

吸収用の300ml捕集容器に4%ほう酸水溶液25mlを入れ、ブロモクレゾールグリーン・メチルレッド混合指示薬（ブロモクレゾールグリーン0.075 g 及びメチルレッド0.05 g を95%エタノール100mlに溶解する。以下同じ。）2～3滴を加え、これを冷却器の下端に留出口が液中に浸るように装着する。

分解が終了したケルダール分解フラスコを装置に接続し、40%水酸化ナトリウム水溶液約60mlを流入させ、アルカリ性にした後、加熱蒸留し、吸収用捕集容器への蒸留液が約150mlになるまで約20分蒸留する。留出口を液面から離し、さらに2分間蒸留を続けた後、少量の水で先端を洗い込む。

イ 自動蒸留装置（ケルダール法の水蒸気蒸留を自動で迅速に行う装置）を用いた方法 ((2)のイと組み合わせて用いる。)

分解液の入ったチューブをそのまま自動蒸留装置に装着し、レシーバー部に4%ほう酸水溶液25ml及びブロモクレゾールグリーン・メチルレッド混合指示薬2～3滴又は4%ほう酸水溶液にあらかじめブロモクレゾールグリーン・メチルレッド混合指示薬を添加した溶液25mlを加えた捕集容器（容量が300ml以上のもの）を装着し、蒸留水50ml、40%水酸化ナトリウム水溶液60ml、蒸留時間約5分（留液が約150ml得られるまで）の条件で蒸留を行う。

(4) 滴定

ア 手動滴定（比色による目視）

蒸留液を0.1mol/L硫酸標準溶液で滴定する。液が緑色、汚無色を経て薄い灰赤色を呈したところを終点とする。空試験用試料について得られた蒸留液も同様に滴定を行う。

イ 自動滴定

蒸留液を0.1mol/L硫酸標準溶液で滴定する。滴定装置の操作に従い、終点を検出する。空試験用試料について得られた蒸留液も同様に操作を行う。

2 計算

$$\text{粗たん白質 (\%)} = (T - B^*) \times F \times 0.0028 / W \times k \times 100$$

T：滴定値 (ml)

B：空試験の滴定値 (ml)

F：0.1mol/L硫酸標準溶液のファクター

W：試料の測定重量 (g)

k：たんぱく質換算係数 (6.25)

0.0028：0.1mol/L硫酸標準溶液1mlに相当する窒素の重量 (g)

)

*：空試験の滴定で、1滴で明らかに終点を超える色を呈したと

きは、空試験の滴定値を0とする。

注1：試験に用いる水は、日本産業規格K 0557（1998）に規定するA2又は同等以上のものとする。

注2：試験に用いる試薬は、日本産業規格の特級等の規格に適合するものとする。

改正の改正文・附則（平成29年10月20日農林水産省告示第1574号）抄
平成29年11月19日から施行する。

附 則

- 1 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格により格付の表示が付された畜産物缶詰及び畜産物瓶詰については、なお従前の例による。
- 2 この告示による改正後の第3条から第6条までのそれぞれの表添加物の項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、平成31年5月19日までの間は、なお従前の例によることができる。

最終改正の改正文（令和元年6月27日農林水産省告示第475号）抄
令和元年7月1日から施行する。