



🦇 全長50 m × 幅5.4~6.3 m


🦇 イチゴ栽培施設(単棟ビニールハウス5棟)





2 野外試験 ～ハスモンヨトウの場合～



2 野外試験 ～ハスモンヨトウの場合～



2 野外試験 ～ハスモンヨトウの場合～



発生量で補正後でも卵塊数94%減

- 1 蛾類と超音波
イントロに代えて
- 2 ハスモンヨトウの防除試験
@イチゴ栽培施設栽培
- 3 シロイチモジヨトウの防除試験
@ネギ露地圃場
- 4 吸蛾類（ヒメエグリバ）の防除試験
@スモモ露地圃場



シロイチモジヨトウ
Spodoptera exigua



広範な寄主範囲
60種以上



長距離移動性
中国大陸から 毎年？



<http://insecta.pro>



<http://www.jpnp.ne.jp>

注意報

関係各位

元病第22号
令和元年8月26日

京都府病虫害防除所長
(公印省略)

病虫害発生予察情報について

下記のとおり発表しましたので送付します。



病虫害発生予察注意報第6号

**ネギにシロイチモジヨトウが多発傾向です
ネギのほか、豆類および野菜類でも発生に注意してください**

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1 作物名 | ネギ、豆類（黒大豆、エダマメ、アズキ）、野菜類 |
| 2 病虫害名 | シロイチモジヨトウ |
| 3 発生地域 | 府内全域 |
| 4 発生時期 | 8月～11月 |
| 5 発生量 | 平年比多い |
| 6 注意報発令の根拠 | |

京都府での注意報

2022年7月27日

2021年8月25日

2019年8月26日

2018年8月30日


2018年8月1日

2017年9月21日


2016年頃～再興

3 飛翔の阻害 ～シロイチモジヨトウ～

シロイチ
モジヨトウ





3 飛翔の阻害 ～シロイチモジヨトウ～



5ms@10・20・40Hz を忌避

3 飛翔の阻害 ～シロイチモジヨトウ～



産卵飛翔を阻害可能

3 野外試験 ～シロイチモジヨトウ～



3 野外試験 ～シロイチモジヨトウ～



3 野外試験 ～シロイチモジヨトウ～

