

葉茎菜類(レタス)

○高温による被害と産地毎の取組事例

都道府県	露地・施設	原因	症状	対策	普及状況	指導体制	問合せ先
静岡県	露地	播種～育苗時期の高温 (8月下旬～9月上中)	発芽不良、不揃い。 根張り不良。	播種時期をずらす。			静岡県経済産業部 農業局農産振興課 TEL:054-221-3299
	露地	定植後～収穫時期の高温(9月～10月)	活着不良による欠株及び生育不良。 抽苔(トウ立ち) ヨトウ、オオタバコガによる虫害	耐暑性品種の導入 防除暦の再編 定植後の灌水実施			
	露地	作付体系は8月中旬からは種・育苗が始まり、10月初旬から翌年6月中旬までが収穫期間である。育苗から収穫初期における高温により障害が発生している。	①発芽率低下、発芽揃いの悪化 ②分球してしまい、商品性が低下(玉が2つになってしまう) ③ヨトウ類の食害	①・② 耐暑性が高く、高温時の結球性が高い品種への更新を検討 ③ 適時防除の徹底	①・② 品種試験の実施		
香川県	露地	生育初期(8-9月)の高温・少雨	・本ぼ定植後の活着不良(枯死又は生育の遅延)	・定植を午後行う。 ・定植直後から1週間程度まで、頻度を高めて(毎日、朝夕など)手かん水する。 ・又は畝間かん水を、ほ場全体が均等に湿らせるよう、土のう等を利用して数畝ごとに行う。 ・定植時期を繰り延べる。	・各機関から情報発信し、相談に応じて個別対応		香川県農政水産部 農業生産流通課 野菜グループ TEL:087-832-3422
	露地	生育初期(8-9月)の高温・少雨	・ヨトウ類の発生量の増加	・病虫害防除所から注意報(ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ)を発表、同害虫の薬剤感受性検定結果を発表。 ・品目別の担当者会で情報を共有し、薬剤を見直し。	・各機関から情報発信し、相談に応じて個別対応	JA、病虫害防除所、普及センターの連携	