

ばれいしょをめぐる状況について

令和8年9月
農林水産省
農産局地域作物課

1 ばれいしょとは

- ばれいしょは、ナス科の植物のナス属に属し、学名は「(*Solanum tuberosum*) (ソラヌム・ツベロスム)」
- 冷涼な気候に適しているため北海道畑作の基幹作物として農業経営上重要。一方、同じ畑で連続して作付けすると「連作障害」が発生するため、北海道では「輪作」が行われている。
- ばれいしょは、青果用、加工用、でん粉原料用などの使用用途に合わせて、最適な品種が栽培されている。

青果用

・男爵薯

・メイクイン

・ニシユタカ

・キタアカリ

・ゆめいころ

加工用

・トヨシロ(ポテトチップ)

・ホッカイコガネ(フレンチフライ)

・きたひめ(ポテトチップ)

・さやか(業務用ポテトサラダ)

でん粉原料用

・コナヒメ

・アーリースターチ

・コナユタカ

・フリア

男爵薯(青果用)

メイクイン(青果用)

ゆめいころ(青果用)

トヨシロ(加工用)

さやか(加工用)

コナヒメ(でん粉用)

コナユタカ(でん粉用)

国内農業におけるばれいしょの概要

	作付面積 (ha)	単収 (Kg/10a)	収穫量 (トン)	農家数 (戸)	農業産出額 (億円)
全 国	70,900	3,240	2,295,000	40,371	1,311
北 海 道	48,700	3,840	1,870,000	7,474	630
都 府 県	22,200	1,910	425,000	32,897	681
鹿 児 島	4,300	1,900	81,700	3,182	129
長 崎	3,030	2,430	73,600	1,817	158
千 葉	1,070	2,530	27,100	1,741	45
茨 城	1,630	3,050	49,700	1,477	49

※「作付面積」、「単収」、「収穫量」は統計部「作物統計」(令和6年度・確報)
※「農家数」は、販売目的でばれいしょを作付している農業経営体で「団体経営体」と「個人経営」の合計(農林センサス2020)。
※農業産出額は、統計部「生産農業所得統計」(令和6年度)



ばれいしょの地上部

2 ばれいしょの栽培歴

- 冷涼な気候を好み、短い生育期間で安定した収量が得られることから、暖地では春・秋の二期作栽培、無霜地域では冬作栽培が行われている。
- 北海道では4～5月に植付けし、8～10月に収穫する。
- 長崎や鹿児島では、一般的に3月に植付けし、6～7月に収穫するが、冬(12月～1月)に植えられたいもを4～5月頃に収穫する栽培や、8～9月頃に植えられたいもを冬(12月)に収穫する栽培も行われる。
- 作物統計では、4月～10月収穫を「春植えばれいしょ」、11月～3月収穫を「秋植えばれいしょ」と区分している。

作型別の生育ステージ

月	旬	作型等	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
栽培技術等		北海道露地												
		青果・加工でん粉	(凡例 : 植付期 : 生育期 : 収穫期)											
		主要作業	○種子消毒 ○日光催芽 ○耕起・砕土・整地 ○施肥・播付 ○中耕除草 ○病害虫防除 ○半培土 ○本培土 ○除草 ○病害虫防除 ○茎葉処理 ○収穫調整・出荷											
		北海道の場合												
		九州トンネル												
		九州早掘マルチ												
		九州春作マルチ												
		九州春作普通												
		九州秋作普通												
		九州秋作抑制												
		沖縄冬作												

3 需要の状況 (1) 需要の動向


- ばれいしょの国内需要は、令和7年度は約211万トン。
- 国内生産量は210～240万トン程度で推移しており、需要量との差は輸入冷凍加工品等によってまかなわれている。
- 令和7年度の輸入量は、高温等の影響により、北海道における令和7年度産のばれいしょの生産量が減少したこと等により、前年度と比べて約10万トン増加。

ばれいしょの需要動向

(千トン)

年 度	国内 生産量	輸入量	輸出量	国内消費 仕向量
昭 6 0	3,727	200	0	3,927
平 2	3,552	392	2	3,942
7	3,365	682	1	4,046
12	2,898	820	3	3,715
17	2,752	807	1	3,558
22	2,290	959	2	3,247
27	2,406	978	7	3,377
28	2,199	1,007	6	3,200
29	2,395	1,091	7	3,479
30	2,260	1,104	7	3,357
令 元	2,399	1,123	7	3,515
2	2,205	1,052	9	3,248
3	2,175	1,088	12	3,251
4	2,283	1,257	13	3,527
5	2,364	1,116	9	3,471
6	2,295	1,204	8	3,491
7概	2,110	1,305	8	3,407
(%)	62	38	0.2	—

(万トン)




資料：農水省「食料需給表」
※ R7年度値は調査時期の都合により、作物統計の値と異なる。
※ 輸出入量の加工品輸入については、原料用生いも換算している。

3 需要の状況 (2)用途別の需要動向

- 令和7年産の用途別構成比は、青果用14%、加工食品用56%、でん粉原料用20%、その他用9%。
- このうち国産ばれいしょのみの構成比は、青果用23%、加工食品用29%、でん粉原料用33%、その他用15%。
- 加工食品用が増加傾向にあり、青果用とでん粉原料用は減少傾向。

国内需要の推移

年 度	青果用	加 工 食 品 用			でん粉原料用	その他
		うち国産	うち輸入			
昭和 6 0	1,178	684	484	200	1,582	483
平成 2	1,183	947	555	392	1,280	532
7	1,007	1,230	548	682	1,307	502
12	936	1,356	536	820	1,023	401
17	791	1,296	489	807	1,058	413
22	689	1,388	429	959	745	425
27	636	1,559	588	978	836	346
28	616	1,544	543	1,007	701	339
29	699	1,713	629	1,091	783	284
30	596	1,631	534	1,104	732	398
令和 元	640	1,733	617	1,123	821	321
2	539	1,624	581	1,052	735	350
3	537	1,617	541	1,088	706	392
4	561	1,832	575	1,257	727	420
5	552	1,739	623	1,116	739	450
6	509	1,879	675	1,204	761	350
7 概	488	1,924	619	1,305	689	314
需要全体 (%)	14	56	18	38	20	9



※輸入量の加工品輸入については、原料用生いも換算している。

資料:各用途 都道府県報告に基づく地域作物課調べ
輸入量 農水省「食糧需給表」


3 需要の状況 (3)ポテトチップ用途の動向

- 近年、ポテトチップ用等の需要が増加しており、国内生産においても加工用ばれいしょの生産が増加しているものの、需要に十分に対応できず、加工メーカーは不足分を輸入に頼らざるを得ない状況。
- 一方、ポテトチップも含めた全ての加工食品について、原料原産地表示の義務づけ等により、加工メーカーの国産原料志向は益々高まっているところ。

加工用ばれいしょの国内生産の推移(年度)


(千トン)

(千トン)



ポテトチップ用生ばれいしょの供給量(輸入を含む)の推移(年度)

(千トン)




資料: 財務省「貿易統計」、都道府県報告に基づく地域作物課調べ

4 生産状況 (1)作付面積

- 作付面積は、生産者の高齢化に伴う作付中止や、農地の集約化により他の省力的な輪作作物の作付割合が増加したこと等により、減少傾向で推移。
- 全国の作付面積のうち、北海道が7割弱を占めており、令和6年度は、北海道では48,700ha、全国では300ha減少し、70,900haとなった。

作付面積の推移

年度	作付面積(ha)		
	全国	北海道	作付割合
昭 60	130,100	75,900	58.3%
平 2	115,800	67,500	58.3%
〃 7	104,400	65,100	62.4%
〃 12	94,600	59,100	62.5%
〃 17	86,900	55,700	64.1%
〃 22	82,500	54,100	65.6%
〃 27	77,400	51,000	65.9%
〃 28	77,200	51,200	66.3%
〃 29	77,200	51,300	66.5%
〃 30	76,500	50,800	66.4%
令 元	74,400	49,600	66.7%
〃 2	71,900	48,100	66.9%
〃 3	70,900	47,100	66.4%
〃 4	71,400	48,500	67.9%
〃 5	71,200	48,500	68.1%
〃 6	70,900	48,700	68.7%




資料:統計部「作物統計」

4 生産状況 (2) 10a当たり収量

- 10a当たり収量は、全国平均は3,240kg/10aだが、北海道は3,840kg/10a、都府県の平均は1,910kg/10a。
- 都府県の平均単収はほぼ横ばいで推移、北海道は平成22年、28年の気象災害等による極端な減収を除いても減少傾向。
- 海外主産国(アメリカ、オランダ、ドイツ等)では、灌漑設備を備えたほ場で生産するなど4,500kg/10aを超えるところもある。

10a当たり収量の推移



資料:統計部「作物統計」

近年の作況

R 1	○ 単収 : 3,220kg/10a (前年産 9%増) 北海道において生育期間全般において天候に恵まれ、いもの肥大が良好であったことにより、対前年109%となった。平年比 106%。
R 2	○ 単収 : 3,070kg/10a (前年産 5%減) 北海道において 6 月後半の低温、日照不足等の影響により、着いも数が少なくなったことにより、対前年95%となった。平年比 101%。
R 3	○ 単収 : 3,070kg/10a (前年産 増減なし) 北海道において7月の高温小雨の影響を受けたが、8月以降は雨量が確保されたため、前年と同水準となった。平年比 101%。
R 4	○ 単収 : 3,200kg/10a (前年産 4%増) 北海道において生育期間全般において天候に恵まれ、着いも数も多く、肥大が良好であったことにより、前年比104%となった。平年比 104%。
R5	○ 単収 : 3,320kg/10a (前年産 4%増) 植付後の好天により初期成育が確保され、それ以降も天候にも恵まれた結果、着いも数が多くなり、前年比104%となった。平年比108%。
R 6	○ 単収 : 3,240kg/10a (前年産 2%減) 北海道において好天により初期成育が確保され、以降も天候にも恵まれた結果、着いも数が多くなり、単収は好調。前年比98%。平年比102%。


※平年値は前5年の平均値

4 生産状況 (3)生産量

- 生産量は、作付面積の減少に伴い減少傾向で推移。
- 令和6年度は主産地である北海道において、植付後に好天に恵まれ、高温・多照により生育が進んだが、7月が干ばつだったため小玉傾向となったこと等により、前年度(236万トン)を下回る収量となり、国内生産量は約230万トンとなった。

生産量の推移

年度	生産量(千トン)		
	全国	北海道	生産割合
昭60	3,727	2,703	72.5%
" 61	4,073	3,064	75.2%
平 2	3,552	2,598	73.1%
" 7	3,365	2,597	77.2%
" 12	2,898	2,161	74.6%
" 17	2,752	2,150	78.1%
" 22	2,290	1,753	76.6%
" 26	2,456	1,916	78.0%
" 27	2,406	1,907	79.3%
" 28	2,199	1,715	78.0%
" 29	2,395	1,883	78.6%
" 30	2,260	1,742	77.1%
令 元	2,399	1,890	78.8%
" 2	2,205	1,733	78.6%
" 3	2,175	1,686	77.5%
" 4	2,283	1,819	79.7%
" 5	2,364	1,916	81.0%
" 6	2,295	1,870	81.5%




4 生産状況（4）北海道の用途別生産状況

- 令和7年度の北海道産ばれいしょの生産量は、約169万トン。
- そのうち、でん粉原料用については、北海道でのみ生産しており、生産量の約4割が仕向けられている。
- また、加工食品用が約3割、青果用が約1割、種子用・その他が約1～2割の仕向けとなっている。

北海道産ばれいしょの用途別生産状況の推移

（千トン）

年度	生産量	青果用	加工食品用	でん粉原料用	種子用	その他
平26	1,916	258	472	849	122	215
27	1,907	268	522	836	121	161
28	1,715	251	476	701	121	166
29	1,883	312	561	783	119	108
30	1,742	211	456	732	115	227
令 元	1,890	264	538	821	111	156
2	1,732	216	506	735	107	168
3	1,686	195	459	706	106	220
4	1,819	225	491	727	105	271
5	1,916	227	543	739	116	291
6	1,870	210	598	761	107	193
7 概	1,692	190	541	689	97	175



資料：都道府県報告に基づく地域作物課調べ


※その他は、飼料用及び減耗の合計である。

4 生産状況 (5)主産県における用途別生産状況


○ 主産4県の用途別生産状況には、それぞれ特徴がある。

- ・ 茨城県は加工食品用が約8割を占めている。一方で、千葉県は青果用が約6割を占めている。
- ・ 九州産地のほとんどが、青果用に仕向けられる一方で、近年、鹿児島県のように一部加工食品用の割合が拡大する県もある。


＜茨城県＞




＜長崎県＞



＜千葉県＞




＜鹿児島県＞




5 担い手・生産費の状況

- 主産地の北海道においては、栽培農家戸数の減少が進み、一戸当たりの作付面積が拡大傾向にあり、規模拡大が進んでいる。
- 生産費については、7割程度を物財費が占めている状況にあり、肥料費等の上昇による物財費の増加等から生産費全体として増加傾向。


ばれいしょ栽培農家戸数と一戸当たり作付面積の推移(北海道)



でん粉原料用ばれいしょの生産費(10a当たり)の推移



ばれいしょの収穫規模別農家戸数割合の推移(北海道)



6 省力化の取組について

- ばれいしょ生産は、特に植付や収穫に係る労力が大きく、かつ、人員の確保が困難になってきていることから、より省力的・集約的な作業体系を導入する必要。
- 収穫時のハーベスタ上の選別作業員の減員など作業の効率化を図るため、多畦オフセットハーベスタ等と倉庫前集中選別などによる作業体系の改善を推進。更に、ロボット・AI・IoT等を活用したスマート農業による効果を検証。

○ 省力的・集約的な作業体系への取組

1 作業体系の改善

- ・ 多畦オフセットハーベスタ等の導入による、収穫速度の大幅な向上や収穫時の機上選別作業の削減
- ・ 無選別収穫を行い、倉庫前に選別作業を集約化させ、収穫・選別作業の省力・効率化

2 スマート農業の活用

- ・ ロボットトラクタの自動操縦による整地や植付作業等の自動化
- ・ ドローンによる土壌条件や生育情報のマップ情報取得
- ・ マップ情報に基づいたドローンによる薬剤防除や可変施肥
- ・ 各種データを集約した営農支援システムによる経営分析

○ ばれいしょの作業体系の改善

現行の収穫体系（機上選別）

- ・ 従来型のハーベスタは、畦をまたぎ収穫を行うため、収穫時に踏み固められた土塊や傷いもが収穫物と一緒に機上に上がりやすい構造
- ・ 土塊や傷いもの除去を行う機上選別のため、1台につき作業員4～5名程度確保が必要



従来型（インロー）ハーベスタ



オフセットハーベスタ



オフセットハーベスタ（2畦同時掘り）

新しい収穫体系（無選別収穫＋倉庫前集中選別）

- ・ 多畦オフセットハーベスタ等により、作業速度を大幅に改善
- ・ 土塊や傷いもの発生が少ないことで、機上選別を削減
- ・ 収穫物を貯蔵庫前に集め、作業人員を集約し、選別作業を実施

○ スマート農業の活用



ロボットトラクタ



ドローンセンシング

取組内容

・北海道更別村において、「スマート農業実証プロジェクト」を活用し、ロボットトラクタの自動操縦による省力化やドローンセンシングによる営農の効率化を検証。（令和元年度）

7 生ばれいしょの輸入状況

○ 生ばれいしょの輸入については、植物防疫法令により、

① 輸入が禁止されている又は隔離検疫を受ける必要

② 米国産については、ポテトチップ用に限り、輸入後に植物防疫所長が指定する加熱加工処理施設で加工される等の二国間で定められた条件を満たす必要（一部地域は輸入禁止、ポテトチップ用以外の用途については、①に同じ）。


○ 近年、ポテトチップの需要の増加に伴い、原料を国産で賄いきれず、上記の②による輸入が増加しているが、メーカーからは国産原料の要望が強く、国内における加工用ばれいしょの増産が課題。

米国産ポテトチップ
加工用ばれいしょの
主な輸入条件
について

- ① ジャガイモシストセンチュウ及びジャガイモシロシストセンチュウの無発生地域で生産されること
- ② 土壌の除去(水洗い)
- ③ 密閉型コンテナにより輸入され、輸入後速やかに加工処理施設まで輸送すること
- ④ 加工処理施設は、港頭地域内に所在し、加熱加工処理等を的確に行える能力を有していること(現在2施設)

ポテトチップ出荷数量の推移


(千トン)



資料：日本スナック・シリアルフーズ協会 「スナック菓子の出荷(生産)額」(会員合計)

ポテトチップ用生ばれいしょの輸入量の推移(年度)

(トン)




資料：財務省「貿易統計」


8 種ばれいしょをめぐるとの現状 (1)種ばれいしょ生産状況

- ばれいしょは、栄養繁殖により増殖するため増殖率が低く、原原種→原種→採種の3段階増殖を経て、一般栽培用の種いもが生産される。
- また、ウイルス病や細菌病等に侵されやすく、一度感染すると防除が困難で、産地にまん延し生産に大きな打撃を与えることから、健全な種ばれいしょの供給が極めて重要。
- 種ばれいしょは、農研機構種苗管理センターが原原種の生産、道が指定する原原種取扱団体が原種の生産、農協が採種の生産を行う3段階増殖体系により、それぞれの段階で植物防疫法に基づく検査を受け、道内外の一般栽培用に供給されている。
- 道が定める原原種取扱団体は、現在、ホクレン農業協同組合連合会及び(公財)日本特産農作物種苗協会の2団体となっており、種ばれいしょの生産(ほ場設置)及び集荷販売は、「北海道種馬鈴しょ生産販売取締条例」に基づき登録を受けた者(登録有効期間3年)が行っている。

種ばれいしょの増殖フロー



種ばれいしょの生産供給体制



8 種ばれいしょをめぐる現状 (2) 種苗管理センターにおける原原種生産

- 種ばれいしょ生産の起点となる原原種は、高い無病性が求められるため、農研機構種苗管理センターが生産を担っており、センターでは、導入した新品種から生長点培養による無病化を行い、試験管内で培養苗の増殖、温室内でミニチューバー(約10g)の生産、防虫網をかけた基本ほで基本種の生産を経て、原原種の生産が行われる。
- 基本ほ及び原原種ほでは、栽培期間中は専門職員の手作業による異常株の抜き取り作業が行われている。加えて、掘残しを徹底的に除去するとともに、連作障害を防ぐため、5年輪作が行われている。

種苗管理センターにおける原原種生産


種苗管理センターにおける増殖



8 種ばれいしょをめぐる現状 (3) 全国の種ばれいしょ生産と北海道の位置付け


- 全国の種ばれいしょ原種ほ、採種ほの作付面積は年々減少するとともに、生産量も減少傾向。
- 北海道は、作付面積、生産量ともに全国の9割以上を担っている我が国の種ばれいしょ供給基地。

原種ほ作付面積及び生産量の推移（全国）




	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
作付面積 (ha)	566	566	556	551	519	534	534	520	496
生産量 (千トン)	20.3	20.1	20.1	19.1	17.4	19.8	19.9	18.3	17.5

採種ほ作付面積及び生産量の推移（全国）




	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
作付面積 (ha)	4,515	4,397	4,326	4,181	4,175	4,193	4,114	3,987	3,925
生産量 (千トン)	163	156	161	146	141	155	154	146	141

原種ほ作付面積の全国シェア（令和7年度）




原種生産量の全国シェア（令和7年度）



採種ほ作付面積の全国シェア（令和7年度）



採種生産量の全国シェア（令和7年度）




資料：農林水産省横浜植物防疫所「種馬鈴しょ検査成績」

8 種ばれいしょをめぐる現状 (4)種ばれいしょ生産における課題


- 種ばれいしょについては、一般用ばれいしょ栽培に比べ作業に長い時間を要することから、主産地である北海道では、高齢化等により生産者数、面積ともに減少傾向。
- ジャガイモシストセンチュウ発生地域の拡大により種ばれいしょほ場の確保が困難になってきていることもあり、一部地域では、地域内で必要な数量の種いも生産が困難な状況。
- このため、種ばれいしょ生産の省力化とジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種の普及拡大が喫緊の課題。

北海道における種ばれいしょ生産者数(採種)



資料:北海道庁調べ

北海道における種ばれいしょほ場合格面積(採種ほ)




資料:植物検疫統計「種ばれいしょ検査成績表」

8 種ばれいしょをめぐる現状 (5)種ばれいしょ生産の省力化

- 種ばれいしょの生産の投下労働時間については、青果・加工用が114時間/haのところ208時間/ha(約1.8倍)かかっており、省力化が課題。
- このため、生産者団体の選別・貯蔵施設を整備し、選別作業の省力化を図るとともに、選別済み種ばれいしょの配布を推進。
- これに、近年開発された消毒機能付きカッティングプランターを導入することで、種ばれいしょの生産における「予措作業」の大幅削減を推進。
- 「病株抜取作業」については、AIによる画像判別を用いた新たな病株検出技術を開発すると共に、同技術を搭載したほ場管理車両・電動乗用カートの開発を推進。

種ばれいしょの投下労働時間

(時間/ha)



114時間 < 208時間
(182%)

- ・種子予措: 植付け前のいも切り作業などで**50時間増大**
- ・病株抜取: 栽培期間中の管理で**40時間労働時間増加**

資料: 北海道農業生産技術体系(第6版)

種ばれいしょ生産の省力化



消毒機能付きカッティングプランター


・選別作業の省力化

生産者団体の選別・貯蔵施設を整備し、道県から配布される原種を事前に選別することで種ばれいしょ生産者の選別作業時間を削減

・予措作業の省力化

消毒機能付きカッティングプランターの導入により、種付け前の消毒やいも切り作業時間を削減

AIを用いた病株の検出技術(農研機構 等)



システムの検出画面

- ・異常株の検出精度は目標とした83%以上を達成(4回検出で植物防疫法合格基準の罹病株0.1%以内に到達可能)



AI搭載のほ場管理車両



AI搭載の乗用電動カート


- ・2024年度に種苗管理センターへ試験導入。
- ・2026年度からは道内複数JAにて順次、試験導入。
- ・搭載するAIについては、継続してデータ収集を行い、対象品種を拡大するとともに、AIの性能を向上させる。

8 種ばれいしょをめぐる現状 (6)ばれいしょ原原種配布の課題と対策

- ばれいしょ原原種の配布において、種苗の健全無病性の確保及び需要に応じた供給が重要。
- 近年、農研機構種苗管理センターにおける配布品種数の増加といった生産上の課題が発生。
- このため、原原種の安定供給のため、農研機構種苗管理センターにおける原原種生産対策として以下の取組を実施。

1. 見込み生産の見直し

農研機構種苗管理センターにおけるばれいしょ原原種生産計画策定の基礎データである「原種ほ設置計画書」(種ばれいしょの生産計画(都道府県作成))の提出時期を、これまでの原原種配布当年から、原原種配布年の2年前に変更することにより、原原種生産の効率化を図り、道県の需要に即した原原種を確実に配布する。




2. 配布品種数の集約

配布品種数(令和元年:85品種)を削減するため、令和4年度からの適用に向けて、新品種を除き※1、過去2ヶ年の配布数量が50袋(20kg/袋)を下回った品種については、原則として原原種の配布※2を停止する。

※1 新品種は、普及拡大のため原原種配布開始から15年間は配布停止の適用を猶予。

※2 原原種配布数量50袋未満の品種は、全配布数量に占める割合1%、全品種数に占める割合約37%(令和3年:25品種)

原原種配布品種数の推移(平成2年～令和7年)



資料: 地域作物課調べ

3. 非抵抗性品種の配布制限

ジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種の普及拡大を図るため、非抵抗性品種については、都道府県ごとに前年の配布実績を超える数量の原原種の配布を原則として行わない。

9 ばれいしょ病害虫について (1)品種の育成・普及状況

- 現在生産されている主要品種は、青果用は「男爵薯」、「メイクイン」、「ニシュタカ」。加工食品用はポテトチップ向けの「トヨシロ」。いずれもジャガイモシストセンチュウ抵抗性がないことから、抵抗性品種への転換が喫緊の課題。でん粉原料用はジャガイモシストセンチュウ感受性の「コナフブキ」から、抵抗性を有する「コナヒメ」等へ全面転換済。
- 近年、加工適性、機械化適性を有し、かつジャガイモシストセンチュウ抵抗性等の病害虫抵抗性を有する優良品種が育成。
 - ア 青果用では、目が浅いため調理しやすく食味もよい「きたかむい」、「ながさき黄金」、「アイマサリ」、「ゆめいころ」等。
 - イ 食味が優れ加工食品にも適した「はるか」、ポテトチップ適性の高い「きたひめ」、「ぽろしり」、「ハロームーン」等。
 - ウ でん粉原料用では、収量の多い「コナユタカ」、早掘り適性が高い「コナヒメ」等。

令和6年産品種別シェア

全国順位	品種名	作付割合	シスト抵抗性	主用途
1	コナヒメ	17.5%	○	でん粉
2	男爵薯	13.3%	×	青果
3	メイクイン	8.1%	×	青果
4	トヨシロ	8.1%	×	チップ
5	ニシュタカ	7.5%	×	青果
6	キタアカリ	4.9%	○	青果
7	きたひめ	4.7%	○	チップ
8	とうや	3.7%	○	青果
9	オホーツクチップ	3.3%	○	チップ
10	ぽろしり	3.0%	○	チップ

新品種の育成状況


主用途	品種名	特性	シスト抵抗性	出願公表年
青果用	はるか	良食味、多収（加工食品兼用）	有	H19北農研
	きたかむい	空洞少、早生	有	H20ホクレン
	さんじゅう丸	大粒、多収、そうか病抵抗性	有	H22長崎
	ながさき黄金	良食味、高カロテノイド、PVY抵抗性	有	H27長崎
	アイマサリ	大粒、多収、PVY抵抗性、西南暖地向け	有	H29長崎
	しまあかり	良食味、多収、西南暖地向け	有	H31鹿児島
	ゆめいころ	早生、多収、そうか病抵抗性	有	R3北見
加工食品用	きたひめ	チップ用、難糖化性	有	H14ホクレン
	オホーツクチップ	チップ用、早生	有	H17北見
	ぽろしり	チップ用、多収、そうか病抵抗性	有	H25カルビー
	ハロームーン	チップ用、そうか病抵抗性、チップカラー良	有	H30北見
	しんせい	チップ用、長期貯蔵適性	有	R2北農研
	きたすずか	サラダ用（青果兼用）、シロシスト抵抗性	有	R4北農研
でん粉原料用	コナユタカ	多収、PVY抵抗性	有	H26北見
	コナヒメ	早期収穫適性、疫病抵抗性	有	H26ホクレン
	フリア	疫病抵抗性、シロシスト抵抗性	有	H30導入
	きよみのり	多収、シロシスト抵抗性	有	R7北農研

資料：地域作物課調べ


9 ばれいしょ病害虫について (2) ジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種の普及拡大

- 北海道は、種ばれいしょ生産における重要地域(国内の種ばれいしょの97%を生産)であるが、ジャガイモシストセンチュウ(以下、「Gr」という。)の発生面積拡大が問題。
- 植物防疫法に基づく種ばれいしょの検査では、ほ場でGrが確認されたり、種ばれいしょにGrの寄生が確認されたりすると不合格となる。種ばれいしょ生産ほ場を保全するため、抵抗性品種の普及をはじめとする、まん延防止対策の徹底が急務。
- 農林水産省では、「ジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種の作付拡大のための目標」(平成31年2月)を策定し、2028年度目標達成に向け、都道府県による転換計画の作成など取組を推進。また、Gr抵抗性品種の普及に向け、品種導入及び新規需要拡大に関する支援を実施。

ジャガイモシストセンチュウの発生がある市町村(北海道)



ジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種の作付面積割合



資料:地域作物課調べ

「ジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種の作付拡大のための目標」

【主にでん粉原料用に仕向けられる品種】

- ・既に生産者団体が自主的に策定・実行している「抵抗性品種転換計画」に基づき、シストの発生・未発生の如何にかかわらず、2022年度までに抵抗性品種の作付割合を100%とする。【2022年完了】

【主に加工用に仕向けられる品種】

- ・シストセンチュウの発生が確認されているほ場については、2028年度までに抵抗性品種の作付割合を100%とする。
- ・その他のほ場については、2028年度までに抵抗性品種の作付割合を80%とすることを目指す。

【主に生食用(青果用)に仕向けられる品種】

- ・男爵薯、メークイン(非抵抗性品種)による産地化が図られていることに鑑み、シストセンチュウの発生が確認されているほ場における抵抗性品種への転換に優先的に取り組み、シストセンチュウの発生が確認されているほ場については、2028年度までに抵抗性品種の作付割合を100%とする。
- ・その他のほ場については、抵抗性を付与した、男爵薯、メークインに代わり得る品種の開発状況等を踏まえ、抵抗性品種への転換を進める。

・畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業(令和7年度補正)

- ① Gr抵抗性品種の新規導入を支援 (3,000円/10a)
- ② Gr抵抗性品種の需要拡大に向けたニーズ調査、PR、新製品開発を支援

(定額又は1/2補助)

9 ばれいしょ病害虫について (3) ジャガイモシロシストセンチュウの根絶に向けた対応

- 網走市全域における土壌診断の結果、ジャガイモシロシストセンチュウの発生が確認された11大字を防除区域として、平成28年10月から植物防疫法に基づく緊急防除を開始。
- 令和8年8月時点の防除区域は、網走市、清里町、小清水町、斜里町内の5大字（発生ほ場：28ほ場81ha）
※防除の結果、発生ほ場の約9割のほ場で防除が完了。全てのほ場の防除が完了した大字は、防除区域から除外される。

緊急防除対策の実施

- 発生ほ場におけるばれいしょ等なす科植物の栽培禁止
- 発生ほ場における、対抗植物（ポテモン、KGM201）及び土壌くん蒸剤を用いた防除対策の実施
- 防除区域内で生産されたなす科植物の地下部（ばれいしょ）やその他植物の地下部であって土の付着したもの（てん菜、根菜類等）の移動制限 等。



土壌消毒機

対抗植物（寄主植物でない）



自滅的なふ化を誘導



シストのふ化を促す物質を分泌

寄主植物がないと数か月で死滅

シロシストセンチュウのまん延防止

- 土壌の移動に伴うセンチュウのまん延を防止するため、作業機械等に付着した土壌を洗浄。



作業機械の洗浄



収穫物運搬車両の洗浄

- シロシストセンチュウ抵抗性品種の普及推進

【海外品種導入】
「フリア」
「ユーロビバ」

【国内開発】
「きたすずか」
「きよみのり」

新たな技術の開発

- 「食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト」において、Gp抵抗性等を有する新品種の開発を推進。
- オープンイノベーション研究・実用化推進事業によって捕獲作物を用いたPCN防除技術の低コスト化と産地営農体系への導入に向けた開発を推進。



「ポテモン」等捕獲作物



ドリルシーダーによる播種



「ポテモン」栽培ほ場