


ニホンザル モニタリング調査状況

	群れ名	発信器個体情報(装着時)			装着日	備考	頭数
		雌雄	体重	年齢			
1	大倉川群	♀	11.8kg	10歳	2019.11.15	冬になると蒲谷地区付近に出没	125
2	高森山群	♀	10.2	7歳	2020.07.02	中ノ沢区や達沢区に出没	13
3	大島原群	♀	10.0kg	12歳	2019.12.23	まれに金堀区や市沢区に出没	65
		♀	10.7kg	8歳	2020.12.07		
4	吾妻群	♀	8.3kg	10歳	2021.03.27	秋になると大原区付近に出没	60～70
5	吾妻2群	♀	—	10歳	2021.04.07		33
6	若宮A群	♀	9.2kg	5歳	2020.10.29	分裂後 群れ規模は縮小傾向	64
		♀	9.0kg	12歳	2022.03.30		
7	若宮B群	♀	9.5kg	8歳	2019.12.16	2019.08に若宮A群から分裂	44
8	若宮2群	♀	9.5kg	8歳	2020.02.17	国道115号沿い(吾妻地区)に出没	60～70
9	若宮3群	♀	8.5kg	6歳	2019.12.23	名家区付近に年間通して出没	39
10	酸川群	♀	11.8kg	11歳	2020.02.18	小野川群(北塩原村)と同群れ	63
11	川上群					まれに川上区に出没	70～80
12	秋元群					川上区～中津川溪谷に生息	10～20
13	長瀬群	♀	12.7kg	11歳	2018.08.07	人馴れレベルが高い 人との距離が近い	24

被害対策 ☆地域住民との連携




被害対策フロー



被害対策

住民からの出沒・被害報告

これは誰の仕業！？



ニホンザル

被害対策

住民からの出沒・被害報告

これは誰の仕業！？



ツキノワグマ

被害対策


住民からの出沒・被害報告

これは誰の仕業！？




イバシ

被害対策フロー



- ・いかに被害現場に急行できるか
- ・すべての報告に対応できるか
- ・正確な加害獣種の特定、対策の立案ができるか



住民からの信頼

集落研修会



地図上で集落環境診断




有害鳥獣の生態・行動や
効果のある被害対策の研修

**住民みずからが考える対策の立案
集落独自の鳥獣害対策組織の設立**

集落主体による対策の成功事例

猪苗代町白津区



- ・白津区は猪苗代町南部に位置し、水源豊かで自然があふれている
- ・世帯数は53帯で集落直営の農作物直売所も備え、活気のある集落である