

(別添)

フェンランド・セロリは、イングランドとウェールズの土壌調査 (Soil Survey of England and Wales) およびダウンホーランドとアイルハムの土壌協会 (the soil associations of Downholland and Isleham) で定義される、アドベンチャーズ1および2 (Adventurers 1 and 2) の土壌で栽培する必要があると規定されています。湛水条件で蓄積された植物の残骸が分解されるため、自然に土壌肥沃度が高く、深い泥炭土壌が特徴です。この土壌タイプは、ケンブリッジシャー (Cambridgeshire)、サフォーク (Suffolk)、ノーフォーク (Norfolk) にある、次の教区で特に見られます。

ケンブリッジシャー :	ノーフォーク :
ウェルニーの一部 (Welney)	レジアット (Leziate)
リトルポート (Littleport)	イースト ウィンチ (East Winch)
イーリー セントメアリーとトリニティ (Ely St Mary and Trinity)	バウジー (Bawsey)
イーリー トリニティ (Ely Trinity)	ミドルトン (Middleton)
(デタッチ [Detached])	ウィンボットシャム (Wimbotsham)
セツフォード (Thetford)	クリンプルシャム (Crimplisham)
ストリーサム (Stretham)	ウェスト デアハム (West Dereham)
ウィリングハム (Willingham)	ウェアハム (Wereham)
ハデナム (Haddenham)	レットン (Wretton)
サットン (Sutton)	ストーク フェリー (Stoke Ferry)
コルネ (Colne)	ノースウォルド (Northwold)
コベニー (Coveney)	ライストン (Ryston)
チャタリス (Chatteris)	ダウンハム マーケット (Downham Market)
ウェルチズ ダム (Welches Dam)	デンバー (Denver)
マネア (Manea)	フォーダム (Fordham)
ウインブリントン (Wimblington)	ノーデルフ (Nordelph)
マーチ (March)	ウェルニー (Welney)
ソーニー (Thorney)	フェルトウェル (Feltwell)
ウィスベック セント メアリー (Wisbech St Mary)	ホックウォールド カム ウィルトン (Hockwold-cum-Wilton)
ウォータービーチ (Waterbeach)	レッドマイア (Redmere)
ホーニングシー (Horningsea)	ウオーメゲイ (Wormegay)
ボティシャム (Bottisham)	イースト ウィンチ (East Winch)
スワファム バルベック (Swaffham)	ミドルトン (Middleton)

Bulbeck) スワファム プライヤー (Swaffham Prior) バーウェル (Burwell) ウィッケン (Wicken) バーウェル (Burwell) ソハム (Burwell) フォーダム (Fordham) アイルハム (Isleham) チップンハム (Chippenham) スネイルウェル (Snailwell) ラムジー (Ramsey)	レジアット (Leziate) ロイドン (Roydon) サフォーク : レイクンヒース (Lakenheath) ミルデンホール (Mildenhall) バートン ミルズ (Barton Mills) ワーリントン (Worlington) フレッケンナム (Freckenham)
---	---