

特定農林水産物等登録簿

登録番号	第 18 号	登録年月日	平成 28 年 10 月 12 日（2016 年 10 月 12 日）
申請番号	第 32 号	申請年月日	平成 27 年 7 月 9 日（2015 年 7 月 9 日）
特定農林水産物等の区分	第二類 野菜類 馬鈴しょ		
特定農林水産物等の名称	みしまばれいしょ 三島馬鈴薯、MISHIMA BAREISHO		
特定農林水産物等の生産地	静岡県三島市の箱根西麓地域（佐野、徳倉、沢地、川原ヶ谷山田、川原ヶ谷小沢、川原ヶ谷元山中、塚原新田、市山新田、三ツ谷新田、笹原新田、山中新田、谷田台崎、玉沢） 静岡県田方郡函南町の箱根西麓地域（桑原、大竹、平井、丹那、畑、田代、軽井沢）		
特定農林水産物等の特性	三島馬鈴薯は、肌を傷つけないように丁寧に収穫を行った後、風乾貯蔵を経て、大産地である長崎県の出荷が終わり、北海道の本格的な出荷が始まる前である概ね 7 月から 8 月にかけて出荷されるメイクイン品種の馬鈴薯である。 一つ一つ丁寧に収穫を行なうため、肌に傷がつかず、艶々で美しい。 食味はメイクインの特徴である粘質で崩れにくい肉質と男爵の特徴である甘みのあるほくほく感が特徴である。 三島馬鈴薯は収穫から 1 週間から 2 週間程度、風通しの良い冷暗所で風乾貯蔵を行ない、しっかり熟成させる。これが甘みとしっとりではくほくの食感を生み、保存性も高める。 一般的な馬鈴薯に比べ、保存性に優れている。これはしっかりと風乾を行なっているからである。馬鈴薯の表面が乾いていない状態で貯蔵すると表面に汗をかき呼吸が出来なくなる。これが傷みや腐敗、病気の原因になるが、しっかりとした風乾により購入後の保存性が高く、品質が保たれる。 上記のような食味と保存性の良さから主要な青果市場での担当者からの評価は高く、同時期他産地のメイクインと比較しても 2 割から 5 割程度高い単価で取引されている。（別紙 1「三島馬鈴薯に関するアンケート」、別紙 2「各産地のメイクイン単価比較」のとおり）		
特定農林水産物等の生産の方法	（1）品種 品種「メイクイン」を用いる。 （2）栽培の方法 生産地（静岡県三島市佐野、徳倉、沢地、川原ヶ谷山田、川原ヶ谷小沢、川原ヶ谷元山中、塚原新田、市山新田、三ツ谷新田、笹原新田、山中新田、谷田台崎、玉沢、田方郡函南町桑原、大竹、平井、丹那、畑、田代、軽井沢）内において品種「メイクイン」を用いて栽培する。 11 月にメイクインの種いもを生産者へ配布し、2 月頃より植え付けを開始する。また栽培の際にはマルチ被覆を行い、収穫は 6 月から 7 月にかけて行う。 収穫の際は肌を傷つけないように丁寧に収穫を行う。その後、コ		

	ンテナに入れ、風通しの良い冷暗所で1週間から2週間程度風乾貯蔵を行なう。 (3) 出荷規格 出荷に当たっては、「三島馬鈴薯出荷規格表」(別紙3「三島馬鈴薯出荷規格表」のとおり)により選別を行なう。 (4) 最終製品としての形態 「三島馬鈴薯」の最終製品としての形態は、青果(馬鈴薯)である。
特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由	「三島馬鈴薯」は生産地である静岡県三島市佐野、徳倉、沢地、川原ヶ谷山田、川原ヶ谷小沢、川原ヶ谷元山中、塚原新田、市山新田、三ツ谷新田、笹原新田、山中新田、谷田台崎、玉沢、田方郡函南町桑原、大竹、平井、丹那、畑、田代、軽井沢の箱根西麓地区の土壌は、表層腐植質黒ボク土、厚層多腐植質黒ボク土、及び淡色多湿黒ボク土に分類される。これらの土壌は作土が深く柔らかいため、透水性、通気性、保水性に優れている。(別紙4「箱根西麓地域土壌図」) また主な生産地である箱根西麓地区の2月から3月の発芽期に於けるマルチ被覆下の地温は10～15℃、以降の生育期に於ける日平均気温は13～20℃になる。日照や気温を利用し、10～25℃が生育適温の馬鈴薯に適した栽培体系となっている。また、栽培期間中は適度な降水があり、土壌が過乾燥になりにくい。(別紙5「三島馬鈴薯の生育ステージと気温・地温推移」) このことから生育時に適度な降水とやや冷涼な気候を必要とし、また、馬鈴薯の発育のために通気性、保水性に優れ、且つ柔らかな土壌を好む馬鈴薯の生産に適している。 更にこの地区の圃場は南向き斜面であり、日照時間が長く、また傾斜地である為、平坦部よりも水はけが良く、三島市内、函南町内の中でも特に馬鈴薯の生産に適している。 そして、生産地が傾斜地であることで、大型収穫機等を使用することが出来なかったこと、また作土が深く柔らかい土壌であったことで、現在に至るまで一つ一つ丁寧に収穫されてきた。このことが肌の美しさに繋がっている。(別紙6「三島市及び函南町傾斜状況図」のとおり) 更に収穫から1週間から2週間程度、風通しの良い冷暗所で風乾貯蔵を行なうことで、味を熟成させ、乾かすことで保存性を高めている。また貯蔵中に腐り等を除去してから出荷することで、市場からの品質評価の高さに繋がっている。
特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績	昭和20年代より、馬鈴薯の産地化へ向け動き始めた。昭和45年より現在の品種である「メイクイン」をメイクインの発祥の地である北海道厚沢部町より導入し生産を開始し、昭和49年には農林水産大臣より野菜指定産地に指定された。そして、現在に至るまで、合計45年間、その生産を継続している。 三島市では、毎年7月1日を「三島馬鈴薯の日」として定め、学校給食への三島馬鈴薯の無償提供や解禁イベント等を行なっている。 「地域団体商標」を平成23年12月16日に登録。 「しずおか食セレクション(静岡県)」に平成23年度に認定。 「三島ブランド(三島商工会議所)」に認定。 5kgの贈答用の化粧箱は「2009グッドデザインしずおか大賞(静岡県)」を受賞し、このことを契機に販売数量は年々増加している。

	B-1 グランプリにて、「三島馬鈴薯」を原料とする「みしまコロッケ」が第4回8位、第5回9位と2年連続で入賞。
規則第6条第2項各号に掲げる事項	第13条第1項第4号ロ該当の有無：該当する 商標権者の氏名又は名称：富士伊豆農業協同組合 登録商標：三島馬鈴薯 指定商品又は指定役務：第31類 静岡県三島市及びその周辺地域で生産された馬鈴薯 商標登録の登録番号：第5457531号 商標権の設定の登録（当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、商標権の設定の登録及び存続期間の更新登録）の年月日：平成23年12月16日 専用使用権者の氏名又は名称：－ 商標権者等の承諾の年月日：－
登録生産者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名	富士伊豆農業協同組合 静岡県沼津市下香貫字上障子 415-1 代表理事組合長 梶 毅
備考 1. [生産者団体の代表者の氏名] 変更年月日：令和2年12月2日（2020年12月2日） （変更前）柿島 直人 （変更後）藤沼 和明 2. [登録生産者団体の名称の変更] 変更年月日：令和4年6月6日（2022年6月6日） （変更前）三島函南農業協同組合 （変更後）富士伊豆農業協同組合 3. [登録生産者団体の住所の変更] 変更年月日：令和4年6月6日（2022年6月6日） （変更前）静岡県三島市谷田字城の内 141-1 （変更後）静岡県沼津市下香貫字上障子 415-1 4. [登録生産者団体の代表者の氏名の変更] 変更年月日：令和4年6月6日（2022年6月6日） 団体の名称：富士伊豆農業協同組合 （変更前）代表者の氏名：代表理事組合長 藤沼 和明 （変更後）代表者の氏名：代表理事組合長 鈴木 正三 5. [規則第6条第2項各号に掲げる事項] 変更年月日：令和4年6月6日（2022年6月6日） 商標権者の氏名又は名称： （変更前）三島函南農業協同組合 （変更後）富士伊豆農業協同組合	

6. [登録生産者団体の代表者の氏名の変更]

変更年月日：令和 5 年 8 月 4 日（2023 年 8 月 4 日）

団体の名称：富士伊豆農業協同組合

（変更前）代表者の氏名：代表理事組合長 鈴木 正三

（変更後）代表者の氏名：代表理事組合長 梶 毅

11 三島馬鈴薯に関するアンケート

(別紙1)

“三島馬鈴薯に関するアンケート”

J A三島函南

市 場 名
伊東青果 株式会社

食味について

良好。

キメが細かくコクがあると評価を頂いている。

品質について

肌のツヤ、選果水準が素晴らしく高いレベルにある。今後も引き続き続けて欲しい。

貯蔵面について

問題なし。傷み、腐り等のクレームは今期なかった。

他産地との比較

高品質の為、当然ながら他産地より高単価で取引されています。

その他

【ご協力頂き、有難うございました】

“三島馬鈴薯に関するアンケート”

J A三島函南

市 場 名
大阪中央青果 株式会社

食味について

他産地にない好条件下で生産されており、中卸、量販店バイヤーから高評価を頂いている。

品質について

機械選果で品質の安定化が確立されており、提案しやすい出荷体制になっている。

貯蔵面について

早期からの掘り取りにより、貯蔵することで腐敗果が抑えられている。
出荷パターンが他産地や消費地の動向に柔軟に対応できる。

他産地との比較

7月期は他産地の新規参入は考えにくく、出荷や品質の安定性に優れている。

その他

食味の良さと見栄えを兼ね揃えており、その特性を活かした販売に取り組み、更なる三島馬鈴薯の固定ユーザーの拡大を図りたい。

【ご協力頂き、有難うございました】

三島馬鈴薯に関するアンケート”

J A三島函南

市 場 名
大阪北部中央青果 株式会社

食味について

舌触りが細かく、ライマン価が高いと思う
余り例のない食味、馬鈴薯らしい食味。他産地は水っぽい。

品質について

問題なし。

貯蔵面について

一年の中で一番猛暑の時期の販売だが、完全風乾により品質の低下が見られず
良好。

他産地との比較

全てに於いて比較出来ない。

その他

【ご協力頂き、有難うございました】

“三島馬鈴薯に関するアンケート”

J A三島函南

市 場 名
静岡V F 株式会社

食味について

ねっとり感があり、煮物やカレーにしても煮崩れしない。

品質について

形状が良く、厳しい選果をされている。

貯蔵面について

風乾が良く、腐敗の心配がない。

他産地との比較

県内他産地や関東産と比べて、風乾・選果が良い。

その他

【ご協力頂き、有難うございました】

“三島馬鈴薯に関するアンケート”

J A三島函南

市 場 名
東京青果

食味について

長期間風乾することで食味が良い評価。
ライマン価が高い。

品質について

肌、形ともに良好。

貯蔵面について

夏場の日持ちが良い。


他産地との比較

その他

【ご協力頂き、有難うございました】

21 各産地のメークイン単価比較

各産地のメークイン単価比較



※7月～8月の東京青果株式会社県別取扱高を基に作成。

三島馬鈴薯出荷規格表

1. 選別基準

等級	階級	1個重量
A・無印	4L	370g以上
	3L	260g～370g未満
	2L	190g～260g未満
	L	120g～190g未満
	M	70g～120g未満
	S	40g～70g未満
	2S	20g～40g未満
	3S	10g～20g未満

2. 調整

項目	基準
異品種	混入を認めない
土砂ゴミ等の異物	混入・付着を認めない
腐敗・変質	混入を認めない
傷	混入を認めない
灌水した物	混入を認めない

3. 品位

項目	A級基準	無印基準
円状そうか病	認めない	2ヶ所まで径1cm、深さ2mm以内
粉状そうか病	斑点が1mm以内の軽微な物	
ケラ	認めない	傷2ヶ所以内、径1cm以下、深さ2mm以内
線虫	認めない	深さ2mm以下で2ヶ所以内
亀裂	認めない	深さ3mm、幅1cm、長さ4cm以内、1ヶ所
奇形	品種固有の形状を有していること。コブ1ヶ以内、高さ1.5cm以内、指でかけない程度	
日焼け	認めない	色が薄く馬鈴薯全体の10分の1まで(1割)
日負け	認めない	色が薄く箱全体の2割以内まで
ネット	軽微な物	

4. B級基準(自主審査)

BL	1個重量が120g以上あり、無印に準ずる物で、商品価値のある物。
BM	1個重量が40g以上120g以下、無印に準ずる物で、商品価値のある物。

5. 仕分け

次の基準により取扱うものとする。

A、無印、Bに仕分け等級欄に表示する。

但し、基準に照らし検査の結果、調整・選別等に問題ある場合は格下げとする。

6. 風乾

直射日光を避けて、1週間から2週間程度良く風乾し、保管に耐える物。


7. 包装・内容量

(1)段ボールの総重量は概ね11kg程度

(2)箱の底はテープ留めとする


(3)等階級・氏名はマジック等で記入する事

16 箱根西麓地域上壤図



番号	所在	土壌統	土壌統群	土壌群	土性
1	三島市 佐野	越路原	淡色多湿黒ボク土	多湿黒ボク土	粘質
2	三島市 徳倉	江木	淡色多湿黒ボク土	多湿黒ボク土	壤質
3	三島市 沢地	井川 桜	黒泥土 表層腐植質黒ボク土	黒泥土 黒ボク土	粘質-強粘質 壤質
4	三島市 川原ヶ谷山田	畑谷	厚層多腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質-粘質
5	三島市 川原ヶ谷小沢	赤井	厚層多腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質-粘質
6	三島市 川原ヶ谷元山中	大川口(桜)	表層腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質
7	三島市 塚原新田	野々村	表層多腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質-粘質
8	三島市 市山新田	桜	表層腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質
9	三島市 三ツ谷新田	桜	表層腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質
10	三島市 笹原新田	桜	表層腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質
11	三島市 山中新田	桜	表層腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質
12	三島市 谷田台崎	桜	表層腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質
13	三島市 玉沢	桜	表層腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質
14	函南町 桑原	桜	表層腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質
15	函南町 大竹	越路原 桜	淡色多湿黒ボク土 表層腐植質黒ボク土	多湿黒ボク土 黒ボク土	粘質 壤質
16	函南町 平井	桜(大川口)	表層腐植質黒ボク土	黒ボク土	壤質
17	函南町 丹那	大谷津 桜	多腐植質黒ボクグライ土 表層腐植質黒ボク土	黒ボクグライ土 黒ボク土	粘質 壤質
18	函南町 畑	古閑 大谷津 桜(大川口)	厚層多腐植多湿黒ボク土 多腐植質黒ボクグライ土 表層腐植質黒ボク土	多湿黒ボク土 黒ボクグライ土 黒ボク土	粘質 粘質 壤質
19	函南町 田代	古閑	厚層多腐植多湿黒ボク土	多湿黒ボク土	粘質
20	函南町 軽井沢	古閑 桜	厚層多腐植多湿黒ボク土 表層腐植質黒ボク土	多湿黒ボク土 黒ボク土	粘質 粘質 壤質

22 三島馬鈴薯の生育ステージと気温・地温推移



気温は三島測候所の日平均気温、2010-2015の平均値

地温は元山中における2015年の日平均値、(静岡県農林所調べ、未公開データ)

三島市・函南町 傾斜状況図

