

平成 年度「山形セルリー」種子及び苗の配布管理表

[illegible]

セルリー生産工程管理表 NO-1

【平成 29年度用】

JA	JA山形市	実行組合										
生産者名	コードNo.											
作物名	セルリー											
耕種概要	要											
栽培面積	a 栽培方法 露地・トンネル・ハウス											
播種日	H 年 月 日	定植日	H 年 月 日									
収穫開始	H 年 月 日											
管理作業	作業											
移植作業	月 日	鉢上げ	月 日	月 日								
芽かき・整枝作業	月 日	月 日	月 日	月 日								
	月 日	月 日	月 日	月 日								
施肥実績												
区分	処理日	肥料名	処理量									
堆肥	主原料:		kg/10a									
土づくり肥料	／		kg/10a									
	／		kg/10a									
	／		kg/10a									
	／		kg/10a									
基肥	／		kg/10a									
	／		kg/10a									
	／		kg/10a									
	／		kg/10a									
追肥	／		kg/10a									
	／		kg/10a									
	／		kg/10a									
	／		kg/10a									
病害虫発生状況												
収量												
注意!												
1 農薬散布の際はラベルを確認し、濃度、回数を守りましょう。												
2 「野」の、サンクリスタル乳剤・粘着くん液剤・オレート液剤・アカリタッチ乳剤、トアロー水和剤CTは使用回数制限ありません。												
3 野は野菜類で登録あり。												

薬 剤 名	対 象 病 害 虫	濃 度 ・ 量	使 用 時 期	処 理 量	実 績	日
殺虫剤使用実績						
ネモモール粒剤30	ネコブセンチュウ・ネグササレセンチュウ	30kg/10a	定植前まで	/10a	／	
アクタラ粒剤5	ナモグリハエ	2g/株	定植時植穴処理 鉢上時土壌混和	/10a	／	
モスピラン粒剤	アブラムシ類	0.5g/株	定植時 植穴土壌混和	/10a	／	
ダントツ粒剤	アブラムシ類	2g/株	定植時植穴処理 土壌混和	/10a	／	
アブアーム乳剤	マハモグリハエ、ヨトウムシ、オオカバコバ、ハモヨトリ	2,000倍	収穫7日前まで	/10a	／	
カスケード乳剤	マハモグリハエ、ゴジラ類	4,000倍	収穫14日前まで	/10a	／	
トリガード液剤	マハモグリハエ	1,000倍	収穫7日前まで	/10a	／	
スピノエース顆粒水和剤	ハモグリハエ類	2,500倍	収穫3日前まで	/10a	／	
コロマイト乳剤	ハダニ類	2,000倍	収穫3日前まで	/10a	／	
ランネート45DF	アブラムシ類	1,000倍	収穫30日前まで	/10a	／	
アドマイヤーフロアブル	アブラムシ類	4,000倍	収穫7日前まで	/10a	／	
スタークル顆粒水溶剤	アブラムシ類	2,000倍	収穫14日前まで	/10a	／	
コテツフロアブル	ヨトウムシ	2,000倍	収穫14日前まで	/10a	／	
モスピラン水溶剤	アブラムシ類	4,000倍	収穫7日前まで	/10a	／	
					／	※モスピラン粒剤を使用した場合 使用回数1回
					／	／
					／	／
トアロー水和剤CT	野 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ	1,000倍	発生初期ただし 収穫前日まで	/10a	／	／
サンクリスタル乳剤	野 アブラムシ類・ハダニ類	300倍	収穫前日まで	/10a	／	／
粘着くん液剤	野 アブラムシ類、ハダニ類	100倍	収穫前日まで	/10a	／	／
オレート液剤	野 アブラムシ類	100倍	発生初期～ 収穫前日まで	/10a	／	／
アカリタッチ乳剤	野 ハダニ類	1,000～3,000倍	収穫前日まで	/10a	／	／
				/10a	／	／

