

別記様式 1

明 細 書

作成日：平成31年 4 月26日

更新日：令和 4 年 4 月 6 日

1 作成者

住所（フリガナ）：^フォン ^ノン ^ギエップ ^{ヴァ} ^フアット ^{トリ}エン ^ノン ^トン ^{ティ} ^トラン ^{チュ} ,
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị trấn Chũ ,

^フエン ^ルック ^ガン ^{ティ}エン ^バック ^{ジャ}ン ^{ヴィ}エットナム
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam (ベトナムバックジャン省ルックガン県チ
ュ町農業農村開発部)

名称（フリガナ）：^ホイ ^サン ^スアット ^{ヴァ} ^{ティ}エウ ^{トゥ} ^{ヴァ}イ ^{ティ}エウ ^ルック ^ガン
Hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn (ルックガン テ
ィエウライチ生産消費協会)

代表者（管理人）の氏名及び役職：Nguyen The Thi ルックガン ティエウライチ
生産消費協会長

ウェブサイトのアドレス：

2 農林水産物等の区分

区分名：第 1 類 農産物類

区分に属する農林水産物等：果実類（ライチ）

3 農林水産物等の名称

名称(フリガナ):ルックガン ライチ、ヴァイティエウ ルックガン、LUC NGAN LYCHEE、
VẢI THIỀU LỤC NGẠN

4 農林水産物等の生産地

ベトナム国バックジャン省ルックガン県のチュ町、ギアホーコミュン(現「チュ町」、
ドンコックコミュン、ビエンソンコミュン、ビエンドンコミュン、ジャップソン
コミュン、ホンジャンコミュン、キエンラオコミュン、キエンタインコミュン、
ミーアンコミュン、ナムズオンコミュン、フィディエンコミュン、フオンソンコ
ミュン、クイソンコミュン、タンホアコミュン、タンラップコミュン、タンモ
ックコミュン、タンクアンコミュン、タインハイコミュン及びツーフウコミュ
ン

5 農林水産物等の特性

ルックガンライチは、他のベトナムの栽培地域のライチと比較して、大きく、甘みが

強いライチである。

ルックガンライチの平均重量は、他のベトナムの栽培地域のライチよりも少なくとも約 10% 重く、果実の底部から頂点までの高さの平均は少なくとも約 11% 長い（資料 1）。また、ルックガンライチの平均ブリックス値は、他のベトナムの栽培地域のライチのものよりも約 2～3 % 高く、平均総糖度は約 2～5 % 高い（資料 2）。

生ライチの他、冷凍全ライチ、皮むき及び種抜きがされた冷凍ライチの状態で出荷され、冷凍全ライチと皮むき及び種抜きがされた冷凍ライチは、生ライチの特性と同じである。

ルックガンライチは 2008 年にベトナムにおいて地理的表示として登録され（地理的表示登録第 1012 / QD-SHTT 号）、2020 年の EU・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）の発効により、EU においても地理的表示として保護されている。

6 農林水産物等の生産の方法

(1) 品種

品種「ティエウ」を用いる。生産地域内にある優良な木から栄養繁殖したもののみ用いる。

(2) 栽培方法

収穫後、大きな枝を含めほぼ全ての枝を剪定する。

(3) 出荷規格

著しい傷や損傷がないもののみ出荷できる。

冷凍全ライチは、著しい傷や損傷がなく、果実の表面に薄い氷の層が付着しており、固く、個々が分離しているもののみ出荷できる。

皮むき及び種抜きがされた冷凍ライチは、著しい傷や損傷がなく、果実の表面に薄い氷の層が付着しており、固く、個々が分離しているもののみ出荷できる。

(4) 最終製品

ルックガンライチの最終製品としての形態は、青果（生ライチ、冷凍全ライチ、皮むき及び種抜きがされた冷凍ライチ）である。

7 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由

ルックガンライチの生産地域は盆地にあり、生産地域の東と南にはドントリエウ弧形が位置しており、西と北にはランソン省から続くバックソン山脈の低山が位置している。この地形により、ルックガンライチ生産地域特有の気候、すなわち、長く乾燥した冬がもたらされる。最も気温が低い月は 2 月であり、2 月の平均気温は 15.2℃である（2015 年～2019 年）。この冬の低温は、ルックガンライチの開花と結実に好ましい条件である。

温度の他に、ライチの生長段階と生長期間に適した降水量が挙げられる。具体的には、平均年間降水量は 1174.5～1736.1 ミリメートルであるが、花芽の分化のため寒く乾燥し

た天候が必要な時期（11月～翌年2月）には、降水量は非常に少なく1.4～148.3ミリメートルである（2015年～2019年）。一方、果物の発育段階（3月～翌年6月）に入ると、ルックガンの総日照時間は他のティエウライチ栽培地域の総日照時間よりも長くなる。

ルックガンライチは、小石の多い土壌の丘陵地に高密度で植えられる。この丘陵地形では地下水容量が低いため、ライチの木への給水を他のライチ栽培地域よりも効果的に制限することが可能となる。そのため、ルックガンライチは甘くなるが、タインハや他の有名なライチ栽培地域のより大きな河川系地域では、地下水容量が高く、ライチの甘さはより穏やかとなる。ルックガンライチの甘さは、土壌中のカリウム（可溶性 K20）の含有量が高い（土壌100グラムあたり2.23～18.63ミリグラム）（2015年）ことにも起因している。

収穫後、他のライチ生産地では大きな枝は剪定されず小さく細い枝のみ剪定されるのと異なり、ルックガンライチ生産地では、新しい葉を作り、全ての枝がより多くの日光を受け光合成の強化及び有機栄養素の蓄積ができるよう、大きな枝を含むほぼ全ての枝が剪定される。これにより、果実の大きさと次期の安定的な供給が保証される。

以上の地理的条件のおかげで、ルックガンライチは強い甘味と大きな果実を有する。

8 農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績

ルックガンライチは、1960年より商業生産されており、現在まで合計60年間、生産が続けられてきた。収穫後の剪定技術は、過去60年間、ルックガンの生産者によって一貫して適用されてきた。

長い生産の歴史を有し、市場の需要に応える優れた能力を有しているため、ルックガンライチはベトナム農民協会中央委員会により定められている代表産品としての基準を満たし、2013年、2015年、2016年及び2017年に、代表的な農産物として承認された。

これまでのところ、ルックガンライチは、ベトナム全土で広く販売されており、中国、米国、ロシア、EU、日本を含む多くの国に輸出されている。冷凍全ライチの日本への輸出量は、近年は年間約5～6トンである。生ライチも、現在、日本で流通している。

9 法第13条第1項第4号ロ該当の有無等

（1）法第13条第1項第4号ロ該当の有無

申請農林水産物等の名称は、法第13条第1項第4号ロに

☒ 該当する

商標権者の氏名又は名称：ホイ サン スアット ティユ テュ ヴァイ ティユ
ルックガン

登録商標：☪ V a i t h i e u - L y c h e e ∞ L U C N G A N

指定商品又は指定役務：第29類 ライチの缶詰及び瓶詰、乾燥加工したライチ
第31類 ライチ

商標登録の登録番号：第5625485号

商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日（当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日を含む。）：2023年10月25日

☐ 該当しない

（２）法第13条第２項該当の有無（（１）で「該当する」欄にチェックを付した場合に限る。）

☒ 法第13条第２項第１号に該当

【専用使用権】

☐ 専用使用権は設定されている。

専用使用権者の氏名又は名称：

専用使用権者の承諾の年月日：

☒ 専用使用権は設定されていない。

☐ 法第13条第２項第２号に該当

【商標権】

商標権者の承諾の年月日：

【専用使用権】

☐ 専用使用権は設定されている。

専用使用権者の氏名又は名称：

専用使用権者の承諾の年月日：

☐ 専用使用権は設定されていない。

☐ 法第13条第２項第３号に該当

【商標権】

商標権者の承諾の年月日：

【専用使用権】

☐ 専用使用権は設定されている。

専用使用権者の氏名又は名称：

専用使用権者の承諾の年月日：

☐ 専用使用権は設定されていない。

10 連絡先

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]