

資料1 ドラゴンフルーツの甘さ

サンプル		ビントゥアン ドラゴンフルーツ	ロンアン ドラゴンフルーツ	ロンアンドラゴンフ ルーツと比較した ビントゥアンドラゴ ンフルーツ (%)
基準				
総糖度 (%)	平均	12.33 ± 0.88	11.22 ± 0.68	109.89
	最小値 – 最大値	10-14.4	10-12.4	
総酸度 (%)	平均	0.33 ± 0.10	0.36 ± 0.08	91.67
	最小値 – 最大値	0.15-0.60	0.19-0.53	
総酸含有 量に対す る総糖含 有量比率 (%)		37.36	31.16	119.90
ブリック ス値	平均	12.45 ± 0.92	11.22 ± 0.65	110.96
	最小値 – 最大値	9.57-14.89	9.84-12.78	

ロンアンはベトナムにおいてビントゥアンに次ぐ第2位のドラゴンフルーツ生産地である。

「総糖度」は、ぶどう糖、果糖、麦芽糖、乳糖（還元糖）及びショ糖（非還元糖）を含む、果実に含まれる全種類の糖分を意味する。

2021年3月分析

(資料「ビントゥアンドラゴンフルーツの特性分析結果報告書」より抜粋)

資料2 ドラゴンフルーツの物理的特徴

サンプル 基準		ビントゥアン ドラゴンフルーツ		ロンアン ドラゴンフルーツ		ロンアン ドラゴン フルーツ と比較し たビント ゥアンド ラゴンフ ルーツ (%)
		平均	最小値 - 最大値	平均	最小値 - 最大値	
果実の長さ (mm)		135.60 ± 17.59	82.72-214.35	121.65 ± 14.30	83-160.90	111.46
包葉 (鱗片) の長さ (mm)	上部	100.61 ± 24.14	36.03-180.48	81.69 ± 18.83	45.19-142.55	123.16
	中部	48.58 ± 9.13	8.29-93.83	48.13 ± 7.20	20.76-67.12	100.93
	下部	17.02 ± 8.47	2.55-85.30	17.48 ± 5.86	5-32.55	97.36
包葉 (鱗片) の厚さ (mm)		3.57 ± 2.19	1-25.75	3.31 ± 1.08	1.04-6.61	107.85
包葉 (鱗片) の硬さ (kg/cm ²)		3.37 ± 2.34	0.78-22.61	2.72 ± 1.07	0.71-6.58	123.89
果皮の厚さ (mm)		3.63 ± 1.57	0.6-10.07	3.38 ± 1.66	1.34-20.50	107.39

ロンアンはベトナムにおいてビントゥアンに次ぐ第2位のドラゴンフルーツ生産地である。

2021年3月分析

(資料「ビントゥアンドラゴンフルーツの特性分析結果報告書」より抜粋)

