

1 品種登録の番号及び年月日 第29499号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch NPCW19280

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は無、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は円形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉柄の長さは短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は中、部分着色葉の数はかなり少、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はかなり短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）はN45B、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は無、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は45B、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NPCW19280」は、対照品種「NPCW14221」と比較して、葉身の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「Valentino」と比較して、葉柄の長さが短であること、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱が無又は弱であること、ほうのねじれの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Guido von Tubeuf

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Vesuvio」に放射線を照射し得られた変異株の中から、選抜したものである。

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW19280

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29499号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 分枝の有無	01 無
02 分枝の数	
03 樹高	01 極低
04 樹の幅	03 狭
05 茎の中間部の緑色の濃淡	05 中
06 茎の中間部のアントシアニン着色の強弱	03 弱
07 茎上部のアントシアニン着色の強弱	02 中
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	05 中
10 葉身の形	05 円形
11 葉身の基部の形	02 円形
12 葉身の表面の色数	01 1色
13 葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）	07 濃
14 葉身の主な色（複色葉品種に限る。）	
15 葉身の二次色（複色葉品種に限る。）	
16 葉身の三次色（複色葉品種に限る。）	
17 葉身の表面の主脈の色	02 帯赤

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW19280

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の切れ込みの数	01 無又は少
19 葉身の切れ込みの深さ	02 かなり浅
20 葉身の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
21 葉柄の長さ	03 短
22 葉柄の表面の緑色の濃淡	01 極淡
23 葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱	07 強
24 葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱	02 中
25 部分着色葉の数	02 かなり少
26 完全着色葉の数	04 やや少
27 着色葉の切れ込みの強弱	01 無又は弱
28 完全着色葉の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
29 ほうの数	03 少
30 最大ほうの長さ（葉柄を含む。）	02 かなり短
31 最大ほうの幅	04 やや狭
32 最大ほうの形	02 楕円形
33 ほうの表面の色数	01 1色
34 ほうの表面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート N45B

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW19280

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）	01 無
36 ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
37 ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
38 ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
39 ほうの表面の斑点の強弱	01 無又は極弱
40 ほうの表面の斑点の色	
41 ほうの裏面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 45B
42 ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
43 ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
44 ほうの裏面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
45 ほうの裏面の斑点の色(斑点模様のある品種に限る。)	
46 ほうの主脈の巻き込みの有無	09 有
47 ほうのねじれの有無	01 無
48 ほうの葉脈間の縮れの強弱	01 無又は極弱
49 集散花序の幅	03 狭
50 蜜腺の大きさ	05 中
51 蜜腺の色	01 黄

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW19280

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 蜜線の変形の有無 53 開花の早晩	01 無
	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第29500号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch イブ

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや多、樹高は低、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はかなり少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は46B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は46C、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はかなり狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「イブ」は、対照品種「クリスマスキャンドル」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が中であること、葉身の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。対照品種「DUEBELITA」と比較して、樹高が低であること、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山下晴義
熊本県玉名市玉名4561番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山下晴義

7 出願公表の年月日 令和3年2月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「サラサ」の変異株である。

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
イブ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝の有無	09 有
02 分枝の数	06 やや多
03 樹高	03 低
04 樹の幅	04 やや狭
05 茎の中間部の緑色の濃淡	03 淡
06 茎の中間部のアントシアニン着色の強弱	05 中
07 茎上部のアントシアニン着色の強弱	02 中
08 葉身の長さ	06 やや長
09 葉身の幅	04 やや狭
10 葉身の形	02 卵形
11 葉身の基部の形	02 円形
12 葉身の表面の色数	01 1色
13 葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）	07 濃
14 葉身の主な色（複色葉品種に限る。）	
15 葉身の二次色（複色葉品種に限る。）	
16 葉身の三次色（複色葉品種に限る。）	
17 葉身の表面の主脈の色	02 帯赤

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
イブ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の切れ込みの数	01 無又は少
19 葉身の切れ込みの深さ	01 極浅
20 葉身の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
21 葉柄の長さ	03 短
22 葉柄の表面の緑色の濃淡	01 極淡
23 葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱	07 強
24 葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱	03 強
25 部分着色葉の数	04 やや少
26 完全着色葉の数	03 少
27 着色葉の切れ込みの強弱	01 無又は弱
28 完全着色葉の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
29 ほうの数	02 かなり少
30 最大ほうの長さ（葉柄を含む。）	04 やや短
31 最大ほうの幅	04 やや狭
32 最大ほうの形	02 楕円形
33 ほうの表面の色数	01 1色
34 ほうの表面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 46B

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
イブ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）	
36 ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
37 ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
38 ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
39 ほうの表面の斑点の強弱	01 無又は極弱
40 ほうの表面の斑点の色	
41 ほうの裏面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 46C
42 ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
43 ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
44 ほうの裏面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
45 ほうの裏面の斑点の色(斑点模様のある品種に限る。)	
46 ほうの主脈の巻き込みの有無	09 有
47 ほうのねじれの有無	01 無
48 ほうの葉脈間の縮れの強弱	03 弱
49 集散花序の幅	02 かなり狭
50 蜜腺の大きさ	04 やや小
51 蜜腺の色	01 黄

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
イブ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 蜜線の変形の有無 53 開花の早晩	01 無
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第29501号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x *Euphorbia corناstra* (Dressler) Radcl.-Sm.

Bonpri 14105

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はかなり少、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は極多、完全着色葉の数は極少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅は極狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は3色以上、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は有、ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）は49B、ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）は150D、ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）は49B、ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）は2D、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは極小、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bonpri 14105」は、対照品種「Bonpri 585」と比較して、ほうの表面の色数が3色以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited

244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の変異株である。

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 14105

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29501号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝の有無	09 有
02 分枝の数	02 かなり少
03 樹高	01 極低
04 樹の幅	01 極狭
05 茎の中間部の緑色の濃淡	05 中
06 茎の中間部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 茎上部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
08 葉身の長さ	04 やや短
09 葉身の幅	04 やや狭
10 葉身の形	02 卵形
11 葉身の基部の形	02 円形
12 葉身の表面の色数	01 1色
13 葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）	07 濃
14 葉身の主な色（複色葉品種に限る。）	
15 葉身の二次色（複色葉品種に限る。）	
16 葉身の三次色（複色葉品種に限る。）	
17 葉身の表面の主脈の色	01 緑のみ

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 14105

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の切れ込みの数	03 多
19 葉身の切れ込みの深さ	03 浅
20 葉身の主脈の曲がりの強弱	02 中
21 葉柄の長さ	01 極短
22 葉柄の表面の緑色の濃淡	05 中
23 葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
25 部分着色葉の数	09 極多
26 完全着色葉の数	01 極少
27 着色葉の切れ込みの強弱	01 無又は弱
28 完全着色葉の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
29 ほうの数	03 少
30 最大ほうの長さ（葉柄を含む。）	03 短
31 最大ほうの幅	01 極狭
32 最大ほうの形	01 卵形
33 ほうの表面の色数	03 3色以上
34 ほうの表面の色（単色品種に限る。）	

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 14105

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）	09 有
36 ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 49B
37 ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 150D
38 ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 143B
39 ほうの表面の斑点の強弱	01 無又は極弱
40 ほうの表面の斑点の色	
41 ほうの裏面の色（単色品種に限る。）	
42 ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 49B
43 ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 2D
44 ほうの裏面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 143C
45 ほうの裏面の斑点の色(斑点模様のある品種に限る。)	
46 ほうの主脈の巻き込みの有無	01 無
47 ほうのねじれの有無	01 無
48 ほうの葉脈間の縮れの強弱	03 弱
49 集散花序の幅	03 狭
50 蜜腺の大きさ	01 極小
51 蜜腺の色	01 黄

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 14105

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29501号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 蜜線の変形の有無 53 開花の早晩	01 無
	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第29502号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x *Euphorbia cornastra* (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 17175

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）はやや濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱はやや強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅は極狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は67B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）はN57D、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは小、蜜腺の色は橙、開花の早晩はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bonpr 17175」は、対照品種「Bonpri 16P5」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が弱であること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）がN57Dであること、ほうの主脈の巻き込みの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonpri 9276」と比較して、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）がN57Dであること、ほうの主脈の巻き込みの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「プリンセチア ルージュ」と比較して、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）がN57Dであること、蜜腺の色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の変異株である。

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 17175

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29502号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 分枝の有無	09 有
02 分枝の数	04 やや少
03 樹高	01 極低
04 樹の幅	02 かなり狭
05 茎の中間部の緑色の濃淡	05 中
06 茎の中間部のアントシアニン着色の強弱	03 弱
07 茎上部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
08 葉身の長さ	04 やや短
09 葉身の幅	04 やや狭
10 葉身の形	02 卵形
11 葉身の基部の形	02 円形
12 葉身の表面の色数	01 1色
13 葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）	06 やや濃
14 葉身の主な色（複色葉品種に限る。）	
15 葉身の二次色（複色葉品種に限る。）	
16 葉身の三次色（複色葉品種に限る。）	
17 葉身の表面の主脈の色	02 帯赤

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 17175

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の切れ込みの数	03 多
19 葉身の切れ込みの深さ	03 浅
20 葉身の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
21 葉柄の長さ	01 極短
22 葉柄の表面の緑色の濃淡	01 極淡
23 葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
24 葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
25 部分着色葉の数	05 中
26 完全着色葉の数	05 中
27 着色葉の切れ込みの強弱	01 無又は弱
28 完全着色葉の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
29 ほうの数	04 やや少
30 最大ほうの長さ（葉柄を含む。）	03 短
31 最大ほうの幅	01 極狭
32 最大ほうの形	02 楕円形
33 ほうの表面の色数	01 1色
34 ほうの表面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 67B

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 17175

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）	
36 ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
37 ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
38 ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
39 ほうの表面の斑点の強弱	01 無又は極弱
40 ほうの表面の斑点の色	
41 ほうの裏面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート N57D
42 ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
43 ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
44 ほうの裏面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
45 ほうの裏面の斑点の色(斑点模様のある品種に限る。)	
46 ほうの主脈の巻き込みの有無	01 無
47 ほうのねじれの有無	01 無
48 ほうの葉脈間の縮れの強弱	03 弱
49 集散花序の幅	03 狭
50 蜜腺の大きさ	03 小
51 蜜腺の色	02 橙

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 17175

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29502号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 蜜線の変形の有無	01 無
53 開花の早晩	02 かなり早

1 品種登録の番号及び年月日 第29503号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x *Euphorbia coranstra* (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 611

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数はやや多、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅は極狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は3色以上、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は無、ほうの表面の斑点の色は69C, 67A(二次色)、ほうの裏面の斑点の色（斑点模様のある品種に限る。）は69C, 67B(二次色)、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩はかなり早である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bonpr 611」は、対照品種「Bonpri 16P5」と比較して、ほうの表面の色数が3色以上であること、ほうの表面の斑点の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonpri 9172」と比較して、ほうの表面の色数が3色以上であること、ほうの表面の斑点の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の変異株である。

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 611

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝の有無	09 有
02 分枝の数	04 やや少
03 樹高	01 極低
04 樹の幅	02 かなり狭
05 茎の中間部の緑色の濃淡	05 中
06 茎の中間部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 茎上部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
08 葉身の長さ	04 やや短
09 葉身の幅	03 狭
10 葉身の形	02 卵形
11 葉身の基部の形	02 円形
12 葉身の表面の色数	01 1色
13 葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）	07 濃
14 葉身の主な色（複色葉品種に限る。）	
15 葉身の二次色（複色葉品種に限る。）	
16 葉身の三次色（複色葉品種に限る。）	
17 葉身の表面の主脈の色	01 緑のみ

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 611

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の切れ込みの数	03 多
19 葉身の切れ込みの深さ	03 浅
20 葉身の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
21 葉柄の長さ	01 極短
22 葉柄の表面の緑色の濃淡	03 淡
23 葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱	03 弱
24 葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
25 部分着色葉の数	06 やや多
26 完全着色葉の数	04 やや少
27 着色葉の切れ込みの強弱	01 無又は弱
28 完全着色葉の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
29 ほうの数	04 やや少
30 最大ほうの長さ（葉柄を含む。）	03 短
31 最大ほうの幅	01 極狭
32 最大ほうの形	02 楕円形
33 ほうの表面の色数	03 3色以上
34 ほうの表面の色（単色品種に限る。）	

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 611

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29503号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）	01 無
36 ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
37 ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
38 ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
39 ほうの表面の斑点の強弱	03 中
40 ほうの表面の斑点の色	RHSカラーチャート 69C, 67A(二次色)
41 ほうの裏面の色（単色品種に限る。）	
42 ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
43 ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
44 ほうの裏面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
45 ほうの裏面の斑点の色(斑点模様のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 69C, 67B(二次色)
46 ほうの主脈の巻き込みの有無	01 無
47 ほうのねじれの有無	01 無
48 ほうの葉脈間の縮れの強弱	03 弱
49 集散花序の幅	04 やや狭
50 蜜腺の大きさ	04 やや小
51 蜜腺の色	01 黄

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia corناstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 611

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第29503号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
52 蜜線の変形の有無	01 無	
53 開花の早晩	02 かなり早	

1 品種登録の番号及び年月日 第29504号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x *Euphorbia coranstra* (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 1639

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はかなり少、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数はやや多、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅は極狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は2色、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は無、ほうの表面の斑点の色は65A、ほうの裏面の斑点の色（斑点模様のある品種に限る。）は69D、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bonpr 1639」は、対照品種「Bonpri 1025」と比較して、ほうの表面の色数が2色であること、ほうの表面の斑点の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonpri 515」と比較して、ほうの表面の色数が2色であること、ほうの表面の斑点の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の変異株である。

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 1639

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29504号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 分枝の有無	09 有
02 分枝の数	02 かなり少
03 樹高	01 極低
04 樹の幅	01 極狭
05 茎の中間部の緑色の濃淡	03 淡
06 茎の中間部のアントシアニン着色の強弱	05 中
07 茎上部のアントシアニン着色の強弱	02 中
08 葉身の長さ	04 やや短
09 葉身の幅	04 やや狭
10 葉身の形	02 卵形
11 葉身の基部の形	02 円形
12 葉身の表面の色数	01 1色
13 葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）	07 濃
14 葉身の主な色（複色葉品種に限る。）	
15 葉身の二次色（複色葉品種に限る。）	
16 葉身の三次色（複色葉品種に限る。）	
17 葉身の表面の主脈の色	02 帯赤

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 1639

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の切れ込みの数	01 無又は少
19 葉身の切れ込みの深さ	03 浅
20 葉身の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
21 葉柄の長さ	01 極短
22 葉柄の表面の緑色の濃淡	01 極淡
23 葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱	07 強
24 葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
25 部分着色葉の数	06 やや多
26 完全着色葉の数	04 やや少
27 着色葉の切れ込みの強弱	01 無又は弱
28 完全着色葉の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
29 ほうの数	04 やや少
30 最大ほうの長さ（葉柄を含む。）	03 短
31 最大ほうの幅	01 極狭
32 最大ほうの形	01 卵形
33 ほうの表面の色数	02 2色
34 ほうの表面の色（単色品種に限る。）	

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 1639

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29504号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）	01 無
36 ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
37 ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
38 ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
39 ほうの表面の斑点の強弱	04 強
40 ほうの表面の斑点の色	RHSカラーチャート 65A
41 ほうの裏面の色（単色品種に限る。）	
42 ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
43 ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
44 ほうの裏面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
45 ほうの裏面の斑点の色(斑点模様のある品種に限る。)	RHSカラーチャート 69D
46 ほうの主脈の巻き込みの有無	01 無
47 ほうのねじれの有無	01 無
48 ほうの葉脈間の縮れの強弱	03 弱
49 集散花序の幅	03 狭
50 蜜腺の大きさ	04 やや小
51 蜜腺の色	01 黄

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia corناstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpr 1639

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29504号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 蜜線の変形の有無	01 無
53 開花の早晩	02 かなり早

1 品種登録の番号及び年月日 第29505号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. チクマッシュTE-3

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の成長最適温度は24℃、菌さん周縁部の巻き込みは有、菌さんの直径は小、菌さんの高さは中、菌さんの直径／高さはかなり小、菌さん表面の色は白、菌さんの硬さは中、ひだの数は中、菌柄の太さは中、菌柄の上部表面の色は白、菌柄の基部の色は白、あめ状物質の成分の有無は無、株の硬さは硬、菌搔きから収穫までの期間は短である。

出願品種「チクマッシュTE-3」は、対照品種「チクマッシュT-011」と比較して、菌糸体の温度別成長量（15℃）が速であること、菌糸体の温度別成長量（20℃）がやや速であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュT-022」と比較して、菌糸体の温度別成長量（15℃）が速であること、菌さんの高さが中であること、ひだの数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本澤和人

7 出願公表の年月日 令和4年6月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チクマッシュT-022」と「チクマッシュT-011」を交配し、選抜したものである。

Flammulina velutipes (Fr.) Sing.
チクマッシュTE-3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌叢表面の着色の有無	01 無
02 菌叢裏面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の成長最適温度	05 24℃
04 菌糸体の温度別成長量 (10℃)	06 やや速
05 菌糸体の温度別成長量 (15℃)	07 速
06 菌糸体の温度別成長量 (20℃)	06 やや速
07 菌糸体の温度別成長量 (25℃)	05 中
08 菌糸体の温度別成長量 (30℃)	05 中
09 菌さん周縁部の巻き込み	09 有
10 菌さんの直径	03 小
11 菌さんの高さ	05 中
12 菌さんの直径／高さ	02 かなり小
13 菌さん表面の色	01 白
14 菌さんの硬さ	05 中
15 ひだの数	05 中
16 菌柄の太さ	05 中
17 菌柄の上部表面の色	01 白

チクマツシュTE-3

第 2 9 5 0 5 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29506号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gerbera L. Sweet Fiesta

3 登録品種の特性の概要

葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉身の凹凸の強弱はやや弱、葉身の毛じの粗密は粗、葉身の中央部の切れ込みの深さは浅、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の先端の形は鋭形、花柄の長さはやや長、花柄の基部のアントシアニン着色の強弱は弱、頭花の型は半八重、頭花の直径はやや小、頭花に対する内部舌状花の直径の大きさ（半八重又は八重品種に限る）は中、頭花の内部舌状花の集まりの境界の規則性（半八重又は八重品種に限る）は規則的、外部舌状花とほう葉先端部の位置は接する、内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の有無は有、総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置は上位、外部舌状花弁の形は狭楕円形、外部舌状花弁の縦断面の形は水平、外部舌状花弁の横断面の形は平行、外部舌状花弁の長さはかなり短、外部舌状花弁の幅はかなり狭、外部舌状花弁の先端の形は丸、外部舌状花弁の表面の色は61B、外部舌状花弁の色数は2、外部舌状花弁のしまの有無は無、外部舌状花弁の下部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の上部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の周縁の二次色の有無は無、外部舌状花弁の先端の二次色の有無は有、外部舌状花弁の二次色は白、外部舌状花弁の裏面の主な色は紫、花盤の直径（一重又は半八重品種に限る）はかなり小、黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る）は無、花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（半八重又は八重品種に限る）は67B、柱頭の主な色は白、やくの主な色は黄、やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は淡い、冠毛の頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は同じである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sweet Fiesta」は、対照品種「グミケーキ」と比較して、外部舌状花弁の表面の色が61Bであること、花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（半八重又は八重品種に限る）が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Classic Femmy」と比較して、葉の長さがやや長であること、葉身の毛じの粗密が粗であること、頭花に対する内部舌状花の直径の大きさ（半八重又は八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florist Holland B.V.

Dwarsweg 15, 1424PL De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Melchior Moen

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gerbera L.
Sweet Fiesta

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29506号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 葉の長さ	06 やや長
02 葉の幅	03 狭
03 葉身の凹凸の強弱	04 やや弱
04 葉身の毛じの粗密	03 粗
05 葉身の中央部の切れ込みの深さ	03 浅
06 葉身の緑色の濃淡	05 中
07 葉身の先端の形	03 鋭形
08 花柄の長さ	06 やや長
09 花柄の基部のアントシアニン着色の強弱	03 弱
10 花柄の頂部のアントシアニン着色の有無	01 無
11 花柄の総ほう下のほう葉の有無	01 無
12 頭花の型	02 半八重
13 頭花の直径	04 やや小
14 頭花に対する内部舌状花の直径の大きさ（半八重又は八重品種に限る）	05 中
15 頭花の内部舌状花の集まりの境界の規則性（半八重又は八重品種に限る）	01 規則的
16 総ほうの高さ	05 中
17 総ほうの直径	03 小

Gerbera L.
Sweet Fiesta

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 外部舌状花とほう葉先端部の位置	09 接する
19 内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の有無	09 有
20 内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の強弱	01 極弱
21 総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置	03 上位
22 外部舌状花弁の形	01 狭楕円形
23 外部舌状花弁の縦断面の形	03 水平
24 内部舌状花弁の縦断面の形	04 やや外反
25 外部舌状花弁の横断面の形	02 平形
26 外部舌状花弁の長さ	02 かなり短
27 外部舌状花弁の幅	02 かなり狭
28 外部舌状花弁の先端の形	02 丸
29 外部舌状花弁の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
30 外部舌状花弁の長い自由花弁を形成する傾向の有無	01 無
31 外部舌状花弁の表面の色	RHSカラーチャート 61B
32 外部舌状花弁の色数	02 2
33 外部舌状花弁の色の分布（単色品種に限る）	
34 外部舌状花弁のしまの有無	01 無

Gerbera L.
Sweet Fiesta

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29506号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 外部舌状花卉の下部の二次色の有無	01 無
36 外部舌状花卉の上部の二次色の有無	01 無
37 外部舌状花卉の周縁の二次色の有無	01 無
38 外部舌状花卉の先端の二次色の有無	09 有
39 外部舌状花卉の二次色	01 白
40 外部舌状花卉の裏面の主な色	09 紫
41 花盤の直径（一重又は半八重品種に限る）	02 かなり小
42 黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る）	01 無
43 花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（一重品種に限る）	
44 花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（半八重又は八重品種に限る）	RHSカラーチャート 67B
45 花盤の両性花の花被片の主な色	06 紫
46 花柱の上部の主な色	01 白
47 柱頭の主な色	01 白
48 やくの主な色	01 黄
49 やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡	01 淡い
50 やくの縦しまの有無	09 有
51 冠毛の頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡	02 同じ

Gerbera L.
Sweet Fiesta

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 未開花の花盤管状花に対する冠毛の頂部の位置	02 同等

1 品種登録の番号及び年月日 第29507号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gerbera L. Sweet Sunset

3 登録品種の特性の概要

葉の長さはやや長、葉の幅はかなり狭、葉身の凹凸の強弱は弱、葉身の毛じの粗密は中、葉身の中央部の切れ込みの深さは浅、葉身の緑色の濃淡は濃、葉身の先端の形は鋭形、花柄の長さは中、花柄の基部のアントシアニン着色の強弱は弱、頭花の型は一重、頭花の直径はやや小、外部舌状花とほう葉先端部の位置は接する、内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の有無は有、総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置は上位、外部舌状花弁の形は狭楕円形、外部舌状花弁の縦断面の形はやや外反、外部舌状花弁の横断面の形は凸形、外部舌状花弁の長さはかなり短、外部舌状花弁の幅はかなり狭、外部舌状花弁の先端の形は尖る、外部舌状花弁の表面の色はN30B、外部舌状花弁の色数は2、外部舌状花弁のしまの有無は無、外部舌状花弁の下部の二次色の有無は有、外部舌状花弁の上部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の周縁の二次色の有無は無、外部舌状花弁の先端の二次色の有無は無、外部舌状花弁の二次色は黄、外部舌状花弁の裏面の主な色は橙、花盤の直径（一重又は半八重品種に限る）はかなり小、黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る）は有、花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（一重品種に限る）は橙、柱頭の主な色は黄、やくの主な色は黄、やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は濃い、冠毛の頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は同じである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sweet Sunset」は、対照品種「ミディ ファイアボールBC」と比較して、葉の長さがやや長であること、花柄の長さが中であること、外部舌状花弁の裏面の主な色が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「トルピド」と比較して、葉身の中央部の切れ込みの深さが浅であること、総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置が上位であること、外部舌状花弁の下部の二次色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florist Holland B.V.

Dwarsweg 15, 1424PL De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Melchior Moen

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gerbera L.
Sweet Sunset

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の長さ	06 やや長
02 葉の幅	02 かなり狭
03 葉身の凹凸の強弱	03 弱
04 葉身の毛じの粗密	05 中
05 葉身の中央部の切れ込みの深さ	03 浅
06 葉身の緑色の濃淡	07 濃
07 葉身の先端の形	03 鋭形
08 花柄の長さ	05 中
09 花柄の基部のアントシアニン着色の強弱	03 弱
10 花柄の頂部のアントシアニン着色の有無	01 無
11 花柄の総ほう下のほう葉の有無	01 無
12 頭花の型	01 一重
13 頭花の直径	04 やや小
14 頭花に対する内部舌状花の直径の大きさ（半八重又は八重品種に限る）	
15 頭花の内部舌状花の集まりの境界の規則性（半八重又は八重品種に限る）	
16 総ほうの高さ	05 中
17 総ほうの直径	03 小

Gerbera L.
Sweet Sunset

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29507号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 外部舌状花とほう葉先端部の位置	09 接する
19 内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の有無	09 有
20 内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の強弱	03 弱
21 総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置	03 上位
22 外部舌状花弁の形	01 狭楕円形
23 外部舌状花弁の縦断面の形	04 やや外反
24 内部舌状花弁の縦断面の形	03 水平
25 外部舌状花弁の横断面の形	03 凸形
26 外部舌状花弁の長さ	02 かなり短
27 外部舌状花弁の幅	02 かなり狭
28 外部舌状花弁の先端の形	01 尖る
29 外部舌状花弁の切れ込みの深さ	03 浅
30 外部舌状花弁の長い自由花弁を形成する傾向の有無	01 無
31 外部舌状花弁の表面の色	RHSカラーチャート N30B
32 外部舌状花弁の色数	02 2
33 外部舌状花弁の色の分布（単色品種に限る）	
34 外部舌状花弁のしまの有無	01 無

Gerbera L.
Sweet Sunset

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 外部舌状花弁の下部の二次色の有無	09 有
36 外部舌状花弁の上部の二次色の有無	01 無
37 外部舌状花弁の周縁の二次色の有無	01 無
38 外部舌状花弁の先端の二次色の有無	01 無
39 外部舌状花弁の二次色	02 黄
40 外部舌状花弁の裏面の主な色	06 橙
41 花盤の直径（一重又は半八重品種に限る）	02 かなり小
42 黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る）	09 有
43 花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（一重品種に限る）	03 橙
44 花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（半八重又は八重品種に限る）	
45 花盤の両性花の花被片の主な色	03 橙
46 花柱の上部の主な色	02 黄
47 柱頭の主な色	02 黄
48 やくの主な色	01 黄
49 やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡	03 濃い
50 やくの縦しまの有無	09 有
51 冠毛の頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡	02 同じ

Gerbera L.
Sweet Sunset

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 未開花の花盤管状花に対する冠毛の頂部の位置	03 上

1 品種登録の番号及び年月日 第29508号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. Snow Crystal

3 登録品種の特性の概要

樹姿は叢生、株の大きさは中、花茎の伸長方向は斜上、花茎の分枝の有無は有、花茎の最長分枝の長さはかなり短、花穂の長さはかなり短、花穂の形は切断円錐形、ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）は赤紫、先端ほう葉の有無は有、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）はかなり短、先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）は倒披針形、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）はN81B、がくの色は緑、花冠の主な色はN92Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Snow Crystal」は、対照品種「Silver Anouk」と比較して、花茎の長さがかなり短であること、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）がN81Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

New Variety B.V.

Kudelstaartseweg 145, 1433GC Kudelstaart, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lammert Koning

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Silver Anouk」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Lavandula L.
Snow Crystal

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29508号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 叢生
02 株の大きさ	05 中
03 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
04 葉の灰色の強弱	07 強
05 花茎の伸長方向	02 斜上
06 株の枝の粗密	05 中
07 葉の長さ	02 かなり短
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	04 やや狭
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	02 かなり短
15 花茎の太さ	04 やや細
16 花茎の緑色の濃淡	03 淡
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	

Lavandula L.
Snow Crystal

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	07 密
19 花茎の分枝の有無	09 有
20 花茎の分枝数	03 少
21 花茎の最長分枝の長さ	02 かなり短
22 花穂の最大幅	03 狭
23 花穂の長さ	02 かなり短
24 花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）	
25 花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）	
26 花穂の輪生花間の距離（Lavandula節に限る。）	
27 花穂の形	03 切断円錐形
28 花穂の花の数	07 多
29 花穂の最上位輪生花の花の数（Lavandula節に限る。）	
30 ほう葉の幅	06 やや広
31 ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	04 赤紫
32 小ほう葉の有無（Lavandula節に限る。）	
33 小ほう葉の長さ（Lavandula節に限る。）	
34 先端ほう葉の有無	09 有

Lavandula L.
Snow Crystal

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29508号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	02 かなり短
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	04 倒披針形
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	RHSカラーチャート N81B
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	03 弱
39 がくの色	01 緑
40 がくの毛の粗密	08 かなり密
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート N92C
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第29509号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. かんむりん

3 登録品種の特性の概要

樹姿は叢生、株の大きさはやや小、花茎の伸長方向は直立、花茎の分枝の有無は有、花茎の最長分枝の長さはかなり短、花穂の長さはかなり短、花穂の形は円筒形、ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）は赤紫、先端ほう葉の有無は有、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）は短、先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）は倒披針形、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）はNN155C、がくの色は紫、花冠の主な色はN87Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「かんむりん」は、対照品種「わたぼうし」と比較して、花穂の花の数が少であること、がくの色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種

「FLORVENDULA BLUWHITE」と比較して、ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）が赤紫であること、がくの色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林孝之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林孝之

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lavandula L.
かんむりん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 叢生
02 株の大きさ	04 やや小
03 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
04 葉の灰色の強弱	05 中
05 花茎の伸長方向	01 直立
06 株の枝の粗密	05 中
07 葉の長さ	02 かなり短
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	02 かなり狭
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	02 かなり短
15 花茎の太さ	02 かなり細
16 花茎の緑色の濃淡	03 淡
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	

Lavandula L.
かんむりん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	04 やや粗
19 花茎の分枝の有無	09 有
20 花茎の分枝数	05 中
21 花茎の最長分枝の長さ	02 かなり短
22 花穂の最大幅	02 かなり狭
23 花穂の長さ	02 かなり短
24 花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）	
25 花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）	
26 花穂の輪生花間の距離（Lavandula節に限る。）	
27 花穂の形	04 円筒形
28 花穂の花の数	03 少
29 花穂の最上位輪生花の花の数（Lavandula節に限る。）	
30 ほう葉の幅	06 やや広
31 ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	04 赤紫
32 小ほう葉の有無（Lavandula節に限る。）	
33 小ほう葉の長さ（Lavandula節に限る。）	
34 先端ほう葉の有無	09 有

Lavandula L.
かんむりん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	03 短
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	04 倒披針形
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	RHSカラーチャート NN155C
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	03 弱
39 がくの色	02 紫
40 がくの毛の粗密	06 やや密
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート N87A
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	01 極早

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 1 0 号 令和 5 年 1 月 1 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. NUFLV17124

3 登録品種の特性の概要

樹姿は叢生、株の大きさは中、花茎の伸長方向は直立、花茎の分枝の有無は無、花穂の長さは短、花穂の形は円筒形、ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）は緑、先端ほう葉の有無は有、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）はやや短、先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）は楕円形、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）はNN155C、がくの色は緑、花冠の主な色はN155Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NUFLV17124」は、対照品種「アルバ」と比較して、先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）が中であること、花冠の主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruijun Li

7 出願公表の年月日 平成 3 1 年 2 月 2 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lavandula L.
NUFLV17124

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 叢生
02 株の大きさ	05 中
03 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
04 葉の灰色の強弱	05 中
05 花茎の伸長方向	01 直立
06 株の枝の粗密	05 中
07 葉の長さ	03 短
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	03 狭
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	03 短
15 花茎の太さ	02 かなり細
16 花茎の緑色の濃淡	03 淡
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	

Lavandula L.
NUFLV17124

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)	06 やや密
19 花茎の分枝の有無	01 無
20 花茎の分枝数	
21 花茎の最長分枝の長さ	
22 花穂の最大幅	03 狭
23 花穂の長さ	03 短
24 花穂の第二輪生花からの長さ (Lavandula節に限る。)	
25 花穂の輪生花の段数 (Lavandula節に限る。)	
26 花穂の輪生花間の距離 (Lavandula節に限る。)	
27 花穂の形	04 円筒形
28 花穂の花の数	04 やや少
29 花穂の最上位輪生花の花の数 (Lavandula節に限る。)	
30 ほう葉の幅	07 広
31 ほう葉の色 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)	02 緑
32 小ほう葉の有無 (Lavandula節に限る。)	
33 小ほう葉の長さ (Lavandula節に限る。)	
34 先端ほう葉の有無	09 有

Lavandula L.
NUFLV17124

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	04 やや短
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	02 楕円形
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	RHSカラーチャート NN155C
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	05 中
39 がくの色	01 緑
40 がくの毛の粗密	07 密
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート N155B
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	01 極早

1 品種登録の番号及び年月日 第29511号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. 長崎Lav3 (ナギサLav3)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は叢生、株の大きさは中、花茎の伸長方向は直立、花茎の分枝の有無は無、花穂の長さはやや短、花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）はやや短、花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）は中、花穂の輪生花間の距離（Lavandula節に限る。）はやや短、花穂の形は切断円錐形、先端ほう葉の有無は無、がくの色は紫、花冠の主な色はN87Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「長崎Lav3」は、対照品種「LAAZ0003」と比較して、花茎の伸長方向が直立であること、葉の長さがやや短であること、ほう葉の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長崎県
長崎県長崎市尾上町3番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹邊丞市 岳田司 諸岡淳司

7 出願公表の年月日 平成31年3月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ハイデコート」の自然交雑実生から選抜したものである。

Lavandula L.
長崎Lav3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 叢生
02 株の大きさ	05 中
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉の灰色の強弱	05 中
05 花茎の伸長方向	01 直立
06 株の枝の粗密	05 中
07 葉の長さ	04 やや短
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	05 中
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	07 長
15 花茎の太さ	02 かなり細
16 花茎の緑色の濃淡	03 淡
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	05 中

Lavandula L.
長崎Lav3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	
19 花茎の分枝の有無	01 無
20 花茎の分枝数	
21 花茎の最長分枝の長さ	
22 花穂の最大幅	03 狭
23 花穂の長さ	04 やや短
24 花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）	04 やや短
25 花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）	05 中
26 花穂の輪生花間の距離（Lavandula節に限る。）	04 やや短
27 花穂の形	03 切断円錐形
28 花穂の花の数	04 やや少
29 花穂の最上位輪生花の花の数（Lavandula節に限る。）	04 やや少
30 ほう葉の幅	05 中
31 ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	
32 小ほう葉の有無（Lavandula節に限る。）	02 常に有
33 小ほう葉の長さ（Lavandula節に限る。）	05 中
34 先端ほう葉の有無	01 無

Lavandula L.
長崎Lav3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	
39 がくの色	02 紫
40 がくの毛の粗密	05 中
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート N87B
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第29512号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler チクマッシュCS-201

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の生長最適温度は23℃、菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）はやや速、菌糸体の温度別成長速度（15° C/日）はやや速、菌糸体の温度別成長速度（20° C/日）はやや遅、菌糸体の温度別生長速度（25℃/日）は速、菌糸体の温度別生長速度（30℃/日）は速、菌さんの縦断面形は丸山形、菌さんの大きさは中、菌さん表面の地色は黄褐色、菌さんの厚さはやや厚、菌さんの硬さは中、りん皮の付着部位は全体、りん皮の大きさは小、りん皮の着色の有無は有、ひだの形は着柄三角形、ひだの並び方は波状・ちぢれ、ひだの幅は極狭、ひだの密度は密、ひだの色は淡黄色、菌柄の形は円柱、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さはやや太、菌柄の表面の着色の有無は有、菌柄の毛羽の密度は中、菌柄の毛羽の着色の有無は有、菌柄の硬さは中、菌柄の色は淡橙色、菌さん直径の菌柄の長さに対する比は中、子実体の平均乾燥重量はやや重、発生処理までの期間はやや長、発生処理から収穫最盛期までの期間はかなり長である。

出願品種「チクマッシュCS-201」は、対照品種「HS701」と比較して、菌さんの縦断面形が丸山形であること、菌さんの厚さがやや厚であること、菌柄の太さがやや太であること、菌さん直径の菌柄の長さに対する比が中であること、子実体の平均乾燥重量がやや重であること、発生処理までの期間がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆう次郎」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）がやや速であること、菌さんの厚さがやや厚であること、りん皮の大きさが小であること、ひだの並び方が波状・ちぢれであること、ひだのちぢれ割合（率）が極多であること、ひだの幅が極狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本澤和人

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有株どうしを交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
チクマッシュCS-201

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29512号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	05 中
02 菌叢表面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の生長最適温度	03 23℃
04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	06 やや速
05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	06 やや速
06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	04 やや遅
07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)	07 速
08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)	07 速
09 菌さんの縦断面形	03 丸山形
10 菌さんの大きさ	05 中
11 菌さん表面の地色	02 黄褐色
12 菌さんの厚さ	06 やや厚
13 菌さんの直径／厚さ	04 やや小
14 菌さんの硬さ	02 中
15 りん皮の付着部位	01 全体
16 りん皮の大きさ	03 小
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
チクマッシュCS-201

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29512号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	02 着柄三角形
20 ひだの並び方	02 波状・ちぢれ
21 ひだのちぢれ割合（率）	05 極多
22 ひだの幅	01 極狭
23 ひだの密度	03 密
24 ひだの色	02 淡黄色
25 菌柄の形	02 円柱
26 菌柄の長さ	04 やや短
27 菌柄の太さ	06 やや太
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	02 中
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	03 中
32 菌柄の色	02 淡橙色
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	05 中
34 子実体の平均乾燥重量	06 やや重

チクマツシュCS-201

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 1 2 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29513号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler チクマッシュCS-202

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の生長最適温度は22℃、菌糸体の温度別成長速度（10℃ C/日）はやや速、菌糸体の温度別成長速度（15℃ C/日）は中、菌糸体の温度別成長速度（20℃ C/日）はやや遅、菌糸体の温度別生長速度（25℃/日）は中、菌糸体の温度別生長速度（30℃/日）はやや速、菌さんの縦断面形は丸山形、菌さんの大きさはやや小、菌さん表面の地色は褐色、菌さんの厚さは中、菌さんの硬さは中、りん皮の付着部位は全体、りん皮の大きさはやや小、りん皮の着色の有無は有、ひだの形は着柄三角形、ひだの並び方は波状・ちぢれ、ひだの幅は極狭、ひだの密度は密、ひだの色は淡黄色、菌柄の形は基部に向かって太い、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さは中、菌柄の表面の着色の有無は有、菌柄の毛羽の密度は中、菌柄の毛羽の着色の有無は有、菌柄の硬さは中、菌柄の色は淡橙色、菌さん直径の菌柄の長さに対する比はやや小、子実体の平均乾燥重量はやや軽、発生処理までの期間中は、発生処理から収穫最盛期までの期間はかなり長である。

出願品種「チクマッシュCS-202」は、対照品種「HS701」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（15℃ C/日）が中であること、菌さんの縦断面形が丸山形であること、菌さん直径の菌柄の長さに対する比がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「森XR1号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（15℃ C/日）が中であること、菌さんの硬さが中であること、発生処理から収穫最盛期までの期間がかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本澤和人

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有株どうしを交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
チクマッシュCS-202

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	05 中
02 菌叢表面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の生長最適温度	02 22℃
04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	06 やや速
05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	05 中
06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	04 やや遅
07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)	05 中
08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)	06 やや速
09 菌さんの縦断面形	03 丸山形
10 菌さんの大きさ	04 やや小
11 菌さん表面の地色	03 褐色
12 菌さんの厚さ	05 中
13 菌さんの直径／厚さ	04 やや小
14 菌さんの硬さ	02 中
15 りん皮の付着部位	01 全体
16 りん皮の大きさ	04 やや小
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
チクマッシュCS-202

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29513号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	02 着柄三角形
20 ひだの並び方	02 波状・ちぢれ
21 ひだのちぢれ割合（率）	05 極多
22 ひだの幅	01 極狭
23 ひだの密度	03 密
24 ひだの色	02 淡黄色
25 菌柄の形	01 基部に向かって太い
26 菌柄の長さ	04 やや短
27 菌柄の太さ	05 中
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	02 中
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	03 中
32 菌柄の色	02 淡橙色
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	04 やや小
34 子実体の平均乾燥重量	04 やや軽

チクマツシュCS-202

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 1 3 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29514号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. マキタ短茎コシヒカリ (マキタタンケイコシヒカリ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さは中、穂数はやや多、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は全体、最長芒の長さは短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性はかなり難、脱粒性は難、着粒密度は中である。

出願品種「マキタ短茎コシヒカリ」は、対照品種「さちいっぱい」と比較して、初期の止め葉の姿勢が半立であること、稈の向きが半立～開であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリつくばSD1号」と比較して、稈の向きが半立～開であること、玄米の千粒重が中であること等で区別性が認められる。対照品種「マキタ超コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牧田克己
鳥取県東伯郡北栄町米里178

6 登録品種の育成をした者の氏名

牧田克己

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「コシヒカリ」の変異株から選抜したものである。

Oryza sativa L.
マキタ短茎コシヒカリ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	04 やや短
14 葉身の幅	04 やや狭
15 初期の止め葉の姿勢	03 半立
16 後期の止め葉の姿勢	04 半立～水平
17 稈の向き	04 半立～開

Oryza sativa L.
マキタ短茎コシヒカリ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	03 早
20 雄性不稔性	
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	04 やや短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	06 やや多
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	05 全体

Oryza sativa L.
マキタ短茎コシヒカリ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29514号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	02 短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	03 早
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
マキタ短茎コシヒカリ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	05 中
54 粳の長さ	05 中
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	03 低崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
マキタ短茎コシヒカリ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	08 かなり難
71 耐倒伏性	
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第29515号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume Sheena439-7

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は凹形、花の縦径は中、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN80B、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN78A、ドーサルセパルの網斑の密度はやや高、ドーサルセパルの網斑の色はN78A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN80B、ペタルの覆色の面積は大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は少、ペタルの縞斑の色はN78A、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色はN78A、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は角卵形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はN78A、中央裂片の覆色は187C、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155A、側裂片の覆色はN78A, 187C（縁部）、13C（基部）、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は187C、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は187C、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sheena439-7」は、対照品種「ハッピービビアン チュンリー」と比較して、花の側面の形が凹形であること、ラテラルセパルの覆色がN80Bであること、側裂片の覆色がN78A, 187C（縁部）、13C（基部）であること等で区別性が認められる。対照品種「Sheena333-1」と比較して、花の側面の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 平成30年9月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のSheena's PearlにHappy Vivienを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	05 中
02 植物体の花序の数	03 2
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉の形	03 かなり細長い
06 葉の最大幅の位置	02 中央部
07 葉の先端の形	02 鈍形
08 葉の先端の対称性	02 非対称
09 葉の向き	03 斜上
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	03 緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	05 中
14 花序の型	03 複総状
15 花序の長さ	05 中
16 花序の花数	03 少
17 花茎の長さ	04 やや短

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	02 中
19 花茎のアントシアニンの着色	05 強
20 花の側面の形	01 凹形
21 花の縦径	05 中
22 花の横径	05 中
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	05 中
26 ドーサルセパルの幅	06 やや広
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	01 内曲
30 ドーサルセパルの横断面の形	01 凹形
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
34 ドーサルセパルの覆色	RHSカラーチャート N80B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	04 やや少
39 ドーサルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78A
40 ドーサルセパルの網斑の密度	06 やや高
41 ドーサルセパルの網斑の色	RHSカラーチャート N78A
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
43 ラテラルセパルの覆色	RHSカラーチャート N80B
44 ラテラルセパルの斑点の数	03 少
45 ラテラルセパルの斑点の色	RHSカラーチャート 71A
46 ラテラルセパルの縞斑の数	05 中
47 ラテラルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78A
48 ラテラルセパルの網斑の密度	05 中
49 ラテラルセパルの網斑の色	RHSカラーチャート N78A
50 ペタルの長さ	04 やや短
51 ペタルの幅	04 やや狭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	03 横長
53 ペタルの最大幅の位置	01 基部
54 ペタルの縦断面の形	01 内曲
55 ペタルの横断面の形	01 凹形
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
59 ペタルの覆色	RHSカラーチャート N80B
60 ペタルの覆色の面積	07 大
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	03 少
65 ペタルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78A
66 ペタルの網斑の密度	05 中
67 ペタルの網斑の色	RHSカラーチャート N78A
68 リップの中央裂片の長さ	04 やや短

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の幅	04 やや狭
70 リップの中央裂片の形	03 角卵形
71 リップのヒゲの有無	09 有
72 リップのヒゲの長さ	04 やや短
73 リップの中央裂片の突起又は稜	02 中
74 リップの側裂片の形	05 V型
75 リップの側裂片の巻き込み	02 中
76 リップの側裂片の大きさ	05 同等
77 中央裂片の地色	RHSカラーチャート N78A
78 中央裂片の覆色	RHSカラーチャート 187C
79 中央裂片の斑点の数	01 無
80 中央裂片の斑点の大きさ	
81 中央裂片の斑点の色	
82 中央裂片の縞斑の数	01 無
83 中央裂片の縞斑の色	
84 中央裂片の網斑の密度	01 無
85 中央裂片の網斑の色	

Phalaenopsis Blume
Sheena439-7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 側裂片の地色	RHSカラーチャート NN155A
87 側裂片の覆色	RHSカラーチャート N78A, 187C (縁部), 13C (基部)
88 側裂片の斑点の数	02 少
89 側裂片の斑点の色	RHSカラーチャート 187C
90 側裂片の縞斑の数	03 中
91 側裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 187C
92 側裂片の網斑の密度	01 無
93 側裂片の網斑の色	
94 リップのカルス	02 盛り上る
95 カルスの色	RHSカラーチャート 13B
96 カルスの毛の有無	01 無
97 ずい柱の色	RHSカラーチャート N78B

1 品種登録の番号及び年月日 第29516号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume MM-409HL

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は中、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径は長、花の横径は広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはかなり長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN80D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN78B、ドーサルセパルの網斑の密度はやや低、ドーサルセパルの網斑の色はN78B、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN80D, N78B（基部）、ペタルの覆色の面積は大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は少、ペタルの縞斑の色はN78C、ペタルの網斑の密度はやや低、ペタルの網斑の色はN78C、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさはかなり広、中央裂片の地色はNN78A、中央裂片の覆色は59B、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155B、側裂片の覆色はN78A, 59B（縁部）、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は59A、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は59A、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MM-409HL」は、対照品種「Unimax 湖衣姫」と比較して、中央裂片の地色がNN78Aであること、側裂片の覆色がN78A, 59B（縁部）であること等で区別性が認められる。対照品種「WATANABE - NO. 10」と比較して、中央裂片の地色がNN78Aであること、側裂片の覆色がN78A, 59B（縁部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社森田洋蘭園
埼玉県川越市大字南田島999番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森田康雄

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のHappy ValentineにHappy Rainbowを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	07 長
02 植物体の花序の数	01 1
03 葉の長さ	05 中
04 葉の幅	05 中
05 葉の形	03 かなり細長い
06 葉の最大幅の位置	03 先端部
07 葉の先端の形	02 鈍形
08 葉の先端の対称性	02 非対称
09 葉の向き	05 水平
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	03 緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
14 花序の型	02 総状
15 花序の長さ	08 かなり長
16 花序の花数	05 中
17 花茎の長さ	06 やや長

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	03 太
19 花茎のアントシアニンの着色	03 中
20 花の側面の形	02 平
21 花の縦径	07 長
22 花の横径	07 広
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	08 かなり長
26 ドーサルセパルの幅	08 かなり広
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	03 外曲
30 ドーサルセパルの横断面の形	03 凸形
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
34 ドーサルセパルの覆色	RHSカラーチャート N80D

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	04 やや少
39 ドーサルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78B
40 ドーサルセパルの網斑の密度	04 やや低
41 ドーサルセパルの網斑の色	RHSカラーチャート N78B
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
43 ラテラルセパルの覆色	RHSカラーチャート N80D, 145D (基部)
44 ラテラルセパルの斑点の数	02 かなり少
45 ラテラルセパルの斑点の色	RHSカラーチャート 72A
46 ラテラルセパルの縞斑の数	05 中
47 ラテラルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78B
48 ラテラルセパルの網斑の密度	04 やや低
49 ラテラルセパルの網斑の色	RHSカラーチャート N78B
50 ペタルの長さ	06 やや長
51 ペタルの幅	07 広

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	01 極横長
53 ペタルの最大幅の位置	01 基部
54 ペタルの縦断面の形	02 平
55 ペタルの横断面の形	02 平
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
59 ペタルの覆色	RHSカラーチャート N80D, N78B (基部)
60 ペタルの覆色の面積	07 大
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	03 少
65 ペタルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78C
66 ペタルの網斑の密度	04 やや低
67 ペタルの網斑の色	RHSカラーチャート N78C
68 リップの中央裂片の長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の幅	05 中
70 リップの中央裂片の形	01 三角形
71 リップのヒゲの有無	09 有
72 リップのヒゲの長さ	06 やや長
73 リップの中央裂片の突起又は稜	01 無又は小
74 リップの側裂片の形	05 V型
75 リップの側裂片の巻き込み	02 中
76 リップの側裂片の大きさ	09 かなり広
77 中央裂片の地色	RHSカラーチャート NN78A
78 中央裂片の覆色	RHSカラーチャート 59B
79 中央裂片の斑点の数	01 無
80 中央裂片の斑点の大きさ	
81 中央裂片の斑点の色	
82 中央裂片の縞斑の数	01 無
83 中央裂片の縞斑の色	
84 中央裂片の網斑の密度	01 無
85 中央裂片の網斑の色	

Phalaenopsis Blume
MM-409HL

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 側裂片の地色	RHSカラーチャート NN155B
87 側裂片の覆色	RHSカラーチャート N78A, 59B (縁部)
88 側裂片の斑点の数	02 少
89 側裂片の斑点の色	RHSカラーチャート 59A
90 側裂片の縞斑の数	04 多
91 側裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 59A
92 側裂片の網斑の密度	01 無
93 側裂片の網斑の色	
94 リップのカルス	02 盛り上る
95 カルスの色	RHSカラーチャート 16A
96 カルスの毛の有無	01 無
97 ずい柱の色	RHSカラーチャート N78C

1 品種登録の番号及び年月日 第29517号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume MM-410HT

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径は長、花の横径は広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は中、ドーサルセパルの縞斑の色はN78B、ドーサルセパルの網斑の密度はやや低、ドーサルセパルの網斑の色はN78B、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78D, N78B（基部）、ペタルの覆色の面積は大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は少、ペタルの縞斑の色はN78C、ペタルの網斑の密度はやや高、ペタルの網斑の色はN78C、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは極長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさはかなり広、中央裂片の地色はNN78B、中央裂片の覆色は173B, 20B（基部）、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155B、側裂片の覆色はN80A, 173B（縁部）、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は59A、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は59A、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MM-410HT」は、対照品種「MM-409HL」と比較して、ペタルの覆色がN78D, N78B（基部）であること、中央裂片の覆色が173B, 20B（基部）であること等で区別性が認められる。対照品種「WATANABE - NO. 10」と比較して、中央裂片の地色がNN78Bであること、側裂片の覆色がN80A, 173B（縁部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社森田洋蘭園
埼玉県川越市大字南田島999番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森田康雄

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MM-317」に出願者所有のHappy Rainbowを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	07 長
02 植物体の花序の数	01 1
03 葉の長さ	05 中
04 葉の幅	06 やや広
05 葉の形	03 かなり細長い
06 葉の最大幅の位置	02 中央部
07 葉の先端の形	02 鈍形
08 葉の先端の対称性	02 非対称
09 葉の向き	05 水平
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	03 緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
14 花序の型	02 総状
15 花序の長さ	08 かなり長
16 花序の花数	04 やや少
17 花茎の長さ	06 やや長

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	03 太
19 花茎のアントシアニンの着色	03 中
20 花の側面の形	02 平
21 花の縦径	07 長
22 花の横径	07 広
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	07 長
26 ドーサルセパルの幅	07 広
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	03 外曲
30 ドーサルセパルの横断面の形	03 凸形
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
34 ドーサルセパルの覆色	RHSカラーチャート N78D

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	05 中
39 ドーサルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78B
40 ドーサルセパルの網斑の密度	04 やや低
41 ドーサルセパルの網斑の色	RHSカラーチャート N78B
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
43 ラテラルセパルの覆色	RHSカラーチャート N78D, 157B (基部)
44 ラテラルセパルの斑点の数	03 少
45 ラテラルセパルの斑点の色	RHSカラーチャート 70A
46 ラテラルセパルの縞斑の数	05 中
47 ラテラルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78B
48 ラテラルセパルの網斑の密度	03 低
49 ラテラルセパルの網斑の色	RHSカラーチャート N78B
50 ペタルの長さ	06 やや長
51 ペタルの幅	07 広

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	01 極横長
53 ペタルの最大幅の位置	01 基部
54 ペタルの縦断面の形	02 平
55 ペタルの横断面の形	02 平
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
59 ペタルの覆色	RHSカラーチャート N78D, N78B (基部)
60 ペタルの覆色の面積	07 大
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	03 少
65 ペタルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78C
66 ペタルの網斑の密度	06 やや高
67 ペタルの網斑の色	RHSカラーチャート N78C
68 リップの中央裂片の長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の幅	05 中
70 リップの中央裂片の形	01 三角形
71 リップのヒゲの有無	09 有
72 リップのヒゲの長さ	09 極長
73 リップの中央裂片の突起又は稜	02 中
74 リップの側裂片の形	05 V型
75 リップの側裂片の巻き込み	02 中
76 リップの側裂片の大きさ	09 かなり広
77 中央裂片の地色	RHSカラーチャート NN78B
78 中央裂片の覆色	RHSカラーチャート 173B, 20B (基部)
79 中央裂片の斑点の数	01 無
80 中央裂片の斑点の大きさ	
81 中央裂片の斑点の色	
82 中央裂片の縞斑の数	02 少
83 中央裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 59B
84 中央裂片の網斑の密度	01 無
85 中央裂片の網斑の色	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 側裂片の地色	RHSカラーチャート NN155B
87 側裂片の覆色	RHSカラーチャート N80A, 173B (縁部)
88 側裂片の斑点の数	02 少
89 側裂片の斑点の色	RHSカラーチャート 59A
90 側裂片の縞斑の数	03 中
91 側裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 59A
92 側裂片の網斑の密度	01 無
93 側裂片の網斑の色	
94 リップのカルス	02 盛り上る
95 カルスの色	RHSカラーチャート 16B
96 カルスの毛の有無	01 無
97 ずい柱の色	RHSカラーチャート N78B

1 品種登録の番号及び年月日 第29518号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume MM-411HR

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色はやや弱、花の側面の形は平、花の縦径は長、花の横径は広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はN78B、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN78A、ドーサルセパルの網斑の密度は低、ドーサルセパルの網斑の色はN78A、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はN78C、ペタルの覆色はNN78A、ペタルの覆色の面積は極小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数はやや少、ペタルの縞斑の色はN78B、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色はN78B、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさはかなり広、中央裂片の地色はNN78A、中央裂片の覆色は59B、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色は155D、側裂片の覆色はN80A, 59B（中央部）、18B（基部）、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は59A、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は59A、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MM-411HR」は、対照品種「Unimax 湖衣姫」と比較して、ペタルの表面の地色がN78Cであること、側裂片の覆色がN80A, 59B（中央部）、18B（基部）であること等で区別性が認められる。対照品種「WATANABE - NO. 10」と比較して、ペタルの表面の地色がN78Cであること、側裂片の覆色がN80A, 59B（中央部）、18B（基部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社森田洋蘭園
埼玉県川越市大字南田島999番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森田康雄

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MM-317」に出願者所有のHappy Rainbowを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	07 長
02 植物体の花序の数	02 1又は2
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	05 中
05 葉の形	03 かなり細長い
06 葉の最大幅の位置	02 中央部
07 葉の先端の形	02 鈍形
08 葉の先端の対称性	03 著しく非対称
09 葉の向き	05 水平
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	03 緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	03 弱
14 花序の型	02 総状
15 花序の長さ	07 長
16 花序の花数	04 やや少
17 花茎の長さ	07 長

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	03 太
19 花茎のアントシアニンの着色	02 やや弱
20 花の側面の形	02 平
21 花の縦径	07 長
22 花の横径	07 広
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	07 長
26 ドーサルセパルの幅	07 広
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	03 外曲
30 ドーサルセパルの横断面の形	03 凸形
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート N78B
34 ドーサルセパルの覆色	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	04 やや少
39 ドーサルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78A
40 ドーサルセパルの網斑の密度	03 低
41 ドーサルセパルの網斑の色	RHSカラーチャート N78A
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート N78B
43 ラテラルセパルの覆色	
44 ラテラルセパルの斑点の数	01 無
45 ラテラルセパルの斑点の色	
46 ラテラルセパルの縞斑の数	05 中
47 ラテラルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78A
48 ラテラルセパルの網斑の密度	03 低
49 ラテラルセパルの網斑の色	RHSカラーチャート N78A
50 ペタルの長さ	06 やや長
51 ペタルの幅	07 広

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	01 極横長
53 ペタルの最大幅の位置	01 基部
54 ペタルの縦断面の形	01 内曲
55 ペタルの横断面の形	01 凹形
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSカラーチャート N78C
59 ペタルの覆色	RHSカラーチャート NN78A
60 ペタルの覆色の面積	01 極小
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	04 やや少
65 ペタルの縞斑の色	RHSカラーチャート N78B
66 ペタルの網斑の密度	05 中
67 ペタルの網斑の色	RHSカラーチャート N78B
68 リップの中央裂片の長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の幅	05 中
70 リップの中央裂片の形	01 三角形
71 リップのヒゲの有無	09 有
72 リップのヒゲの長さ	06 やや長
73 リップの中央裂片の突起又は稜	01 無又は小
74 リップの側裂片の形	05 V型
75 リップの側裂片の巻き込み	02 中
76 リップの側裂片の大きさ	09 かなり広
77 中央裂片の地色	RHSカラーチャート NN78A
78 中央裂片の覆色	RHSカラーチャート 59B
79 中央裂片の斑点の数	01 無
80 中央裂片の斑点の大きさ	
81 中央裂片の斑点の色	
82 中央裂片の縞斑の数	02 少
83 中央裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 59B
84 中央裂片の網斑の密度	01 無
85 中央裂片の網斑の色	

Phalaenopsis Blume
MM-411HR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 側裂片の地色	RHSカラーチャート 155D
87 側裂片の覆色	RHSカラーチャート N80A, 59B（中央部）, 18B（基部）
88 側裂片の斑点の数	02 少
89 側裂片の斑点の色	RHSカラーチャート 59A
90 側裂片の縞斑の数	03 中
91 側裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 59A
92 側裂片の網斑の密度	01 無
93 側裂片の網斑の色	
94 リップのカルス	02 盛り上る
95 カルスの色	RHSカラーチャート 16D
96 カルスの毛の有無	01 無
97 ずい柱の色	RHSカラーチャート N78B

1 品種登録の番号及び年月日 第29519号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume 雪っこ (ユキッコ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は中、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花の側面の形は凹形、花の縦径は中、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは中、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は12A、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は12A、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は少、側裂片の縞斑の色は186B、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「雪っこ」は、対照品種「SEKAI-F1881」と比較して、花の側面の形が凹形であること、中央裂片の覆色が12Aであること、側裂片の縞斑の色が186Bであること等で区別性が認められる。対照品種「アマビリス」と比較して、花の側面の形が凹形であること、側裂片の縞斑の色が186Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

熊澤博満
三重県鈴鹿市石薬師町2457-239

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊澤博満

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有のPhalaenopsis amabilisどうしを交配し、選抜したものである。

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	05 中
02 植物体の花序の数	02 1又は2
03 葉の長さ	03 短
04 葉の幅	05 中
05 葉の形	02 細長い
06 葉の最大幅の位置	02 中央部
07 葉の先端の形	02 鈍形
08 葉の先端の対称性	02 非対称
09 葉の向き	05 水平
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	03 緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
14 花序の型	03 複総状
15 花序の長さ	06 やや長
16 花序の花数	05 中
17 花茎の長さ	04 やや短

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	02 中
19 花茎のアントシアニンの着色	01 無又は弱
20 花の側面の形	01 凹形
21 花の縦径	05 中
22 花の横径	05 中
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	05 中
26 ドーサルセパルの幅	05 中
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	01 内曲
30 ドーサルセパルの横断面の形	01 凹形
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
34 ドーサルセパルの覆色	

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	01 無
39 ドーサルセパルの縞斑の色	
40 ドーサルセパルの網斑の密度	01 無
41 ドーサルセパルの網斑の色	
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
43 ラテラルセパルの覆色	
44 ラテラルセパルの斑点の数	01 無
45 ラテラルセパルの斑点の色	
46 ラテラルセパルの縞斑の数	01 無
47 ラテラルセパルの縞斑の色	
48 ラテラルセパルの網斑の密度	01 無
49 ラテラルセパルの網斑の色	
50 ペタルの長さ	04 やや短
51 ペタルの幅	04 やや狭

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	01 極横長
53 ペタルの最大幅の位置	02 中央部
54 ペタルの縦断面の形	01 内曲
55 ペタルの横断面の形	01 凹形
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
59 ペタルの覆色	
60 ペタルの覆色の面積	
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	01 無
65 ペタルの縞斑の色	
66 ペタルの網斑の密度	01 無
67 ペタルの網斑の色	
68 リップの中央裂片の長さ	04 やや短

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の幅	04 やや狭
70 リップの中央裂片の形	01 三角形
71 リップのヒゲの有無	09 有
72 リップのヒゲの長さ	05 中
73 リップの中央裂片の突起又は稜	02 中
74 リップの側裂片の形	05 V型
75 リップの側裂片の巻き込み	02 中
76 リップの側裂片の大きさ	07 広
77 中央裂片の地色	RHSカラーチャート NN155C
78 中央裂片の覆色	RHSカラーチャート 12A
79 中央裂片の斑点の数	01 無
80 中央裂片の斑点の大きさ	
81 中央裂片の斑点の色	
82 中央裂片の縞斑の数	01 無
83 中央裂片の縞斑の色	
84 中央裂片の網斑の密度	01 無
85 中央裂片の網斑の色	

Phalaenopsis Blume

雪っこ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 1 9 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 側裂片の地色	RHSカラーチャート NN155C
87 側裂片の覆色	RHSカラーチャート 12A
88 側裂片の斑点の数	01 無
89 側裂片の斑点の色	
90 側裂片の縞斑の数	02 少
91 側裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 186B
92 側裂片の網斑の密度	01 無
93 側裂片の網斑の色	
94 リップのカルス	02 盛り上る
95 カルスの色	RHSカラーチャート 12C
96 カルスの毛の有無	01 無
97 ずい柱の色	RHSカラーチャート NN155C

1 品種登録の番号及び年月日 第29520号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 月の香 (ツキカ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさはやや大、樹勢は強、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は中、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は濃桃、花弁の大きさは大、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は無、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さはやや短、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは極大、果実の形は円形、果頂部の形は平、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅はやや広、果実の地色は黄、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積はやや大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さはやや硬、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は高、核の大きさは小、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少はやや低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は弱、収穫期はやや晩である。

出願品種「月の香」は、対照品種「スウィート光黄」と比較して、花粉の有無が無であること、果実の大きさが極大であること、核の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「黄金桃」と比較して、花粉の有無が無であること、果実の大きさが極大であること、果実の酸味が極低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三浦勝正
福島県福島市瀬上町字四斗蒔14-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

三浦勝正

7 出願公表の年月日 平成30年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

不明品種の偶発実生である。

Prunus persica (L.) Batsch
月の香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹の大きさ	06 やや大
02 樹勢	07 強
03 樹姿	05 開張
04 枝の太さ	05 中
05 節間長	06 やや長
06 着花枝のアントシアニン着色の有無	09 有
07 着花枝のアントシアニン着色の強弱	05 中
08 着花枝の花芽の粗密	05 中
09 花芽の着き方	02 複
10 花の咲き型	01 普通咲
11 がく筒の内側の色	02 橙
12 花冠の表面の色	05 濃桃
13 花弁の形	01 狭楕円形
14 花弁の大きさ	07 大
15 花弁の数	01 5
16 雄ずいの花弁に対する位置	03 上位
17 柱頭のやくに対する位置	03 上位

Prunus persica (L.) Batsch
月の香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花粉の有無	01 無
19 子房の毛じの有無	09 有
20 新しょうのたく葉の長さ	05 中
21 葉身の長さ	07 長
22 葉身の幅	06 やや広
23 葉身の長さ／幅	05 中
24 葉身の横断面の形	02 平
25 葉身の先端の反りの有無	09 有
26 葉身の基部の形	02 ほぼ直角
27 葉身の先端の角度	05 中
28 葉身の色	02 緑
29 葉身の裏面主脈の着色の有無	01 無
30 葉柄の長さ	04 やや短
31 蜜腺の有無	09 有
32 蜜腺の形	02 腎臓形
33 蜜腺の数	01 2
34 果実の大きさ	09 極大

Prunus persica (L.) Batsch
月の香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の形	03 円形
36 果頂部の形	03 平
37 果実の対称性	02 対称
38 縫合線の強弱	05 中
39 梗あいの深さ	07 深
40 梗あいの幅	06 やや広
41 果実の地色	09 黄
42 果実の地色2	
43 果実の着色の有無	09 有
44 果実の着色の色	05 赤
45 果実の着色の型	03 ぼかし状
46 果実の着色面積	06 やや大
47 果実の毛じの有無	09 有
48 果実の毛じの粗密	05 中
49 果皮の厚さ	05 中
50 果皮の付着性	05 中
51 果肉の硬さ	06 やや硬

Prunus persica (L.) Batsch
月の香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果肉の地色	05 黄
53 果皮直下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
54 果肉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
55 核の周辺のアントシアニン着色の強弱	02 弱
56 果肉の肉質	01 非繊維質
57 果実の甘味	07 高
58 果実の酸味	01 極低
59 核の大きさ	03 小
60 核の横面の形	03 楕円形
61 核の褐色の濃淡	05 中
62 核の表面の紋様	04 点・条
63 核割れの多少	04 やや低
64 核と果肉の粘離の有無	09 有
65 核と果肉の粘離の強弱	03 弱
66 葉芽のほう芽期	05 中
67 開花始期	05 中
68 開花期間	06 やや長

Prunus persica (L.) Batsch
月の香

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 収穫期 70 後期落果性	06 やや晩
	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第29521号 令和5年1月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 黄美の月 (キミツキ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさはやや大、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱はやや強、着花枝の花芽の粗密はかなり密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は桃、花弁の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さはやや長、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは極大、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は弱、梗あ幅は広、果実の地色は黄、果実の着色の型は条状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は強、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はやや高、核の大きさはやや小、核の横断面の形は楕円形、核の褐色の濃淡はやや濃、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は中、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は中、収穫期は極晩である。

出願品種「黄美の月」は、対照品種「黄ららのきわみ」と比較して、果実の大きさが極大であること、核の周辺のアントシアニン着色の強弱が強であること、収穫期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめかおり」と比較して、花粉の有無が有であること、果実の地色が黄であること、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋忠吉
福島県伊達市月舘町御代田字馬場13

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋忠吉

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ゆめかおり」の自然交雑実生から選抜したものである。

Prunus persica (L.) Batsch
黄美の月

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹の大きさ	06 やや大
02 樹勢	05 中
03 樹姿	05 開張
04 枝の太さ	05 中
05 節間長	04 やや短
06 着花枝のアントシアニン着色の有無	09 有
07 着花枝のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
08 着花枝の花芽の粗密	08 かなり密
09 花芽の着き方	02 複
10 花の咲き型	01 普通咲
11 がく筒の内側の色	02 橙
12 花冠の表面の色	04 桃
13 花弁の形	02 広楕円形
14 花弁の大きさ	05 中
15 花弁の数	01 5
16 雄ずいの花弁に対する位置	03 上位
17 柱頭のやくに対する位置	03 上位

Prunus persica (L.) Batsch
黄美の月

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花粉の有無	09 有
19 子房の毛じの有無	09 有
20 新しょうのたく葉の長さ	05 中
21 葉身の長さ	06 やや長
22 葉身の幅	06 やや広
23 葉身の長さ／幅	05 中
24 葉身の横断面の形	02 平
25 葉身の先端の反りの有無	09 有
26 葉身の基部の形	01 鋭
27 葉身の先端の角度	03 小
28 葉身の色	02 緑
29 葉身の裏面主脈の着色の有無	01 無
30 葉柄の長さ	06 やや長
31 蜜腺の有無	09 有
32 蜜腺の形	02 腎臓形
33 蜜腺の数	01 2
34 果実の大きさ	09 極大

Prunus persica (L.) Batsch
黄美の月

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の形	03 円形
36 果頂部の形	04 広浅凹
37 果実の対称性	02 対称
38 縫合線の強弱	03 弱
39 梗あいの深さ	07 深
40 梗あいの幅	07 広
41 果実の地色	09 黄
42 果実の地色2	
43 果実の着色の有無	09 有
44 果実の着色の色	05 赤
45 果実の着色の型	02 条状
46 果実の着色面積	05 中
47 果実の毛じの有無	09 有
48 果実の毛じの粗密	05 中
49 果皮の厚さ	05 中
50 果皮の付着性	05 中
51 果肉の硬さ	05 中

Prunus persica (L.) Batsch
黄美の月

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果肉の地色	05 黄
53 果皮直下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
54 果肉のアントシアニン着色の強弱	02 弱
55 核の周辺のアントシアニン着色の強弱	03 強
56 果肉の肉質	01 非繊維質
57 果実の甘味	06 やや高
58 果実の酸味	04 やや低
59 核の大きさ	04 やや小
60 核の横面の形	03 楕円形
61 核の褐色の濃淡	06 やや濃
62 核の表面の紋様	04 点・条
63 核割れの多少	05 中
64 核と果肉の粘離の有無	09 有
65 核と果肉の粘離の強弱	05 中
66 葉芽のほう芽期	04 やや早
67 開花始期	04 やや早
68 開花期間	05 中

Prunus persica (L.) Batsch
黄美の月

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 収穫期 70 後期落果性	09 極晩
	03 弱