

1 品種登録の番号及び年月日 第29567号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Berzelia lanuginosa Brongn. リピッコロミサト

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高は中、茎の太さは極太、茎の色は赤褐、針状葉の長さは中、針状葉の緑色の濃淡は中、針状葉の着生角度は小、頭花の緑色の濃淡は中、花柄の基部のアントシアニン着色の有無は有、着蕾から開花までの枝の伸長の強弱は弱、頭花の大きさは小、頭花の色は157D、花柄の長さは短、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「リピッコロミサト」は、対照品種「エレガントライム」と比較して、花柄の基部のアントシアニン着色の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「バーゼリア」と比較して、樹高が中であること、針状葉の着生角度が小であること、頭花の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山隆之

福岡県久留米市田主丸町地徳2282

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「エレガントライム」の変異株である。

Berzelia lanuginosa Brongn.
リピッコロミサト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 半直立
02 樹高	05 中
03 茎の太さ	05 極太
04 茎の色	03 赤褐
05 針状葉の長さ	03 中
06 針状葉の緑色の濃淡	02 中
07 針状葉の着生角度	02 小
08 頭花の緑色の濃淡	02 中
09 花柄の基部のアントシアニン着色の有無	09 有
10 着蕾から開花までの枝の伸長の強弱	02 弱
11 頭花の大きさ	02 小
12 頭花の色	RHSカラーチャート 157D
13 花柄の長さ	02 短
14 開花期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第29568号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. TF940

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、株の高さは極低、花茎長は極短、茎の太さは太、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形は砲弾形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は心形脚、葉の欠刻は少、葉長は中、葉幅はやや広、葉数はやや少、葉色は緑、花数は中、花形は半八重咲、花容は斜上、花の大きさはやや小、舌状花の重ねの程度は中、舌状花数は少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の複色の有無は無、花弁表側の色は14B、花弁裏側の色は14B;175B(先端)、花の中心部の色は黒紫、総ほうの直径は小、花柄の長さはかなり短である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TF940」は、対照品種「ファッションイエローアイ」と比較して、花形が半八重咲であること、花弁裏側の色が14B;175B(先端)であること、花の中心部の色が黒紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

池口英明 伊豆直幸

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calendula L.
TF940

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 斜上
02 株張り	04 やや狭
03 株の高さ	01 極低
04 花茎長	01 極短
05 茎の太さ	07 太
06 茎のアントシアニンの有無	01 無
07 茎の毛の有無	09 有
08 たく葉の有無	01 無
09 立茎数	02 かなり少
10 側枝発生の早晩性	03 早
11 節間長	02 かなり短
12 葉序	02 互生
13 葉の着生角度	02 斜上
14 葉形	03 砲弾形
15 葉先端の形	01 微突形
16 葉基部の形	03 心形脚
17 葉面の凹凸	03 少

Calendula L.
TF940

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の波打ち	05 中
19 葉の欠刻	03 少
20 葉長	05 中
21 葉幅	06 やや広
22 葉数	04 やや少
23 葉色	02 緑
24 葉の光沢	05 中
25 葉の厚さ	05 中
26 葉の毛の有無	09 有
27 花房の形	01 円錐形
28 花数	05 中
29 花形	03 半八重咲
30 花容	01 斜上
31 花の大きさ	04 やや小
32 舌状花の重ねの程度	05 中
33 舌状花数	03 少
34 管状花部の大きさ	03 小

Calendula L.
TF940

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 管状花数	02 かなり少
36 管状花の配列の状態	01 整う
37 管状花の大きさ	04 やや小
38 花弁全体の形	02 線形
39 花弁先端の形	03 波状形
40 花弁の長さ	05 中
41 花弁の幅	04 やや狭
42 花弁の複色の有無	01 無
43 花弁表側の色	RHSカラーチャート 14B
44 花弁裏側の色	RHSカラーチャート 14B;175B(先端)
45 花の中心部の色	06 黒紫
46 花盤の色	01 緑白
47 花たくの形	02 平なドーム形
48 花たくの大きさ	02 かなり小
49 総ほうの直径	03 小
50 総ほうの形	01 I
51 花柄の長さ	02 かなり短

Calendula L.
TF940

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花柄の太さ 53 開花期 54 耐寒性 55 耐暑性 56 うどんこ病抵抗性 57 その他病害抵抗性 58 虫害抵抗性	03 細
	02 かなり早

1 品種登録の番号及び年月日 第29569号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callisia Loefl. Sho-ne

3 登録品種の特性の概要

草型は這性、草丈はかなり低、茎の太さは細、茎の長さは極短、茎のアントシアニンの発現の有無は有、茎のアントシアニン着色部の色は中、茎の毛の有無は有、葉長は短、葉幅は狭、葉の形は広卵形、葉の先端の形は鈍形、葉表面の色は黄緑、葉表面の色の变化の有無は無、葉表面の斑の有無は有、葉表面の斑の種類は散斑、葉表面の斑の色は71A、葉裏面の着色の有無は有、葉裏面着色のパターンは均一、葉の毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sho-ne」は、対照品種「桜色カリシア」と比較して、葉の先端の形が鈍形であること、葉表面の斑の色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Rosato」と比較して、葉表面の斑の種類が散斑であること、葉表面の斑の色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

海田正吾

愛知県稲沢市祖父江町中牧1483

6 登録品種の育成をした者の氏名

海田正吾

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「桜色カリシア」の変異株である。

Callisia Loeﬂ.
Sho-ne

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 這性
02 草丈	02 かなり低
03 茎の太さ	03 細
04 茎の長さ	01 極短
05 節間長	02 かなり短
06 茎の色	
07 茎のアントシアニンの発現の有無	09 有
08 茎のアントシアニン着色部の色	05 中
09 茎の毛の有無	09 有
10 ストロンの発生の有無	01 無
11 葉長	03 短
12 葉幅	03 狭
13 葉の形	04 広卵形
14 葉縁の波状の有無	01 無
15 葉の先端の形	04 鈍形
16 葉表面の色	02 黄緑
17 葉表面の色の变化の有無	01 無

Callisia Loeftl.
Sho-ne

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第29569号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉表面の変化後の色	
19 葉表面の斑の有無	09 有
20 葉表面の斑の種類	06 散斑
21 葉表面の斑の色	RHSカラーチャート 71A
22 葉裏面の着色の有無	09 有
23 葉裏面着色のパターン	01 均一
24 葉の毛の有無	09 有
25 花径	
26 花弁の色	
27 柱頭の形状	
28 雄しべの数	
29 葯隔の色	
30 花の香りの有無	

1 品種登録の番号及び年月日 第29570号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. マコポン

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや直立、枝梢の密度はやや密、樹の大きさは中、樹勢はやや強、枝梢の太さはやや太、枝梢の長さは中、節間長はやや短、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は卵形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは小、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉形指数はかなり小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は楔形、葉柄の長さは短、葉柄の太さはやや細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは軽、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは短、花弁の幅は中、花弁(花蕾の外側)の色は白、花弁の数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は無、果実の形は扁平、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は中、果心の充実度はかなり粗、果心の大きさはやや大、果実の重さは重、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは大小混合、油胞の密度はやや疎、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑はやや粗、果皮の厚さはやや薄、果皮歩合はやや小、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は多、甘味はかなり高、酸味は低、香気の多少は中、種子数は無、発芽期はやや晩、開花期はやや晩、成熟期はかなり早、隔年結果性はやや低である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「マコポン」は、対照品種「西南のひかり」と比較して、枝梢のとげの多少が無であること、種子数が無であること等で区別性が認められる。対照品種「大分果研4号」と比較して、果形指数が大であること、果梗部放射条溝の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小原誠
大分県中津市三光田口3286-41番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小原誠

7 出願公表の年月日 令和2年5月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「大分果研4号」等の単胚早生品種に「不知火」を交配し、選抜したものである。

Citrus L.
マコボン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	04 やや直立
02 枝梢の密度	06 やや密
03 樹の大きさ	05 中
04 樹勢	06 やや強
05 枝梢の太さ	06 やや太
06 枝梢の長さ	05 中
07 節間長	04 やや短
08 枝梢のとげの多少	01 無
09 葉身の形	04 卵形
10 葉身先端の形	02 鈍尖形
11 葉身基部の形	03 鈍形
12 葉身波状の程度	03 弱
13 葉身の大きさ	03 小
14 葉身長	03 短
15 葉身幅	04 やや狭
16 葉形指数	02 かなり小
17 葉の厚さ	05 中

Citrus L.
マコボン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 網脈の鮮明度	02 やや明瞭
19 翼葉の形	04 楔形
20 翼葉の長さ	05 中
21 翼葉の幅	03 狭
22 葉柄の長さ	03 短
23 葉柄の太さ	04 やや細
24 花序の形成	01 単生
25 花(蕾)の重さ	03 軽
26 花弁の形	01 紡錘形
27 花弁の長さ	03 短
28 花弁の幅	05 中
29 花弁（花蕾の外側）の色	01 白
30 花弁の数	02 5枚
31 花糸の数	02 かなり少
32 花糸の分離の程度	01 分離
33 花粉の多少	01 無
34 子房の形	03 扁球

Citrus L.
マコボン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花柱の形	02 弓形
36 果実の形	04 扁平
37 果形指数	07 大
38 果頂部の形	01 陥没
39 果頂部放射条溝の有無	01 無
40 果頂部の凹環の有無	05 不明瞭
41 果梗部の形	04 切平面
42 果梗部放射条溝の多少	05 中
43 果心の充実度	02 かなり粗
44 果心の大きさ	06 やや大
45 果実の重さ	07 重
46 果皮の色	06 濃橙
47 アルベドの色	02 淡黄
48 油胞の大きさ	09 大小混合
49 油胞の密度	04 やや疎
50 油胞の凹凸	03 凸
51 果面の粗滑	06 やや粗

Citrus L.
マコボン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果皮の厚さ	04 やや薄
53 果皮歩合	04 やや小
54 剥皮の難易	03 易
55 じょうのう膜の硬さ	03 軟
56 さじょうの形	02 中
57 さじょうの大きさ	05 中
58 さじょう（果肉）の色	06 濃橙
59 果汁の多少	07 多
60 甘味	08 かなり高
61 苦味の有無	01 無
62 酸味	03 低
63 香気の多少	05 中
64 香気の種類	（ポンカン、不知火）
65 種子数	01 無
66 胚の色	
67 胚の数	
68 発芽期	06 やや晩

Citrus L.
マコボン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 開花期	06 やや晩
70 四季咲き性の有無	01 無
71 成熟期	02 かなり早
72 隔年結果性	04 やや低
73 着色の難易	09 良
74 後期落果の多少	
75 日焼け果の発生	
76 浮皮果の発生	
77 裂果の発生	
78 その他の生理障害	
79 貯蔵性	
80 果実の耐寒性	
81 樹体の耐寒性	
82 かいよう病抵抗性	
83 そうか病抵抗性	
84 こくてん病抵抗性	
85 ヤノ初イガラムシ抵抗性	

Citrus L.
マコボン

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 接ぎ木の難易(台木用品種に限る) 87 実生のそろい(台木用品種に限る) 88 栄養繁殖の難易(台木用品種に限る) 89 接ぎ木後の樹勢(台木用品種に限る) 90 台木の根の発育(台木用品種に限る) 91 耐湿性(台木用品種に限る) 92 耐干性(台木用品種に限る)	

1 品種登録の番号及び年月日 第29571号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. ボナルーナ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹の大きさは大、樹勢は強、枝梢の太さは太、枝梢の長さはかなり長、節間長は長、枝梢のとげの多少はやや多、葉身の形は楕円形、葉身の波状の程度は強、葉身の大きさは極大、葉身長は中、葉身幅は極広、葉形指数は小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は心臓形、葉柄の長さは長、葉柄の太さは太、花序の形成は総状、花(蕾)の重さは重、花弁の形は紡錘形、花弁の長さはやや長、花弁の幅はかなり広、花弁の色(花蕾の外側)は白、花弁の数は4枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多、果実の形は短卵形、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少はやや少、果心の充実度は中、果心の大きさは小、果実の重さは重、果皮の色は黄、油胞の大きさは大、油胞の密度はかなり疎、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は滑、果皮の厚さはかなり厚、果皮歩合は大、剥皮の難易は難、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は太長、さじょうの大きさは大、さじょう(果肉)の色は黄白、果汁の多少は多、甘味はやや高、酸味はかなり低、香気の多少は中、種子数はかなり少、発芽期は中、開花期は中、成熟期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ボナルーナ」は、対照品種「汐里」と比較して、葉形指数が小であること、果皮の厚さがかなり厚であること等で区別性が認められる。対照品種「土佐文旦」と比較して、果心の大きさが小であること、種子数がかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人京都大学
京都府京都市左京区吉田本町36番地1
高知県
高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
広島県
広島県広島市中区基町10番52号

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島宣 山崎安津 中崎鉄也 小原敬弘 矢野臣祐 金好純子
柳本裕子 森田剛成

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

「土佐文旦」に「水晶文旦」の染色体倍加花粉を交配し、選抜したものである。

Citrus L.
ボナルーナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 直立
02 枝梢の密度	05 中
03 樹の大きさ	07 大
04 樹勢	07 強
05 枝梢の太さ	07 太
06 枝梢の長さ	08 かなり長
07 節間長	07 長
08 枝梢の毛じの有無	01 無
09 枝梢のとげの多少	06 やや多
10 葉身の形	03 楕円形
11 葉身先端の形	02 鈍尖形
12 葉身基部の形	04 円形
13 葉身の波状の程度	07 強
14 葉身の大きさ	09 極大
15 葉身長	05 中
16 葉身幅	09 極広
17 葉形指数	03 小

Citrus L.
ボナルーナ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29571号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の厚さ	07 厚
19 網脈の鮮明度	02 やや明瞭
20 翼葉の形	05 心臓形
21 翼葉の長さ	07 長
22 翼葉の幅	07 広
23 葉柄の長さ	07 長
24 葉柄の太さ	07 太
25 花序の形成	02 総状
26 花(蕾)の重さ	07 重
27 花弁の形	01 紡錘形
28 花弁の長さ	06 やや長
29 花弁の幅	08 かなり広
30 花弁の色（花蕾の外側）	01 白
31 花弁の数	01 4枚
32 花糸の数	05 中
33 花糸の分離の程度	02 一部合一
34 花粉の多少	07 多

Citrus L.
ボナルーナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 子房の形	06 短卵形
36 花柱の形	01 直
37 果実の形	04 短卵形
38 果形指数	05 中
39 果頂部の形	01 陥没
40 果頂部放射条溝の有無	01 無
41 果頂部の凹環の有無	01 無
42 果梗部の形	04 切平面
43 果梗部放射条溝の多少	04 やや少
44 果心の充実度	05 中
45 果心の大きさ	03 小
46 果実の重さ	07 重
47 果皮の色	02 黄
48 アルベドの色	01 白
49 油胞の大きさ	07 大
50 油胞の密度	02 かなり疎
51 油胞の凹凸	03 凸

Citrus L.
ボナルーナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果面の粗滑	03 滑
53 果皮の厚さ	08 かなり厚
54 果皮歩合	07 大
55 剥皮の難易	07 難
56 じょうのう膜の硬さ	05 中
57 さじょうの形	04 太長
58 さじょうの大きさ	07 大
59 さじょう（果肉）の色	02 黄白
60 果汁の多少	07 多
61 甘味	06 やや高
62 苦味の有無	09 有
63 酸味	02 かなり低
64 香気の多少	05 中
65 香気の種類	(土佐文旦)
66 種子数	02 かなり少
67 胚の色	01 白
68 胚の数	01 単胚

Citrus L.
ボナルーナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 発芽期	05 中
70 開花期	05 中
71 成熟期	06 やや晩
72 隔年結果性	
73 着色の難易	
74 後期落果の多少	
75 その他の生理障害	
76 貯蔵性	
77 果実の耐寒性	
78 樹体の耐寒性	
79 かいよう病抵抗性	
80 そうか病抵抗性	
81 こくてん病抵抗性	
82 ヤノ肋イガラムシ抵抗性	
83 接ぎ木の難易(台木用品種に限る)	
84 実生のそろい(台木用品種に限る)	
85 栄養繁殖の難易(台木用品種に限る)	

Citrus L.
ボナルーナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 接ぎ木後の樹勢(台木用品種に限る) 87 台木の根の発育(台木用品種に限る) 88 耐湿性(台木用品種に限る) 89 耐干性(台木用品種に限る)	

1 品種登録の番号及び年月日 第29572号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ライトピンクビルマニア

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さは長、茎の太さは太、茎の横断面の形は角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の巻きは反曲が極強、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は円形、がくの長さはやや長、がくの幅はやや広、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花弁の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さはやや高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は多、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは中、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は69A、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ライトピンクビルマニア」は、対照品種「セレネ」と比較して、花弁の切れ込みの深さが中であること、子房の下部の色が白系であること等で区別性が認められる。対照品種「BRESA14305」と比較して、節間の長さが長であること、花弁の主な色が69Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Selecta Cut Flowers S.A.

Av Beniamino Farina, 135, 1, Mercat Flor I Planta, Vilassar de Mar, CP 08340, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Massimo Baratta

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ビルマニア」の変異株である。

Dianthus caryophyllus L.
 ライトピンクビルマニア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	07 長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	03 角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	05 反曲が極強
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
 ライトピンクビルマニア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	02 円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
 ライトピンクビルマニア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	03 多
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	05 中
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 69A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
 ライトピンクビルマニア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 7 3 号 令和 5 年 3 月 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ユカリチェリー

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、節間の長さは長、茎の太さは太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは強い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は円形、がくの長さは長、がくの幅はやや広、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花弁の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さは高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ 3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は中、花弁の縁の形は鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は NN155C、花弁の二次色は 63B、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は中、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「ユカリチェリー」は、対照品種「Bresf17179」と比較して、ほう葉の外裂片のがくに対する密着度が離れるであること、ほう葉の内裂片の先端の長さが中であること、花弁の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Selecta Cut Flowers S.A.

Av Beniamino Farina, 135, 1, Mercat Flor I Planta, Vilassar de Mar, CP
08340, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Massimo Baratta

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 1 1 月 2 2 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ユカリ」の変異株である。

Dianthus caryophyllus L.
ユカリチェリー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	07 長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	04 強い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
ユカリチェリー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	02 円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	03 中
29 がくの長さ	07 長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
ユカリチェリー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	02 やや鋭尖
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	07 高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	04 鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 63B

Dianthus caryophyllus L.
ユカリチェリー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	03 中
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29574号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ミニティアラエメラルド

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は5、節間の長さはやや短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅は極狭、葉の巻きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さはやや短、がくの幅はやや狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ7、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形はとげ状鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はかなり狭、花卉の主な色は1C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミニティアラエメラルド」は、対照品種「ミニティアラサニー」と比較して、葉の巻きが弱い反曲であること、花卉のぼかしの大きさが無であること等で区別性が認められる。対照品種「シャギーイエロー」と比較して、がくの裂片の長さがやや長であること、花卉の主な形がタイプ7であること、花卉の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町四丁目1番10号
農事組合法人香花園
香川県高松市塩江町安原下1-558
農事組合法人綾川花卉園生産組合
香川県綾歌郡綾川町東分乙271-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

真鍋佳亮 瀬尾龍右 森健人

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
ミニティアラエメラルド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	01 無又は極少
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	04 やや短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
ミニティアラエメラルド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	01 平又はわずかに凸
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	04 やや短
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
ミニティアラエメラルド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	06 やや長
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	07 タイプ 7
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	03 とげ状鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	02 かなり狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 1C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
ミニティアラエメラルド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	04 長楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29575号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ミニティアラスピネル

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや短、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は4、節間の長さは中、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅は極狭、葉の卷きは反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は小、花卉の数（八重品種に限る。）は少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ7、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はかなり狭、花卉の主な色は52A、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミニティアラスピネル」は、対照品種「ミニティアラコーラルピンク」と比較して、花卉の数（八重品種に限る。）が少であること、花卉の主な色が52Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ヒルステルルビー」と比較して、茎の長さがやや短であること、花卉の覆輪部の幅が無であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町四丁目1番10号
農事組合法人香花園
香川県高松市塩江町安原下1-558
農事組合法人綾川花卉園生産組合
香川県綾歌郡綾川町東分乙271-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

真鍋佳亮 瀬尾龍右 森健人

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
ミニティアラスピネル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	04 やや短
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	05 中
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	01 4
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	03 反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
ミニティアラスピネル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	01 平又はわずかに凸
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
ミニティアラスピネル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	02 やや鋭尖
36 がくの裂片の長さ	05 中
37 花型	02 八重
38 花の直径	03 小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	07 タイプ 7
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	02 かなり狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 52A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
ミニティアラスピネル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	02 黄系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29576号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. アイラ

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は6、節間の長さはやや短、茎の太さはやや太、茎の横断面の形は円形、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は25D、花卉の二次色は10C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは大、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アイラ」は、対照品種「BARSALADA」と比較して、節間の長さがやや短であること、子房の下部の色が白系であること等で区別性が認められる。対照品種「カミリー」と比較して、花卉の三次色の模様が無であること、柱頭の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金丸直明

7 出願公表の年月日 平成30年12月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
アイラ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29576号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	07 多
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	03 6
09 節間の長さ	04 やや短
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	01 円形
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
アイラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つばみの形	05 倒卵形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.

アイラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 25D
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 10C

Dianthus caryophyllus L.
アイラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	04 大
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29577号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. クレーヌ

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は6、節間の長さは中、茎の太さはやや太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さは中、がくの幅はやや狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さは低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花卉の主な形はタイプ1、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さは極浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅は狭、花卉の主な色は1C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クレーヌ」は、対照品種「ソリア」と比較して、花卉の切れ込みの深さが極浅であること、開花期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「マリル」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、花卉の主な形がタイプ1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金丸直明

7 出願公表の年月日 平成30年12月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
クレース

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	07 多
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	03 6
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
クレース

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	03 かなり凸
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
クレース

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	02 鈍鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	03 狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 1C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
クレース

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	04 黄
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29578号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. VIL18C09

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さは長、茎の太さは中、茎の横断面の形は角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅はかなり狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は円形、がくの長さはやや長、がくの幅は中、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は大、花弁の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さはやや高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は多、花弁の縁の形は鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや深、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は55C、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VIL18C09」は、対照品種「KLEDS07504」と比較して、花弁の切れ込みの深さがやや深であること、柱頭の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクモンテズマ」と比較して、花弁の切れ込みの深さがやや深であること、花柱の肩の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Selecta Cut Flowers S.A.

Av Beniamino Farina, 135, 1, Mercat Flor I Planta, Vilassar de Mar, CP 08340, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Massimo Baratta

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Danzica」に「Mafalda」を交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
VIL18C09

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	07 長
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	03 角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
VIL18C09

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	02 円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
VIL18C09

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	05 中
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	03 多
46 花弁の縁の形	04 鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	06 やや深
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 55C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
VIL18C09

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29579号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Brese19148

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、節間の長さはやや長、茎の太さは太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の卷きは強い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さは長、がくの幅は中、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花卉の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ4、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さは浅、花卉の長さはやや長、花卉の幅はやや広、花卉の主な色はN57A、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Brese19148」は、対照品種「せとのみやび」と比較して、花冠の高さがやや高であること、花卉の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「BREZ12255」と比較して、花卉の数（八重品種に限る。）が中であること、子房の表面がやや肋状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Brese19148

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29579号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	04 強い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Brese19148

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	03 鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	07 長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Brese19148

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	02 やや鋭尖
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	04 タイプ 4
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート N57A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Brese19148

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	01 卵形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29580号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresf1923

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さは長、茎の太さは太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さは中、がくの幅はやや広、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は大、花卉の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さはやや高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さは極浅、花卉の長さはやや長、花卉の幅はやや広、花卉の主な色は42A、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや早である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresf1923」は、対照品種「ビヨン」と比較して、茎の太さが太であること、子房の表面が強い肋状であること、花柱の数が2．3．4．5本であること等で区別性が認められる。対照品種「クレン04255」と比較して、茎の太さが太であること、花柱の数が2．3．4．5本であること等で区別性が認められる。対照品種「パドリード」と比較して、葉の長さがやや長であること、花柱の数が2．3．4．5本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresf1923

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	07 長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresf1923

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	02 やや鋭尖
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresf1923

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	02 やや鋭尖
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 42A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresf1923

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	06 赤
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29581号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresf1953

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さは中、茎の太さはやや太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は卵形、がくの長さはやや長、がくの幅はやや広、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は大、花卉の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さは中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは強、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さはやや長、花卉の幅はやや広、花卉の主な色は65C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresf1953」は、対照品種「BRES16447」と比較して、茎の太さがやや太であること、葉の幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。対照品種「ミュ」と比較して、葉の横断面の形が弱い凹であること、花卉の波打ちが強であること等で区別性が認められる。対照品種「ナエマ」と比較して、つぼみの形が卵形であること、花柱の数が3～4本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresf1953

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresf1953

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29581号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	01 卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresf1953

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29581号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	05 中
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	03 強
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	02 鈍鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 65C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresf1953

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29581号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	01 卵形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29582号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresg191091

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、節間の長さはやや長、茎の太さはやや太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さはやや長、がくの幅はやや広、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は大、花卉の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さはやや高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は中、花卉の縁の形は鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、花卉の長さはやや長、花卉の幅はやや広、花卉の主な色は42A、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresg191091」は、対照品種「BAROSBORNE」と比較して、葉の卷きが弱い反曲であること、花柱の数が2～3本であること、開花期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「BREZ15153」と比較して、子房の表面が平滑であること、花柱の数が2～3本であること、開花期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「カイザー」と比較して、葉の卷きが弱い反曲であること、つぼみの形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl91091

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl91091

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl91091

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29582号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	04 鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 42A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresg191091

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	05 桃
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29583号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresg19144

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、節間の長さはやや長、茎の太さは太、茎の横断面の形は角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さはやや長、がくの幅は中、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花弁の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さは中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花弁の主な形はタイプ1、花弁の波打ちは強、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は61B、花弁の二次色はNN155C、花弁の覆輪部の幅は狭、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは大、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresg19144」は、対照品種「モメンタム」と比較して、ほう葉の外裂片のがくに対する密着度が離れるであること、花弁の数（八重品種に限る。）がやや少であること、花弁の主な形がタイプ1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9144

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	03 角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9144

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9144

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	05 中
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	03 強
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 61B
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート NN155C

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9144

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	02 狭
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	04 大
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	01 卵形
60 子房の下部の色	02 黄系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29584号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresgl9295

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さは中、茎の太さはやや太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は凹、葉の色は暗緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は円形、がくの長さはやや長、がくの幅はやや広、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は大、花卉の数（八重品種に限る。）は多、花冠の高さは中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは強、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さはやや長、花卉の幅はやや広、花卉の主な色は154C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresgl9295」は、対照品種「BRESA16235」と比較して、葉の形が線形であること、花卉の主な色が154Cであること等で区別性が認められる。対照品種「アレッサンドリア」と比較して、葉の卷きが無又は反曲が極弱であること、花卉の主な色が154Cであること、花柱の数が3～4本であること等で区別性が認められる。対照品種「キロ」と比較して、ほう葉の外裂片のがくに対する密着度が離れるであること、がくの裂片の縦軸の形が内反であること、花卉の主な色が154Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9295

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	03 凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19295

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	02 円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9295

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	07 多
40 花冠の高さ	05 中
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	03 強
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	02 鈍鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 154C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9295

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	04 黄
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29585号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresg19442

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さはやや長、茎の太さは中、茎の横断面の形は円形、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は極狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さは長、がくの幅は中、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は大、花弁の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さは中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は中、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色はN79D、花弁の二次色は58C、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは中、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresg19442」は、対照品種「PURPLE SKY」と比較して、花弁の数（八重品種に限る。）がやや少であること、花弁の主な色がN79Dであること等で区別性が認められる。対照品種「モメンタム」と比較して、花弁の数（八重品種に限る。）がやや少であること、花弁の二次色が58Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9442

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	01 円形
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19442

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	07 長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9442

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	05 中
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート N79D
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 58C

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19442

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	03 中
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29586号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresgl9445

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、節間の長さは中、茎の太さはやや太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の卷きは反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は円形、がくの長さは長、がくの幅は中、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は弱、がくのアントシアニン着色の分布は裂片の周縁、花型は八重、花の直径は大、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ1、花弁の波打ちは無又は弱、花弁の縁の切れ込みの多少は中、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は58B、花弁の二次色は79C、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは大、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresgl9445」は、対照品種「Bresgl9442」と比較して、茎の長さがやや長であること、花柱の肩の有無が無であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒロ ジュリエットローズ」と比較して、花弁のぼかしの大きさが大であること、花柱の数が3～4本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9445

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	03 反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19445

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	02 円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	07 長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	02 弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	01 裂片の周縁

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19445

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 58B
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 79C

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19445

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	04 大
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29587号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresg19451

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さは長、茎の太さは中、茎の横断面の形は円形、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は極狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さは長、がくの幅は中、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花弁の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さは高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ1、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は58B、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresg19451」は、対照品種「マンダレイ」と比較して、がくの形が鐘形であること、花弁の主な形がタイプ1であること、柱頭の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「BREZ12255」と比較して、花弁の切れ込みの深さがかなり浅であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9451

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	07 長
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	01 円形
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19451

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	07 長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9451

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	07 高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 58B
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19451

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	01 卵形
60 子房の下部の色	02 黄系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	05 4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29588号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresg19486

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さはやや短、茎の太さは太、茎の横断面の形は角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の巻きは反曲が極強、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は円形、がくの長さは長、がくの幅はかなり広、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は極大、花卉の数（八重品種に限る。）は極多、花冠の高さはかなり高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ1、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さはやや長、花卉の幅はやや広、花卉の主な色は145C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresg19486」は、対照品種「ブレーサ」と比較して、葉の巻きが反曲が極強であること、花卉の主な色が145Cであること等で区別性が認められる。対照品種「レディグリン」と比較して、花卉の数（八重品種に限る。）が極多であること、花卉の切れ込みの深さがかなり浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19486

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	04 やや短
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	03 角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	04 やや狭
16 葉の巻き	05 反曲が極強
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19486

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	02 円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	07 長
30 がくの幅	08 かなり広
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19486

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	09 極大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	09 極多
40 花冠の高さ	08 かなり高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 145C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19486

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	01 卵形
60 子房の下部の色	02 黄系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	07 晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29589号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresgl9567

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は6、節間の長さは中、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は全縁、花卉の切れ込みの深さは極浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は150D、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresgl9567」は、対照品種「グリーンティー」と比較して、花卉の数（八重品種に限る。）が中であること、子房の表面が強い肋状であること等で区別性が認められる。対照品種「カーネアイチ8号」と比較して、花冠下部の側面の形が凹であること、子房の表面が強い肋状であること等で区別性が認められる。対照品種「Bresf171515」と比較して、葉の巻きが弱い反曲であること、子房の表面が強い肋状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19567

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	03 少
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	03 6
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19567

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19567

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	06 全縁
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 150D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19567

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	02 黄系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29590号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresgl9586

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は6より多い、節間の長さはやや長、茎の太さはやや太、茎の横断面の形は円形、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の巻きは反曲が極強、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は直、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さは低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花卉の主な形はタイプ1、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は波状、花卉の切れ込みの深さは極浅、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は29A、花卉の二次色は4B、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは大、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresgl9586」は、対照品種「ダークレンジ」と比較して、茎の長さが長であること、葉の巻きが反曲が極強であること、花卉の主な色が29Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ロブスター」と比較して、葉の巻きが反曲が極強であること、花卉の主な色が29Aであること、柱頭の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「カミリー」と比較して、葉の巻きが反曲が極強であること、花卉の二次色が4Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19586

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	07 長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	07 多
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	04 6 より多い
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	01 円形
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	05 反曲が極強
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19586

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	03 かなり凸
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19586

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 29A
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 4B

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19586

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	04 大
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29591号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresgl19756

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は5、節間の長さは中、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅は極狭、葉の巻きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は直、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ1、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さは浅、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は1C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresgl19756」は、対照品種「グアルンスイエロー」と比較して、葉の白粉の強弱が強であること、花柱の肩の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ソリア」と比較して、花柱の数が3～4本であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19756

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29591号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	03 少
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19756

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl9756

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 1C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresgl19756

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29591号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	04 黄
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29592号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bre17FB007

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや短、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は5、節間の長さはやや短、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは強い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は58C、花卉の二次色は69B、花卉の覆輪部の幅は広、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bre17FB007」は、対照品種「ナージャ」と比較して、茎の長さがやや短であること、葉の巻きが強い反曲であること等で区別性が認められる。対照品種「キスマーク」と比較して、節間の長さがやや短であること、葉の巻きが強い反曲であること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ブレアチ」の変異株である。

Dianthus caryophyllus L.
Bre17FB007

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29592号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	04 やや短
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	07 多
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	04 やや短
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	04 強い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bre17FB007

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つばみの形	05 倒卵形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bre17FB007

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 58C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 69B

Dianthus caryophyllus L.
Bre17FB007

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	04 広
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29593号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARFULJOY

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は6、節間の長さは中、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色はN57A、花卉の二次色はNN155C、花卉の覆輪部の幅は広、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARFULJOY」は、対照品種「キスマーク」と比較して、柱頭の色が桃であること、開花期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ナージャ」と比較して、ほう葉の外裂片の先端の長さが短であること、花柱の数が2本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
BARFULJOY

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	07 多
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	03 6
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
BARFULJOY

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート N57A
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート NN155C

Dianthus caryophyllus L.
BARFULJOY

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	04 広
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	05 桃
66 開花期	07 晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29594号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARTICEL

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、節間の長さはやや長、茎の太さは太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さはやや長、がくの幅はやや広、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は150C、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARTICEL」は、対照品種「BRESA13239」と比較して、花弁の主な色が150Cであること、花柱の肩の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「Bresg19295」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、花弁の数（八重品種に限る。）が中であること、花柱の肩の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
BARTICEL

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	02 やや鋭尖
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
BARTICEL

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	02 やや鋭尖
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 150C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
BARTICEL

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29595号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARGLACIRA

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は5、節間の長さは中、茎の太さは太、茎の横断面の形は角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の卷きは強い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花卉の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さは浅、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色はNN155D、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARGLACIRA」は、対照品種「WESACE」と比較して、葉の卷きが強い反曲であること、子房の形が長楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「バウンティ」と比較して、葉の卷きが強い反曲であること、花卉の数（八重品種に限る。）がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「ミルキーウェイ」と比較して、葉の卷きが強い反曲であること、花卉の縁の切れ込みの多少が無又は少であること、子房の表面がやや肋状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
BARGLACIRA

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29595号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	01 無
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	05 中
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	03 角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	04 強い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
BARGLACIRA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つぼみの形	05 倒卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
BARGLACIRA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
BARGLACIRA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	04 長楕円形
60 子房の下部の色	02 黄系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29596号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. DGALISM

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さはやや長、茎の太さは太、茎の横断面の形は円形、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の巻きは反曲が極強、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は円形、がくの長さは長、がくの幅は広、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花卉の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さは高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は中、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さは浅、花卉の長さはやや長、花卉の幅は広、花卉の主な色は52C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DGALISM」は、対照品種「KLEDS07504」と比較して、葉の巻きが反曲が極強であること、花卉の主な色が52Cであること等で区別性が認められる。対照品種「VIL18C09」と比較して、花卉の主な色が52Cであること、子房の表面が強い肋状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Azienda Agricola Di Giorgio Di Antonio & Renato Societa' Semplice
Via del Piano 143, Taggia (IM), CAP 18018, Italy

6 登録品種の育成をした者の氏名

Donato Di Giorgio

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29596号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	01 円形
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	05 反曲が極強
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	02 円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	07 長
30 がくの幅	07 広
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	02 やや鋭尖
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	07 高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	07 広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 52C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
DGALISM

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29597号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. SKアマン

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は広卵形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は円形、葉縁の形は鋭鋸歯、葉身の長さは長、葉身の幅は中、新葉表面の色は143A、成葉表面の色は137A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは長、葉柄の色はその他（褐）、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは長、花冠の向きは横向き、花冠の開き方はロート型、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色はN45C, 154D(中央部の地色)、単色・複色の別は三色、複色のタイプはバンド、縦条、花卉のバンド1の色は187B、花卉のバンド2の色は43B、花卉の縦条の地色は43B、花卉の縦条の色は155A、花卉の脈の明瞭さは明瞭（ピンク）、花卉のバンド1の幅はやや狭、花卉のバンド2の幅は広、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは弱、花卉の長さは中、花卉の幅は中、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは三色、ずい柱基部の色は53A、ずい柱先端の色は48D、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色は赤、花柱枝の毛は有

（赤）、柱頭の色は赤、花糸の長さは中、花糸の色はその他（ピンク）、やくの色は赤、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は144A、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は144B、副がくの形は線状披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SKアマン」は、対照品種「STARRY WIND」と比較して、枝の色が褐であること、花卉の縦条の色が155Aであること、やくの色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「VOLCANO」と比較して、単色・複色の別が三色であること、花卉のバンド1の色が187Bであること、やくの色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

仙田錠司

愛知県丹羽郡大口町河北2丁目350

6 登録品種の育成をした者の氏名

仙田錠司

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「イエローユカリン」にγ線を照射して得られた変異株の中から選抜したものである。

Hibiscus L.
SKアマン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 立性
02 樹高	03 低木
03 樹皮の亀裂の形	03 線状
04 樹皮の色	01 灰
05 枝の粗密	05 中
06 枝の出方	03 上向き
07 枝の色	04 褐
08 枝の皮目	03 少
09 枝の毛	09 有（白）
10 葉全体の形	05 広卵形
11 葉先端の形	01 鋭尖形
12 葉基部の形	03 円形
13 葉縁の形	04 鋭鋸齒
14 異葉性	09 有
15 葉身の長さ	07 長
16 葉身の幅	05 中
17 葉の厚さ	05 中

Hibiscus L.
SKアマン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 新葉表面の色	RHSカラーチャート 143A
19 成葉表面の色	RHSカラーチャート 137A
20 新葉裏面の色	RHSカラーチャート 144A
21 成葉裏面の色	RHSカラーチャート 137D
22 斑の有無	01 無
23 斑のタイプ	
24 斑の色	
25 新葉表面の光沢	05 中
26 成葉表面の光沢	05 中
27 新葉裏面の光沢	03 弱
28 成葉裏面の光沢	03 弱
29 新葉表面の毛	09 有（白）
30 成葉表面の毛	09 有（白）
31 新葉裏面の毛	09 有（白）
32 成葉裏面の毛	09 有（白）
33 葉脈の形	03 掌状型
34 葉脈の凹凸	09 明瞭

Hibiscus L.
SKアマン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉柄の溝	01 溝無し
36 葉柄の太さ	05 中
37 葉柄の長さ	07 長
38 葉柄の色	09 その他（褐）
39 葉柄の毛	09 有（白）
40 托葉の形	01 線状披針形
41 托葉の宿存性	05 中
42 托葉の長さ	07 長
43 托葉の幅	05 中
44 托葉の色	03 緑、05 赤褐（緑、赤褐（表面基部））
45 花冠の向き	03 横向き
46 花冠の開き方	02 ロート型
47 花冠の型	01 一重咲き
48 花弁の重なり	07 重なる
49 花冠の長径	03 小
50 花冠の短径	
51 つばみの色	RHSカラーチャート N45C, 154D（中央部の地色）

Hibiscus L.
SKアマン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 単色・複色の別	03 三色
53 単色花の色	
54 複色のタイプ	01 バンド、02 縦条
55 花弁のバンド1の色	RHSカラーチャート 187B
56 花弁のバンド2の色	RHSカラーチャート 43B
57 花弁のバンド3の色	
58 花弁のバンド4の色	
59 花弁のバンド5の色	
60 花弁の縦条の地色	RHSカラーチャート 43B
61 花弁の縦条の色	RHSカラーチャート 155A
62 花弁のブロッチの地色	
63 花弁のブロッチの色	
64 花弁の脈の明瞭さ	09 明瞭（ピンク）
65 花弁のバンド1の幅	04 やや狭
66 花弁のバンド2の幅	07 広
67 花弁のバンド3の幅	
68 花弁のバンド4の幅	

Hibiscus L.
SKアマン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 花弁のバンド5の幅	
70 花弁全体の形	02 扇型
71 花弁先端の切れ込み	01 無
72 花弁縁のひだの多少	03 少
73 花弁基部の翼の有無	01 無
74 花弁のねじれ	03 弱
75 花弁の長さ	05 中
76 花弁の幅	05 中
77 花弁の数	03 少
78 花弁の光沢	01 無
79 ずい柱の弁化の有無	01 無
80 ずい柱のよじれ	01 無
81 ずい柱の曲り	01 無
82 ずい柱の下垂性	01 無
83 ずい柱の太さ	05 中
84 ずい柱の長さ	05 中
85 ずい柱の色のタイプ	03 三色

Hibiscus L.
SKアマン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 ずい柱基部の色	RHSカラーチャート 53A
87 ずい柱中間部の色	RHSカラーチャート 50B
88 ずい柱先端の色	RHSカラーチャート 48D
89 ずい柱先端裂片の数	01 5 裂
90 花柱枝の開出	02 斜
91 花柱枝の長さ	05 中
92 花柱枝の色	03 赤
93 花柱枝の毛	09 有 (赤)
94 柱頭の色	03 赤
95 花糸の長さ	05 中
96 花糸のずい柱着生の位置	04 1/2
97 花糸の色	09 その他 (ピンク)
98 やくの色	03 赤
99 花柄上部の形態	01 直線
100 花柄上部の太さ	05 中
101 花柄上部の長さ	05 中
102 花柄上部の色	RHSカラーチャート 144A

Hibiscus L.
SKアマン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 花柄上部の毛	09 有（白）
104 花柄下部の形態	01 直線
105 花柄下部の太さ	05 中
106 花柄下部の長さ	07 長
107 花柄下部の色	RHSカラーチャート 144B
108 花柄下部の毛	09 有（白）
109 副がくの形	01 線状披針形
110 副がくの開放の方向	02 やや接着
111 副がくの長さ-1	05 中
112 副がくの長さ-2	05 中
113 副がくの幅	07 広
114 副がくの色	03 緑
115 副がくの毛	09 有（白）
116 がく筒の形	03 鐘形
117 がく筒の太さ	05 中
118 がく筒の長さ	05 中
119 がく筒の色	02 淡緑

SKアマン

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 9 7 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29598号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow 長野農工研B-4号 (カキノウコウケンB-4コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の成長最適温度は23℃、菌糸体の温度別成長量(30℃)はやや遅、菌さんの縦断面の形は丸山形、菌さんの直径は小、菌さんの高さは大、菌さんの直径／高さは大、菌さんの中央部の色は暗灰褐、菌さん周縁部の色は灰茶、菌さん表面の斑紋の大きさは大、菌さん表面の斑紋の分布は全体、菌さん表面の斑紋の明瞭度は明瞭、菌さんの硬さは中、ひだの並び方は直、ひだの密度は粗、ひだの色は白、菌柄の形は細長、菌柄の長さは中、菌さんの直径／菌柄の長さはやや大、菌柄の最大径はやや細、菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径は小、菌柄の色は黄白、菌柄の毛羽の有無は無、菌柄の硬さはやや硬、子実体の平均乾燥重量はやや重、発生処理までの期間はやや短、菌搔きから子実体収穫までの期間はやや短である。

出願品種「長野農工研B-4号」は、対照品種「長野農工研B-3号」と比較して、菌糸体の温度別成長量(15℃)がやや遅であること、菌さんの高さが大であること、菌さんの直径／高さが大であること、菌さんの直径／菌柄の長さがやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「大木0h-494」と比較して、菌さんの直径／高さが大であること、ひだの並び方が直であること、菌柄の長さが中であること、菌さんの直径／菌柄の長さがやや大であること、子実体の平均乾燥重量がやや重であること、発生処理までの期間がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般社団法人長野県農村工業研究所

長野県須坂市大字須坂787番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

立川俊良 城石雅弘 清水宏幸

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有株と「長野農工研B-3号」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌叢表面の着色の有無	01 無
02 菌叢裏面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の成長最適温度	04 23℃
04 菌糸体の温度別成長量 (10℃)	06 やや速
05 菌糸体の温度別成長量 (15℃)	04 やや遅
06 菌糸体の温度別成長量 (20℃)	05 中
07 菌糸体の温度別成長量 (25℃)	04 やや遅
08 菌糸体の温度別成長量 (30℃)	04 やや遅
09 菌さんの縦断面の形	03 丸山形
10 菌さんの直径	03 小
11 菌さんの高さ	07 大
12 菌さんの直径／高さ	07 大
13 菌さんの中央部の色	08 暗灰褐
14 菌さん周縁部の色	05 灰茶
15 菌さん表面の斑紋の大きさ	03 大
16 菌さん表面の斑紋の分布	02 全体
17 菌さん表面の斑紋の明瞭度	03 明瞭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 菌さんの硬さ	05 中
19 ひだの並び方	01 直
20 ひだの密度	01 粗
21 ひだの色	01 白
22 菌柄の形	01 細長
23 菌柄の長さ	05 中
24 菌さんの直径／菌柄の長さ	06 やや大
25 菌柄の最大径	04 やや細
26 菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径	03 小
27 菌柄の色	02 黄白
28 菌柄の毛羽の有無	01 無
29 菌柄の硬さ	06 やや硬
30 子実体の平均乾燥重量	06 やや重
31 発生処理までの期間	04 やや短
32 菌掻きから子実体収穫までの期間	04 やや短

1 品種登録の番号及び年月日 第29599号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel HIL200802

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈はかなり高、球根の形は球形、球根の大きさはやや大、葉身全体の形は線形、葉身長は長、葉身幅は極広、葉表面の色は緑、葉裏面の色は緑、斑の有無は無、花の向きは上向、花形は一重咲、花径は小、内花被片の開き方はかなり斜上、外花被片の開き方は斜上、内花被片の花色は67B、内花被片の花色変化の有無は無、内花被片の模様の有無は無、外花被片の花色は67B、外花被片の花色変化の有無は無、外花被片の模様の有無は無、内花被片全体の形は長楕円形、内花被片先端の形は鋭尖形、内花被片の縁の形は全縁、外花被片全体の形は長楕円形、外花被片先端の形は鈍形、外花被片の縁の形は全縁、内花被片の長さは長、内花被片の幅は狭、外花被片の長さは中、外花被片の幅はやや狭、花弁数は中、雄ずいの有無は有、花柄の長さはやや長、花柄の色は紫紅、花数はやや少、開花の早晩はかなり晩、開花期間はやや長である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「HIL200802」は、対照品種「紅千鳥」と比較して、葉身幅が極広であること、葉表面の毛が少であること、外花被片の開き方が斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Philip van Hilst
Bernsehoef 2, 5171 PJ, Kaatsheuvel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Philip van Hilst

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の品種名不詳の品種を集団交配し、選抜したものである。

Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel
HIL200802

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 直立性
02 草丈	08 かなり高
03 球根の形	01 球形
04 球根の大きさ	06 やや大
05 葉枚数	06 やや多
06 葉身全体の形	01 線形
07 葉身先端の形	01 鋭形
08 葉身長	07 長
09 葉身幅	09 極広
10 葉表面の色	02 緑
11 葉裏面の色	02 緑
12 斑の有無	01 無
13 斑のパターン	
14 斑色	
15 葉表面の毛	03 少
16 葉裏面の毛	03 少
17 花の向き	01 上向

Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel
HIL200802

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花形	01 一重咲
19 花径	03 小
20 内花被片の開き方	02 かなり斜上
21 外花被片の開き方	03 斜上
22 内花被片の花色	RHSカラーチャート 67B
23 内花被片の花色変化の有無	01 無
24 内花被片の開花後期の色	
25 内花被片の模様の有無	01 無
26 内花被片の模様の種類数	
27 内花被片の1次模様のタイプ	
28 内花被片の2次模様のタイプ	
29 内花被片の1次模様の色	
30 内花被片の2次模様の色	
31 外花被片の花色	RHSカラーチャート 67B
32 外花被片の花色変化の有無	01 無
33 外花被片の開花後期の色	
34 外花被片の模様の有無	01 無

Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel
HIL200802

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 外花被片の模様の種類数	
36 外花被片の1次模様のタイプ	
37 外花被片の2次模様のタイプ	
38 外花被片の1次模様の色	
39 外花被片の2次模様の色	
40 内花被片全体の形	02 長楕円形
41 内花被片先端の形	01 鋭尖形
42 内花被片の縁の形	01 全縁
43 内花被片のねじれ	01 無
44 外花被片全体の形	02 長楕円形
45 外花被片先端の形	03 鈍形
46 外花被片の縁の形	01 全縁
47 外花被片のねじれ	01 無
48 内花被片の長さ	07 長
49 内花被片の幅	03 狭
50 外花被片の長さ	05 中
51 外花被片の幅	04 やや狭

Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel
HIL200802

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁数	05 中
53 雄ずいの有無	09 有
54 花柄の太さ	05 中
55 花柄の長さ	06 やや長
56 花柄の硬さ	05 中
57 花柄の色	04 紫紅
58 花柄の毛	05 中
59 花柄の花数	05 中
60 花数	04 やや少
61 花の香り	01 無
62 開花の早晩	08 かなり晩
63 開花期間	06 やや長
64 繁殖性	04 やや少
65 耐寒性	
66 耐暑性	
67 病害抵抗性	
68 虫害抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29600号 令和5年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel ムーラン ルージュ

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈は中、球根の形は楕円形、球根の大きさは大、葉身全体の形は線形、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、葉表面の色は緑、葉裏面の色は緑、斑の有無は無、花の向きは上向、花形は一重咲、花径はやや小、内花被片の開き方は斜上、外花被片の開き方は水平、内花被片の花色は67B、内花被片の花色変化の有無は無、内花被片の模様の有無は無、外花被片の花色は67B、外花被片の花色変化の有無は無、外花被片の模様の有無は無、内花被片全体の形は長楕円形、内花被片先端の形は鈍形、内花被片の縁の形は全縁、外花被片全体の形は長楕円形、外花被片先端の形は鈍形、外花被片の縁の形は全縁、内花被片の長さは中、内花被片の幅は狭、外花被片の長さは中、外花被片の幅はやや狭、花弁数は中、雄ずいの有無は有、花柄の長さはやや短、花柄の色は淡紅、花数はやや少、開花の早晩はやや早、開花期間は長である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ムーラン ルージュ」は、対照品種「シェリーローズ」と比較して、葉身幅がやや広であること、外花被片の開き方が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浅井崇紀
兵庫県養父市中瀬983-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅井崇紀

7 出願公表の年月日 平成30年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ヘプロンファームピンク」の変異株である。

Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel
ムーラン ルージュ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 直立性
02 草丈	05 中
03 球根の形	02 楕円形
04 球根の大きさ	07 大
05 葉枚数	05 中
06 葉身全体の形	01 線形
07 葉身先端の形	01 鋭形
08 葉身長	06 やや長
09 葉身幅	06 やや広
10 葉表面の色	02 緑
11 葉裏面の色	02 緑
12 斑の有無	01 無
13 斑のパターン	
14 斑色	
15 葉表面の毛	05 中
16 葉裏面の毛	05 中
17 花の向き	01 上向

Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel
ムーラン ルージュ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花形	01 一重咲
19 花径	04 やや小
20 内花被片の開き方	03 斜上
21 外花被片の開き方	05 水平
22 内花被片の花色	RHSカラーチャート 67B
23 内花被片の花色変化の有無	01 無
24 内花被片の開花後期の色	
25 内花被片の模様の有無	01 無
26 内花被片の模様の種類数	
27 内花被片の1次模様のタイプ	
28 内花被片の2次模様のタイプ	
29 内花被片の1次模様の色	
30 内花被片の2次模様の色	
31 外花被片の花色	RHSカラーチャート 67B
32 外花被片の花色変化の有無	01 無
33 外花被片の開花後期の色	
34 外花被片の模様の有無	01 無

Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel
ムーラン ルージュ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 外花被片の模様の種類数	
36 外花被片の1次模様のタイプ	
37 外花被片の2次模様のタイプ	
38 外花被片の1次模様の色	
39 外花被片の2次模様の色	
40 内花被片全体の形	02 長楕円形
41 内花被片先端の形	03 鈍形
42 内花被片の縁の形	01 全縁
43 内花被片のねじれ	01 無
44 外花被片全体の形	02 長楕円形
45 外花被片先端の形	03 鈍形
46 外花被片の縁の形	01 全縁
47 外花被片のねじれ	01 無
48 内花被片の長さ	05 中
49 内花被片の幅	03 狭
50 外花被片の長さ	05 中
51 外花被片の幅	04 やや狭

Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel
ムーラン ルージュ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29600号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁数	05 中
53 雄ずいの有無	09 有
54 花柄の太さ	06 やや太
55 花柄の長さ	04 やや短
56 花柄の硬さ	05 中
57 花柄の色	03 淡紅
58 花柄の毛	05 中
59 花柄の花数	05 中
60 花数	04 やや少
61 花の香り	01 無
62 開花の早晩	04 やや早
63 開花期間	07 長
64 繁殖性	04 やや少
65 耐寒性	
66 耐暑性	
67 病害抵抗性	
68 虫害抵抗性	