

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 0 1 号 令和 5 年 4 月 6 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. カチホマレ

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや直立、葉色はやや濃緑、葉形は披針、葉長は長、葉身の大きさはやや小、葉柄長はやや長、葉数は多、葉面縮は中、根形は短円錐～円錐、根長はやや短、根周はやや大、露肩は中、クラウンの大小は中、肉質は中、トップ重は中、根重は多、T/R比はやや低、根中糖分はやや高、糖量はかなり多、ナトリウムは低、カリウムはかなり低、可溶性窒素はかなり低、種子の胚数は単胚、倍数性は二倍体である。

出願品種「カチホマレ」は、対照品種「アマホマレ」と比較して、葉形が披針であること、倍数性が二倍体であること等で区別性が認められる。対照品種「北海みつぼし」と比較して、葉色はやや濃緑であること、カリウムがかなり低であること等で区別性が認められる。

- 4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
DLF Beet Seed ApS
Højbygaardvej 31, 4960 Holeby, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

松平洋明 田口和憲 岡崎和之 黒田洋輔 上田重文 高橋宙之 Rickard
Johnsson

- 7 出願公表の年月日 令和 2 年 9 月 2 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「JMS72」と「POLL-5015」を交配し、選抜したものである。

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.
カチホマレ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	04 やや直立
02 葉色	06 やや濃緑
03 葉形	03 披針
04 葉長	07 長
05 葉身の大きさ	04 やや小
06 葉柄長	06 やや長
07 葉柄の太さ	04 やや細
08 葉数	07 多
09 葉面縮	05 中
10 根形	02 短円錐～円錐
11 根長	04 やや短
12 根周	06 やや大
13 露肩	05 中
14 ク라운の大小	05 中
15 分岐根	03 少
16 皺の多少	04 やや少
17 肉質	05 中

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.
カチホマレ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 トップ重	05 中
19 根重	07 多
20 T／R比	04 やや低
21 根中糖分	06 やや高
22 糖量	08 かなり多
23 ナトリウム	03 低
24 カリウム	02 かなり低
25 可溶性窒素	02 かなり低
26 種子の胚数	03 単胚
27 胚軸の赤色個体	04 やや少
28 倍数性	02 二倍体
29 熟期	
30 抽だい性	
31 褐斑病抵抗性	
32 根腐病抵抗性	
33 葉腐病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29602号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch アダム

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はかなり少、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱はやや強、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は心形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は中、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は46B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）はN45C、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アダム」は、対照品種「クリスマスキャンドル」と比較して、葉身の基部の形が心形であること、ほうの主脈の巻き込みの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「MRS1」と比較して、葉身の基部の形が心形であること、ほうの数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山下晴義
熊本県玉名市玉名4561番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山下晴義

7 出願公表の年月日 令和3年2月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「クリスマスキャンドル」の変異株である。

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

アダム

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29602号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 分枝の有無	09 有
02 分枝の数	02 かなり少
03 樹高	04 やや低
04 樹の幅	05 中
05 茎の中間部の緑色の濃淡	03 淡
06 茎の中間部のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
07 茎上部のアントシアニン着色の強弱	02 中
08 葉身の長さ	06 やや長
09 葉身の幅	06 やや広
10 葉身の形	02 卵形
11 葉身の基部の形	04 心形
12 葉身の表面の色数	01 1色
13 葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）	07 濃
14 葉身の主な色（複色葉品種に限る。）	
15 葉身の二次色（複色葉品種に限る。）	
16 葉身の三次色（複色葉品種に限る。）	
17 葉身の表面の主脈の色	02 帯赤

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
アダム

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の切れ込みの数	02 中
19 葉身の切れ込みの深さ	03 浅
20 葉身の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
21 葉柄の長さ	01 極短
22 葉柄の表面の緑色の濃淡	01 極淡
23 葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱	07 強
24 葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱	03 強
25 部分着色葉の数	03 少
26 完全着色葉の数	04 やや少
27 着色葉の切れ込みの強弱	02 中
28 完全着色葉の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
29 ほうの数	03 少
30 最大ほうの長さ（葉柄を含む。）	04 やや短
31 最大ほうの幅	05 中
32 最大ほうの形	02 楕円形
33 ほうの表面の色数	01 1色
34 ほうの表面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 46B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）	
36 ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
37 ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
38 ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
39 ほうの表面の斑点の強弱	01 無又は極弱
40 ほうの表面の斑点の色	
41 ほうの裏面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート N45C
42 ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
43 ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
44 ほうの裏面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
45 ほうの裏面の斑点の色(斑点模様のある品種に限る。)	
46 ほうの主脈の巻き込みの有無	01 無
47 ほうのねじれの有無	01 無
48 ほうの葉脈間の縮れの強弱	03 弱
49 集散花序の幅	04 やや狭
50 蜜腺の大きさ	06 やや大
51 蜜腺の色	01 黄

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

アダム

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 6 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 蜜線の変形の有無 53 開花の早晩	01 無
	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第29603号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 佐大H01号 (サダ H01ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数はやや少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は白、茎の長さは中、茎の節数は中、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは中、裂きょうの難易は中、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）はやや大、子実の形は偏球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期は中、成熟期は中、生態型は秋大豆型である。

出願品種「佐大H01号」は、対照品種「フクユタカ」と比較して、子実の形が偏球であること、子実のへその色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「むらゆたか」と比較して、さやの数が中であること、開花始期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「サチユタカ」と比較して、熟さやの色の濃淡が淡であること、開花始期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人佐賀大学
佐賀県佐賀市本庄町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

穴井 豊昭 渡邊啓史

7 出願公表の年月日 平成30年11月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Bay」にX線照射及びEMS処理し、「フクユタカ」及び「むらゆたか」を交配して選抜した系統に「むらゆたか」を交配し、選抜したものである。

Glycine max (L.) Merr.

佐大H01号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	05 中
03 伸育型	01 有限
04 分枝の数	04 やや少
05 草姿	02 直立～斜上
06 茎の毛じの色	01 白
07 茎の長さ	05 中
08 茎の節数	05 中
09 葉の表面の凹凸の強弱	05 中
10 小葉の数	01 3枚葉
11 側小葉の形	03 鋭先卵形
12 側小葉の大きさ	05 中
13 葉の緑色の濃淡	05 中
14 花の色	02 紫
15 最下着きょう節位の高さ	05 中
16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）	
17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）	

Glycine max (L.) Merr.

佐大H01号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）	
19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）	
20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）	
21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）	
22 さやの数	05 中
23 裂きょうの難易	05 中
24 熟さやの色の濃淡	03 淡
25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）	06 やや大
26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）	
27 子実の形	02 偏球
28 種皮の色数	01 1色
29 種皮の地色	01 黄白
30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	
32 子実のへその色	02 黄
33 胎座残の色	01 種皮と同じ
34 子実の子葉の色	01 黄

Glycine max (L.) Merr.

佐大H01号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 開花始期	05 中
36 成熟期	05 中
37 生態型	03 秋大豆型
38 粗タンパク含有率	
39 7Sタンパク質サブユニットの有無	
40 リボキシゲナーゼアイソザイムの有無	
41 ヘソ周辺の着色抵抗性	
42 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A系統)	
43 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A2系統)	
44 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (B系統)	
45 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (C系統)	
46 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (D系統)	
47 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (E系統)	
48 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース1)	
49 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース3)	
50 ハスモンヨトウ抵抗性 (抗生性)	
51 ハスモンヨトウ抵抗性 (非選好性)	

1 品種登録の番号及び年月日 第29604号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 黒招福 (クロショウフク)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数は中、茎の毛じの色は褐、茎の長さはやや短、茎の節数は中、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは中、裂きょうの難易はやや難、熟さやの色の濃淡は濃、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）はかなり大、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黒、子実のへその色は黒、開花始期はやや晩、成熟期はやや晩、生態型は秋大豆型、粗タンパク含有率は中である。

出願品種「黒招福」は、対照品種「クロダマル」と比較して、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）がかなり大であること、成熟期はやや晩であること、ハスモンヨトウ抵抗性（抗生性）がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「フクユタカ」と比較して、茎の長さがやや短であること、種皮の地色が黒であること、子実のへその色が黒であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

大木 信彦 高橋 将一 小松 邦彦 高橋 幹 中澤 芳則 河野 雄飛 松永 亮一

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Co1愛媛1983宇都宮31」に「タチナガハ」を交配し、選抜したものである。

Glycine max (L.) Merr.

黒招福

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	05 中
03 伸育型	01 有限
04 分枝の数	05 中
05 草姿	
06 茎の毛じの色	02 褐
07 茎の長さ	04 やや短
08 茎の節数	05 中
09 葉の表面の凹凸の強弱	
10 小葉の数	01 3枚葉
11 側小葉の形	03 鋭先卵形
12 側小葉の大きさ	
13 葉の緑色の濃淡	
14 花の色	02 紫
15 最下着きょう節位の高さ	05 中
16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）	
17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）	

Glycine max (L.) Merr.

黒招福

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）	
19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）	
20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）	
21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）	
22 さやの数	
23 裂きょうの難易	06 やや難
24 熟さやの色の濃淡	07 濃
25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）	08 かなり大
26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）	
27 子実の形	01 球
28 種皮の色数	01 1色
29 種皮の地色	09 黒
30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	
32 子実のへその色	07 黒
33 胎座残の色	
34 子実の子葉の色	01 黄

Glycine max (L.) Merr.

黒招福

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 開花始期	06 やや晩
36 成熟期	06 やや晩
37 生態型	03 秋大豆型
38 粗タンパク含有率	05 中
39 7Sタンパク質サブユニットの有無	
40 リボキシゲナーゼアイソザイムの有無	
41 ヘソ周辺の着色抵抗性	
42 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A系統)	01 感受性 (モザイク)
43 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A2系統)	
44 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (B系統)	01 感受性 (モザイク)
45 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (C系統)	01 感受性 (モザイク)
46 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (D系統)	01 感受性 (モザイク)
47 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (E系統)	01 感受性 (モザイク)
48 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース1)	
49 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース3)	01 極弱
50 ハスモンヨトウ抵抗性 (抗生性)	06 やや強
51 ハスモンヨトウ抵抗性 (非選好性)	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第29605号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Humulus lupulus L. フラノ1401U号（フラノ1401Uコウ）

3 登録品種の特性の概要

主茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉身の大きさはやや小、葉身の表面の凹凸の強弱は中、葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）は中、開花期はやや早、草型は高性、草姿は円柱～棍棒状、植物体の上部の大きさはやや大、主茎中央部の側枝の長さの中、主茎上部の側枝の長さは短、主茎中央部の側枝の葉の密度はやや粗、主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数はやや多、主茎中央部の側枝の総きゅう果数は中、主茎上部の側枝の総きゅう果数は少、きゅう果の摘果期は中、きゅう果の大きさは大、きゅう果の形は卵形、きゅう果のほうの開く程度は閉じる、きゅう果の緑色の濃淡は中、ほうの大きさはやや大、ほうの幅／長さは中、外ほう先端の長さは中、 α 酸含量は多、 α 酸中のフムロン含量は極多、 α 酸中のコフムロン含量は少である。

出願品種「フラノ1401U号」は、対照品種「フラノ0901B号」と比較して、草姿が円柱～棍棒状であること、主茎上部の側枝の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「リトルスター」と比較して、主茎上部の側枝の長さが短であること、きゅう果の形が卵形であること、ほうの大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サッポロビール株式会社
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

鯉江弘一朗 上本允大 久慈正義 古川雄登 糸賀裕 後藤真伸 島岡克佳

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有株どうしを交配し、選抜したものである。

Humulus lupulus L.
フラノ1401U号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 主茎のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
02 葉身の大きさ	04 やや小
03 葉身の表面の凹凸の強弱	05 中
04 葉身の表面の色	03 緑
05 葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）	05 中
06 開花期	04 やや早
07 草型	02 高性
08 草姿	04 円柱～棍棒状
09 植物体の上部の大きさ	06 やや大
10 主茎中央部の側枝の長さ	05 中
11 主茎上部の側枝の長さ	03 短
12 主茎中央部の側枝の葉の密度	04 やや粗
13 主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数	06 やや多
14 主茎中央部の側枝の総きゅう果数	05 中
15 主茎上部の側枝の総きゅう果数	03 少
16 きゅう果の摘果期	05 中
17 きゅう果の大きさ	07 大

Humulus lupulus L.
フラノ1401U号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 きゅう果の形	03 卵形
19 きゅう果のほうの開く程度	01 閉じる
20 きゅう果の緑色の濃淡	05 中
21 ほうの大きさ	06 やや大
22 ほうの幅／長さ	05 中
23 外ほう先端の長さ	05 中
24 α 酸含量	07 多
25 β 酸／ α 酸	02 かなり小
26 α 酸中のフムロン含量	09 極多
27 α 酸中のコフムロン含量	03 少

1 品種登録の番号及び年月日 第29606号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Humulus lupulus L. フラノ1508B号（フラノ1508Bホウ）

3 登録品種の特性の概要

主茎のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の大きさはやや小、葉身の表面の凹凸の強弱は弱、葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）は中、開花期は中、草型は高性、草姿は円柱～棍棒状、植物体の上部の大きさは中、主茎中央部の側枝の長さはやや短、主茎上部の側枝の長さはやや短、主茎中央部の側枝の葉の密度は粗、主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数は中、主茎中央部の側枝の総きゅう果数は中、主茎上部の側枝の総きゅう果数はやや少、きゅう果の摘果期は中、きゅう果の大きさは中、きゅう果の形は卵形、きゅう果のほうの開く程度は閉じる、きゅう果の緑色の濃淡は中、ほうの大きさは中、ほうの幅／長さはやや大、外ほう先端の長さはやや短、 α 酸含量はかなり多、 α 酸中のフムロン含量は極多、 α 酸中のコフムロン含量は少である。

出願品種「フラノ1508B号」は、対照品種「フラノ1501U号」と比較して、きゅう果の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「フラノ0802D号」と比較して、主茎上部の側枝の長さがやや短であること、主茎中央部の側枝の葉の密度が粗であること、きゅう果の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サッポロビール株式会社
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

鯉江弘一朗 上本允大 久慈正義 古川雄登 糸賀裕 後藤真伸 島岡克佳

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有株どうしを交配し、選抜したものである。

Humulus lupulus L.
フラノ1508B号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 主茎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
02 葉身の大きさ	04 やや小
03 葉身の表面の凹凸の強弱	03 弱
04 葉身の表面の色	03 緑
05 葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）	05 中
06 開花期	05 中
07 草型	02 高性
08 草姿	04 円柱～棍棒状
09 植物体の上部の大きさ	05 中
10 主茎中央部の側枝の長さ	04 やや短
11 主茎上部の側枝の長さ	04 やや短
12 主茎中央部の側枝の葉の密度	03 粗
13 主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数	05 中
14 主茎中央部の側枝の総きゅう果数	05 中
15 主茎上部の側枝の総きゅう果数	04 やや少
16 きゅう果の摘果期	05 中
17 きゅう果の大きさ	05 中

Humulus lupulus L.
フラノ1508B号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 きゅう果の形	03 卵形
19 きゅう果のほうの開く程度	01 閉じる
20 きゅう果の緑色の濃淡	05 中
21 ほうの大きさ	05 中
22 ほうの幅／長さ	06 やや大
23 外ほう先端の長さ	04 やや短
24 α 酸含量	08 かなり多
25 β 酸／ α 酸	03 小
26 α 酸中のフムロン含量	09 極多
27 α 酸中のコフムロン含量	03 少

1 品種登録の番号及び年月日 第29607号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Humulus lupulus L. フラノ0414B号（フラノ0414Bホウ）

3 登録品種の特性の概要

主茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の大きさは中、葉身の表面の凹凸の強弱は中、葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）はやや濃、開花期はやや早、草型は高性、草姿は円柱状、植物体の上部の大きさは中、主茎中央部の側枝の長さはやや短、主茎上部の側枝の長さは中、主茎中央部の側枝の葉の密度は中、主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数はやや多、主茎中央部の側枝の総きゅう果数はやや多、主茎上部の側枝の総きゅう果数はやや多、きゅう果の摘果期はやや早、きゅう果の大きさは中、きゅう果の形は卵形、きゅう果のほうの開く程度はやや開く、きゅう果の緑色の濃淡はやや淡、ほうの大きさはやや小、ほうの幅／長さは中、外ほう先端の長さは短、 α 酸含量はやや多、 α 酸中のフムロン含量は極多、 α 酸中のコフムロン含量は少である。

出願品種「フラノ0414B号」は、対照品種「フラノスペシャル」と比較して、主茎上部の側枝の総きゅう果数がやや多であること、きゅう果の大きさが中であること、きゅう果の形が卵形であること、ほうの幅／長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「信州早生」と比較して、開花期がやや早であること、草姿が円柱状であること、植物体の上部の大きさが中であること、きゅう果の摘果期がやや早であること、外ほう先端の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サッポロビール株式会社
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久慈正義 糸賀裕 鯉江弘一朗 上本允大 古川雄登 後藤真伸 島岡克佳

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「リトルスター」に自社保有株を交配し、選抜したものである。

Humulus lupulus L.
フラノ0414B号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 主茎のアントシアニン着色の強弱	05 中
02 葉身の大きさ	05 中
03 葉身の表面の凹凸の強弱	05 中
04 葉身の表面の色	03 緑
05 葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）	06 やや濃
06 開花期	04 やや早
07 草型	02 高性
08 草姿	03 円柱状
09 植物体の上部の大きさ	05 中
10 主茎中央部の側枝の長さ	04 やや短
11 主茎上部の側枝の長さ	05 中
12 主茎中央部の側枝の葉の密度	05 中
13 主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数	06 やや多
14 主茎中央部の側枝の総きゅう果数	06 やや多
15 主茎上部の側枝の総きゅう果数	06 やや多
16 きゅう果の摘果期	04 やや早
17 きゅう果の大きさ	05 中

Humulus lupulus L.
フラノ0414B号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 きゅう果の形	03 卵形
19 きゅう果のほうの開く程度	02 やや開く
20 きゅう果の緑色の濃淡	04 やや淡
21 ほうの大きさ	04 やや小
22 ほうの幅／長さ	05 中
23 外ほう先端の長さ	03 短
24 α 酸含量	06 やや多
25 β 酸／ α 酸	05 中
26 α 酸中のフムロン含量	09 極多
27 α 酸中のコフムロン含量	03 少

1 品種登録の番号及び年月日 第29608号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Humulus lupulus L. フラノ0612B号（フラノ0612Bホウ）

3 登録品種の特性の概要

主茎のアントシアニン着色の強弱はやや強、葉身の大きさは大、葉身の表面の凹凸の強弱は強、葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）はやや濃、開花期はやや晩、草型は高性、草姿は円柱～棍棒状、植物体の上部の大きさは大、主茎中央部の側枝の長さはやや長、主茎上部の側枝の長さは中、主茎中央部の側枝の葉の密度は中、主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数は少、主茎中央部の側枝の総きゅう果数は少、主茎上部の側枝の総きゅう果数は中、きゅう果の摘果期はやや晩、きゅう果の大きさは大、きゅう果の形は狭卵形、きゅう果のほうの開く程度はやや開く、きゅう果の緑色の濃淡は中、ほうの大きさはやや大、ほうの幅／長さは大、外ほう先端の長さは短、 α 酸含量はかなり多、 α 酸中のフムロン含量はかなり多、 α 酸中のコフムロン含量はやや少である。

出願品種「フラノ0612B号」は、対照品種「フラノ0204A号」と比較して、主茎中央部の側枝の長さがやや長であること、主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数が少であること、主茎中央部の側枝の総きゅう果数が少であること、きゅう果の形が狭卵形であること、外ほう先端の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「フラノ0901B号」と比較して、草姿が円柱～棍棒状であること、植物体の上部の大きさが大であること、主茎中央部の側枝の長さがやや長であること、主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数が少であること、主茎中央部の側枝の総きゅう果数が少であること、きゅう果の形が狭卵形であること、外ほう先端の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サッポロビール株式会社
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久慈正義 糸賀裕 鯉江弘一朗 上本允大 古川雄登 後藤真伸 島岡克佳

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Chinook（4倍体）」に自社保有株を交配し、選抜したものである。

Humulus lupulus L.
フラノ0612B号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 主茎のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
02 葉身の大きさ	07 大
03 葉身の表面の凹凸の強弱	07 強
04 葉身の表面の色	03 緑
05 葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）	06 やや濃
06 開花期	06 やや晩
07 草型	02 高性
08 草姿	04 円柱～棍棒状
09 植物体の上部の大きさ	07 大
10 主茎中央部の側枝の長さ	06 やや長
11 主茎上部の側枝の長さ	05 中
12 主茎中央部の側枝の葉の密度	05 中
13 主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数	03 少
14 主茎中央部の側枝の総きゅう果数	03 少
15 主茎上部の側枝の総きゅう果数	05 中
16 きゅう果の摘果期	06 やや晩
17 きゅう果の大きさ	07 大

Humulus lupulus L.
フラノ0612B号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 きゅう果の形	02 狭卵形
19 きゅう果のほうの開く程度	02 やや開く
20 きゅう果の緑色の濃淡	05 中
21 ほうの大きさ	06 やや大
22 ほうの幅／長さ	07 大
23 外ほう先端の長さ	03 短
24 α 酸含量	08 かなり多
25 β 酸／ α 酸	02 かなり小
26 α 酸中のフムロン含量	08 かなり多
27 α 酸中のコフムロン含量	04 やや少

1 品種登録の番号及び年月日 第29609号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. つやきらり

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はやや早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや短、穂数は少、芒の有無は無、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや早、穎の色は黄白、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや小、玄米の長さはやや短、玄米の幅はやや広、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性はやや難、脱粒性は難、穂いもちほ場抵抗性はやや強、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、高温登熟性は中である。

出願品種「つやきらり」は、対照品種「きぬむすめ」と比較して、芒の有無が無であること、穂発芽性がやや難であること等で区別性が認められる。対照品種「おてんとそだち」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、芒の有無が無であること、高温登熟性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹内善信 田村克徳 片岡知守 中西愛 佐藤宏之 田村泰章 坂井真
梶亮太

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「西海258号」に「あきだわら」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
つやきらり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	
14 葉身の幅	
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
つやきらり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	04 やや早
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	05 中
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	04 やや短
31 穂数	03 少
32 芒の有無	01 無
33 初期の芒の色	
34 芒の分布	

Oryza sativa L.
つやきらり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	04 やや早
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	

Oryza sativa L.
つやきらり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	05 中
54 粳の長さ	04 やや短
55 粳の幅	06 やや広
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	04 やや短
60 玄米の幅	06 やや広
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	04 低崩壊～中間
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
つやきらり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	06 やや難
71 耐倒伏性	
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pii, Pik
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	06 やや強
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	04 やや弱
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	05 中
85 着粒密度	

1 品種登録の番号及び年月日 第29610号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. えみまる

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はかなり早、柱頭の色は白、稈の太さはやや細、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は全体、最長芒の長さは短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、玄米の千粒重は中、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は6型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は中、脱粒性は難、葉いもちほ場抵抗性はやや強、穂いもちほ場抵抗性はやや強である。

出願品種「えみまる」は、対照品種「ほしまる」と比較して、穂数の中であること、葉いもちほ場抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ななつぼし」と比較して、出穂期がかなり早であること、葉いもちほ場抵抗性がやや強であること、穂いもちほ場抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

平山裕治 木内均 西村努 道満剛平 前川利彦 佐藤博一 佐藤毅
沼尾吉則 品田博史 吉村徹 粕谷雅志 尾崎洋人 木下雅文 菅原彰
其田達也 小倉玲奈 林和希

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「緑系07216」に「上系06181」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
えみまる

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	02 鋭形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	05 中
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
えみまる

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	02 かなり早
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	04 やや細
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	05 中
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	05 中
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	05 全体

Oryza sativa L.
えみまる

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	02 短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	03 早
45 葉の枯れ上がりの時期	05 中
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	03 短

Oryza sativa L.
えみまる

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	06 やや大
54 粳の長さ	06 やや長
55 粳の幅	06 やや広
56 穎のフェノール反応の有無	
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	06 やや長
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	06 6 型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
えみまる

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	05 中
70 穂発芽性	
71 耐倒伏性	05 中
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pii
74 葉いもちほ場抵抗性	06 やや強
75 穂いもちほ場抵抗性	06 やや強
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	

1 品種登録の番号及び年月日 第29611号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. てんたかく81

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期はかなり早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや短、穂数はやや多、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性は難、耐倒伏性は中、脱粒性は難、高温登熟性は強、着粒密度は中である。

出願品種「てんたかく81」は、対照品種「ハナエチゼン」と比較して、高温登熟性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「てんたかく」と比較して、出穂期がかなり早であること、成熟期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「とがおとめ」と比較して、障害型耐冷性がやや強であること等で区別性が認められ

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

富山県
富山県富山市新総曲輪1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口琢也 表野元保 伊山幸秀 村岡裕一 木谷吉則 尾崎秀宣
藤田健司 池田博一 村田和優 森川真紀子 小島洋一朗 寶田研
向野尚幸 前田寛明

7 出願公表の年月日 平成31年4月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「てんたかく」に「コシヒカリ」を交配し、「てんたかく」を戻し交配したものである。

Oryza sativa L.
てんたかく81

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	
14 葉身の幅	
15 初期の止め葉の姿勢	03 半立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
てんたかく81

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	02 かなり早
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	05 中
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	04 やや短
31 穂数	06 やや多
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	01 先端のみ

Oryza sativa L.
てんたかく81

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	02 短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	02 かなり早
45 葉の枯れ上がりの時期	04 やや早
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
てんたかく81

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	05 中
54 粳の長さ	06 やや長
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
てんたかく81

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	06 やや強
70 穂発芽性	07 難
71 耐倒伏性	05 中
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	07 強
85 着粒密度	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第29612号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Petchoa J. M. H. Shaw SAKPXC026

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは極短、花型は一重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは弱、花の波打ちは弱、花の脈はやや弱、花の脈の色は黄（黄褐色）、花の主な色はN74C、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はNN155A、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は中、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色はNN74B、開花後期の花の主な色は75A、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈は弱、花筒の外面の主な色は8B、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPXC026」は、対照品種「SAKPET104」と比較して、花の主な色がN74Cであること、花筒の内面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「藤色小町」と比較して、花の脈がやや弱であること、花の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	06 やや高
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	01 極短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	02 弱

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	04 やや弱
20 花の脈の色	03 黄（黄褐色）
21 花の主な色	RHSカラーチャート N74C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155A
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	03 花冠裂片の癒合部に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN74B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 75A
29 花冠裂片の先端の形	04 切形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12A
32 花筒の内面の脈	03 弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 8B
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	02 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 1 3 号 令和 5 年 4 月 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. バリフロー パープル

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は有、葉の主な色は淡緑、がく片の長さは中、花型は一重、花の幅はやや広、花の切れ込みは中、花の波打ちは弱、花の脈は弱、花の脈の色は紫、花の主な色はNN74A、開花初期の花の主な色はN81B、開花後期の花の主な色はNN74A、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色はN80A、花筒の内面の脈は強、花筒の外面の主な色はN78D、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バリフロー パープル」は、対照品種「バリフロー チェリー」と比較して、花の主な色がNN74Aであること、開花初期の花の主な色がN81Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

須藤 雅和

7 出願公表の年月日 令和元年 1 1 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ウェーブ パープル」の斑入り個体を自殖し、選抜したものである。

Petunia Juss.
バリフロー パープル

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29613号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	09 有
09 葉の主な色	02 淡緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	02 弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	06 やや広
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
バリフロー パープル

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29613号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN74A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N81B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN74A
29 花冠裂片の先端の形	04 切形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート N80A
32 花筒の内面の脈	07 強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N78D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	05 青紫

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 1 4 号 令和 5 年 4 月 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX933

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは短、葉の長さは中、葉の形は卵形、葉の先端の形は鋭尖形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは中、花型は八重、花の粗密（八重品種に限る。）は中、花の幅は中、花の切れ込みは中、花の波打ちは弱、花の脈は中、花の脈の色は赤、花の主な色はN45C、開花初期の花の主な色はN45A、開花後期の花の主な色は53C、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は185D、花筒の内面の脈は強、花筒の外面の主な色は156Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX933」は、対照品種「TX680」と比較して、花の脈が中であること、開花後期の花の主な色が53Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 令和元年 1 0 月 2 8 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
TX933

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	01 鋭尖形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	04 長
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	02 中
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
TX933

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	05 中
20 花の脈の色	05 赤
21 花の主な色	RHSカラーチャート N45C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N45A
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 53C
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 185D
32 花筒の内面の脈	07 強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 156A
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第29615号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. MIPEHQ407

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は高、茎の長さは中、葉の長さは中、葉の形は卵形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は濃緑、がく片の長さは極短、花型は八重、花の粗密（八重品種に限る。）は密、花の幅はやや狭、花の切れ込みは強、花の波打ちは中、花の脈は無又は極弱、花の主な色はNN155D、花の二次色（二次色のある品種に限る。）は72A、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は花冠裂片の癒合部に沿う、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は小、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色はNN155D、開花後期の花の主な色はNN155D、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は150D、花筒の内面の脈はかなり弱、花筒の外面の主な色は145Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MIPEHQ407」は、対照品種「HBPM1」と比較して、花の脈が無又は極弱であること、花の主な色がNN155Dであること、花筒の内面の脈はかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「花舞姫」と比較して、花の主な色がNN155Dであること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）が72Aであること等で区別性が認められ

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大同原野 大屋寛高

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統に育成系統を交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
MIPEHQ407

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	07 高
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	04 濃緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	02 弱
12 がく片の長さ	01 極短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	04 強

Petunia Juss.
MIPEHQ407

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	03 中
19 花の脈	01 無又は極弱
20 花の脈の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 72A
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	03 花冠裂片の癒合部に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 150D
32 花筒の内面の脈	02 かなり弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 145D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 1 6 号 令和 5 年 4 月 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. HBPMR2

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は低、茎の長さはかなり短、葉の長さはやや短、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは短、花型は八重、花の粗密（八重品種に限る。）は密、花の幅は中、花の切れ込みは極強、花の波打ちは弱、花の脈は中、花の脈の色は赤、花の主な色は52B、開花初期の花の主な色は50B、開花後期の花の主な色は54C、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は150D、花筒の内面の脈はかなり強、花筒の外面の主な色は145Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HBPMR2」は、対照品種「TX680」と比較して、花の脈が中であること、花の主な色が52Bであること、花筒の内面の主な色が150Dであること等で区別性が認められる。対照品種「デュオ サーモン」と比較して、花の脈が中であること、花筒の内面の脈がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川上竜一

埼玉県吉川市栄町1568-1 グラス・アビタシオンⅢ201

6 登録品種の育成をした者の氏名

川上竜一

7 出願公表の年月日 令和元年 1 1 月 5 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ホイップマカロン モカモンブラン」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29616号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	02 かなり短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	05 極強

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29616号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	05 中
20 花の脈の色	05 赤
21 花の主な色	RHSカラーチャート 52B
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 50B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 54C
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 150D
32 花筒の内面の脈	08 かなり強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 145C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 1 7 号 令和 5 年 4 月 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. HBPMP3

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さはかなり短、葉の長さはやや短、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは短、花型は八重、花の粗密（八重品種に限る。）は密、花の幅は中、花の切れ込みは極強、花の波打ちは中、花の脈は中、花の脈の色は赤、花の主な色は55B、花の二次色（二次色のある品種に限る。）は55D、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は花冠裂片の癒合部に沿う、縁部、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は小、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色は54B、開花後期の花の主な色は63C、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は150D、花筒の内面の脈はかなり強、花筒の外面の主な色は145Cである。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HBPMP3」は、対照品種「HBPMR2」と比較して、花の主な色が55Bであること等で区別性が認められる。対照品種「VIVA ローズベイン」と比較して、花の主な色が55Bであること、花筒の内面の主な色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川上竜一

埼玉県吉川市栄町1568-1 グラス・アビタシオンⅢ201

6 登録品種の育成をした者の氏名

川上竜一

7 出願公表の年月日 令和元年 1 1 月 5 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ホイップマカロン モカモンブラン」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29617号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	02 かなり短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	03 鈍形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	05 極強

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	03 中
19 花の脈	05 中
20 花の脈の色	05 赤
21 花の主な色	RHSカラーチャート 55B
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 55D
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	03 花冠裂片の癒合部に沿う、04 縁部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 54B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 63C
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 150D
32 花筒の内面の脈	08 かなり強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 145C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 1 8 号 令和 5 年 4 月 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. KEIPEBRAINEM

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は高、茎の長さはやや長、葉の長さはやや長、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは極短、花型は一重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の波打ちは弱、花の脈は弱、花の脈の色は黒（黒褐色）、花の主な色は2D、花の二次色（二次色のある品種に限る。）は183A、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は喉部、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は大、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色は154D、開花後期の花の主な色は4D、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は166A、花筒の内面の脈は無又は極弱、花筒の外面の主な色は145C、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIPEBRAINEM」は、対照品種「ヨシニアシルラテ」と比較して、小花柄の長さが短であること、花筒の内面の主な色が166Aであること等で区別性が認められる。対照品種「あずき」と比較して、花の脈の色が黒（黒褐色）であること、花の主な色が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 令和元年 1 2 月 1 2 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	07 高
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	01 極短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29618号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	08 黒（黒褐色）
21 花の主な色	RHSカラーチャート 2D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 183A
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	01 喉部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	03 大
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 154D
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 4D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 166A
32 花筒の内面の脈	01 無又は極弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 145C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	02 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第29619号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. HBPMS5

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さは短、葉の長さはやや短、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは短、花型は八重、花の粗密（八重品種に限る。）は密、花の幅は中、花の切れ込みは極強、花の波打ちは中、花の脈はやや強、花の脈の色は赤、花の主な色は155C、開花初期の花の主な色は155C、開花後期の花の主な色は155C、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は150D、花筒の内面の脈はかなり強、花筒の外面の主な色は145Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HBPMS5」は、対照品種「HBPM1」と比較して、花の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Kermarimp」と比較して、葉の長さがやや短であること、花の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川上竜一

埼玉県吉川市栄町1568-1 グラス・アビタシオンⅢ201

6 登録品種の育成をした者の氏名

川上竜一

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ホイップマカロン モカモンブラン」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29619号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	03 鈍形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	05 極強

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29619号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	03 中
19 花の脈	06 やや強
20 花の脈の色	05 赤
21 花の主な色	RHSカラーチャート 155C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 155C
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 155C
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 150D
32 花筒の内面の脈	08 かなり強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 145C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第29620号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Surf Migoyago

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の形は卵形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は淡緑、がく片の長さは長、花型は一重、花の幅はやや広、花の切れ込みは強、花の波打ちは中、花の脈は中、花の脈の色は青紫、花の主な色は86A、開花初期の花の主な色はN89A、開花後期の花の主な色はN88A、花冠裂片の先端の形は鋭形、花筒の内面の主な色はN81A、花筒の内面の脈はやや強、花筒の外面の主な色はN79D、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は白である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Surf Migoyago」は、対照品種「ペチュラテ ブルー」と比較して、葉の形が卵形であること、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が白であること等で区別性が認められる。対照品種「バカラ ブルー」と比較して、花の脈が中であること、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
Surf Migoyago

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29620号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	02 淡緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	04 長
13 がく片の幅	04 広
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	06 やや広
17 花の切れ込み	04 強

Petunia Juss.
Surf Migoyago

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29620号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	03 中
19 花の脈	05 中
20 花の脈の色	07 青紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート 86A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N89A
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N88A
29 花冠裂片の先端の形	01 鋭形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	04 広
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート N81A
32 花筒の内面の脈	06 やや強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N79D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第29621号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunpet 1252

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さはやや長、葉の長さはやや短、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは中、花型は一重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の波打ちは弱、花の脈はかなり弱、花の主な色は71A、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はNN155D、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は縁部、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は小、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色はN79C、開花後期の花の主な色は71C、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は85D、花筒の内面の脈はやや弱、花筒の外面の主な色は76C、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunpet 1252」は、対照品種「GC-PE-1439」と比較して、開花初期の花の主な色がN79Cであること、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が白であること等で区別性が認められる。対照品種「粋な小町」と比較して、花の主な色が71Aであること、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
Sunpet 1252

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29621号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	03 鈍形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	04 長
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
Sunpet 1252

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29621号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	02 かなり弱
20 花の脈の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 71A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155D
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	04 縁部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N79C
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 71C
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 85D
32 花筒の内面の脈	04 やや弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 76C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第29622号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunpetu 471

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さはやや長、葉の長さは中、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは短、花型は一重、花の幅は狭、花の切れ込みは中、花の波打ちは無又は極弱、花の脈は中、花の脈の色は黄、花の主な色は62C、花の二次色（二次色のある品種に限る。）は15B、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は喉部、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は中、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色は62C、開花後期の花の主な色は62C、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の内面の主な色は4D、花筒の内面の脈はかなり弱、花筒の外面の主な色は4C、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunpetu 471」は、対照品種「マウントブッチ ピンクイエロー」と比較して、花の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ファンタジーピンク モーン」と比較して、花の脈が中であること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）が15Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
Sunpetu 471

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29622号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	03 狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
Sunpetu 471

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29622号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	01 無又は極弱
19 花の脈	05 中
20 花の脈の色	03 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート 62C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 15B
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	01 喉部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 62C
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 62C
29 花冠裂片の先端の形	03 円形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 4D
32 花筒の内面の脈	02 かなり弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 4C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	02 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第29623号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. SAKPET105

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは短、花型は一重、花の幅は中、花の切れ込みは中、花の波打ちは中、花の脈はかなり弱、花の主な色は71A、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はNN155C、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は中央脈に沿う、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は中、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色はN79B、開花後期の花の主な色は71B、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は6C、花筒の内面の脈はやや弱、花筒の外面の主な色は4C、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPET105」は、対照品種「ロンド バーガンディスター」と比較して、花の脈がかなり弱であること、花筒の内面の脈がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
SAKPET105

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	04 長
11 小花柄のアントシアニンの着色	02 弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
SAKPET105

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	03 中
19 花の脈	02 かなり弱
20 花の脈の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 71A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	02 中央脈に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N79B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 71B
29 花冠裂片の先端の形	04 切形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 6C
32 花筒の内面の脈	04 やや弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 4C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 2 4 号 令和 5 年 4 月 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUNJ1901M2

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さは短、葉の長さはやや短、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは極短、花型は一重、花の幅は狭、花の切れ込みは強、花の波打ちは弱、花の脈は弱、花の脈の色は紫、花の主な色は83B、開花初期の花の主な色は83A、開花後期の花の主な色は83C、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色はN81B、花筒の内面の脈は中、花筒の外面の主な色はN79B、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は淡青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUNJ1901M2」は、対照品種「TX840」と比較して、花の脈が弱であること、開花初期の花の主な色が83Aであること、花筒の内面の脈が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant 21, L.L.C.

32019 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄 潮

7 出願公表の年月日 令和 2 年 2 月 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「USTUNJ1901」の変異株である。

Petunia Juss.
USTUNJ1901M2

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29624号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	03 中
12 がく片の長さ	01 極短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	03 狭
17 花の切れ込み	04 強

Petunia Juss.
USTUNJ1901M2

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第29624号
18 花の波打ち 19 花の脈 20 花の脈の色 21 花の主な色 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。） 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。） 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。） 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。） 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。） 27 開花初期の花の主な色 28 開花後期の花の主な色 29 花冠裂片の先端の形 30 花筒の幅（一重品種に限る。） 31 花筒の内面の主な色 32 花筒の内面の脈 33 花筒の外面の主な色 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	02 弱	
	03 弱	
	06 紫	
	RHSカラーチャート 83B	
	RHSカラーチャート 83A	
	RHSカラーチャート 83C	
	02 突形	
	01 極狭	
	RHSカラーチャート N81B	
	05 中	
	RHSカラーチャート N79B	
	04 淡青	

1 品種登録の番号及び年月日 第29625号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUN79904

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は高、茎の長さは中、葉の長さはやや長、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は濃緑、がく片の長さは短、花型は一重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の波打ちは中、花の脈は弱、花の脈の色は紫、花の主な色はNN74A、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はNN155C、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は花冠裂片の癒合部に沿う、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は小、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色はNN78A、開花後期の花の主な色はNN74B、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の内面の主な色は71C、花筒の内面の脈はやや強、花筒の外面の主な色は72B、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は白である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUN79904」は、対照品種「SAKPET098」と比較して、花の主な色がNN74Aであること、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が白であること等で区別性が認められる。対照品種「USTUNJ2402」と比較して、花の波打ちが中であること、花の主な色がNN74Aであること、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant 21, L.L.C.

32019 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄 潮

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
USTUN79904

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	07 高
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	04 濃緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	02 弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
USTUN79904

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
18 花の波打ち		03 中
19 花の脈		03 弱
20 花の脈の色		06 紫
21 花の主な色		RHSカラーチャート NN74A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）		RHSカラーチャート NN155C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）		03 花冠裂片の癒合部に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）		01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）		01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）		
27 開花初期の花の主な色		RHSカラーチャート NN78A
28 開花後期の花の主な色		RHSカラーチャート NN74B
29 花冠裂片の先端の形		03 円形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）		03 中
31 花筒の内面の主な色		RHSカラーチャート 71C
32 花筒の内面の脈		06 やや強
33 花筒の外面の主な色		RHSカラーチャート 72B
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）		01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第29626号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン 19NORU

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の形は卵形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは短、花型は一重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の波打ちは無又は極弱、花の脈は中、花の脈の色は黒、花の主な色は203B、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はN200C、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は花冠裂片の癒合部に沿う、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は中、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色は203B、開花後期の花の主な色は203B、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の内面の主な色は203B、花筒の内面の脈は無又は極弱、花筒の外面の主な色は200A、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン 19NORU」は、対照品種「USTUN62305」と比較して、小花柄のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、花の主な色が203Bであること、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

未来アグリス株式会社
愛知県長久手市山越606番地
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の名称不詳の品種どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
カミホン 19NORU

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29626号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	05 中
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
カミホン 19NORU

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29626号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	01 無又は極弱
19 花の脈	05 中
20 花の脈の色	08 黒
21 花の主な色	RHSカラーチャート 203B
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N200C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	03 花冠裂片の癒合部に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 203B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 203B
29 花冠裂片の先端の形	03 円形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 203B
32 花筒の内面の脈	01 無又は極弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 200A
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第29627号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン 19SALA

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さは中、葉の長さはやや短、葉の形は卵形、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは極短、花型は八重、花の粗密（八重品種に限る。）は中、花の幅はやや狭、花の切れ込みは強、花の波打ちは弱、花の脈は弱、花の脈の色は紫、花の主な色はN78A、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はNN155C、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は縁部、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は小、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色はN79C、開花後期の花の主な色はN78A、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色はN82B、花筒の内面の脈はやや弱、花筒の外面の主な色はN80Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン 19SALA」は、対照品種「MIPEHR436」と比較して、花の主な色がN78Aであること、花筒の内面の脈がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「パープル ピルエット」と比較して、がく片の長さが極短であること、花の幅がやや狭であること、花の波打ちが弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ダブルフェイマス マジェンタピコティ」と比較して、花の幅がやや狭であること、花の主な色がN78Aであること、花筒の内面の脈がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

未来アグリ株式会社
愛知県長久手市山越606番地
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の名称不詳の品種どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
カミホン 19SALA

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29627号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	03 鈍形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	04 長
11 小花柄のアントシアニンの着色	02 弱
12 がく片の長さ	01 極短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	02 中
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	04 強

Petunia Juss.
カミホン 19SALA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート N78A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	04 縁部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N79C
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N78A
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート N82B
32 花筒の内面の脈	04 やや弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N80B
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 2 8 号 令和 5 年 4 月 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン 19HANA

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは中、花型は八重、花の粗密（八重品種に限る。）は密、花の幅はやや狭、花の切れ込みは極強、花の波打ちは弱、花の脈は無又は極弱、花の主な色はN92A、花の二次色（二次色のある品種に限る。）は154C、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は縁部、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は小、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は中、開花初期の花の主な色はN92A、開花後期の花の主な色はN92A、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は203B、花筒の内面の脈は無又は極弱、花筒の外面の主な色はN92Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン 19HANA」は、対照品種「ミヨペEA109-2」と比較して、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）が小であること等で区別性が認められる。対照品種「湘南プチヴェルデ チョコラータ」と比較して、花の主な色がN92Aであること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）が154Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

未来アグリ株式会社
愛知県長久手市山越606番地
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 令和 2 年 1 月 2 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の名称不詳の品種どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
カミホン 19HANA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	03 鈍形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	02 弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	05 極強

Petunia Juss.
カミホン 19HANA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	01 無又は極弱
20 花の脈の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート N92A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 154C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	04 縁部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	02 中
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N92A
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N92A
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 203B
32 花筒の内面の脈	01 無又は極弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N92A
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第29629号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン 19PIN (カミホン 19PIN)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の形は卵形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は淡緑、がく片の長さは短、花型は一重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の波打ちは弱、花の脈はやや弱、花の脈の色は紫、花の主な色はNN155C、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はNN78A、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は中央脈に沿う、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は大、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色はNN155B、開花後期の花の主な色はNN155D、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は77B、花筒の内面の脈は強、花筒の外面の主な色は79C、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン 19PIN」は、対照品種「USTUN79904」と比較して、花の主な色がNN155Cであること、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が青紫であること等で区別性が認められる。対照品種「クレイジーチュニア マニアックライラック」と比較して、花の二次色（二次色のある品種に限る。）がNN78Aであること、花筒の内面の主な色が77Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

未来アグリス株式会社
愛知県長久手市山越606番地
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の名称不詳の品種どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
カミホン 19PIN

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29629号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	05 中
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	02 淡緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	03 中
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
カミホン 19PIN

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29629号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	04 やや弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN78A
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	02 中央脈に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	03 大
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 77B
32 花筒の内面の脈	07 強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 79C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	05 青紫

1 品種登録の番号及び年月日 第29630号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン 19MOMO

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の形は卵形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは短、花型は八重、花の粗密（八重品種に限る。）は粗、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の波打ちは中、花の脈は弱、花の脈の色は紫、花の主な色はNN155D、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はN74A、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は中央脈に沿う、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は中、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色はNN155D、開花後期の花の主な色はNN155D、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色はN81B、花筒の内面の脈は中、花筒の外面の主な色はN79Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン 19MOMO」は、対照品種「穂希リメイクダブル」と比較して、葉の長さがやや短であること、花の主な色がNN155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨペEK469-1」と比較して、花の主な色がNN155Dであること、花筒の内面の脈が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

未来アグリス株式会社
愛知県長久手市山越606番地
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の名称不詳の品種どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
カミホン 19MOMO

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29630号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	06 やや高
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	02 弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	01 粗
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
カミホン 19MOMO

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29630号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	03 中
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N74A
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	02 中央脈に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート N81B
32 花筒の内面の脈	05 中
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N79B
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第29631号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. DPETAMKOH

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の形は卵形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは中、花型は一重、花の幅は中、花の切れ込みは中、花の波打ちは弱、花の脈は弱、花の脈の色は緑、花の主な色はNN155C、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はN45B、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は花冠裂片の癒合部に沿う、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は中、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は中、開花初期の花の主な色はNN155C、開花後期の花の主な色はNN155C、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色はNN155B、花筒の内面の脈は弱、花筒の外面の主な色は150D、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DPETAMKOH」は、対照品種「DPETAMPNK」と比較して、花の主な色がNN155Cであること、花筒の内面の主な色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「α（アルファ） レッドスター」と比較して、花の波打ちが弱であること、花筒の内面の脈が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 令和2年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
DPETAMKOH

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	03 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	02 緑
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N45B
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	03 花冠裂片の癒合部に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	02 中
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート NN155B
32 花筒の内面の脈	03 弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 150D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第29632号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. DPETAMPNK

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは短、葉の長さはやや短、葉の形は卵形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは短、花型は一重、花の幅は中、花の切れ込みは中、花の波打ちは弱、花の脈はやや弱、花の脈の色は赤、花の主な色は67A、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はNN155C、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は中央脈に沿う、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は大、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色は61B、開花後期の花の主な色はNN78B、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は154C、花筒の内面の脈はやや弱、花筒の外面の主な色は2D、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DPETAMPNK」は、対照品種「ジョコンダ パープル&ホワイト」と比較して、花の主な色が67Aであること、花筒の外面の主な色が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 令和2年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
DPETAMPNK

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29632号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	03 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29632号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	04 やや弱
20 花の脈の色	05 赤
21 花の主な色	RHSカラーチャート 67A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	02 中央脈に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	03 大
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 61B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN78B
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 154C
32 花筒の内面の脈	04 やや弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 2D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第29633号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. INPETLOROPL

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さはやや短、葉の長さは短、葉の形は楕円形、葉の先端の形は円形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは極短、花型は一重、花の幅は狭、花の切れ込みは中、花の波打ちは弱、花の脈は弱、花の脈の色は緑、花の主な色はN74A、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はNN155C、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は中央脈に沿う、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は小、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色は71A、開花後期の花の主な色はNN74A、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の内面の主な色は76D、花筒の内面の脈は強、花筒の外面の主な色は75A、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INPETLOROPL」は、対照品種「カスカディアス バイカラーカベルネ」と比較して、花の脈が弱であること、花の主な色がN74Aであること、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Peppy Neon」に「Surfinia Star Purple」を交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
INPETLOROPL

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29633号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	03 短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	04 円形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	01 極短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	03 狭
17 花の切れ込み	03 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	02 緑
21 花の主な色	RHSカラーチャート N74A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	02 中央脈に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 71A
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN74A
29 花冠裂片の先端の形	03 円形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 76D
32 花筒の内面の脈	07 強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 75A
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第29634号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Kerclipsfan

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉の長さはやや長、葉の形は卵形、葉の先端の形は円形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは中、花型は一重、花の幅はやや広、花の切れ込みは強、花の波打ちは強、花の脈は弱、花の脈の色は紫、花の主な色は72A、花の二次色（二次色のある品種に限る。）は4D、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は縁部、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は小、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は中、開花初期の花の主な色はN79C、開花後期の花の主な色は72A、花冠裂片の先端の形は鋭形、花筒の内面の主な色はN92A、花筒の内面の脈はかなり強、花筒の外面の主な色はN79B、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Kerclipsfan」は、対照品種「キャンディ ピコティ ベルベット」と比較して、花の主な色が72Aであること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「フラフープ ベルベット」と比較して、花の主な色が72Aであること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）が4Dであること、花筒の内面の脈がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David William Kerley
Bethany 49 Station Road Over Cambridge CB24 5NJ, United Kingdom
Priscilla Grace Kerley
Bethany 49 Station Road Over Cambridge CB24 5NJ, United Kingdom
Timothy Edward Kerley
Keeper's Lodge Haden Way Willingham CB24 5HB, United Kingdom
Sarah Elisabeth Kerley
Keeper's Lodge Haden Way Willingham CB24 5HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David William Kerley Priscilla Grace Kerley Timothy Edward Kerley
Sarah Elisabeth Kerley

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
Kerclipsfan

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	06 やや広
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	04 円形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	05 極長
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	03 中
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	06 やや広
17 花の切れ込み	04 強

Petunia Juss.
Kerclipsfan

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	04 強
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート 72A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 4D
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	04 縁部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	02 中
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N79C
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 72A
29 花冠裂片の先端の形	01 鋭形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	04 広
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート N92A
32 花筒の内面の脈	08 かなり強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N79B
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第29635号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. MIPEKD888

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉の長さは短、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は淡緑、がく片の長さは短、花型は一重、花の幅はかなり狭、花の切れ込みは中、花の波打ちは弱、花の脈は弱、花の脈の色は黄、花の主な色はNN155C、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はN74C、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は縁部、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は大、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色はNN155C、開花後期の花の主な色はNN155C、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は155C、花筒の内面の脈はかなり弱、花筒の外面の主な色は160C、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MIPEKD888」は、対照品種「TX716」と比較して、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）が縁部であること、花筒の内面の脈がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunpetu 511」と比較して、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）が縁部であること、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大同原野

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
MIPEKD888

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	06 やや高
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	03 短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	02 淡緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	02 かなり狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
MIPEKD888

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	03 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N74C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	04 縁部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	03 大
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	01 極狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 155C
32 花筒の内面の脈	02 かなり弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 160C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第29636号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. MIPEKY058

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉の長さはやや短、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは極短、花型は八重、花の粗密（八重品種に限る。）は密、花の幅は狭、花の切れ込みは中、花の波打ちは弱、花の脈は強、花の脈の色は紫、花の主な色はN82B、花の二次色（二次色のある品種に限る。）はNN155D、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は縁部、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は中、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は中、開花初期の花の主な色はN82B、開花後期の花の主な色は85A、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の内面の主な色は85D、花筒の内面の脈は強、花筒の外面の主な色はN77Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MIPEKY058」は、対照品種「VIVA バイオレットベイン」と比較して、花の粗密（八重品種に限る。）が密であること、花の幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大同原野

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
MIPEKY058

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	03 鈍形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	03 中
12 がく片の長さ	01 極短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	03 狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
MIPEKY058

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	07 強
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート N82B
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155D
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	04 縁部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	02 中
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N82B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 85A
29 花冠裂片の先端の形	03 円形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 85D
32 花筒の内面の脈	07 強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N77C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第29637号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン 19PRI

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さは短、葉の長さは中、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、がく片の長さは短、花型は一重、花の幅は中、花の切れ込みは中、花の波打ちは中、花の脈は弱、花の脈の色は緑、花の主な色は60A、花の二次色（二次色のある品種に限る。）は1D、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は中央脈に沿う、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は中、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は中、花の三次色（三次色のある品種に限る。）は187B（花冠裂片の癒合部）、開花初期の花の主な色は53A、開花後期の花の主な色は186A、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は183A、花筒の内面の脈は中、花筒の外面の主な色は183D、やくの花粉の色（一重品種に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン 19PRI」は、対照品種「DAMORQUEEN」と比較して、花の二次色（二次色のある品種に限る。）が1Dであること、花筒の内面の主な色が183Aであること等で区別性が認められる。対照品種「クレイジーチュニア ラズベリーレモネード」と比較して、花の二次色（二次色のある品種に限る。）が1Dであること、花筒の内面の主な色が183Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

未来アグリス株式会社
愛知県長久手市山越606番地
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野 隆

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
カミホン 19PRI

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29637号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	05 中
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	03 鈍形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	03 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	03 中
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	02 緑
21 花の主な色	RHSカラーチャート 60A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 1D
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	02 中央脈に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	02 中
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 187B（花冠裂片の癒合部）
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 53A
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 186A
29 花冠裂片の先端の形	04 切形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 183A
32 花筒の内面の脈	05 中
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 183D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第29638号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ヨシニアダイン

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は濃緑、がく片の長さは短、花型は八重、花の粗密（八重品種に限る。）は密、花の幅はやや狭、花の切れ込みは弱、花の波打ちは弱、花の脈は中、花の脈の色は紫、花の主な色はN79C、花の二次色（二次色のある品種に限る。）は64C、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）は花冠裂片の癒合部に沿う、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）は小、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）は無又は少、開花初期の花の主な色はN79B、開花後期の花の主な色はN77D、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は150D、花筒の内面の脈はかなり強、花筒の外面の主な色はN144Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヨシニアダイン」は、対照品種「ヨシニアジュリパル」と比較して、花の主な色がN79Cであること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）が64Cであること等で区別性が認められる。対照品種「VIVA ローズベイン」と比較して、花の脈が中であること、花の主な色がN79Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大塩芳弘
兵庫県姫路市豊富町御蔭1553番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名

大塩芳弘

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ヨシニアジュリ」の変異株である。

Petunia Juss.
ヨシニアダイナ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29638号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	04 濃緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	02 弱

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29638号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	05 中
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート N79C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 64C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	03 花冠裂片の癒合部に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N79B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N77D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 150D
32 花筒の内面の脈	08 かなり強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N144D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第29639号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart 飯島ダルマ1ゴウ (イジマダルマ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

分枝性は中、草姿は開張、草丈は中、株の幅はやや狭、茎の色は緑、越冬芽の有無は有、葉の向きは上向き、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の形は倒卵形、葉の基部の形は鋭形、葉の先端部の形は鈍形、葉の横断面の反りは内曲、葉の縦断面の反りは平、葉の主な色は緑、葉の斑の有無は無、葉の鋸歯の形は鋸歯状、花序の長さは中、花序の幅はやや広、やくの色は黄、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「飯島ダルマ1ゴウ」は、対照品種「富山在来」と比較して、葉の長さがやや短であること、葉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

飯島健太郎
神奈川県厚木市関口460-19

6 登録品種の育成をした者の氏名

飯島健太郎

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有のタケシマキリンソウ種(在来系統)の変異株である。

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
飯島ダルマ1ゴウ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝性	03 中
02 草姿	02 開張
03 冬期の草丈	01 極低
04 草丈	05 中
05 冬期の株の幅	01 極狭
06 株の幅	04 やや狭
07 冬期の茎の長さ	((冬期の茎なし、形質9及び11について同様))
08 茎の長さ	05 中
09 冬期の茎の太さ	
10 茎の太さ	05 中
11 冬期の茎の色	
12 茎の色	03 緑
13 越冬芽の有無	09 有
14 越冬芽の展葉の早晚	05 中
15 冬期の葉の数	((冬期の葉なし、形質18、20、22、24、26、31～33について同様))
16 葉の数	03 少
17 葉の向き	01 上向き

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
飯島ダルマ1ゴウ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 冬期の葉の長さ	
19 葉の長さ	04 やや短
20 冬期の葉の幅	
21 葉の幅	02 かなり狭
22 冬期の葉の厚さ	
23 葉の厚さ	02 薄
24 冬期の葉の形	
25 葉の形	06 倒卵形
26 冬期の葉の基部の形	
27 葉の基部の形	02 鋭形
28 葉の先端部の形	02 鈍形
29 葉の横断面の反り	01 内曲
30 葉の縦断面の反り	02 平
31 冬期の葉のアントシアニン着色の強弱	
32 冬期の葉のアントシアニン分布	
33 冬期の葉の主な色	
34 葉の主な色	03 緑

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
飯島ダルマ1ゴウ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉の斑の有無	01 無
36 葉の斑の色	
37 葉の斑の模様	
38 葉の鋸歯の形	02 鋸歯状
39 葉の鋸歯の大きさ	02 小
40 葉の鋸歯の分布	02 1 / 3 から 2 / 3
41 花序の長さ	05 中
42 花序の幅	06 やや広
43 花の直径	02 中
44 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
45 花冠裂片の長さ	02 中
46 花冠裂片の幅	02 中
47 花冠裂片の形	03 披針形
48 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 7A
49 やくの色	01 黄
50 開花期	04 やや早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 4 0 号 令和 5 年 4 月 6 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rhodanthemum (Vogt) B. H. Wilcox et al. ゴールデンアイズ アカリ

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、草丈はやや低、株の幅は狭、茎の太さは中、節間長はやや短、節数はやや少、一次分枝の数はやや少、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の色は暗緑、葉片の幅はかなり狭、葉の表面の毛の密度は密、花の直径は小、花盤の直径は小、花盤の主な色はN144A、舌状花の向きは斜上、舌状花の数は少、舌状花の形は舌状、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の裏面の主な色はNN155C、花粉の有無は有、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゴールデンアイズ アカリ」は、対照品種「ライトアイズ」と比較して、葉の長さがかなり短であること、葉の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「白鳥」と比較して、葉の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
中村一己
静岡県沼津市大岡3758-3

- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中村一己

- 7 出願公表の年月日 令和元年 6 月 1 1 日

- 8 登録品種の育成の経過の概要
「African Eyes」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29640号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 斜上
02 草丈	04 やや低
03 株の幅	03 狭
04 茎の太さ	05 中
05 節間長	04 やや短
06 節数	04 やや少
07 一次分枝の数	04 やや少
08 葉の長さ	02 かなり短
09 葉の幅	04 やや狭
10 葉の色	01 暗緑
11 葉片の幅	02 かなり狭
12 葉の表面の毛の密度	07 密
13 花の直径	03 小
14 花盤の直径	03 小
15 花盤の主な色	RHSカラーチャート N144A
16 舌状花の向き	01 斜上
17 舌状花の数	03 少

Rhodanthemum (Vogt) B. H. Wilcox et al.
 ゴールデンアイズ アカリ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29640号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の形	01 舌状
19 舌状花の長さ	05 中
20 舌状花の幅	03 狭
21 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
22 舌状花の表面の二次色（複色品種に限る。）	
23 舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
24 舌状花の裏面の二次色（複色品種に限る。）	
25 花粉の有無	09 有
26 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第29641号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Olijcreafra

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は極多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Olijcreafra」は、対照品種「メルセフヘン」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が円形であること、花弁の表面の主な色が155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「AUSOBLIGE」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が円形であること、花弁の形が横楕円形であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Philippe Veys

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
Olijcreafra

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	02 白系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	02 横楕円形

Rosa L.
Olijcreafra

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
Olijcreafra

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29641号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29642号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ピーチェ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はミニ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはかなり小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径はかなり小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は67A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは極大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピーチェ」は、対照品種「ピンベリー」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）が半八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 ミニ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	02 かなり小
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
11 葉の表面の光沢の強弱	03 弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	01 狭楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
ピーチェ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	04 やや少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 半八重
22 花弁の数	02 かなり少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	02 かなり小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
ピーチエ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 極小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 67A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	09 極大
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
ピーチェ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 6 4 2 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29643号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. フィーラー

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はミニ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はNN155C、花弁の表面の二次色は69C、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フィーラー」は、対照品種「ザ フェアリー」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が強であること、花弁の表面の主な色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「吉池 1」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が強であること、花弁の表面の主な色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

Rosa L.
フィーラー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 ミニ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	02 かなり小
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	01 狭楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
フィーラー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	04 やや少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	03 粗
27 花の直径	03 小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	02 かなり弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
フューラー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	07 強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 極小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 69C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
フィーラー

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 6 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	02 緑

1 品種登録の番号及び年月日 第29644号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アンビレッド

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN45A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アンビレッド」は、対照品種「POULPAH053」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が開張であること、葉の大きさが小であること、花弁の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ALTcaptain」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が開張であること、葉の大きさが小であること、花弁の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイミレッド」と比較して、先端小葉の葉身の形が卵形であること、花弁の表面の主な色がN45Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

Rosa L.
アンビレッド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 矮性
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	07 開張
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	03 小
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
アンビレッド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	01 極少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	03 粗
27 花の直径	04 やや小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
アンビレット

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 かなり小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N45A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
アンビレッド

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 6 4 4 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29645号 令和5年4月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. EVERA441

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型

（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横橢円形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN45A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「EVERA441」は、対照品種「EVERA452」と比較して、花卉の形が横橢円形であること、花卉の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「ALTcaptain」と比較して、花卉の形が横橢円形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Rosa L.
EVERA441

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29645号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
EVERA441

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	01 極少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	02 横楕円形

Rosa L.
EVERA441

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N45A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
EVERA441

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 6 4 5 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 4 6 号 令和 5 年 4 月 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TY15

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はミニ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはかなり小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はかなり小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TY15」は、対照品種「吉池 1」と比較して、葉の大きさがかなり小であること、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「フィーラー」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

吉池貞蔵
岩手県花巻市石鳥谷町猪鼻2-233-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉池貞蔵

7 出願公表の年月日 令和 3 年 1 月 2 1 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「フェニックスシングルホワイト」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 ミニ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	02 かなり小
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	01 狭楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
TY15

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	04 やや少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 楕円形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27 花の直径	02 かなり小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
TY15

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 極小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 65C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
TY15

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 6 4 6 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 4 7 号 令和 5 年 4 月 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L. Allfount

3 登録品種の特性の概要

草型 1 は叢生型、草型 2 は直立、草丈はやや高、茎の色は緑、節間長は長、葉序は対生、ロゼット葉の有無は無、茎葉の葉身の全形は披針形、茎葉の葉身長はやや長、茎葉の葉身幅は中、葉表面の色はNN137A、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、葉柄の長さはかなり短、花序の形は複合花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さはやや短、花序の幅は極広、小花の形 1 は一重、小花の形 2 は筒形、花卉表面の地色はN88A、花卉の形は広卵形、がく片の形は長楕円形、雌ずいの色は紫、葯の色はN92Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Allfount」は、対照品種「Blue Bomb」と比較して、草丈がやや高であること、茎葉の葉身長がやや長であること、花卉表面の地色がN88Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allplants Holding B.V.

Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wim van den Hoogen

7 出願公表の年月日 令和元年 7 月 4 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Veronica L.
Allfount

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型 1	01 叢生型
02 草型 2	01 直立
03 草丈	06 やや高
04 茎の太さ	06 やや太
05 茎の色	03 緑
06 茎の毛の多少	03 粗
07 茎からの分枝数	08 かなり多
08 節間長	07 長
09 葉序	01 対生
10 ロゼット葉の有無	01 無
11 根出葉の葉身の全形	
12 茎葉の葉身の全形	04 披針形
13 葉縁鋸歯の有無	09 有
14 根出葉の葉身長	
15 根出葉の葉身幅	
16 茎葉の葉身長	06 やや長
17 茎葉の葉身幅	05 中

Veronica L.
Allfount

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉表面の色	RHSカラーチャート NN137A
19 葉裏面の色	RHSカラーチャート 147B
20 葉の斑の有無	01 無
21 葉の斑の形	
22 葉の斑の色	
23 葉のアントシアニンの着色	01 無
24 葉の毛の多少	03 粗
25 葉柄の長さ	02 かなり短
26 葉数	04 やや少
27 花序の形	04 複合花序
28 花序の石化の発生の程度	01 無又は極少
29 花序の着生位置	01 頂生
30 花序の分枝節位数	07 4節以上から分枝
31 花序の長さ	04 やや短
32 花序の幅	09 極広
33 頂生花序の伸長性	03 短
34 花序の向き	03 上向き

Veronica L.
Allfount

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 小花の形 1	01 一重
36 小花の形 2	03 筒形
37 小花の花弁の重なり	01 無
38 小花の大きさ	04 やや小
39 花弁表面の地色	RHSカラーチャート N88A
40 花弁表面の脈の色	
41 花弁裏面の地色	RHSカラーチャート N88A
42 脈の分布	
43 花弁の形	02 広卵形
44 花弁先端の形	02 鈍形
45 花弁数	05 中
46 がく片の形	01 長楕円形
47 がくの大きさ	03 小
48 がくの色	RHSカラーチャート 137A
49 雄ずいの長さ	07 長
50 雌ずいの長さ	05 中
51 雌ずいの色	05 紫

Veronica L.
Allfount

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 葯の色	RHSカラーチャート N92D
53 小花柄の長さ	04 やや短
54 一花序の花数	09 極多
55 花の香り	01 無
56 開花始期	02 夏咲き
57 開花の早晩	06 やや晩
58 2季咲き性	09 有
59 開花期間 1	04 やや短
60 開花期間 2	07 長
61 耐寒性	
62 耐暑性	
63 病害抵抗性	
64 虫害抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 4 8 号 令和 5 年 4 月 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L. VERSPI

3 登録品種の特性の概要

草型 1 は叢生型、草型 2 は直立、草丈は低、茎の色は緑、節間長は中、葉序は対生、ロゼット葉の有無は有、茎葉の葉身の全形は披針形、茎葉の葉身長は短、茎葉の葉身幅は狭、葉表面の色は137B、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、葉柄の長さはかなり短、花序の形は総状花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さは短、花序の幅はやや狭、小花の形 1 は一重、小花の形 2 は筒形、花弁表面の地色は68A、花弁の形は広卵形、がく片の形は長楕円形、雌ずいの色は紫、葯の色はN79Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「VERSPI」は、対照品種「ベイビーピンク」と比較して、花弁表面の地色が68Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

A. Verschoor Horticulture Import-Export B.V.
Marcelisvaartpad 17, 2015CS Haarlem, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janus Verschoor

7 出願公表の年月日 令和元年 1 2 月 2 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のV. spicata (在来系統) の実生から選抜したものである。

Veronica L.
VERSPI

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型 1	01 叢生型
02 草型 2	01 直立
03 草丈	03 低
04 茎の太さ	03 細
05 茎の色	03 緑
06 茎の毛の多少	03 粗
07 茎からの分枝数	04 やや少
08 節間長	05 中
09 葉序	01 対生
10 ロゼット葉の有無	09 有
11 根出葉の葉身の全形	
12 茎葉の葉身の全形	04 披針形
13 葉縁鋸歯の有無	09 有
14 根出葉の葉身長	
15 根出葉の葉身幅	
16 茎葉の葉身長	03 短
17 茎葉の葉身幅	03 狭

Veronica L.
VERSPI

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉表面の色	RHSカラーチャート 137B
19 葉裏面の色	RHSカラーチャート 147B
20 葉の斑の有無	01 無
21 葉の斑の形	
22 葉の斑の色	
23 葉のアントシアニンの着色	01 無
24 葉の毛の多少	02 かなり粗
25 葉柄の長さ	02 かなり短
26 葉数	03 少
27 花序の形	03 総状花序
28 花序の石化の発生の程度	01 無又は極少
29 花序の着生位置	01 頂生
30 花序の分枝節位数	05 2-3節から分枝
31 花序の長さ	03 短
32 花序の幅	04 やや狭
33 頂生花序の伸長性	03 短
34 花序の向き	03 上向き

Veronica L.
VERSPI

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 小花の形 1	01 一重
36 小花の形 2	03 筒形
37 小花の花弁の重なり	09 有
38 小花の大きさ	05 中
39 花弁表面の地色	RHSカラーチャート 68A
40 花弁表面の脈の色	
41 花弁裏面の地色	RHSカラーチャート 68A
42 脈の分布	
43 花弁の形	02 広卵形
44 花弁先端の形	02 鈍形
45 花弁数	05 中
46 がく片の形	01 長楕円形
47 がくの大きさ	06 やや大
48 がくの色	RHSカラーチャート NN137A
49 雄ずいの長さ	05 中
50 雌ずいの長さ	05 中
51 雌ずいの色	05 紫

Veronica L.
VERSPI

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 葯の色	RHSカラーチャート N79C
53 小花柄の長さ	03 短
54 一花序の花数	05 中
55 花の香り	01 無
56 開花始期	02 夏咲き
57 開花の早晩	04 やや早
58 2季咲き性	09 有
59 開花期間 1	04 やや短
60 開花期間 2	07 長
61 耐寒性	
62 耐暑性	
63 病害抵抗性	
64 虫害抵抗性	