

1 品種登録の番号及び年月日 第29833号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. スプレーアイチ夏3号 (スプレーイチサツゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スプレーアイチ夏3号」は、対照品種「セイパレア」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「セイフレイ」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥村義秀 石原元浩 二村幹雄 近藤敬典 平松裕邦 植村真也 新井和俊 長谷川徹 渡邊孝政 遠山宏和

7 出願公表の年月日 令和3年9月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
スプレーアイチ夏3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	02 かなり小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	06 やや広
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	03 円筒形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	05 中
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート NN155B
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部から1/2まで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部から1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
スプレーアイチ夏3号

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29833号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29834号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 秀の苑 (シュノエン)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は70B、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は極晩、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀の苑」は、対照品種「秀芳優美」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が強い外巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和3年11月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「芳園の恵」に紅色系輪ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	09 極高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	02 かなり斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	07 長
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	07 多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 71A
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	06 やや大
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	04 やや粗
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	07 強い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部から1/2まで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部から1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	01 内曲
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 先端部から1/2
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 弱
59 舌状花の長さ	08 かなり長
60 舌状花の幅	06 やや広
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 72A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 70B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 71A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N79C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	05 中
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋）
97 各開花習性における早晩性	09 極晩
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

秀の苑

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29834号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29835号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 秀みくら (シュミクラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数値は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀みくら」は、対照品種「精あきさめ」と比較して、花らいの外面の色がNN155Cであること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「秀むらさめ」と比較して、葉の長さがやや短であること、葉の周縁の二次欠刻の数値がかなり多であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和3年11月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「てかがみ」に育成者所有の白色系小ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
秀みくら

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
 秀みくら

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	08 かなり多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	06 やや多
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート NN155C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

Chrysanthemum L.

秀みくら

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部から1/2まで

Chrysanthemum L.

秀みくら

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
 秀みくら

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
秀みくら

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	05 中
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋）
97 各開花習性における早晩性	09 極晩
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
秀みくら

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第29836号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 秀ひさき (シュヒサキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀ひさき」は、対照品種「精寒くれは」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の主な色が71Bであること等で区別性が認められる。対照品種「秀ふゆみ」と比較して、舌状花の表面の主な色が71Bであること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ようせい」に赤色系小ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
秀ひさき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	04 紫
06 たく葉の大きさ	02 かなり小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡

Chrysanthemum L.
 秀ひさき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	06 やや多
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 72A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

Chrysanthemum L.

秀ひさき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部から1/2まで

Chrysanthemum L.
 秀ひさき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 71B
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
 秀ひさき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 71B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	05 中
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
秀ひさき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	06 黄橙
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	08 かなり晩
96 開花習性	04 12月～2月咲き（冬）
97 各開花習性における早晩性	01 極早
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

秀ひさき

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第29837号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. シューピクシー (シュピクシー)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN74D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューピクシー」は、対照品種「シュープリマ」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が円筒形であること、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「セイセティ」と比較して、たく葉の大きさが中であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が円筒形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の表面の主な色がNN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「エトワール」の自然交雑実生から、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
シュューピクシー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	06 やや広
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19	葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20	葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	04 やや少
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23	花序の形 (叢生でない品種に限る)	03 円筒形
24	花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25	花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26	花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27	一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28	株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29	花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 75A
30	頭花の型	03 半八重
31	花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32	頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33	頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34	頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	07 先端部から1/4まで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部から1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	04 やや弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部から1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 弱
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN74D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色		
70 舌状花の表面の三次色の分布		
71 舌状花の表面の三次色の分布2		
72 舌状花の表面の三次色の型		
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01	類似する
74 舌状花の裏面の色		RHSカラーチャート 75C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）		RHSカラーチャート NN74D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）		RHSカラーチャート 75C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06	やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）		
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05	中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	06	強い円錐状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03	黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2		
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01	無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）		
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）		

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	08 かなり晩
96 開花習性	04 12月～2月咲き（冬）
97 各開花習性における早晩性	01 極早
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

シュープクシー

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29837号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29838号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 精えんよう (セインヨウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精えんよう」は、対照品種「紅式部」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の周縁の二次欠刻の数が中であること、舌状花の表面の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「精はんな」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）がかなり斜上であること、舌状花の表面の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の紅色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
精えんよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	04 紫
06 たく葉の大きさ	06 やや大
07 葉柄の向き	02 かなり斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	07 長
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
精えんよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	05 中
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 71A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

Chrysanthemum L.
精えんよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	01 極少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	02 かなり少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	02 かなり斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	07 先端部から1/4まで

Chrysanthemum L.
精えんよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部から1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 75A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
精えんよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 77D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 77D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	02 平
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
精えんよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	03 早
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋）
97 各開花習性における早晩性	01 極早
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

精えんよう

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第 2 9 8 3 8 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29839号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 精みつき (セイミツキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精みつき」は、対照品種「精たからぼし」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が濃であること、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の裏面の色が7Dであること等で区別性が認められる。対照品種「精なりひら」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数かなり多であること、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の裏面の色が7Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
精みつぎ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	02 かなり短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	07 長
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃

Chrysanthemum L.
精みつき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	08 かなり多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	05 中
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 9A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

Chrysanthemum L.

精みつぎ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	02 かなり斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 6A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 7D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 6A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 7D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
精みつぎ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	04 やや早
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋）
97 各開花習性における早晚性	05 中
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

精みつ

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質

1 品種登録の番号及び年月日 第29840号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 精ささなき (セイサナキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精ささなき」は、対照品種「精寒はくこま」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の一次欠刻の深さが深であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「精えなみ」と比較して、たく葉の大きさが中であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系一重咲き育成系統に小ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.

精ささなき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.

精ささなき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	06 やや多
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート NN155B
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

Chrysanthemum L.

精ささなき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	06 外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部から1/2まで

Chrysanthemum L.

精ささなき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部から1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	02 平
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
精ささなき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	05 中
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	02 平
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

精ささなき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	07 晩
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晩性	09 極晩
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

精ささなき

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質

03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第29841号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 精ゆきしろ (セイキシロ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精ゆきしろ」は、対照品種「精寒はくこま」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、舌状花の先端の形が突起状であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）がかなり大であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種「精ゆきみ」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、舌状花の先端の形が突起状であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系一重咲き育成系統に小ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
精ゆきしろ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	03 短
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	02 平行
15 葉の基部の形	04 平形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
精ゆきしろ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	04 やや少
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	02 かなり狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート NN155A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

Chrysanthemum L.
精ゆきしろ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	01 極少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	02 かなり斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.
精ゆきしろ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部から1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
精ゆきしろ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155A
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155A
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	08 かなり大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	06 強い円錐状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
精ゆきしろ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	06 黄橙
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	08 かなり晩
96 開花習性	04 12月～2月咲き（冬）
97 各開花習性における早晩性	01 極早
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

精ゆきしろ

第29841号

03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第29842号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 精いちよう (セイイヨウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晚性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精いちよう」は、対照品種「精寒はなさくら」と比較して、草丈が極高であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が平であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「精寒くれは」と比較して、草丈が極高であること、葉の裂片縁部の重なりが接するであること、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の主な色が72Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の紅色系一重咲き育成系統に小ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
精いちよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	09 極高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	07 長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
精いちよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	02 かなり狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 72B
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

Chrysanthemum L.
精いちよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	07 先端部から1/4まで

Chrysanthemum L.
精いちよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 72B
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
精いちよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75A
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 72B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75A
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
精いちよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	06 黄橙
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	08 かなり晩
96 開花習性	04 12月～2月咲き（冬）
97 各開花習性における早晩性	01 極早
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
精いちよう

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第29843号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 精きつねび (セイヤツネビ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精きつねび」は、対照品種「精かしわざ」と比較して、葉の長さが中であること、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）がかなり少であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が黄橙であること等で区別性が認められる。対照品種「精冬こうしょう」と比較して、葉の長さが中であること、葉の一次欠刻の深さが深であること、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）がかなり少であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が黄橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
精きつねび

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.

精きつねび

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	02 かなり狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 9A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

Chrysanthemum L.

精きつねび

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部から1/2まで

Chrysanthemum L.

精きつねび

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 6A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 6C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 6A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 6C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	07 大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

精きつねび

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	06 黄橙
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	08 かなり晩
96 開花習性	04 12月～2月咲き（冬）
97 各開花習性における早晩性	03 早
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

精きつねび

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第29844号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 精かんの (セカン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN78B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は70B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精かんの」は、対照品種「精寒はなさくら」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「精寒くれは」と比較して、舌状花の表面の主な色がNN78Bであること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
精かんの

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	02 平行
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
精かんの

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	04 やや少
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	02 かなり狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	05 中
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 72B
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

Chrysanthemum L.

精かんの

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.

精かんの

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN78B
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 70B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN78B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 70B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
精かんの

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	08 かなり晩
96 開花習性	04 12月～2月咲き（冬）
97 各開花習性における早晩性	03 早
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

精かんの

第 2 9 8 4 4 号

03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第29845号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 笑光記 (ショウコウキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75A、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり晩、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「笑光記」は、対照品種「笑の声」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること、舌状花の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「笑の歩」と比較して、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「笑の宴」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、頭花の舌状花の二次的な形が舌状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小井戸輝雄
長野県松本市元町一丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小井戸輝雄

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 71A
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	04 やや小
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	04 やや低
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	04 やや粗
40 頭花の舌状花の形の数	02 2
41 頭花の舌状花の主要な形	02 船底状
42 頭花の舌状花の二次的な形	01 舌状
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	01 基部から1/4まで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部から1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 71A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75A
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 59A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 70A:NN155A(基部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	05 中
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋）
97 各開花習性における早晩性	08 かなり晩
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	01 無又は極少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

笑光記

第 2 9 8 4 5 号

06 やや斜下

1 品種登録の番号及び年月日 第29846号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Consolida Gray 岡山LAR3号 (カヤマLAR3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、草丈は極高、茎の長さは長、茎の太さは太、茎の毛の有無は無、葉の全形はⅡ、葉の長さは中、葉の幅は中、葉柄の有無と長さは短、葉縁の毛の有無は無、葉の表面の色は137A、花序の長さは長、花序の幅は中、1花序に着生している小花数は中、1花序に着生している小花の密度は中、花の咲き方は普通咲、花形は八重咲、花冠の大きさは中、がく片の数は多、がく片の毛の有無は有、最外層がく片の全形は広卵形、最外層がく片の長さは中、最外層がく片の幅は中、最外層がく片表面の着色パターンはⅠ、最外層がく片表面のAゾーンの色はN89B、最外層がく片裏面先端部の緑色着色は明瞭、最内層がく片の全形は広卵形、最内層がく片の長さは短、最内層がく片の幅は中、最内層がく片表面の着色パターンはⅠ、最内層がく片表面のAゾーンの色は83B、最内層がく片裏面先端部の緑色着色は不明瞭、がく片の距の有無と長さは中、がく片の距の太さは中、がく片の距の色はN89D、花弁部の大きさは無又は小、花弁数は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「岡山LAR3号」は、対照品種「カンヌ ディープブルー」と比較して、最外層がく片表面のAゾーンの色がN89Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ジャイアントインペリアル ブルースパイヤー」と比較して、最外層がく片表面のAゾーンの色がN89Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岡山県
岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

森義雄 土居典秀 笠原有加

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ジャイアントインペリアル ブルースパイヤー」の自然交雑実生から選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 中間型
02 草丈	09 極高
03 地下部の形状	01 繊根性
04 茎の長さ	07 長
05 茎の太さ	07 太
06 茎の分枝性	05 中
07 茎の毛の有無	01 無
08 茎の色	RHSカラーチャート 143A
09 葉の枚数	05 中
10 葉の全形	02 II
11 葉の長さ	05 中
12 葉の幅	05 中
13 葉の厚さ	05 中
14 葉柄の有無と長さ	03 短
15 葉縁の毛の有無	01 無
16 葉の表面の色	RHSカラーチャート 137A
17 葉の裏面の色	RHSカラーチャート 138B

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29846号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花序の長さ	07 長
19 花序の幅	05 中
20 1花序に着生している小花数	05 中
21 1花序に着生している小花の密度	05 中
22 花の咲き方	01 普通咲
23 花形	03 八重咲
24 花冠の大きさ	05 中
25 花柄の長さ	07 長
26 がく片の数	07 多
27 がく片の毛の有無	09 有
28 最外層がく片の全形	05 広卵形
29 最外層がく片の長さ	05 中
30 最外層がく片の幅	05 中
31 最外層がく片表面の着色パターン	01 I
32 最外層がく片表面のAゾーンの色	RHSカラーチャート N89B
33 最外層がく片表面のBゾーンの色	
34 最外層がく片裏面先端部の緑色着色	03 明瞭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最内層がく片の全形	05 広卵形
36 最内層がく片の長さ	03 短
37 最内層がく片の幅	05 中
38 最内層がく片表面の着色パターン	01 I
39 最内層がく片表面のAゾーンの色	RHSカラーチャート 83B
40 最内層がく片表面のBゾーンの色	
41 最内層がく片裏面先端部の緑色着色	02 不明瞭
42 がく片の距の有無と長さ	05 中
43 がく片の距の太さ	05 中
44 がく片の距の色	RHSカラーチャート N89D
45 花弁部の大きさ	03 無又は小
46 花弁数	01 無
47 花弁の距の有無	
48 花弁の単色・複色の別	
49 花弁の色	
50 花弁の2次的な色	
51 花弁の表面の毛の有無	

岡山LAR3号

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 8 4 6 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 8 4 7 号 令和 5 年 9 月 1 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Curcuma L. Starlet

3 登録品種の特性の概要

草型は中間、草丈はやや低、根茎の形はⅠ型、貯蔵根（水球）の有無は有、根茎の大きさはやや小、根茎の形成数は少、根茎の色は淡褐、立茎数は2以下、茎の太さはやや細、茎の長さは中、葉の形は中間、葉の幅は中、葉の長さはやや短、葉鞘の長さはやや短、葉の表面の斑の有無は無、葉の表面のアントシアニンの発現の割合は無、葉鞘のアントシアニンの発現の程度は弱、花序の形はⅢ型、花茎の抽出方向は直立、花茎の先端の位置は上部、花茎の抽出数は3～4、小花の露出の有無は無、花序の幅は狭、花序の長さは短、ほう葉の枚数は少、ほう葉の着色の程度は多、上部ほう葉の形は楕円形、上部ほう葉の先端の形は円形、上部ほう葉の横断面の形は浅U型、上部ほう葉の縦断面の形は外に反る、上部ほう葉の周縁部の波打ちは弱、下部ほう葉の形は倒卵形、下部ほう葉の先端の形は円形、下部ほう葉の横断面の形は浅U型、下部ほう葉の縦断面の形はやや外へ反る、上部ほう葉の幅は狭、上部ほう葉の長さは短、下部ほう葉の幅は中、下部ほう葉の長さは短、上部ほう葉の表面の地色は75B、上部ほう葉の表面の斑の模様は爪斑、上部ほう葉の表面の斑の色は144B、下部ほう葉の表面の地色は155C、下部ほう葉の表面の斑の模様は爪斑、ぼかし、下部ほう葉の表面の斑の色は146C(爪斑) ;N74D(ぼかし)、小花の長さはやや短、小花の横径は小、小花の縦径はやや小、小花の色は76D、唇弁の色は85D、唇弁の中肋の色は12A、唇弁の形は分裂型、花卉の数は6～7、小花数は3以上、花の香りは無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Starlet」は、対照品種「ブアラーイ チョンプー」と比較して、葉の形が中間であること、下部ほう葉の裏面の地色が145Cであること等で区別性が認められる。対照品種「メーテンN0.1」と比較して、葉の形が中間であること、下部ほう葉の裏面の地色が145Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chiang Mai University

239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, 50200, Thailand

6 登録品種の育成をした者の氏名

Soraya Ruamrungsri

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 7 月 1 8 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ブアラーイ チョンプー」に「Crown Patumma」を交配し、選抜したものである。

Curcuma L.
Starlet

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29847号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 株幅	05 中
04 根茎の形	01 I 型
05 貯蔵根（水球）の有無	09 有
06 根茎の大きさ	04 やや小
07 根茎の形成数	03 少
08 根茎の色	01 淡褐
09 立茎数	01 2 以下
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の長さ	05 中
12 茎の強さ	07 強
13 茎の色	02 緑
14 葉の形	02 中間
15 葉の先端の形	03 鋭形
16 葉の横断面の形	03 外巻き
17 葉の周縁部の波打ち	03 弱

Curcuma L.
Starlet

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の幅	05 中
19 葉の長さ	04 やや短
20 葉の厚さ	03 薄
21 葉鞘の長さ	04 やや短
22 葉の枚数	02 3 ～ 5
23 葉の表面の色	02 緑
24 葉の裏面の色	04 灰緑
25 葉の表面の斑の有無	01 無
26 葉の表面の斑の色	
27 葉の表面のアントシアニンの発現の割合	01 無
28 葉鞘のアントシアニンの発現の程度	03 弱
29 葉柄の長さ	02 かなり短
30 花序の形	03 III型
31 花茎の抽出方向	01 直立
32 花茎の先端の位置	01 上部
33 花茎の抽出数	02 3 ～ 4
34 小花の露出の有無	01 無

Curcuma L.
Starlet

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花序の幅	03 狭
36 花序の長さ	03 短
37 ほう葉の枚数	03 少
38 ほう葉の着色の程度	07 多
39 上部ほう葉の形	03 楕円形
40 上部ほう葉の先端の形	05 円形
41 上部ほう葉の横断面の形	02 浅U型
42 上部ほう葉の縦断面の形	03 外に反る
43 上部ほう葉の周縁部の波打ち	03 弱
44 下部ほう葉の形	03 倒卵形
45 下部ほう葉の先端の形	04 円形
46 下部ほう葉の横断面の形	01 浅U型
47 下部ほう葉の縦断面の形	02 やや外へ反る
48 下部ほう葉の周縁部の波打ち	01 無
49 上部ほう葉の幅	03 狭
50 上部ほう葉の長さ	03 短
51 上部ほう葉の厚さ	05 中

Curcuma L.
Starlet

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 下部ほう葉の幅	05 中
53 下部ほう葉の長さ	03 短
54 下部ほう葉の厚さ	05 中
55 上部ほう葉の表面の地色	RHSカラーチャート 75B
56 上部ほう葉の表面の斑の模様	02 爪斑
57 上部ほう葉の表面の斑の色	RHSカラーチャート 144B
58 上部ほう葉の裏面の地色	RHSカラーチャート 75B
59 上部ほう葉の裏面の斑の模様	02 爪斑、06 ぼかし
60 上部ほう葉の裏面の斑の色	RHSカラーチャート 144B(爪斑);45C(ぼかし)
61 下部ほう葉の表面の地色	RHSカラーチャート 155C
62 下部ほう葉の表面の斑の模様	02 爪斑、06 ぼかし
63 下部ほう葉の表面の斑の色	RHSカラーチャート 146C(爪斑);N74D(ぼかし)
64 下部ほう葉の裏面の地色	RHSカラーチャート 145C
65 下部ほう葉の裏面の斑の模様	02 爪斑、06 ぼかし
66 下部ほう葉の裏面の斑の色	RHSカラーチャート 146C(爪斑);N74D(ぼかし)
67 小花の長さ	04 やや短
68 小花の横径	03 小

Curcuma L.
Starlet

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 小花の縦径	04 やや小
70 小花の色	RHSカラーチャート 76D
71 唇弁の色	RHSカラーチャート 85D
72 唇弁の中肋の色	RHSカラーチャート 12A
73 唇弁の形	02 分裂型
74 花弁の数	03 6 ～ 7
75 小花数	03 3 以上
76 花の香り	01 無
77 開花期	04 やや早
78 耐寒性	
79 耐暑性	
80 病害対抗性	
81 虫害抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29848号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ハヤシミニゴールド (ハシミニゴールド)

3 登録品種の特性の概要

草型は小型、葉の数は少、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は心臓形、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちの強弱は無又は弱、葉身の裏面のアントシアニンの着色は無、葉身の表面の地色は濃緑、葉身の表面の模様の有無は有、葉身の模様の明瞭度は強、葉身の模様の型は帯斑、葉柄の長さは短、花茎の長さは中、花茎の結実後の回旋性は無又は弱、花の型は一重、花の香りは中、花弁の数は極少、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の縁の欠刻の有無は無、花弁の縁の波打ちの有無は無、花弁の反転は反転するが一部花茎にかかる、花弁のねじれは弱、花弁の模様の有無は無、花弁先端の色は157B、花弁中央部の色は157B、花弁基部の色は157C、花弁の表面の突起の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハヤシミニゴールド」は、対照品種「マイクロゴールドボーイ」と比較して、葉身の長さが長であること、花弁の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

林博俊
群馬県沼田市原町88番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

林博俊

7 出願公表の年月日 平成30年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ゴールドイルミネーション」の変異株に「スクリュースター」を交配し、選抜した個体どうしを交配し選抜したものである。

Cyclamen L.
ハヤシミニゴールド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 小型
02 葉の数	03 少
03 葉身の長さ	07 長
04 葉身の幅	06 やや広
05 葉身の形	01 心臓形
06 葉身の基部の形	01 広く開く
07 葉身の先端の形	02 鈍形
08 葉縁の欠刻	01 浅く粗
09 葉縁の波打ちの強弱	01 無又は弱
10 葉身の裏面のアントシアニンの着色	01 無
11 葉身の表面の地色	03 濃緑
12 葉身の表面の模様の有無	09 有
13 葉身の模様の明瞭度	03 強
14 葉身の模様の型	03 帯斑
15 葉柄の長さ	03 短
16 葉柄の太さ	05 中
17 花茎の長さ	05 中

Cyclamen L.
ハヤシミニゴールド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	06 やや太
19 花茎のアントシアニンの着色	02 弱
20 花茎の結実後の回旋性	01 無又は弱
21 花の型	01 一重
22 花の香り	02 中
23 花弁の数	01 極少
24 花弁の長さ	04 やや短
25 花弁の幅	04 やや狭
26 花弁の縁の欠刻の有無	01 無
27 花弁の縁の欠刻の数	
28 花弁の縁の欠刻の深さ	
29 花弁の縁の波打ちの有無	01 無
30 花弁の縁の波打ちの強弱	
31 花弁の反転	02 反転するが一部花茎にかかる
32 花弁のねじれ	02 弱
33 花弁の模様の有無	01 無
34 花弁の模様のタイプ	

ハヤシミニゴールド

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 8 4 8 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 8 4 9 号 令和 5 年 9 月 1 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. HWA02

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、葉の数はやや多、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は広、葉身の形は心臟形、葉縁の欠刻は深く密、葉縁の波打ちの強弱は無又は弱、葉身の裏面のアントシアニンの着色は弱、葉身の表面の地色は濃緑、葉身の表面の模様の有無は有、葉身の模様の明瞭度は強、葉身の模様の型は帯斑、葉柄の長さは中、花茎の長さはやや長、花の型は八重、花の香りは中、花弁の数は中、花弁の長さは極短、花弁の幅は極狭、花弁の縁の欠刻の有無は無、花弁の縁の波打ちの有無は有、花弁の縁の波打ちの強弱は中、花弁の反転は反転するが一部花茎にかかる、花弁のねじれは無又は極弱、花弁の模様の有無は有、花弁の模様のタイプは覆輪、目、花弁先端の色は145A、花弁中央部の色はNN155B、花弁基部の色は61B、花弁の表面の突起の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HWA02」は、対照品種「スクリュースター（花弁先端が緑色のタイプ）」と比較して、葉身の長さがかなり長であること、花弁の模様の割合が多であること等で区別性が認められる。対照品種「プリマドンナゴールド」と比較して、花の型が八重であること、花弁の縁の欠刻の有無が無であること、花弁先端の色が145Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社はら園芸
神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘1-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

一石金四郎

7 出願公表の年月日 平成 3 1 年 3 月 2 2 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「フェアリーピコ」の変異株である。

Cyclamen L.
HWA02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 中型
02 葉の数	06 やや多
03 葉身の長さ	08 かなり長
04 葉身の幅	07 広
05 葉身の形	01 心臓形
06 葉身の基部の形	03 浅く重なる
07 葉身の先端の形	01 尖形
08 葉縁の欠刻	04 深く密
09 葉縁の波打ちの強弱	01 無又は弱
10 葉身の裏面のアントシアニンの着色	02 弱
11 葉身の表面の地色	03 濃緑
12 葉身の表面の模様の有無	09 有
13 葉身の模様の明瞭度	03 強
14 葉身の模様の型	03 帯斑
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉柄の太さ	05 中
17 花茎の長さ	06 やや長

Cyclamen L.
HWA02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	05 中
19 花茎のアントシアニンの着色	02 弱
20 花茎の結実後の回旋性	(未結実)
21 花の型	03 八重
22 花の香り	02 中
23 花弁の数	05 中
24 花弁の長さ	01 極短
25 花弁の幅	01 極狭
26 花弁の縁の欠刻の有無	01 無
27 花弁の縁の欠刻の数	
28 花弁の縁の欠刻の深さ	
29 花弁の縁の波打ちの有無	09 有
30 花弁の縁の波打ちの強弱	02 中
31 花弁の反転	02 反転するが一部花茎にかかる
32 花弁のねじれ	01 無又は極弱
33 花弁の模様の有無	09 有
34 花弁の模様のタイプ	03 覆輪、07 目

Cyclamen L.
HWA02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の模様の割合 36 花弁先端の色 37 花弁中央部の色 38 花弁基部の色 39 花弁の表面の突起の有無 40 がく片の弁化 41 がく片の裏面の色 42 開花習性	07 多
	RHSカラーチャート 145A
	RHSカラーチャート NN155B
	RHSカラーチャート 61B
	01 無
	01 無

1 品種登録の番号及び年月日 第29850号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. HWA03

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、葉の数は中、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は広、葉身の形は心臓形、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちの強弱は無又は弱、葉身の裏面のアントシアニンの着色は強、葉身の表面の地色は濃緑、葉身の表面の模様の有無は有、葉身の模様の明瞭度は強、葉身の模様の型は帯斑、葉柄の長さは中、花茎の長さは長、花茎の結実後の回旋性は無又は弱、花の型は八重、花の香りは中、花弁の数は中、花弁の長さはかなり短、花弁の幅はかなり狭、花弁の縁の欠刻の有無は無、花弁の縁の波打ちの有無は無、花弁の反転は反転するが一部花茎にかかる、花弁のねじれは無又は極弱、花弁の模様の有無は有、花弁の模様のタイプは糸覆輪、刷毛目、目、花弁先端の色はN155B、花弁中央部の色はN66D;61C、花弁基部の色は64A、花弁の表面の突起の有無は無である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「HWA03」は、対照品種「フェアリーピコ ミディダブルバイカラーミックス」と比較して、葉身の裏面のアントシアニンの着色が強であること、花弁の模様のタイプが糸覆輪、刷毛目、目であること、花弁中央部の色がN66D;61Cであること等で区別性が認められる。対照品種「フェアリーピコ 大輪ダブルバイカラーピンク」と比較して、葉身の裏面のアントシアニンの着色が強であること、花弁中央部の色がN66D;61Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社はら園芸
神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘1-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

一石金四郎

7 出願公表の年月日 平成31年3月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「フェアリーピコ」の変異株である。

Cyclamen L.
HWA03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 中型
02 葉の数	05 中
03 葉身の長さ	08 かなり長
04 葉身の幅	07 広
05 葉身の形	01 心臓形
06 葉身の基部の形	02 開く
07 葉身の先端の形	02 鈍形
08 葉縁の欠刻	01 浅く粗
09 葉縁の波打ちの強弱	01 無又は弱
10 葉身の裏面のアントシアニンの着色	03 強
11 葉身の表面の地色	03 濃緑
12 葉身の表面の模様の有無	09 有
13 葉身の模様の明瞭度	03 強
14 葉身の模様の型	03 帯斑
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉柄の太さ	06 やや太
17 花茎の長さ	07 長

Cyclamen L.
HWA03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	05 中
19 花茎のアントシアニンの着色	02 弱
20 花茎の結実後の回旋性	01 無又は弱
21 花の型	03 八重
22 花の香り	02 中
23 花弁の数	05 中
24 花弁の長さ	02 かなり短
25 花弁の幅	02 かなり狭
26 花弁の縁の欠刻の有無	01 無
27 花弁の縁の欠刻の数	
28 花弁の縁の欠刻の深さ	
29 花弁の縁の波打ちの有無	01 無
30 花弁の縁の波打ちの強弱	
31 花弁の反転	02 反転するが一部花茎にかかる
32 花弁のねじれ	01 無又は極弱
33 花弁の模様の有無	09 有
34 花弁の模様のタイプ	02 糸覆輪、06 刷毛目、07 目

Cyclamen L.
HWA03

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 8 5 0 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29851号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delphinium L. さくら乙女L (サクラトメL)

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、草丈は高、茎の長さは長、茎の太さは細、茎の毛の有無は有、葉の全形はⅢ、葉の長さは中、葉の幅は中、葉柄の有無と長さは短、葉縁の毛の有無は無、葉の表面の色は141B、花序の長さは短、花序の幅は広、1花序に着生している小花数は少、1花序に着生している小花の密度はやや粗、花の咲き方は普通咲、花形は一重咲、花冠の大きさは中、がく片の数は少、がく片の毛の有無は有、最外層がく片の全形は楕円形、最外層がく片の長さは中、最外層がく片の幅は中、最外層がく片表面の着色パターンはⅠ、最外層がく片表面のAゾーンの色は65A、最外層がく片裏面先端部の緑色着色は明瞭、がく片の距の有無と長さは無、花弁部の大きさは無又は小、花弁数は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「さくら乙女L」は、対照品種「さくらひめ」と比較して、1花序に着生している小花数が少であること、最外層がく片表面のAゾーンの色が65Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ムラクリスタル ピンク」と比較して、草丈が高であること、最外層がく片表面のAゾーンの色が65Aであること等で区別性が認められる。対照品種「プデル シェルピンク」と比較して、最外層がく片表面のAゾーンの色が65Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金田隆
栃木県日光市猪倉1287

6 登録品種の育成をした者の氏名

金田隆

7 出願公表の年月日 令和2年8月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

「さくら乙女」の変異株である。

Delphinium L.
さくら乙女L

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 中間型
02 草丈	07 高
03 地下部の形状	01 繊根性
04 茎の長さ	07 長
05 茎の太さ	03 細
06 茎の分枝性	05 中
07 茎の毛の有無	09 有
08 茎の色	RHSカラーチャート 143B
09 葉の枚数	05 中
10 葉の全形	03 III
11 葉の長さ	05 中
12 葉の幅	05 中
13 葉の厚さ	03 薄
14 葉柄の有無と長さ	03 短
15 葉縁の毛の有無	01 無
16 葉の表面の色	RHSカラーチャート 141B
17 葉の裏面の色	RHSカラーチャート 138B

Delphinium L.
さくら乙女L

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第29851号
18 花序の長さ	03 短	
19 花序の幅	07 広	
20 1花序に着生している小花数	03 少	
21 1花序に着生している小花の密度	04 やや粗	
22 花の咲き方	01 普通咲	
23 花形	01 一重咲	
24 花冠の大きさ	05 中	
25 花柄の長さ	07 長	
26 がく片の数	03 少	
27 がく片の毛の有無	09 有	
28 最外層がく片の全形	03 楕円形	
29 最外層がく片の長さ	05 中	
30 最外層がく片の幅	05 中	
31 最外層がく片表面の着色パターン	01 I	
32 最外層がく片表面のAゾーンの色	RHSカラーチャート 65A	
33 最外層がく片表面のBゾーンの色		
34 最外層がく片裏面先端部の緑色着色	03 明瞭	

Delphinium L.
さくら乙女L

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最内層がく片の全形	
36 最内層がく片の長さ	
37 最内層がく片の幅	
38 最内層がく片表面の着色パターン	
39 最内層がく片表面のAゾーンの色	
40 最内層がく片表面のBゾーンの色	
41 最内層がく片裏面先端部の緑色着色	
42 がく片の距の有無と長さ	01 無
43 がく片の距の太さ	
44 がく片の距の色	
45 花弁部の大きさ	03 無又は小
46 花弁数	01 無
47 花弁の距の有無	
48 花弁の単色・複色の別	
49 花弁の色	
50 花弁の2次的な色	
51 花弁の表面の毛の有無	

さくら乙女L

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29851号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29852号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. SAKCAR112

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、植物体の粗密は密、花の位置は同じあるいはわずかに上、節間の長さはかなり短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さは中、がくの幅はかなり狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は直、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）は少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は多、花卉の縁の形は鋸歯、花卉の切れ込みの深さは中、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は45B、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCAR112」は、対照品種「SAKCAR099」と比較して、花卉の切れ込みの深さが中であること、花柱の数が2本であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイス」と比較して、がくのアントシアニンの着色が無又は極弱であること、花卉の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR112

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	03 低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	02 楕円形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	04 やや狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR112

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	02 かなり狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR112

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	03 多
46 花弁の縁の形	04 鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	05 中
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 45B
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR112

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29853号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. OP 14 J 4

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、植物体の粗密は密、花の位置は同じあるいはわずかに上、節間の長さはかなり短、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは長、葉の幅はやや狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ4、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さは浅、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は2C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OP 14 J 4」は、対照品種「11Ye 4 2」と比較して、花卉の主な形がタイプ4であること、花卉の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ルミナリア」と比較して、葉の長さが長であること、花卉の覆輪部の幅が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
OP 14 J 4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	07 長
15 葉の幅	04 やや狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
OP 14 J 4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	05 倒卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
OP 14 J 4

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29853号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	04 タイプ4
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 2C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
OP 14 J 4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	04 黄
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29854号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. OP 14 P 8

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、植物体の粗密は中、花の位置は同じあるいはわずかに上、節間の長さはかなり短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の巻きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ4、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は中、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは浅、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は65C、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OP 14 P 8」は、対照品種「フロー サウスビーチ」と比較して、花弁の主な色が65Cであること、花柱の数が3～4本であること等で区別性が認められる。対照品種「マシュマローズ」と比較して、葉の巻きが無又は反曲が極弱であること、花弁の主な形がタイプ4であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29854号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	05 倒卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
OP 14 P 8

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	02 かなり短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	04 タイプ 4
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 65C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
OP 14 P 8

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	02 黄系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29855号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. OP 15 R 11

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、植物体の粗密は中、花の位置は上、節間の長さはかなり短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）は少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は波状、花卉の切れ込みの深さは極浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は44A、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OP 15 R 11」は、対照品種「マンマミーア」と比較して、葉の卷きが無又は反曲が極弱であること、がくのアントシアニンの着色が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ミアモーレ」と比較して、花冠下部の側面の形が凹であること、花卉の波打ちが中であること、子房の下部の色が黄系であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
OP 15 R 11

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
OP 15 R 11

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
OP 15 R 11

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29855号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 44A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
OP 15 R 11

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	02 黄系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 8 5 6 号 令和 5 年 9 月 1 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARLICREKIN

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、植物体の粗密は密、花の位置は上、節間の長さは短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の巻きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さは低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花卉の主な形はタイプ 4、花卉の波打ちは強、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は56D、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARLICREKIN」は、対照品種「フロー サウスビーチ」と比較して、草丈が中であること、花卉の波打ちが強であること等で区別性が認められる。対照品種「マシュマローズ」と比較して、花卉の波打ちが強であること、花卉の主な色が56Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 令和元年 1 2 月 2 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Crea」の変異株である。

Dianthus caryophyllus L.
BARLICREKIN

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	05 中
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	03 短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
BARLICREKIN

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29856号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	05 倒卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
BARLICREKIN

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	04 タイプ 4
44 花弁の波打ち	03 強
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 56D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
BARLICREKIN

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29857号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. 海老名 MK 1号 (エビナ MK 1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、植物体の粗密は中、花の位置は上、節間の長さはかなり短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は暗緑、葉の白粉の強弱は弱、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さは中、がくの幅はかなり狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）は少、花冠の高さは低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花卉の主な形はタイプ4、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さは浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は68B、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「海老名 MK 1号」は、対照品種「プリティセリウス」と比較して、草丈がやや低であること、花の位置が上であること等で区別性が認められる。対照品種「JABREA」と比較して、つぼみの形が長楕円形であること、子房の下部の色が黄系であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイポットアモーレ」と比較して、葉の白粉の強弱が弱であること、花卉の数（八重品種に限る。）が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

菅野政夫

神奈川県茅ヶ崎市萩園1649-11

菅野雅子

神奈川県茅ヶ崎市萩園1649-11

6 登録品種の育成をした者の氏名

菅野政夫 菅野雅子

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
海老名 MK 1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	04 やや狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
海老名 MK 1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	01 弱
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	02 かなり狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
海老名 MK 1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	04 タイプ 4
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 68B
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
海老名 MK 1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	02 黄系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	(0本)
63 花柱の長さ	
64 花柱の肩の有無	
65 柱頭の色	
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29858号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. 海老名 MK 2号 (エビナ MK 2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、植物体の粗密は密、花の位置は同じあるいはわずかに上、節間の長さはかなり短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さはやや短、がくの幅はかなり狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）は少、花冠の高さは低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は68C、花卉の二次色はN155C、花卉の覆輪部の幅は広、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「海老名 MK 2号」は、対照品種「パティシエール」と比較して、草丈がかなり低であること、花卉の数（八重品種に限る。）が少であること等で区別性が認められる。対照品種「オデッサ エイミー」と比較して、草丈がかなり低であること、がくのアントシアニンの着色が無又は極弱であること、花卉の主な色が68Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

菅野政夫
神奈川県茅ヶ崎市萩園1649-11
菅野雅子
神奈川県茅ヶ崎市萩園1649-11

6 登録品種の育成をした者の氏名

菅野政夫 菅野雅子

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
海老名 MK 2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	02 かなり低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
海老名 MK 2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	04 やや短
30 がくの幅	02 かなり狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
海老名 MK 2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 68C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート N155C

Dianthus caryophyllus L.
海老名 MK 2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	04 広
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	03 緑
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29859号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ゆきかなで (ユキカナデ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、植物体の粗密は中、花の位置は上、節間の長さはかなり短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は暗緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は直、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さは低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花卉の主な形はタイプ1、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さは極浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色はNN155B、花卉の二次色は50A、花卉の覆輪部の幅は狭、花卉の条の多少は中、花卉の斑点の多少は少、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆきかなで」は、対照品種「パナシェ」と比較して、花卉の主な色がNN155Bであること、花卉の二次色が50Aであること等で区別性が認められる。対照品種「シュガークレプ」と比較して、花卉の主な形がタイプ1であること、花卉の二次色が50Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
ゆきかなで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
ゆきかなで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
ゆきかなで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155B
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 50A

Dianthus caryophyllus L.
ゆきかなで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	02 狭
53 花弁の条の多少	03 中
54 花弁の斑点の多少	02 少
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29860号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ナスビアン (ナスビアン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、植物体の粗密は密、花の位置は同じあるいはわずかに上、節間の長さはかなり短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は暗緑、葉の白粉の強弱は弱、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さは中、がくの幅はやや狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は弱、がくのアントシアニン着色の分布は裂片の周縁、花型は八重、花の直径は中、花弁の数（八重品種に限る。）は少、花冠の高さは中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ2、花弁の波打ちは無又は弱、花弁の縁の切れ込みの多少は多、花弁の縁の形は鋸歯、花弁の切れ込みの深さは極深、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の主な色は67B、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナスビアン」は、対照品種「カラズ ドルチェ」と比較して、花弁の切れ込みの深さが極深であること、花弁の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ALLURA」と比較して、花弁の数（八重品種に限る。）が少であること、花弁の切れ込みの深さが極深であること、花弁の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
ナスビアン

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29860号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
ナスビアン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	01 弱
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	02 弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	01 裂片の周縁

Dianthus caryophyllus L.
ナスビアン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	05 中
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	02 タイプ 2
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	03 多
46 花弁の縁の形	04 鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	09 極深
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	05 中
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 67B
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
ナスビアン

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第29860号
52 花弁の覆輪部の幅	01 無	
53 花弁の条の多少	01 無	
54 花弁の斑点の多少	01 無	
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無	
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無	
57 花弁の三次色の模様	01 無	
58 花弁の三次色		
59 子房の形	04 長楕円形	
60 子房の下部の色	01 白系	
61 子房の表面	01 平滑	
62 花柱の数	01 2本	
63 花柱の長さ	02 中	
64 花柱の肩の有無	01 無	
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし	
66 開花期	03 早	
67 日持ち性		

1 品種登録の番号及び年月日 第29861号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. アプリシア (アプリシア)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、植物体の粗密は中、花の位置は上、節間の長さはかなり短、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は直、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは無又は弱、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは極浅、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は73C、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アプリシア」は、対照品種「ダイポットアモーレ」と比較して、花弁の主な形がタイプ3であること、花弁の主な色が73Cであること等で区別性が認められる。対照品種「マシュマローズ」と比較して、葉の白粉の強弱が中であること、花弁の主な色が73Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

「フルート」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
アプリシア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	04 やや狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
アプリシア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
アプリシア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 73C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
アプリシア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29862号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. レモンフィズ (レモンフィズ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、植物体の粗密は密、花の位置は同じあるいはわずかに上、節間の長さはかなり短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の卷きは反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は暗緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）は少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は中、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さは浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は2C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レモンフィズ」は、対照品種「フロー ゴールデンベイ」と比較して、花卉の切れ込みの深さが浅であること、花卉の覆輪部の幅が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ルミナリア」と比較して、花冠下部の側面の形が凹であること、柱頭の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
レモンフィズ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29862号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	03 反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
レモンフィズ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
レモンフィズ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29862号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 2C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
レモンフィズ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	04 黄
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29863号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. さくら月夜 (サクラツキヨ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、植物体の粗密は中、花の位置は同じあるいはわずかに上、節間の長さはかなり短、茎の太さは細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）はかなり少、花冠の高さは低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さは浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は55A、花卉の二次色は36D、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは大、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「さくら月夜」は、対照品種「ピンクエクレア」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、花卉の波打ちは無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ミルクサーモンピンク」と比較して、がくの長さが中であること、がくの裂片の縦軸の形が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
さくら月夜

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	03 細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
さくら月夜

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
さくら月夜

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	02 かなり少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 55A
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 36D

Dianthus caryophyllus L.
さくら月夜

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第29863号
52 花弁の覆輪部の幅	01 無	
53 花弁の条の多少	01 無	
54 花弁の斑点の多少	01 無	
55 花弁のぼかしの大きさ	04 大	
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無	
57 花弁の三次色の模様	01 無	
58 花弁の三次色		
59 子房の形	02 ひし形	
60 子房の下部の色	02 黄系	
61 子房の表面	01 平滑	
62 花柱の数	01 2本	
63 花柱の長さ	02 中	
64 花柱の肩の有無	01 無	
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし	
66 開花期	03 早	
67 日持ち性		

1 品種登録の番号及び年月日 第29864号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. フィエルテ (フィエルテ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、植物体の粗密は中、花の位置は上、節間の長さはかなり短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さはやや短、がくの幅は狭、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅は狭、花卉の主な色はNN155D、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フィエルテ」は、対照品種「サンフロール コスモス」と比較して、花卉の切れ込みの深さがかなり浅であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「フロー ホワイトベイ」と比較して、花卉の主な形がタイプ3であること、花卉の主な色がNN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
フィエルテ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
フィエルテ

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 8 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	04 やや短
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
フィエルテ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29864号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	03 狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
フィエルテ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29865号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. フェアリースマイル (フェアリースマイル)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、植物体の粗密は密、花の位置は同じあるいはわずかに上、節間の長さはかなり短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は直、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）は少、花冠の高さは低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は波状、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は44A、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フェアリースマイル」は、対照品種「ミアモーレ」と比較して、植物体の粗密が密であること、花の位置が同じあるいはわずかに上であること等で区別性が認められる。対照品種「CFPC チアフル」と比較して、花卉の縁の形が波状であること、花卉の切れ込みの深さがかなり浅であること等で区別性が認められる。対照品種「OP 15 R 11」と比較して、植物体の粗密が密であること、花の位置が同じあるいはわずかに上であること、子房の下部の色が白系であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

「CFPC チアフル」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
フェアリースマイル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	03 低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
フェアリースマイル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
フェアリースマイル

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第29865号
35 がくの裂片の先端部の形 36 がくの裂片の長さ 37 花型 38 花の直径 39 花弁の数（八重品種に限る。） 40 花冠の高さ 41 花冠上部の側面の形 42 花冠下部の側面の形 43 花弁の主な形 44 花弁の波打ち 45 花弁の縁の切れ込みの多少 46 花弁の縁の形 47 花弁の切れ込みの深さ 48 花弁の長さ 49 花弁の幅 50 花弁の主な色 51 花弁の二次色	01 鋭	
	03 短	
	02 八重	
	04 やや小	
	03 少	
	03 低	
	03 やや凸	
	01 凹	
	03 タイプ3	
	01 無又は弱	
	01 無又は少	
	01 波状	
	02 かなり浅	
	04 やや短	
	04 やや狭	
	RHSカラーチャート 44A	

Dianthus caryophyllus L.
フェアリースマイル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 8 6 6 号 令和 5 年 9 月 1 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. KLEDG18305

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、植物体の粗密は密、花の位置は同じあるいはわずかに上、節間の長さは短、茎の太さは細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の巻きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は緑、葉の白粉の強弱は弱、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さはやや短、がくの幅は極狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は直、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は一重、花の直径はかなり小、花冠の高さは極低、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は平、花卉の主な形はタイプ 3、花卉の波打ちは無又は弱、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さはやや浅、花卉の長さは短、花卉の幅は狭、花卉の主な色は 54C、花卉の二次色は 46D、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは中、花卉の三次色の模様は覆輪、花卉の三次色は 65C、開花期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLEDG18305」は、対照品種「ピグミンピンク」と比較して、花卉の切れ込みの深さがやや浅であること、花卉の主な色が 54C であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lena Gutbrodt

7 出願公表の年月日 令和元年 8 月 3 0 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Dianthus L.
KLEDG18305

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	03 低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	03 短
10 茎の太さ	03 細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus L.
KLEDG18305

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	01 緑
19 葉の白粉の強弱	01 弱
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	03 中
29 がくの長さ	04 やや短
30 がくの幅	01 極狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus L.
KLEDG18305

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	02 かなり短
37 花型	01 一重
38 花の直径	02 かなり小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	
40 花冠の高さ	01 極低
41 花冠上部の側面の形	02 平
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	04 やや浅
48 花弁の長さ	03 短
49 花弁の幅	03 狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 54C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 46D

Dianthus L.
KLEDG18305

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	03 中
57 花弁の三次色の模様	02 覆輪
58 花弁の三次色	RHSカラーチャート 65C
59 子房の形	04 長楕円形
60 子房の下部の色	02 黄系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	02 かなり早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 8 6 7 号 令和 5 年 9 月 1 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. KLEDG18267

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、植物体の粗密は密、花の位置は同じあるいはわずかに上、節間の長さはかなり短、茎の太さは細、茎の横断面の形は円形、葉の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は緑、葉の白粉の強弱は弱、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さはやや短、がくの幅はかなり狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は直、がくのアントシアニンの着色は強、がくのアントシアニン着色の分布はがく全体、花型は八重、花の直径は小、花弁の数（八重品種に限る。）はかなり少、花冠の高さはかなり低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花弁の主な形はタイプ 3、花弁の波打ちは無又は弱、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは中、花弁の長さはやや短、花弁の幅は狭、花弁の主な色は61B、花弁の二次色は59A、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは中、花弁の三次色の模様は無、開花期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLEDG18267」は、対照品種「KLEDG12163」と比較して、がくのアントシアニンの着色が強であること、花の直径が小であること、花弁の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ロディン」と比較して、草丈がかなり低であること、花の位置が同じあるいはわずかに上であること、花弁の二次色が59Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lena Gutbrodt

7 出願公表の年月日 令和元年 8 月 3 0 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus L.
KLEDG18267

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	02 かなり低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	03 細
11 茎の横断面の形	01 円形
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	02 楕円形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus L.
KLEDG18267

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	01 緑
19 葉の白粉の強弱	01 弱
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	04 やや短
30 がくの幅	02 かなり狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	04 強
34 がくのアントシアニン着色の分布	03 がく全体

Dianthus L.
KLEDG18267

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	03 小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	02 かなり少
40 花冠の高さ	02 かなり低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	05 中
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	03 狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 61B
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 59A

Dianthus L.
KLEDG18267

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	03 中
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	05 倒卵形
60 子房の下部の色	03 緑
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし
66 開花期	02 かなり早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29868号 令和5年9月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. タ雅1 (ユウガ`1)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、植物体の粗密は密、花の位置は同じあるいはわずかに上、節間の長さはかなり短、茎の太さは細、茎の横断面の形は円形、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は緑、葉の白粉の強弱は弱、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さは中、がくの幅は極狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は直、がくのアントシアニンの着色は強、がくのアントシアニン着色の分布は裂片の周縁、花型は一重、花の直径は中、花冠の高さは低、花冠上部の側面の形は凹、花冠下部の側面の形はやや凸、花弁の主な形はタイプ7、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は多、花弁の縁の形は鋸歯、花弁の切れ込みの深さは極深、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は65B、花弁の二次色は71B、花弁の覆輪部の幅は狭、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは大、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「タ雅1」は、対照品種「伊勢ナデシコ」と比較して、草丈がやや低であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ピグミンピンク」と比較して、花の直径が中であること、花弁の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社つのたんIP
愛知県一宮市萩原町萩原橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

角田ミサ子 角田志偉

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus L.
夕雅1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	03 細
11 茎の横断面の形	01 円形
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus L.
夕雅1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	01 緑
19 葉の白粉の強弱	01 弱
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	04 長
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	03 中
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	01 極狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	04 強
34 がくのアントシアニン着色の分布	01 裂片の周縁

Dianthus L.
夕雅1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	03 鋭尖
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	01 一重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	01 凹
42 花冠下部の側面の形	03 やや凸
43 花弁の主な形	07 タイプ7
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	03 多
46 花弁の縁の形	04 鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	09 極深
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 65B
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 71B

Dianthus L.
夕雅1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 8 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	02 狭
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	04 大
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	04 長楕円形
60 子房の下部の色	03 緑
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	07 紫
66 開花期	02 かなり早
67 日持ち性	