

- 1 品種登録の番号及び年月日 第29996号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia sinensis (L.) Kuntze 熊本TC01 (クマトTC01)
- 3 登録品種の特性の概要
樹勢は強、樹姿は直立～半直立、ほう芽期（一番茶）はやや早、一心三葉期の第三葉の色は濃緑、一心三葉期の新芽長はやや短、摘採期（一番茶）は中、摘採期の茶芽の芽数は少、葉の着生角度は水平、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の形は狭楕円形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の表面のしわの強弱は中、葉身の先端の形は鋭形、葉の周縁部の波打ちの強弱は無又は弱、開花期はやや晩、花の直径はやや小、内花弁の色は白、子房の毛じの有無は有、子房の毛じの粗密は密である。
出願品種「熊本TC01」は、対照品種「さきみどり」と比較して、摘採期の茶芽の芽数が少であること、葉身の長さがやや長であること、葉身の先端の形が鋭形であること、葉身の基部の形が鋭形であること等で区別性が認められる。対照品種「やぶきた」と比較して、摘採期の茶芽の芽数が少であること、葉身の幅がやや広であること、開花期がやや晩であること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山内崇 村上公朗 小野亮太郎 緒方伸吾 西澤法聖 入江慎二
- 7 出願公表の年月日 令和4年7月26日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
県内の地域在来系統から複数回に分けて有望株を選抜し、その中からさらに複数回にわたって選抜して育種したものである。

Camellia sinensis (L.) Kuntze
熊本TC01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	07 強
02 樹型	01 灌木性
03 樹姿	02 直立～半直立
04 分枝の粗密	04 やや粗
05 枝の屈曲の有無	01 無
06 ほう芽期（一番茶）	04 やや早
07 一心一葉始期	05 中
08 一心三葉期の第三葉の色	05 濃緑
09 新芽の毛じの有無	09 有
10 新芽の毛じの粗密	05 中
11 新芽の葉柄基部のアントシアニン着色の有無	01 無
12 一心三葉期の新芽長	04 やや短
13 摘採期（一番茶）	05 中
14 摘採期の茶芽の芽数	03 少
15 枝条の太さ	05 中
16 葉の着生角度	03 水平
17 葉身の長さ	06 やや長

Camellia sinensis (L.) Kuntze
熊本TC01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の幅	06 やや広
19 葉身の形	02 狭楕円形
20 葉身の緑色の濃淡	05 中
21 葉身の横断面の形	02 平
22 葉身の表面のしわの強弱	02 中
23 葉身の先端の形	02 鋭形
24 葉の周縁部の波打ちの強弱	01 無又は弱
25 葉の周縁部の鋸歯の強弱	05 中
26 葉身の基部の形	01 鋭形
27 開花期	06 やや晩
28 花柄の長さ	05 中
29 がくの外面の毛じの有無	01 無
30 がくの外面のアントシアニン着色の有無	01 無
31 花の直径	04 やや小
32 内花卉の色	02 白
33 子房の毛じの有無	09 有
34 子房の毛じの粗密	07 密

Camellia sinensis (L.) Kuntze
熊本TC01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花柱の長さ 36 花柱の分岐点の位置 37 雄ずいに対する柱頭の位置 38 発酵性 39 カフェイン含量	06 やや長
	04 やや低
	03 同位

1 品種登録の番号及び年月日 第29997号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. Artokimp

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN172C、舌状花の表面の二次色は3B、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は170B;13C(基部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Artokimp」は、対照品種「DELIZARITA DARK」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「シュードルチェ」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B.V.

Lavendelweg 15, 1435EW Rijnsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 令和3年5月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Fixxion Dark」に「Aliya」を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
Artokimp

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	01 無又は極小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 34B
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）		
36 頭花の花柄の長さ		06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）		03 少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）		04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）		
40 頭花の舌状花の形の数		01 1
41 頭花の舌状花の主要な形		01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形		
43 頭花の舌状花の三次的な形		
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）		05 水平
45 舌状花の表面の状態		02 うね状
46 舌状花のキールの数		
47 舌状花の花筒の長さ		01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）		05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2		
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）		04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）		

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部から1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	04 やや弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部から1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 弱
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N172C
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 3B
66 舌状花の表面の二次色の分布	08 基部
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 170B;13C(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N172C;3B(基部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 163B;13C(中央部の縦線)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	07 8.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Artokimp

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第29997号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29998号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DEK TO GET

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は61A、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は70B;NN155C(先端;基部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEK TO GET」は、対照品種「セイリゲル」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の舌状花の形の数1であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のエリオット」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dekker Breeding B.V.

Julianaweg 6a, 1711RP Hensbroek, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DEK TO GET

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	02 かなり斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 187D;4D(先端)
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部から1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	05 中
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 61A
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート NN155C
66 舌状花の表面の二次色の分布	02 先端部1/4、08 基部
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 70B;NN155C(先端;基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 61A;NN155C(先端部;基部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 70B;NN155C(先端部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	05 強いドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第2998号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DEK TO GET

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第29998号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29999号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DEKTYPHOON

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らしていないもの）は大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面の二次色はNN155B、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76B;NN155A(先端部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKTYPHOON」は、対照品種「セイフェスト」と比較して、花らいの外面の色がN79C;145D(先端部)であること、舌状花の裏面の色が76B;NN155A(先端部)であること等で区別性が認められる。対照品種「弓戸フーミン」と比較して、葉の一次欠刻の深さが極深であること、舌状花の長さ／幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dekker Breeding B. V.

Julianaweg 6a, 1711RP Hensbroek, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	09 極深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	07 多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	05 中
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	03 斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート N79C;145D(先端部)
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	07 大
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	07 高

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	04 やや粗
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	08 やや凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	07 強い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部から1/2まで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 外反
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部から1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	02 かなり弱
59 舌状花の長さ	06 やや長
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 70B
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート NN155B
66 舌状花の表面の二次色の分布	02 先端部1/4
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 76B;NN155A(先端部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 70B;NN155A(縁部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N155B;155A(先端部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	07 8.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
DEKTYPHOON

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 9 9 9 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30000号

令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFSALV1

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFSALV1」は、対照品種「ハウノホワイトティーン」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。対照品種「セイネフィー」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが中であること、頭花の高さ（摘らいしていないもの）が低であること等で区別性が認められる。対照品種「SKE160-5132」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和3年6月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	07 多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート NN155C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	04 中央部

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFSALV1

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30000号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30001号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. Marflor

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は46A、舌状花の表面の二次色は1A、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は51C;4A(基部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Marflor」は、対照品種「モゼフラム」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること等で区別性が認められる。対照品種「セイタチアナ」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIMORETTI」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Floritec Breeding B.V.
van Hemessenkade 7, 2481BG Woubrugge, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rob Noodelijck

7 出願公表の年月日 令和3年9月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
Marflor

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	09 極高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	04 紫
06 たく葉の大きさ	01 無又は極小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	05 中
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	06 やや大
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 60A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30001号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 46A
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 1A
66 舌状花の表面の二次色の分布	08 基部
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 51C;4A(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 46A;1A(基部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 51C;4A(基部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	04 やや円錐状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Marflor

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30001号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30002号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFARIS1

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFARIS1」は、対照品種「セイプリンス」と比較して、舌状花の先端の形が突起状であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「セリアルプス」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和3年8月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFARIS1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	05 中
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	05 中
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート NN155D
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部から1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	05 強いドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFARIS1

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30002号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30003号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFKIZ04

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN34A、舌状花の表面の二次色は1B、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は39A;1B(基部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFKIZ04」は、対照品種「DLFMAGNA」と比較して、舌状花の裏面の色が39A;1B(基部)であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）がやや斜上であること等で区別性が認められる。対照品種「スフェラ レッド」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）がやや斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFKIZ04

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	03 強
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	05 中
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	05 中
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 187C
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	04 やや粗
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	02 内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	03 基部から3/4まで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部から1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	01 内曲
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部から1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	02 かなり弱
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N34A
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 1B
66 舌状花の表面の二次色の分布	08 基部
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 39A;1B(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 185A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 181C;11C(至る所);3D(基部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFKIZ04

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30003号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30004号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFMARA1

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は管状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅は高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は極大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は145C、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）はNN155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFMARA1」は、対照品種「AVCLEAR」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「Yes Together」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「スピーディー」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	02 かなり小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	08 かなり長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	07 高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	03 短
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	01 広がる
15 葉の基部の形	02 鈍形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	03 少
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	03 浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	03 円筒形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 155C
30 頭花の型	02 一重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	02 アネモネ
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	02 2
41 頭花の舌状花の主要な形	04 管状
42 頭花の舌状花の二次的な形	03 さじ状
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	01 平滑
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	09 極長
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	02 扁円形
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	02 かなり狭
61 舌状花の長さ／幅	07 高
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	05 中
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	09 極大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート 145C
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	02 管状
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	04 やや短
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	02 6週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFMARA1

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30004号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30005号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFLARK3

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はNN74D、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75B;N144D(基部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFLARK3」は、対照品種「DAPITEC」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること等で区別性が認められる。対照品種「セイザック」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6.5週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFLARK3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	03 狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	03 円筒形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 72D
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	02 かなり小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	07 密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	03 強い凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	03 基部から3/4まで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	01 内曲
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部から1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 弱
59 舌状花の長さ	02 かなり短
60 舌状花の幅	02 かなり狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN74D
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート NN155C
66 舌状花の表面の二次色の分布	08 基部
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75B;N144D(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN74D;155C(基部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75B;NN155C(基部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	03 6.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
DLFLARK3

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30005号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30006号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFPOMP3

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度

（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFPOMP3」は、対照品種「太陽のブルーション」と比較して、舌状花の表面の主な色が69Cであること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイセルザム」と比較して、たく葉の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「Victory」と比較して、舌状花の表面の主な色が69Cであること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFPOMP3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	03 強
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	07 多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 75A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部から1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部から1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 69C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート N155B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 69D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N155B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	05 強いドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	07 8.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFPOMP3

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 0 0 6 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30007号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFP0WABL3

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は極多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は84C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76C;NN155A(基部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFP0WABL3」は、対照品種「レファミリー」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が極多であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「プラダ」と比較して、たく葉の大きさが中であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFP0WA3」の変異株である。

Chrysanthemum L.
DLFPOWABL3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	03 淡

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	03 円筒形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 181C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	04 やや少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	09 極多
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	06 外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	04 中央部

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 84C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 76C;NN155A(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75D;NN155B(至る所)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFPOWABL3

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30007号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30008号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFPOWAPA7

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は極多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜下、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面の二次色は155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75A;155A(基部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFPOWAPA7」は、対照品種「DLFPOWA3」と比較して、花らいの外面の色が60Cであること等で区別性が認められる。対照品種「プラダ」と比較して、たく葉の大きさが中であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFPOWA3」の変異株である。

Chrysanthemum L.
DLFPOWAPA7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30008号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	03 円筒形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 60C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	04 やや少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	09 極多
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	06 やや斜下
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	04 中央部

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N74C
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 155C
66 舌状花の表面の二次色の分布	08 基部
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75A;155A(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75B;NN155B(基部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75C;NN155C(基部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFPOWAPA7

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30008号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30009号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFMAPL6

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は12B、舌状花の表面の二次色は167C、舌状花の表面の二次色の分布2は至る所、舌状花の表面の二次色の型はまだら、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFMAPL6」は、対照品種「セイカミンオレンジ」と比較して、舌状花の裏面の色が6Cであること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。対照品種「DEKBARTOLI」と比較して、舌状花の表面の主な色が12Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	02 かなり小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	05 中
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 168A
30 頭花の型	04 露心する八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	07 多
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	02 基部から1/2まで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部から1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部から1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 弱
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 12B
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 167C
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	04 至る所
68 舌状花の表面の二次色の型	07 まだら

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 6C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N163C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 163B;2B(基部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFMAPL6

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30009号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30010号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus unshiu Marcow. にしおか (ニシカ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張、樹の大きさは中、樹勢はやや強、枝梢の太さはやや細、節間長はやや短、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身の大きさは小、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さはやや細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは軽、花弁の形は紡錘形、花弁の色は白、花弁の数は5枚、花糸の数は中、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、子房の形は扁球、果実の形は扁球、果実の重さは中、果皮の色は橙、油胞の大きさは中、果面の粗滑は中、果皮の厚さは中、果皮歩合は大、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少はやや多、甘味は極高、酸味は低、種子数は無、成熟期は極早である。
出願品種「にしおか」は、対照品種「ゆら早生」と比較して、甘味が極高であること等で区別性が認められる。対照品種「YN26」と比較して、甘味が極高であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社玄柑舎
福岡県八女市祈祷院45番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
西岡嗣郎
- 7 出願公表の年月日 令和元年8月30日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ゆら早生」の変異株である。

Citrus unshiu Marcow.
にしおか

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30010号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	07 開張
02 枝梢の密度	05 中
03 樹の大きさ	05 中
04 樹勢	06 やや強
05 枝梢の太さ	04 やや細
06 枝梢の長さ	03 短
07 節間長	04 やや短
08 枝梢のとげの多少	01 無
09 葉身の形	02 紡錘形
10 葉身先端の形	03 鋭形
11 葉身基部の形	02 鋭形
12 葉身波状の程度	03 弱
13 葉身の大きさ	03 小
14 葉身長	04 やや短
15 葉身幅	04 やや狭
16 葉形指数	05 中
17 葉の厚さ	05 中

Citrus unshiu Marcow.
にしおか

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30010号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 網脈の鮮明度	03 明瞭
19 翼葉の形	02 痕跡
20 葉柄の長さ	06 やや長
21 葉柄の太さ	04 やや細
22 花序の形成	01 単生
23 花(蕾)の重さ	03 軽
24 花弁の形	01 紡錘形
25 花弁の長さ	03 短
26 花弁の幅	07 広
27 花弁の色	01 白
28 花弁の数	02 5枚
29 花糸の数	05 中
30 花糸の分離の程度	02 一部合一
31 花粉の多少	03 少
32 子房の形	02 扁球
33 花柱の形	01 直
34 果実の形	02 扁球

Citrus unshiu Marcow.
にしおか

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30010号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 果形指数	04 やや小
36 果頂部の形	02 平坦
37 果頂部放射条溝の有無	01 無
38 果頂部の凹環の有無	01 無
39 果梗部の形	01 球面
40 果梗部放射条溝の多少	01 無
41 果心の充実度	05 中
42 果心の大きさ	03 小
43 果実の重さ	05 中
44 果皮の色	02 橙
45 アルベドの色	02 淡黄
46 油胞の大きさ	05 中
47 油胞の密度	07 密
48 油胞の凹凸	02 平
49 果面の粗滑	05 中
50 果皮の厚さ	05 中
51 果皮歩合	07 大

Citrus unshiu Marcow.
にしおか

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30010号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 剥皮の難易	03 易
53 じょうのう膜の硬さ	03 軟
54 さじょうの形	02 中
55 さじょうの大きさ	05 中
56 さじょう（果肉）の色	02 濃橙
57 果汁の多少	06 やや多
58 甘味	09 極高
59 酸味	03 低
60 種子数	01 無
61 胚の色	
62 胚の数	
63 発芽期	05 中
64 開花期	05 中
65 成熟期	01 極早

1 品種登録の番号及び年月日 第30011号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cornus L. レッド ムーン (レッド ムーン)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立性、樹高は低、枝の太さはやや細、新梢の色は黄緑、枝の色は褐、分枝性
は中、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は円形、葉縁の波打ちは
無、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、新葉の色は紅、成葉表面の色は緑、成葉裏面
の色は淡緑、秋季の葉色はその他（紫褐）、斑の有無は無、葉表面の毛は中、葉裏面
の毛は中、葉柄の長さはやや長、葉柄の色は黄緑、花序のタイプは頭状花序、花序の向
きは上向き、花序の大きさは中、総苞を含む花序の大きさは小、総苞のタイプは一重
咲、総苞の重なりは重ならない、総苞の開き方は水平、総苞の反り方は水平、総苞の
ねじれは無、総苞全体の形は楕円形、総苞片の長さは短、総苞片の幅は狭、総苞片
の色は47A、模様の有無は有、模様のタイプは基部別色、その他（先端）、模様の色
は1A、花柄の太さはやや細、花柄の長さは中、花の香りは無、花つきの多少は中、
開花性は一季咲、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レッド ムーン」は、対照品種「月光」と比較して、葉基部の形が円形
であること、総苞片の色が47Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サ
トミ」と比較して、総苞の重なりが重ならないであること、総苞片の色が47Aであ
ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

古賀誠
福岡県久留米市田主丸町上原846-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

古賀誠

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者の所有する常緑ヤマボウシの系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Cornus L.
レッド ムーン

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30011号
01 樹姿 02 樹高 03 枝の太さ 04 新梢の色 05 枝の色 06 枝の模様 07 分枝性 08 節間長 09 葉全体の形 10 葉先端の形 11 葉基部の形 12 葉縁の形 13 葉の反り 14 葉の湾曲 15 葉縁の波打ち 16 葉身長 17 葉身幅	01 直立性	
	03 低	
	04 やや細	
	02 黄緑	
	06 褐	
	01 無	
	05 中	
	03 短	
	04 楕円形	
	01 鋭尖形	
	04 円形	
	01 全縁	
	05 水平	
	03 内曲	
	01 無	
	04 やや短	
	04 やや狭	

Cornus L.
レッド ムーン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の厚さ	05 中
19 新芽の色	06 紅
20 新葉の色	07 紅
21 新葉の着色	09 有
22 成葉表面の色	03 緑
23 成葉裏面の色	03 淡緑
24 葉色の変化性	01 無
25 秋季の葉色	09 その他（紫褐）
26 斑の有無	01 無
27 斑のパターン	
28 斑色	
29 斑色の変化性	
30 葉の光沢	05 中
31 葉表面の毛	05 中
32 葉裏面の毛	05 中
33 葉脈の明瞭さ	01 明瞭
34 葉柄の太さ	04 やや細

Cornus L.
レッド ムーン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉柄の長さ	06 やや長
36 葉柄の色	02 黄緑
37 花序のタイプ	03 頭状花序
38 花序の向き	03 上向き
39 花序の大きさ	05 中
40 総苞を含む花序の大きさ	03 小
41 小花の大きさ	(開やくなし。形質42、59、60について同様)
42 小花の色	
43 総苞のタイプ	01 一重咲
44 総苞の重なり	01 重ならない
45 総苞の開き方	05 水平
46 総苞の反り方	05 水平
47 総苞の反りの程度	01 極弱
48 総苞の湾曲	05 水平
49 総苞のねじれ	01 無
50 総苞全体の形	02 楕円形
51 総苞先端の形	01 鋭尖形

Cornus L.
レッド ムーン

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30011号
52 総苞片の長さ	03 短	
53 総苞片の幅	03 狭	
54 総苞片数	05 中	
55 総苞片の色	RHSカラーチャート 47A	
56 模様の有無	09 有	
57 模様のタイプ	03 基部別色、09 その他（先端）	
58 模様の色	RHSカラーチャート 1A	
59 雌ずいの色		
60 雄ずいの色		
61 花柄の太さ	04 やや細	
62 花柄の長さ	05 中	
63 花柄の色	03 黄緑	
64 果実の形	04 球形	
65 果実の長さ	05 中	
66 果実の幅	04 やや狭	
67 果実の色	04 黒紫	
68 花の香り	01 無	

Cornus L.
レッド ムーン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 稔実性 70 到花樹令の早晩 71 花つきの多少 72 開花性 73 開花期 74 落葉性	
	05 中
	01 一季咲
	07 晩
	03 常緑性

1 品種登録の番号及び年月日 第30012号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cosmos Cav. ドワーフカーペット レモンイエロー (ドワーフカーペット レモンイエロー)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、茎のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の緑色の濃淡は中、葉の裂片の数は中、花盤の型はデイジー、副花弁の有無は無、頭花の舌状花数は少、頭花の直径はかなり小、花盤の直径は小、花盤の頭花に対する直径の大きさは小、舌状花の形は舌状、舌状花の縦断面の形状はわずかに内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや小、舌状花の表面の主な色は14A、舌状花の表面の二次色の分布は無、舌状花の裏面の主な色は11B、舌状花の先端部の切れ込みは浅、花盤の主な色は13Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ドワーフカーペット レモンイエロー」は、対照品種「エロー ロード」と比較して、舌状花の裏面の主な色が11Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通17丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 古林健吾

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「エローロード」の変異株である。

Cosmos Cav.

ドワーフカーペット レモンイエロー

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 0 1 2 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	02 かなり低
03 一次側枝の数	03 少
04 茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
05 茎の毛の粗密	02 中
06 葉の長さ	03 短
07 葉の幅	03 狭
08 葉の緑色の濃淡	02 中
09 葉の裂片の数	03 中
10 葉の先端裂片の幅	06 やや広
11 花柄の長さ	03 短
12 頭花の向き	01 上向き
13 花盤の型	01 デイジー
14 副花弁の有無	01 無
15 頭花の舌状花数	02 少
16 頭花の直径	02 かなり小
17 花盤の直径	02 小

Cosmos Cav.

ドワーフカーペット レモンイエロー

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 0 1 2 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花盤の頭花に対する直径の大きさ	02 小
19 舌状花の形	01 舌状
20 舌状花の縦断面の形状	03 わずかに内曲
21 舌状花の湾曲した部位	02 先端
22 舌状花の長さ	02 かなり短
23 舌状花の幅	03 狭
24 舌状花の長さ／幅	04 やや小
25 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 14A
26 舌状花の表面の二次色	
27 舌状花の表面の二次色の分布	01 無
28 舌状花の表面の二次色の分布2	
29 舌状花の表面の二次色の型	
30 舌状花の表面の三次色	
31 舌状花の表面の三次色の分布	01 無
32 舌状花の表面の三次色の分布2	
33 舌状花の表面の三次色の型	
34 舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート 11B

ドワーフカーペット レモンイエロー

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質

35 舌状花の先端部の切れ込み

03 浅

36 花盤の主な色

RHSカラーチャート 13A

1 品種登録の番号及び年月日 第30013号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 夜空の星 (ヨゾラノホシ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は中、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は12A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は12A, 174B（基部）、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は174D、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は12A、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は12A, 174B（基部）、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさはやや小、ペタルの斑点の色は172A、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は174D、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は10C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は13B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色はN34A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色はN34A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「夜空の星」は、対照品種「黄蝶遊々」と比較して、リップの斑点の有無が有であること、ずい柱の先端の色が175Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ハニーキャット」と比較して、リップの斑点の有無が有であること、ずい柱の先端の色が175Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野圭佑

7 出願公表の年月日 令和4年3月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「アートフラワー ゴールドマスク」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Cymbidium Sw.
夜空の星

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	05 中
04 葉の先端と垂線に対する角度	03 小
05 り球茎の形成の有無	09 明確
06 り球茎の大きさ	05 中
07 り球茎の縦断面の形	04 卵形
08 り球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	05 中
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	03 狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.
夜空の星

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	05 中
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	09 有
28 花茎のほう葉の大きさ	04 やや小
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	03 短
32 花の幅	04 やや狭
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	07 広
36 ドーサルセパルの正面の形	05 倒卵形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	07 広
43 ラテラルセパルの正面の形	05 倒卵形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	06 やや強
48 セパルの色数	03 3
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 12A
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 12A, 174B (基部)

Cymbidium Sw.
夜空の星

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 174D
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	06 やや広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 III型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	06 やや強
66 ペタルの色数	04 4 以上
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 12A
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 12A, 174B (基部)
70 ペタルの斑点の有無	09 有
71 ペタルの斑点の大きさ	04 やや小
72 ペタルの斑点の色	RHSカラーチャート 172A
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 174D
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	07 広
79 リップの正面の形	04 円形
80 リップの縦断面の形	05 V型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
85 リップの色数	03 3

Cymbidium Sw.
夜空の星

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 10C
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 13B
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	04 やや小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート N34A
92 リップのくさびの有無	09 有
93 リップのくさびの色	RHSカラーチャート N34A
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート N170B
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 175C
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 176A
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 11C

Cymbidium Sw.
夜空の星

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	03 冬咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30014号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. そよ風のダイアリー (ソヨセノダイアリー)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は中、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は150C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は150D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は150D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はNN155A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はNN155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はNN155C、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は春咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「そよ風のダイアリー」は、対照品種「スペースシティ」と比較して、ペタルの中央部の色が150Dであること、リップの色数が1であること等で区別性が認められる。対照品種「風立ちぬ」と比較して、ペタルの中央部の色が150Dであること、リップの色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野圭佑

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「プラーレ ポエムグリーン」を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30014号
01 株の大きさ	06 やや大	
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上	
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小	
04 葉の先端と垂線に対する角度	03 小	
05 り球茎の形成の有無	09 明確	
06 り球茎の大きさ	05 中	
07 り球茎の縦断面の形	02 楕円形	
08 り球茎の横断面の形	01 楕円形	
09 葉の数	05 中	
10 葉の長さ	05 中	
11 葉の幅	03 狭	
12 葉の厚さ	04 やや薄	
13 葉の形	02 線形	
14 葉の先端の形	01 鋭形	
15 葉の先端の対称性	02 対称	
16 葉の横断面の形	01 平形	
17 葉の欠刻の有無	01 無	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30014号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	05 中
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	02 部分抱・平咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	05 中
33 花の香り	01 無又は極弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	07 広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	06 やや広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	04 やや弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
48 セパルの色数	02 2
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 150C
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 150D

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30014号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	01 無
58 セパルの条線の色	
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	05 中
61 ペタルの正面の形	03 楕円形
62 ペタルの縦断面の形	03 III型
63 ペタルの先端の形	02 鋭形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
66 ペタルの色数	02 2
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 150D
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30014号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート NN155A
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	01 無
76 ペタルの条線の色	
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	07 広
79 リップの正面の形	01 長三角形
80 リップの縦断面の形	06 VI型
81 リップの先端の形	02 鋭形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	05 中
85 リップの色数	01 1

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30014号
86	リップの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
87	リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88	リップの周縁の色	RHSカラーチャート NN155C
89	リップの斑点の有無	01 無
90	リップの斑点の大きさ	
91	リップの斑点の色	
92	リップのくさびの有無	01 無
93	リップのくさびの色	
94	リップの条線の有無	01 無
95	リップの条線の色	
96	ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 155B
97	ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 8D
98	ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99	ずい柱の斑点の有無	01 無
100	ずい柱の斑点の大きさ	
101	ずい柱の斑点の色	
102	ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 13D

Cymbidium Sw.
そよ風のダイアリー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	04 春咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30015号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. CV1578

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや少、花茎の長さはやや短、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは中、花の幅は中、花の香りは強、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は64D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅はかなり広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はNN155C, 64B(基部)、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや強、リップの中央部の色は4D、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CV1578」は、対照品種「にじおと」と比較して、リップの周縁の色が64Bであること、ずい柱の中央部の色が64Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エンザンスプリングハレルヤ」と比較して、ペタルの周縁の色がNN155C, 64B(基部)であること、リップの斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山譲治

7 出願公表の年月日 令和4年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30015号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	04 やや小
02 葉の先端の地際に対する位置	05 同位
03 葉の最高点と垂線に対する角度	03 小
04 葉の先端と垂線に対する角度	06 やや大
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	04 やや小
07 ギ球茎の縦断面の形	04 卵形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	03 狭
12 葉の厚さ	03 薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	01 平形
17 葉の欠刻の有無	01 無

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30015号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	04 やや少
23 花茎の長さ	04 やや短
24 花茎の太さ	05 中
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	02 部分抱・平咲
31 花の長さ	05 中
32 花の幅	05 中
33 花の香り	03 強
34 ドーサルセパルの長さ	06 やや長

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30015号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	08 かなり広
36 ドーサルセパルの正面の形	05 倒卵形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	06 やや長
42 ラテラルセパルの幅	08 かなり広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	06 やや強
48 セパルの色数	02 2
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 64D

Cymbidium Sw.
CV1578

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30015号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	01 無
58 セパルの条線の色	
59 ペタルの長さ	06 やや長
60 ペタルの幅	08 かなり広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 Ⅲ型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	06 やや強
66 ペタルの色数	02 2
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30015号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート NN155C, 64B(基部)
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	01 無
76 ペタルの条線の色	
77 リップの長さ	08 かなり長
78 リップの幅	07 広
79 リップの正面の形	04 円形
80 リップの縦断面の形	05 V型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	06 やや強
85 リップの色数	02 2

Cymbidium Sw.
CV1578

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 4D
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 64B
89 リップの斑点の有無	01 無
90 リップの斑点の大きさ	
91 リップの斑点の色	
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 64B
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 64A
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	02 かなり小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 64A
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 4D

Cymbidium Sw.
CV1578

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	03 冬咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30016号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. CG1180

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はかなり少、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや少、花茎の長さは中、花茎の太さは細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はかなり狭、ドーサルセパルの正面の形は広線形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅はかなり狭、ラテラルセパルの正面の形は広線形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は145C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は144B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は144A、ペタルの長さは短、ペタルの幅はかなり狭、ペタルの正面の形は広線形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は145C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は144B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は144A、リップの長さは短、リップの幅は狭、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は150D、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は150D、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は春咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CG1180」は、対照品種「雨月」と比較して、ペタルの周縁の色が144Bであること、リップの正面の形が長三角形であること等で区別性が認められる。対照品種「春一番」と比較して、ペタルの幅がかなり狭であること、リップの正面の形が長三角形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山譲治

7 出願公表の年月日 令和4年6月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30016号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小
04 葉の先端と垂線に対する角度	03 小
05 り球茎の形成の有無	09 明確
06 り球茎の大きさ	04 やや小
07 り球茎の縦断面の形	03 円形
08 り球茎の横断面の形	02 円形
09 葉の数	02 かなり少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	02 かなり狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.
CG1180

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30016号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	04 やや少
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	03 細
25 花茎の強さ	03 弱
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	02 部分抱・平咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	03 狭
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	04 やや短

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30016号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	02 かなり狭
36 ドーサルセパルの正面の形	02 広線形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	04 IV型
38 ドーサルセパルの先端の形	02 鋭形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	03 短
42 ラテラルセパルの幅	02 かなり狭
43 ラテラルセパルの正面の形	02 広線形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	04 IV型
45 ラテラルセパルの先端の形	02 鋭形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
48 セパルの色数	03 3
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 145C
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 144B

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30016号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 144A
59 ペタルの長さ	03 短
60 ペタルの幅	02 かなり狭
61 ペタルの正面の形	01 広線形
62 ペタルの縦断面の形	04 IV型
63 ペタルの先端の形	02 鋭形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	03 弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
66 ペタルの色数	03 3
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 145C
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30016号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 144B
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 144A
77 リップの長さ	03 短
78 リップの幅	03 狭
79 リップの正面の形	01 長三角形
80 リップの縦断面の形	06 VI型
81 リップの先端の形	02 鋭形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
85 リップの色数	01 1

Cymbidium Sw.
CG1180

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 150D
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 150D
89 リップの斑点の有無	01 無
90 リップの斑点の大きさ	
91 リップの斑点の色	
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 4B
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 7A
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	01 無
100 ずい柱の斑点の大きさ	
101 ずい柱の斑点の色	
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 6D

Cymbidium Sw.
CG1180

登 録 番 号 第 3 0 0 1 6 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	04 春咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30017号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 桃雪花 (モモセッカ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色は4D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は186D、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「桃雪花」は、対照品種「舞うさぎ」と比較して、セパルの周縁の色が186Bであること、ペタルの周縁の色が186Cであること等で区別性が認められる。対照品種「桃色小町」と比較して、ペタルの縦断面の形がV型であること、リップの正面の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	01 かなり上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	03 小
04 葉の先端と垂線に対する角度	02 かなり小
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	05 中
07 ギ球茎の縦断面の形	02 楕円形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	03 狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	06 やや多
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	05 中
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	02 部分抱・平咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	05 中
33 花の香り	01 無又は極弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	07 広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	05 中
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	06 やや広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	06 やや強
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
48 セパルの色数	02 2
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート N155B
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 186B

Cymbidium Sw.
桃雪花

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	01 無
58 セパルの条線の色	
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	07 広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	05 V型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	04 やや弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
66 ペタルの色数	02 2
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155B
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 186C
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	01 無
76 ペタルの条線の色	
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	06 やや広
79 リップの正面の形	04 円形
80 リップの縦断面の形	05 V型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	05 中
85 リップの色数	02 2

Cymbidium Sw.
桃雪花

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 4D
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 186D
89 リップの斑点の有無	01 無
90 リップの斑点の大きさ	
91 リップの斑点の色	
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート NN155C
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	01 無
100 ずい柱の斑点の大きさ	
101 ずい柱の斑点の色	
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 11D

Cymbidium Sw.
桃雪花

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	02 初冬咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30018号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. メルティスマイル (メルティスマイル)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はNN155C, 65B（基部）、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はNN155C, 65B（基部）、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はやや弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや強、リップの中央部の色は8C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は76C、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルティスマイル」は、対照品種「エンゼルナースユキ冬のソナタ」と比較して、ラテラルセパルの周縁の反転の強弱が中であること、リップの正面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「夢咲あんな」と比較して、リップの斑点の有無が無であること、ずい柱の先端の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野圭佑

7 出願公表の年月日 令和4年5月6日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ハッピーフラワー 花絵巻」に「ミッチェル」を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30018号
01 株の大きさ	06 やや大	
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上	
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小	
04 葉の先端と垂線に対する角度	02 かなり小	
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確	
06 ギ球茎の大きさ	05 中	
07 ギ球茎の縦断面の形	02 楕円形	
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形	
09 葉の数	04 やや少	
10 葉の長さ	05 中	
11 葉の幅	03 狭	
12 葉の厚さ	04 やや薄	
13 葉の形	02 線形	
14 葉の先端の形	01 鋭形	
15 葉の先端の対称性	02 対称	
16 葉の横断面の形	02 V形	
17 葉の欠刻の有無	01 無	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30018号
18 葉のねじれの強弱	02 かなり弱	
19 葉の緑色の濃淡	05 中	
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無	
21 花序の型	02 総状	
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中	
23 花茎の長さ	05 中	
24 花茎の太さ	05 中	
25 花茎の強さ	05 中	
26 花茎の向き	03 斜上	
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無	
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中	
29 花型	01 一重	
30 花の咲き型	02 部分抱・平咲	
31 花の長さ	04 やや短	
32 花の幅	05 中	
33 花の香り	01 無又は極弱	
34 ドーサルセパルの長さ	05 中	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30018号
35	ドーサルセパルの幅	07 広
36	ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37	ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38	ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39	ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	04 やや弱
40	ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41	ラテラルセパルの長さ	05 中
42	ラテラルセパルの幅	07 広
43	ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44	ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45	ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46	ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	05 中
47	ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
48	セパルの色数	02 2
49	セパルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
50	セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51	セパルの周縁の色	RHSカラーチャート NN155C, 65B (基部)

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無	
53 セパルの斑点の大きさ		
54 セパルの斑点の色		
55 セパルのくさびの有無	01 無	
56 セパルのくさびの色		
57 セパルの条線の有無	01 無	
58 セパルの条線の色		
59 ペタルの長さ	05 中	
60 ペタルの幅	07 広	
61 ペタルの正面の形	03 楕円形	
62 ペタルの縦断面の形	04 IV型	
63 ペタルの先端の形	03 鈍形	
64 ペタルの周縁の反転の強弱	03 弱	
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	06 やや強	
66 ペタルの色数	02 2	
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C	
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
69	ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート NN155C, 65B (基部)
70	ペタルの斑点の有無	01 無
71	ペタルの斑点の大きさ	
72	ペタルの斑点の色	
73	ペタルのくさびの有無	01 無
74	ペタルのくさびの色	
75	ペタルの条線の有無	01 無
76	ペタルの条線の色	
77	リップの長さ	07 長
78	リップの幅	07 広
79	リップの正面の形	04 円形
80	リップの縦断面の形	04 IV型
81	リップの先端の形	03 鈍形
82	リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83	リップの周縁の反転の強弱	04 やや弱
84	リップの周縁の波打ちの強弱	06 やや強
85	リップの色数	02 2

Cymbidium Sw.
メルティスマイル

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30018号
86	リップの中央部の色	RHSカラーチャート 8C
87	リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88	リップの周縁の色	RHSカラーチャート 76C
89	リップの斑点の有無	01 無
90	リップの斑点の大きさ	
91	リップの斑点の色	
92	リップのくさびの有無	01 無
93	リップのくさびの色	
94	リップの条線の有無	01 無
95	リップの条線の色	
96	ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート NN155B
97	ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート NN155B
98	ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99	ずい柱の斑点の有無	01 無
100	ずい柱の斑点の大きさ	
101	ずい柱の斑点の色	
102	ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 158D

Cymbidium Sw.
メルティスマイル

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30018号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	02 初冬咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30019号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 冬の陽だまり (フユヒタマリ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は186D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は186B、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は186D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186B、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさはかなり小、ペタルの斑点の色は186A、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は186B、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は5D、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は186B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は61A、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「冬の陽だまり」は、対照品種「紅ちどり」と比較して、リップの周縁の色が186Bであること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「福娘」と比較して、セパルの周縁の色が186Bであること、リップのくさびの色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野圭佑

7 出願公表の年月日 令和4年7月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「レッドセンセーション 光彩」に「ピュアメロディ さくや姫」を交配し、選抜したものである。

Cymbidium Sw.
冬の陽だまり

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30019号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小
04 葉の先端と垂線に対する角度	03 小
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	05 中
07 ギ球茎の縦断面の形	02 楕円形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	06 やや長
11 葉の幅	04 やや狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	01 平形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.
冬の陽だまり

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30019号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	06 やや多
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	06 やや太
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	03 短
32 花の幅	04 やや狭
33 花の香り	01 無又は極弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

Cymbidium Sw.
冬の陽だまり

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30019号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	07 広
36 ドーサルセパルの正面の形	05 倒卵形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	07 広
43 ラテラルセパルの正面の形	05 倒卵形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	04 やや弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
48 セパルの色数	02 2
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 186D
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 186B

Cymbidium Sw.
冬の陽だまり

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無	
53 セパルの斑点の大きさ		
54 セパルの斑点の色		
55 セパルのくさびの有無	01 無	
56 セパルのくさびの色		
57 セパルの条線の有無	09 有	
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 186B	
59 ペタルの長さ	05 中	
60 ペタルの幅	07 広	
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形	
62 ペタルの縦断面の形	03 III型	
63 ペタルの先端の形	03 鈍形	
64 ペタルの周縁の反転の強弱	03 弱	
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱	
66 ペタルの色数	03 3	
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 186D	
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭	

Cymbidium Sw.
冬の陽だまり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 186B
70 ペタルの斑点の有無	09 有
71 ペタルの斑点の大きさ	02 かなり小
72 ペタルの斑点の色	RHSカラーチャート 186A
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 186B
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	07 広
79 リップの正面の形	04 円形
80 リップの縦断面の形	04 IV型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
85 リップの色数	03 3

Cymbidium Sw.
冬の陽だまり

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
86	リップの中央部の色	RHSカラーチャート 5D
87	リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88	リップの周縁の色	RHSカラーチャート 186B
89	リップの斑点の有無	09 有
90	リップの斑点の大きさ	03 小
91	リップの斑点の色	RHSカラーチャート 61A
92	リップのくさびの有無	09 有
93	リップのくさびの色	RHSカラーチャート 61A
94	リップの条線の有無	01 無
95	リップの条線の色	
96	ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート NN155A
97	ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 70B
98	ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99	ずい柱の斑点の有無	09 有
100	ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101	ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 70A
102	ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 4D

Cymbidium Sw.
冬の陽だまり

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30019号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	02 初冬咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30020号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. トワイライトルージュ (トワイトルージュ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はNN155C, 145C（基部）、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はNN155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は9D、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は63B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は63B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トワイライトルージュ」は、対照品種「ミマジェンヌ」と比較して、リップの周縁の色が63Bであること、ずい柱の先端の色が70Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーエール」と比較して、リップの周縁の色が63Bであること、ずい柱の先端の色が70Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野圭佑

7 出願公表の年月日 令和4年5月6日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ハッピーエール」の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	01 かなり上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	03 小
04 葉の先端と垂線に対する角度	02 かなり小
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	05 中
07 ギ球茎の縦断面の形	02 楕円形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	04 やや狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	01 平形
17 葉の欠刻の有無	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	06 やや多
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	05 中
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	03 短
32 花の幅	04 やや狭
33 花の香り	01 無又は極弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	07 広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	07 広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
48 セパルの色数	02 2
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート NN155C, 145C (基部)

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	01 無
58 セパルの条線の色	
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	06 やや広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 Ⅲ型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
66 ペタルの色数	01 1
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート NN155C
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	01 無
76 ペタルの条線の色	
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	06 やや広
79 リップの正面の形	02 正三角形
80 リップの縦断面の形	04 IV型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	03 弱
85 リップの色数	02 2

Cymbidium Sw.
トワイライトルージュ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 9D
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 63B
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	03 小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 63B
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート NN155A
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 70C
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	01 無
100 ずい柱の斑点の大きさ	
101 ずい柱の斑点の色	
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 8D

Cymbidium Sw.
トワイライトルージュ

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	03 冬咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30021号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. あかいいと (アカイト)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は70D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は64A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は64B、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は70D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は64A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は64B、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はやや弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はNN155A、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は63A、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は春咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「あかいいと」は、対照品種「ななつぼし」と比較して、リップの斑点の有無が無であること、ずい柱の先端の色が186Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ファーストストーリー」と比較して、リップの斑点の有無が無であること、ずい柱の先端の色が186Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユウ
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 令和4年6月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

サニーサイドに「セレブの集い」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	01 かなり上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小
04 葉の先端と垂線に対する角度	02 かなり小
05 り球茎の形成の有無	09 明確
06 り球茎の大きさ	05 中
07 り球茎の縦断面の形	02 楕円形
08 り球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	06 やや長
11 葉の幅	03 狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.
あかいいと

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	02 かなり弱
19 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	06 やや多
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	05 中
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	03 小
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	05 中
33 花の香り	01 無又は極弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	07 広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	07 広
43 ラテラルセパルの正面の形	05 倒卵形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	04 やや弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
48 セパルの色数	03 3
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 70D
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 64A

Cymbidium Sw.
あかいいと

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 64B
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	06 やや広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 III型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
66 ペタルの色数	03 3
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 70D
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

Cymbidium Sw.
あかいいと

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 64A
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 64B
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	06 やや広
79 リップの正面の形	02 正三角形
80 リップの縦断面の形	04 IV型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	04 やや弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	05 中
85 リップの色数	02 2

Cymbidium Sw.
あかいいと

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート NN155A
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 63A
89 リップの斑点の有無	01 無
90 リップの斑点の大きさ	
91 リップの斑点の色	
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート NN155A
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 186D
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	01 無
100 ずい柱の斑点の大きさ	
101 ずい柱の斑点の色	
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 4D

Cymbidium Sw.
あかいいと

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	04 春咲

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30022号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hebe Comm. ex Juss. TULL 304
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は半直立、樹高はやや低、幼しょうのアントシアニンの着色は無又は極弱、幼しょうの毛の有無は無、新しょうの枝の色は緑、枝の節間長はやや短、葉芽の隙間の有無は無、葉柄の有無は無、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅はやや小、葉身の形は倒披針形、葉身の最大幅の位置は先端部、葉身の先端の形は鋭形、葉身の周縁の鋸歯の有無は無、葉身の主な色は139A、葉身の二次色の分布は無、葉身の三次色の分布は無、花序の着生位置は腋生、花序の形は三角形、花序の長さは短、花序の幅はかなり狭、花序の花の粗密は密、花冠の色の変化の強弱は無又は弱、花冠の幅はかなり狭、花冠裂片の表面の色は76D、花筒部のがくに対する長さは同等、花筒部の外面の色はNN155Aである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「TULL 304」は、対照品種「UNGVE11」と比較して、樹高がやや低であること、葉身の主な色が139Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Purple Pixie」と比較して、枝の節間のアントシアニンの着色が弱であること、葉身の長さが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Padraig Tully
Sweeps, Richardstown, Ballyboughal, County Dublin, Ireland
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Padraig Tully
- 7 出願公表の年月日 令和元年7月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Black Beauty」の変異株である。

Hebe Comm. ex Juss.
TULL 304

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 半直立
02 樹高	04 やや低
03 葉の粗密	05 中
04 幼しょうのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
05 幼しょうの毛の有無	01 無
06 幼しょうの毛の粗密	
07 新しょうの枝の色	02 緑
08 枝の節間長	04 やや短
09 枝の節間のアントシアニンの着色	03 弱
10 葉芽の隙間の有無	01 無
11 葉柄の有無	01 無
12 葉柄の長さ	
13 葉の着生角度	04 水平
14 葉身の長さ	05 中
15 葉身の幅	04 やや狭
16 葉身の長さ／幅	04 やや小
17 葉身の形	05 倒披針形

Hebe Comm. ex Juss.
TULL 304

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30022号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の最大幅の位置	03 先端部
19 葉身の先端の形	02 鋭形
20 葉身の横断面の形	02 平
21 葉身の周縁の鋸歯の有無	01 無
22 葉身の主な色	RHSカラーチャート 139A
23 葉身の二次色の分布	01 無
24 葉身の二次色	
25 葉身の二次色の面積	
26 葉身の三次色の分布	01 無
27 葉身の三次色	
28 葉身の光沢	03 中
29 葉身のろう質	01 無又は極弱
30 花序の着生位置	03 腋生
31 花序の形	01 三角形
32 花序の長さ	03 短
33 花序の幅	02 かなり狭
34 花序の花の粗密	07 密

TULL 304

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30022号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30023号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hebe Comm. ex Juss. NGHEB30

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高は高、幼しょうのアントシアニンの着色は極強、幼しょうの毛の有無は有、新しょうの枝の色は紫、枝の節間長は中、葉芽の隙間の有無は無、葉柄の有無は無、葉身の長さは極長、葉身の幅は広、葉身の長さ／幅は小、葉身の形は楕円形、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の先端の形は鋭形、葉身の周縁の鋸歯の有無は無、葉身の主な色は147A、葉身の二次色の分布は不規則、葉身の二次色は200A、葉身の三次色の分布は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NGHEB30」は、対照品種「UNGVE11」と比較して、葉身の長さが極長であること、葉身の主な色が147Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Stephen Burton

249 Peak Road, RD1, Cambridge 3493, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

Stephen Burton

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統の変異株である。

Hebe Comm. ex Juss.
NGHEB30

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立
02 樹高	07 高
03 葉の粗密	03 粗
04 幼しょうのアントシアニンの着色	05 極強
05 幼しょうの毛の有無	09 有
06 幼しょうの毛の粗密	02 粗
07 新しょうの枝の色	08 紫
08 枝の節間長	05 中
09 枝の節間のアントシアニンの着色	07 強
10 葉芽の隙間の有無	01 無
11 葉柄の有無	01 無
12 葉柄の長さ	
13 葉の着生角度	04 水平
14 葉身の長さ	09 極長
15 葉身の幅	07 広
16 葉身の長さ／幅	03 小
17 葉身の形	04 楕円形

Hebe Comm. ex Juss.
NGHEB30

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の最大幅の位置	02 中央部
19 葉身の先端の形	02 鋭形
20 葉身の横断面の形	01 凹
21 葉身の周縁の鋸歯の有無	01 無
22 葉身の主な色	RHSカラーチャート 147A
23 葉身の二次色の分布	08 不規則
24 葉身の二次色	RHSカラーチャート 200A
25 葉身の二次色の面積	03 小
26 葉身の三次色の分布	01 無
27 葉身の三次色	
28 葉身の光沢	03 中
29 葉身のろう質	01 無又は極弱
30 花序の着生位置	(開花なし。形質31から40について同様)
31 花序の形	
32 花序の長さ	
33 花序の幅	
34 花序の花の粗密	

Hebe Comm. ex Juss.
NGHEB30

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の色の変化の強弱 36 花冠の幅 37 花冠裂片の表面の色 38 花筒部のがくに対する長さ 39 花筒部の外面の色 40 花序の数	

1 品種登録の番号及び年月日 第30024号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hebe Comm. ex Juss. CELE

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高は中、幼しょうのアントシアニンの着色は弱、幼しょうの毛の有無は無、新しょうの枝の色は褐、枝の節間長は中、葉芽の隙間の有無は有、葉柄の有無は有、葉柄の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の長さ／幅は中、葉身の形は倒披針形、葉身の最大幅の位置は先端部、葉身の先端の形は鋭形、葉身の周縁の鋸歯の有無は無、葉身の主な色は146A、葉身の二次色の分布は中央部、葉身の二次色はNN137A、葉身の三次色の分布は無、花序の着生位置は腋生、花序の形は楕円形、花序の長さは短、花序の幅は狭、花序の花の粗密は粗、花冠の色の変化の強弱は無又は弱、花冠の幅は中、花冠裂片の表面の色はNN74C、花筒部のがくに対する長さは同等、花筒部の外面の色はNN74Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CELE」は、対照品種「アイスイザベラ」と比較して、枝の節間のアントシアニンの着色が中であること、葉身の主な色が146Aであること、葉身の二次色の分布が中央部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社フジ フローラ
東京都港区南青山2丁目22番14-802号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Stephen Humphreys Yvonne Humphreys

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Wiri Charm」の変異株である。

Hebe Comm. ex Juss.
CELE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 半直立
02 樹高	05 中
03 葉の粗密	05 中
04 幼しょうのアントシアニンの着色	02 弱
05 幼しょうの毛の有無	01 無
06 幼しょうの毛の粗密	
07 新しょうの枝の色	05 褐
08 枝の節間長	05 中
09 枝の節間のアントシアニンの着色	05 中
10 葉芽の隙間の有無	09 有
11 葉柄の有無	09 有
12 葉柄の長さ	01 短
13 葉の着生角度	04 水平
14 葉身の長さ	04 やや短
15 葉身の幅	03 狭
16 葉身の長さ／幅	05 中
17 葉身の形	05 倒披針形

Hebe Comm. ex Juss.
CELE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の最大幅の位置	03 先端部
19 葉身の先端の形	02 鋭形
20 葉身の横断面の形	01 凹
21 葉身の周縁の鋸歯の有無	01 無
22 葉身の主な色	RHSカラーチャート 146A
23 葉身の二次色の分布	05 中央部
24 葉身の二次色	RHSカラーチャート NN137A
25 葉身の二次色の面積	05 中
26 葉身の三次色の分布	01 無
27 葉身の三次色	
28 葉身の光沢	01 無又は極弱
29 葉身のろう質	01 無又は極弱
30 花序の着生位置	03 腋生
31 花序の形	03 楕円形
32 花序の長さ	03 短
33 花序の幅	03 狭
34 花序の花の粗密	03 粗

Hebe Comm. ex Juss.
CELE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の色の変化の強弱 36 花冠の幅 37 花冠裂片の表面の色 38 花筒部のがくに対する長さ 39 花筒部の外面の色 40 花序の数	01 無又は弱
	05 中
	RHSカラーチャート NN74C
	02 同等
	RHSカラーチャート NN74B
	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30025号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. ヒルディアイースト (ヒルディアイースト)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、花序の数は中、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さはかなり長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さはかなり短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は直立、花序の花数は多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は149D、がくの中肋の色は149D、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2A、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ヒルディアイースト」は、対照品種「キノラパン」と比較して、葉の長さが短であること、がくの主な色が149Dであること等で区別性が認められる。対照品種「キノレモン」と比較して、葉の長さが短であること、がくの主な色が149Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
HilverdaFlorist B.V.
Dwarsweg 15, 1424PL De Kwakel, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
A. N. J. Koekkoek
- 7 出願公表の年月日 令和元年8月30日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Limonium Mill.
ヒルディアイースト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	03 短
04 葉の幅	03 狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	03 弱
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	01 無
15 葉柄の長さ	
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
17 茎出葉の有無	09 有

Limonium Mill.
ヒルディアイースト

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30025号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	08 かなり長
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	02 かなり短
25 花序の型	04 IV型
26 一次分枝の長さ	06 やや長
27 花序の分枝性	06 やや強
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	07 多
30 がくの長さ	04 やや短
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート 149D
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 149D

ヒルディアイースト

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 0 2 5 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30026号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. WP1723

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや多、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さは中、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色は75A、がくの中肋の色は76C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色はN155B、開花始期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WP1723」は、対照品種「ミヨプララブリーピンク」と比較して、葉の切れ込みの強弱が弱であること、がくの主な色が75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨリモメトロピンク」と比較して、葉の切れ込みの強弱が弱であること、一次分枝の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中心区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

可児隆裕

7 出願公表の年月日 令和元年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Limonium Mill.
WP1723

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	06 やや多
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	05 中
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	03 淡
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	03 粗
10 葉の周縁の毛の密度	03 粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	03 弱
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	04 やや短
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
WP1723

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	06 やや長
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	03 狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	01 無又は極弱
24 一次分枝部のたく葉の長さ	03 短
25 花序の型	02 II型
26 一次分枝の長さ	05 中
27 花序の分枝性	04 やや弱
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	05 中
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	05 中
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート 75A
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 76C

Limonium Mill.
WP1723

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ 36 花冠の型 37 花冠の色 38 やくに対する柱頭の位置 39 柱頭の形 40 花の香りの有無 41 開花始期	05 中
	01 I 型
	RHSカラーチャート N155B
	03 下位
	02 乳頭状
	01 無
	02 かなり早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30027号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. オリゾンネイビー (オリゾンネイビー)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、花序の数は中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はやや狭、花茎の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88A、がくの中肋の色は85C、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅡ型、花冠の色はNN155B、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「オリゾンネイビー」は、対照品種「ミヨリモエキゾトールブルー」と比較して、花茎の毛の密度が粗であること、一次分枝の長さがやや短であること、花冠の型がⅡ型であること等で区別性が認められる。対照品種「セイシャルスカイ」と比較して、葉の切れ込みの強弱がやや弱であること、一次分枝の長さがやや短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中心区高麗橋4丁目6番17号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
可児隆裕
- 7 出願公表の年月日 令和2年4月2日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Limonium Mill.
オリゾンネイビー

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30027号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	06 やや長
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	03 粗
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	04 やや弱
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	06 やや長
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
オリゾンネイビー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	07 長
19 花茎の太さ	05 中
20 花茎の毛の密度	03 粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	04 やや狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	02 かなり弱
24 一次分枝部のたく葉の長さ	04 やや短
25 花序の型	02 II型
26 一次分枝の長さ	04 やや短
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	04 やや少
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート N88A
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 85C

Limonium Mill.
オリゾンネイビー

登録番号 第30027号	
登録品種の植物体の特性記録部	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ 36 花冠の型 37 花冠の色 38 やくに対する柱頭の位置 39 柱頭の形 40 花の香りの有無 41 開花始期	06 やや大
	02 II型
	RHSカラーチャート NN155B
	03 下位
	02 乳頭状
	01 無
	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第30028号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨリモセレナバイオレット (ミヨリモセレナバイオレット)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は多、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は強、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さはやや短、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87A、がくの中肋の色はN87A、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155C、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミヨリモセレナバイオレット」は、対照品種「セイシャルスカイ」と比較して、茎出葉の有無が無であること、がくの長さがやや短であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「リウスブルー」と比較して、花序の数が多であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤卓也 宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Limonium Mill.
ミヨリモセレナバイオレット

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	07 多
03 葉の長さ	06 やや長
04 葉の幅	06 やや広
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	03 粗
10 葉の周縁の毛の密度	03 粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	07 強
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	07 強
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	04 やや短
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
ミヨリモセレナバイオレット

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30028号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	07 長
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	03 粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	03 狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	01 無又は極弱
24 一次分枝部のたく葉の長さ	04 やや短
25 花序の型	02 II型
26 一次分枝の長さ	05 中
27 花序の分枝性	04 やや弱
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	04 やや少
30 がくの長さ	04 やや短
31 がくの直径	05 中
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート N87A
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート N87A

Limonium Mill.
ミヨリモセレナバイオレット

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30028号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ 36 花冠の型 37 花冠の色 38 やくに対する柱頭の位置 39 柱頭の形 40 花の香りの有無 41 開花始期	05 中
	01 I 型
	RHSカラーチャート 155C
	03 下位
	01 トウモロコシ状
	01 無
	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第30029号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 宮崎52号（ミザキ52コウ）

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はかなり早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は短、穂の主軸の長さは中、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上1/4のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり早、穎の色は黄白、護穎の色は黄白、籾の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は易、耐倒伏性は強、脱粒性は難、葉いもちほ場抵抗性は強、穂いもちほ場抵抗性は強、白葉枯病ほ場抵抗性はやや強、着粒密度は中である。

出願品種「宮崎52号」は、対照品種「夏の笑み」と比較して、葉いもちほ場抵抗性が強であること、穂いもちほ場抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、穂発芽性が易であること、葉いもちほ場抵抗性が強であること、穂いもちほ場抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藪押睦幸 永吉嘉文 赤木武 加治佐光洋 森山あゆみ 松浦聡司 三枝大樹 川口満 押川純二 井場良一 角朋彦 北崎康生 川越博 中原孝博 中西葵 黒木知

7 出願公表の年月日 平成31年4月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「おてんとそだち」に「東北195号」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
宮崎52号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	01 無又は極粗
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	05 中
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	01 立
17 稈の向き	01 立

Oryza sativa L.
宮崎52号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	02 かなり早
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	03 短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	05 中
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	02 上1/4のみ

Oryza sativa L.
宮崎52号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	02 短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	02 かなり早
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	

Oryza sativa L.
宮崎52号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	05 中
54 粳の長さ	05 中
55 粳の幅	04 やや狭
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	06 やや長
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	04 低崩壊～中間
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
宮崎52号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	03 易
71 耐倒伏性	07 強
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pii
74 葉いもちほ場抵抗性	07 強
75 穂いもちほ場抵抗性	07 強
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	06 やや強
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30030号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. コシヒカリ駿河sd1Bms (コシカリスカ`sd1Bms)
- 3 登録品種の特性の概要
葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期はやや早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は短、穂の主軸の長さは中、穂数はやや多、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の長さはやや長、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、脱粒性は難、着粒密度はやや粗である。
出願品種「コシヒカリ駿河sd1Bms」は、対照品種「さちいっぱい」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「かずさ11号」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
富田因則
静岡県静岡市駿河区大谷836静岡大学大谷宿舎3-21
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
富田因則
- 7 出願公表の年月日 令和元年7月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「コシヒカリBms」に「コシヒカリsd1」を交配し、そのF2に「コシヒカリ」を戻し交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河sd1Bms

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30030号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	04 やや短
14 葉身の幅	04 やや狭
15 初期の止め葉の姿勢	03 半立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河sd1Bms

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	04 やや早
20 雄性不稔性	
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	03 短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	06 やや多
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	01 先端のみ

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河sd1Bms

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	01 極短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	05 中
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	06 やや長

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河sd1Bms

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	05 中
54 粳の長さ	05 中
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	05 中間
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河sd1Bms

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	07 難
71 耐倒伏性	
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	04 やや粗

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河sd1Bms

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30030号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 87 セシウム吸収性		

1 品種登録の番号及び年月日 第30031号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume Sheena81-2

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はかなり少、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花の側面の形は平、花の縦径はやや短、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は10C、ドーサルセパルの覆色はNN155C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色は181C、ドーサルセパルの網斑の密度は低、ドーサルセパルの網斑の色は181C、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は10C、ペタルの覆色はNN155C、ペタルの覆色の面積はかなり小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は少、ペタルの縞斑の色は181C、ペタルの網斑の密度はやや低、ペタルの網斑の色は181C、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は菱形、リップのヒゲの有無は無、リップの側裂片の形はⅢ型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN78B、中央裂片の覆色は60B、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155B、側裂片の覆色はN78A, 61A（縁部）、側裂片の斑点の数は多、側裂片の斑点の色は59A、側裂片の縞斑の数は無、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sheena81-2」は、対照品種「オレンジマジック」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が無であること、ペタルの覆色がNN155Cであること、リップの中央裂片の形が菱形であること等で区別性が認められる。対照品種「オレンジ」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が無であること、ペタルの覆色がNN155Cであること、リップの中央裂片の形が菱形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のGoldfinchにHappy Vivienを交配し、選抜したものである。

Phalaenopsis Blume
Sheena81-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	04 やや短
02 植物体の花序の数	03 2
03 葉の長さ	03 短
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉の形	03 かなり細長い
06 葉の最大幅の位置	02 中央部
07 葉の先端の形	02 鈍形
08 葉の先端の対称性	02 非対称
09 葉の向き	03 斜上
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	03 緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
14 花序の型	02 総状
15 花序の長さ	03 短
16 花序の花数	02 かなり少
17 花茎の長さ	04 やや短

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	02 中
19 花茎のアントシアニンの着色	01 無又は弱
20 花の側面の形	02 平
21 花の縦径	04 やや短
22 花の横径	05 中
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	05 中
26 ドーサルセパルの幅	05 中
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	01 内曲
30 ドーサルセパルの横断面の形	01 凹形
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート 10C
34 ドーサルセパルの覆色	RHSカラーチャート NN155C

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	04 やや少
39 ドーサルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート 181C
40 ドーサルセパルの網斑の密度	03 低
41 ドーサルセパルの網斑の色	RHSカラーチャート 181C
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート 10C
43 ラテラルセパルの覆色	
44 ラテラルセパルの斑点の数	01 無
45 ラテラルセパルの斑点の色	
46 ラテラルセパルの縞斑の数	05 中
47 ラテラルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート 181C
48 ラテラルセパルの網斑の密度	01 無
49 ラテラルセパルの網斑の色	
50 ペタルの長さ	04 やや短
51 ペタルの幅	04 やや狭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	03 横長
53 ペタルの最大幅の位置	01 基部
54 ペタルの縦断面の形	01 内曲
55 ペタルの横断面の形	01 凹形
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSカラーチャート 10C
59 ペタルの覆色	RHSカラーチャート NN155C
60 ペタルの覆色の面積	02 かなり小
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	03 少
65 ペタルの縞斑の色	RHSカラーチャート 181C
66 ペタルの網斑の密度	04 やや低
67 ペタルの網斑の色	RHSカラーチャート 181C
68 リップの中央裂片の長さ	04 やや短

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の幅	04 やや狭
70 リップの中央裂片の形	05 菱形
71 リップのヒゲの有無	01 無
72 リップのヒゲの長さ	
73 リップの中央裂片の突起又は稜	02 中
74 リップの側裂片の形	03 III型
75 リップの側裂片の巻き込み	02 中
76 リップの側裂片の大きさ	05 同等
77 中央裂片の地色	RHSカラーチャート NN78B
78 中央裂片の覆色	RHSカラーチャート 60B
79 中央裂片の斑点の数	01 無
80 中央裂片の斑点の大きさ	
81 中央裂片の斑点の色	
82 中央裂片の縞斑の数	01 無
83 中央裂片の縞斑の色	
84 中央裂片の網斑の密度	01 無
85 中央裂片の網斑の色	

Phalaenopsis Blume
Sheena81-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 側裂片の地色	RHSカラーチャート NN155B
87 側裂片の覆色	RHSカラーチャート N78A, 61A (縁部)
88 側裂片の斑点の数	04 多
89 側裂片の斑点の色	RHSカラーチャート 59A
90 側裂片の縞斑の数	01 無
91 側裂片の縞斑の色	
92 側裂片の網斑の密度	01 無
93 側裂片の網斑の色	
94 リップのカルス	02 盛り上る
95 カルスの色	RHSカラーチャート 12A
96 カルスの毛の有無	01 無
97 ずい柱の色	RHSカラーチャート 76D

1 品種登録の番号及び年月日 第30032号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume フレンズ 東105 (フレンズ ヒガシ105)

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色はやや強、花の側面の形は平、花の縦径は長、花の横径はかなり広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはかなり長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN75B、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色は75A、ペタルの覆色の面積は小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさはかなり広、中央裂片の地色はNN78B、中央裂片の覆色は173B, 14D (基部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はNN78B, 173C (縁部)、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は59A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「フレンズ 東105」は、対照品種「Ayako」と比較して、ラテラルセパルの覆色が75A, 157D (基部) であること、ペタルの覆色が75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Ayano」と比較して、ラテラルセパルの覆色が75A, 157D (基部) であること、ペタルの覆色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宇戸平和幸

栃木県下野市細谷107番地1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇戸平和幸

7 出願公表の年月日 令和3年12月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のHappy ValentineにSaitama Allianceを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	07 長
02 植物体の花序の数	01 1
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	05 中
05 葉の形	03 かなり細長い
06 葉の最大幅の位置	03 先端部
07 葉の先端の形	02 鈍形
08 葉の先端の対称性	02 非対称
09 葉の向き	03 斜上
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	03 緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
14 花序の型	02 総状
15 花序の長さ	08 かなり長
16 花序の花数	04 やや少
17 花茎の長さ	06 やや長

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	02 中
19 花茎のアントシアニンの着色	04 やや強
20 花の側面の形	02 平
21 花の縦径	07 長
22 花の横径	08 かなり広
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	08 かなり長
26 ドーサルセパルの幅	07 広
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	03 外曲
30 ドーサルセパルの横断面の形	03 凸形
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
34 ドーサルセパルの覆色	RHSカラーチャート N75B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	01 無
39 ドーサルセパルの縞斑の色	
40 ドーサルセパルの網斑の密度	01 無
41 ドーサルセパルの網斑の色	
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
43 ラテラルセパルの覆色	RHSカラーチャート 75A, 157D (基部)
44 ラテラルセパルの斑点の数	03 少
45 ラテラルセパルの斑点の色	RHSカラーチャート 71A
46 ラテラルセパルの縞斑の数	01 無
47 ラテラルセパルの縞斑の色	
48 ラテラルセパルの網斑の密度	01 無
49 ラテラルセパルの網斑の色	
50 ペタルの長さ	06 やや長
51 ペタルの幅	07 広

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	01 極横長
53 ペタルの最大幅の位置	01 基部
54 ペタルの縦断面の形	02 平
55 ペタルの横断面の形	02 平
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
59 ペタルの覆色	RHSカラーチャート 75A
60 ペタルの覆色の面積	03 小
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	01 無
65 ペタルの縞斑の色	
66 ペタルの網斑の密度	01 無
67 ペタルの網斑の色	
68 リップの中央裂片の長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の幅	06 やや広
70 リップの中央裂片の形	01 三角形
71 リップのヒゲの有無	09 有
72 リップのヒゲの長さ	07 長
73 リップの中央裂片の突起又は稜	02 中
74 リップの側裂片の形	05 V型
75 リップの側裂片の巻き込み	02 中
76 リップの側裂片の大きさ	09 かなり広
77 中央裂片の地色	RHSカラーチャート NN78B
78 中央裂片の覆色	RHSカラーチャート 173B, 14D (基部)
79 中央裂片の斑点の数	01 無
80 中央裂片の斑点の大きさ	
81 中央裂片の斑点の色	
82 中央裂片の縞斑の数	01 無
83 中央裂片の縞斑の色	
84 中央裂片の網斑の密度	01 無
85 中央裂片の網斑の色	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 側裂片の地色	RHSカラーチャート NN155C
87 側裂片の覆色	RHSカラーチャート NN78B, 173C (縁部)
88 側裂片の斑点の数	01 無
89 側裂片の斑点の色	
90 側裂片の縞斑の数	04 多
91 側裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 59A
92 側裂片の網斑の密度	01 無
93 側裂片の網斑の色	
94 リップのカルス	03 かなり盛り上る
95 カルスの色	RHSカラーチャート 10A
96 カルスの毛の有無	01 無
97 ずい柱の色	RHSカラーチャート NN155B

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30033号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Photinia Lindl. OPL005
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は放物形、樹高はかなり低、新しょうの色は濃赤、枝の皮目の形は点状、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は長楕円形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は鈍形、新葉の主な色は49B、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の模様は掃込み斑、葉身の斑の色は150D、葉縁の鋸歯の深さは浅、葉柄の長さはやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「OPL005」は、対照品種「レッドロビン」と比較して、新葉の主な色が49Bであること、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「丸葉カナメ」と比較して、新葉の主な色が49Bであること、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Van Oploo Beheer B.V.
Lage Aard 2 C, 4854NM Bavel, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Alexander A.A.M. van Oploo
- 7 出願公表の年月日 平成29年10月26日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Jenny」の変異株である。

Photinia Lindl.
OPL005

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 放物形
02 樹高	02 かなり低
03 新しょうの色	05 濃赤
04 枝の皮目の形	01 点状
05 葉身の長さ	03 短
06 葉身の幅	04 やや狭
07 葉身の形	04 長楕円形
08 葉身の先端の形	03 鈍形
09 葉身の基部の形	03 鈍形
10 新葉の主な色	RHSカラーチャート 49B
11 葉身の斑の有無	09 有
12 葉身の斑の模様	01 掃込み斑
13 葉身の斑の色	RHSカラーチャート 150D
14 葉縁の鋸歯の深さ	01 浅
15 葉柄の長さ	04 やや短
16 葉身の長さ／葉柄の長さ	04 やや小
17 花序の型	(開花なし。形質18から20について同様。)

Photinia Lindl.
OPL005

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の大きさ 19 花の大きさ 20 花弁の主な色	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30034号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Photinia Lindl. OPL001
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は放物形、樹高は低、新しょうの色は濃赤、枝の皮目の形は点状、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は鋭形、新葉の主な色は178A、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の模様は掃込み斑、葉身の斑の色は145A、葉縁の鋸歯の深さは浅、葉柄の長さは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「OPL001」は、対照品種「レッドロビン」と比較して、新葉の主な色が178Aであること、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「丸葉カナメ」と比較して、新葉の主な色が178Aであること、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Van Oploo Beheer B.V.
Lage Aard 2 C, 4854NM Bavel, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Alexander A.A.M. van Oploo
- 7 出願公表の年月日 平成30年4月9日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「レッドロビン」の変異株である。

Photinia Lindl.
OPL001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 放物形
02 樹高	03 低
03 新しょうの色	05 濃赤
04 枝の皮目の形	01 点状
05 葉身の長さ	05 中
06 葉身の幅	05 中
07 葉身の形	06 狭倒卵形
08 葉身の先端の形	02 鋭形
09 葉身の基部の形	02 鋭形
10 新葉の主な色	RHSカラーチャート 178A
11 葉身の斑の有無	09 有
12 葉身の斑の模様	01 掃込み斑
13 葉身の斑の色	RHSカラーチャート 145A
14 葉縁の鋸歯の深さ	01 浅
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉身の長さ／葉柄の長さ	05 中
17 花序の型	(開花なし。形質18から20について同様。)

Photinia Lindl.
OPL001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の大きさ 19 花の大きさ 20 花弁の主な色	

1 品種登録の番号及び年月日 第30035号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Photinia Lindl. BR2011

3 登録品種の特性の概要

樹姿は球形、樹高はかなり低、新しょうの色は濃赤紫、枝の皮目の形は縦短線状、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は鋭形、新葉の主な色は179A、葉身の斑の有無は無、葉縁の鋸歯の深さは浅、葉柄の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BR2011」は、対照品種「OPL001」と比較して、葉身の長さが短であること、葉身の幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「丸葉カナメ」と比較して、葉身の基部の形が鋭形であること、新葉の主な色が179Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bart Adrianus Johannes van Roessel
Berktweg 10, 5076 PA Haaren, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Bart Adrianus Johannes van Roessel

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「リトルレッドロビン」の変異株である。

Photinia Lindl.
BR2011

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	05 球形
02 樹高	02 かなり低
03 新しょうの色	07 濃赤紫
04 枝の皮目の形	02 縦短線状
05 葉身の長さ	03 短
06 葉身の幅	03 狭
07 葉身の形	03 楕円形
08 葉身の先端の形	02 鋭形
09 葉身の基部の形	02 鋭形
10 新葉の主な色	RHSカラーチャート 179A
11 葉身の斑の有無	01 無
12 葉身の斑の模様	
13 葉身の斑の色	
14 葉縁の鋸歯の深さ	01 浅
15 葉柄の長さ	03 短
16 葉身の長さ／葉柄の長さ	04 やや小
17 花序の型	(開花なし。形質18から20について同様。)

Photinia Lindl.
BR2011

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の大きさ 19 花の大きさ 20 花弁の主な色	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30036号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Photinia Lindl. KOLMAVOCA
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は球形、樹高はやや高、新しょうの色は濃赤紫、枝の皮目の形は横短線状、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は倒卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は鋭形、新葉の主な色は183A、葉身の斑の有無は無、葉縁の鋸歯の深さは深、葉柄の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「KOLMAVOCA」は、対照品種「レッドロビン」と比較して、新葉の主な色が183A であること等で区別性が認められる。対照品種「丸葉カナメ」と比較して、葉身の長さが中であること、葉身の幅が中であること、新葉の主な色が183A であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Kolster Holding B.V.
Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Peter R. Kolster
- 7 出願公表の年月日 平成30年12月18日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「レッドロビン」に育成者所有のP. serratifoliaの系統を交配し、選抜したものである。

Photinia Lindl.
KOLMAVOCA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	05 球形
02 樹高	06 やや高
03 新しょうの色	07 濃赤紫
04 枝の皮目の形	03 横短線状
05 葉身の長さ	05 中
06 葉身の幅	05 中
07 葉身の形	05 倒卵形
08 葉身の先端の形	02 鋭形
09 葉身の基部の形	02 鋭形
10 新葉の主な色	RHSカラーチャート 183A
11 葉身の斑の有無	01 無
12 葉身の斑の模様	
13 葉身の斑の色	
14 葉縁の鋸歯の深さ	03 深
15 葉柄の長さ	03 短
16 葉身の長さ／葉柄の長さ	07 大
17 花序の型	(開花なし。形質18から20について同様。)

Photinia Lindl.
KOLMAVOCA

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の大きさ 19 花の大きさ 20 花弁の主な色	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30037号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus L. 白浜伊古奈（シラマイナ）
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は傘状、樹高は亜高木性、樹幹の色は紫褐色（187B）、皮目の多少は多、枝の太さは中、枝の色は褐色（172A）、分枝性は中、葉の全体の形は楕円形、葉の先端の形は尾形鋭尖形、葉の基部の形は円形、葉縁の鋸歯の深さは中、葉の鋸歯の形は単鋸歯、葉の鋸歯の先端の形は鋭形、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の厚さは薄、蜜腺の有無は有、蜜腺の位置は葉柄上部、花序の形は散房状、花序の花数はやや多、蕾の色は61B、花の向きは横向き、花の形は一重咲、花の開き方は平開形、花の大きさは大輪、花の色はN66D、花卉全体の形は円形、花卉の先端の形（切れ込みの多少）は少、花卉の基部の形は突出形、花卉の脈の色は目立たない、花卉の数は約5、雌ずいと雄ずいの長さの比較は同、雄ずいの数はやや多、がく筒の形は盤状形以外、盤状形以外のがく筒の形は鐘形、がく筒の毛の多少は無、がく裂片の形は長楕円形、花柄の長さは短、花の香りは殆ど無、通常開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「白浜伊古奈」は、対照品種「カワヅザクラ」と比較して、葉の幅がやや広であること、花卉の長さがやや長であること、展葉期と開花期の関係が同時であること等で区別性が認められる。対照品種「河津正月」と比較して、花の大きさが大輪であること、花卉の長さがやや長であること、花卉の幅がやや広であること、展葉期と開花期の関係が同時であること、通常開花期が早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
金指資行
静岡県下田市白浜1778番地4
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
金指資行
- 7 出願公表の年月日 平成27年11月27日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「カワヅザクラ」の自然交雑実生から選抜したものである。

Prunus L.
白浜伊古奈

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	07 傘状
02 樹高	05 亜高木性
03 樹幹の色	04 紫褐色 (187B)
04 樹皮の光沢の有無	09 有
05 皮目の多少	07 多
06 皮目の並び方	01 横並び
07 気根の有無	01 無
08 樹皮の裂け方	01 無
09 枝の太さ	05 中
10 枝の色	03 褐色 (172A)
11 新梢の毛の多少	01 無
12 分枝性	05 中
13 葉の全体の形	02 楕円形
14 葉の先端の形	01 尾形鋭尖形
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉縁の鋸歯の深さ	05 中
17 葉の鋸歯の形	01 単鋸歯

Prunus L.
白浜伊古奈

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の鋸歯の先端の形	02 鋭形
19 葉の鋸歯の先端の腺の有無	09 有
20 葉の長さ	07 長
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	03 薄
23 若芽の色	
24 成葉の表面の色	RHSカラーチャート 137B
25 成葉の裏面の色	RHSカラーチャート 146B
26 成葉の表面の毛の多少	01 無
27 成葉の裏面の毛の多少	01 無
28 成葉の毛の出方	
29 葉の側脈の数	05 中
30 葉柄の長さ	05 中
31 葉柄の毛の多少	01 無
32 葉柄の毛の出方	
33 蜜腺の有無	09 有
34 蜜腺の位置	01 葉柄上部

Prunus L.
白浜伊古奈

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 托葉の分岐性	
36 托葉の大きさ	
37 花序の形	02 散房状
38 花序の花数	06 やや多
39 蕾の色	RHSカラーチャート 61B
40 花の向き	03 横向き
41 花の形	01 一重咲
42 花の開き方	04 平開形
43 花の大きさ	07 大輪
44 花の色	RHSカラーチャート N66D
45 花弁全体の形	07 円形
46 花弁の先端の形（切れ込みの多少）	03 少
47 花弁の基部の形	01 突出形
48 旗弁の有無	09 有
49 花弁の表面のしわの多少	03 少
50 花弁の脈の色	03 目立たない
51 花弁の長さ	06 やや長

Prunus L.
白浜伊古奈

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の幅	06 やや広
53 花弁の厚さ	05 中
54 花弁の数	01 約 5
55 雌ずいの長さ	07 長
56 雌ずいと雄ずいの長さの比較	05 同
57 雌ずいの数	01 1 本
58 雌ずいの葉化の有無	01 無
59 花柱の毛の有無	01 無
60 雄ずいの長さ	08 かなり長
61 雄ずいの数	06 やや多
62 がく筒の形	09 盤状形以外
63 盤状形以外のがく筒の形	02 鐘形
64 がく筒の毛の多少	01 無
65 がく裂片の形	05 長楕円形
66 がく裂片の鋸歯の有無	09 有
67 がく裂片の毛の有無	01 無
68 がく裂片の色	03 紅褐色

Prunus L.
白浜伊古奈

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 副がくの有無	01 無
70 副がくの数	
71 花柄の長さ	03 短
72 小花柄の長さ	05 中
73 小花柄の太さ	07 太
74 小花柄の毛の有無	01 無
75 (小) 花柄の色	02 緑色
76 花の香り	01 殆ど無
77 果実の大きさ	05 中
78 果実の色	05 黒紫色
79 果実の味	01 苦味
80 平年展葉期	03 早
81 展葉期と開花期の関係	05 同時
82 通常開花期	03 早
83 通常開花期以外の開花期	01 無
84 着果性	05 中
85 常緑・落葉の別	07 落葉

Prunus L.
白浜伊古奈

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 樹勢	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30038号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rudbeckia L. VPRU1513T

3 登録品種の特性の概要

草姿は縦長、草丈は中、茎径はやや細、茎のアントシアニン発色の有無は有、1次分枝の数は中、枝数はやや少、葉の形は線状長楕円形、葉長は中、葉幅は中、花の形は半八重、舌状花の展開角度は下垂、花芯の形は鈍形、頭状花の直径はやや小、花芯の直径は中、花芯の高さはやや低、花芯開花前の色はN186C、花芯開花後の色はN186B、舌状花の色数は2色、舌状花条斑の有無は有、舌状花条斑の形はぼかし状、舌状花上部の色は183D、舌状花基部の色は144B、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花弁の形は平弁、舌状花先端の形は歯状形、舌状花弁数はやや少、花粉の有無は有、花柄の長さはやや短である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「VPRU1513T」は、対照品種「トト(トトゴールド)」と比較して、草丈が中であること、葉長が中であること、舌状花条斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「タカオ」と比較して、草丈が中であること、葉長が中であること、舌状花条斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「トトレモン」と比較して、草丈が中であること、葉長が中であること、舌状花条斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Branded Garden Products Limited

3rd Floor Cumberland House, Cumberland Place, Southampton, England, S015
2BG, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Charles Valin

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Rudbeckia L.
VPRU1513T

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 縦長
02 草丈	05 中
03 茎径	04 やや細
04 茎色	02 緑
05 茎のアントシアニン発色の有無	09 有
06 茎の毛の有無	09 有
07 1次分枝の数	05 中
08 1次分枝の発生位置	01 下部
09 枝数	04 やや少
10 葉の形	02 線状長楕円形
11 葉の鋸歯の有無	09 有
12 葉数	04 やや少
13 葉長	05 中
14 葉幅	05 中
15 葉色	05 中
16 葉の毛の多少	07 多
17 花の形	03 半八重

Rudbeckia L.
VPRU1513T

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30038号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の展開角度	03 下垂
19 花芯の形	01 鈍形
20 頭状花の直径	04 やや小
21 花芯の直径	05 中
22 花芯の高さ	04 やや低
23 花芯開花前の色	RHSカラーチャート N186C
24 花芯開花後の色	RHSカラーチャート N186B
25 舌状花の色数	02 2色
26 舌状花条斑の有無	09 有
27 舌状花条斑の形	01 ぼかし状
28 舌状花基部濃着色部の程度	
29 舌状花上部の色	RHSカラーチャート 183D
30 舌状花基部の色	RHSカラーチャート 144B
31 舌状花の長さ	03 短
32 舌状花の幅	04 やや狭
33 舌状花弁の形	01 平弁
34 舌状花先端の形	04 歯状形

Rudbeckia L.
VPRU1513T

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花弁のねじれ	01 無
36 舌状花弁数	04 やや少
37 がくの大きさ	03 小
38 がくの色	02 緑
39 花粉の有無	09 有
40 花柄の長さ	04 やや短
41 花の香りの有無	01 無
42 花の開花時期	05 中
43 開花期間	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30039号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rudbeckia L. VPRU1514T
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は縦長、草丈は中、茎径はやや細、茎のアントシアニン発色の有無は有、1次分枝の数は中、枝数はやや少、葉の形は線状長楕円形、葉長は中、葉幅はやや広、花の形は半八重、舌状花の展開角度は水平、花芯の形は鈍形、頭状花の直径はやや小、花芯の直径はやや小、花芯の高さはやや低、花芯開花前の色はN187A、花芯開花後の色はN186B、舌状花の色数は2色、舌状花条斑の有無は有、舌状花条斑の形はその他、舌状花基部濃着色部の程度は中、舌状花上部の色は187C、舌状花基部の色は59A、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花弁の形は平弁、舌状花先端の形は歯状形、舌状花弁数はやや多、花粉の有無は有、花柄の長さは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「VPRU1514T」は、対照品種「チェリーブランディー」と比較して、頭状花の直径がやや小であること、花芯開花前の色がN187Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ヒルタ・チェロキー・サンセット」と比較して、頭状花の直径がやや小であること、花芯開花前の色がN187Aであること等で区別性が認められる。対照品種「オータムカラーズ」と比較して、頭状花の直径がやや小であること、花芯開花前の色がN187Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Branded Garden Products Limited
3rd Floor Cumberland House, Cumberland Place, Southampton, England, S015
2BG, United Kingdom
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Charles Valin
- 7 出願公表の年月日 令和2年3月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Rudbeckia L.
VPRU1514T

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 縦長
02 草丈	05 中
03 茎径	04 やや細
04 茎色	02 緑
05 茎のアントシアニン発色の有無	09 有
06 茎の毛の有無	09 有
07 1次分枝の数	05 中
08 1次分枝の発生位置	01 下部
09 枝数	04 やや少
10 葉の形	02 線状長楕円形
11 葉の鋸歯の有無	09 有
12 葉数	03 少
13 葉長	05 中
14 葉幅	06 やや広
15 葉色	05 中
16 葉の毛の多少	07 多
17 花の形	03 半八重

Rudbeckia L.
VPRU1514T

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30039号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の展開角度	02 水平
19 花芯の形	01 鈍形
20 頭状花の直径	04 やや小
21 花芯の直径	04 やや小
22 花芯の高さ	04 やや低
23 花芯開花前の色	RHSカラーチャート N187A
24 花芯開花後の色	RHSカラーチャート N186B
25 舌状花の色数	02 2色
26 舌状花条斑の有無	09 有
27 舌状花条斑の形	05 その他
28 舌状花基部濃着色部の程度	05 中
29 舌状花上部の色	RHSカラーチャート 187C
30 舌状花基部の色	RHSカラーチャート 59A
31 舌状花の長さ	03 短
32 舌状花の幅	03 狭
33 舌状花弁の形	01 平弁
34 舌状花先端の形	04 歯状形

Rudbeckia L.
VPRU1514T

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花弁のねじれ	01 無
36 舌状花弁数	06 やや多
37 がくの大きさ	03 小
38 がくの色	02 緑
39 花粉の有無	09 有
40 花柄の長さ	05 中
41 花の香りの有無	01 無
42 花の開花時期	05 中
43 開花期間	06 やや長

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30040号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Spiraea japonica L. f. MInspiz02
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張性、樹高はかなり低、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鋭形、葉身長は短、葉身幅は狭、新葉の色は178B、斑の有無は無、葉柄の長さは短、花序のタイプは複散房花序、花房の大きさはやや小、花形は一重咲、花の大きさは中、主な花色は75C、花卉の形は円形、花糸の色はピンク、花の香りは無、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「MInspiz02」は、対照品種「Goldflame」と比較して、新葉の色が178Bであること、主な花色が75Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Hortival Diffusion S.A.S.
les Fontaines de l'Aunay Beaufort-en-Vallee 49250 Beaufort-en-Anjou, France
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Patrick PINEAU
- 7 出願公表の年月日 令和元年7月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Spiraea japonica L. f.
MInspiz02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 開張性
02 樹高	02 かなり低
03 枝の太さ	03 細
04 新梢の色	03 淡紅
05 節間長	05 中
06 葉全体の形	04 卵形
07 葉先端の形	02 鋭形
08 葉基部の形	02 鋭形
09 葉縁の形	03 鈍鋸歯
10 葉身長	03 短
11 葉身幅	03 狭
12 新葉の色	RHSカラーチャート 178B
13 成葉表面の色	02 黄緑
14 斑の有無	01 無
15 斑のパターン	
16 斑色	
17 斑色の変化性	

Spiraea japonica L. f.
MInspiz02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の毛の有無	01 無
19 葉柄の長さ	03 短
20 花序のタイプ	02 複散房花序
21 花房の大きさ	04 やや小
22 花形	01 一重咲
23 花の大きさ	05 中
24 花色数	01 単色
25 蕾の色	RHSカラーチャート N77A
26 主な花色	RHSカラーチャート 75C
27 その他の花色	
28 花弁の形	04 円形
29 花弁数	05 中
30 花糸の色	02 ピンク
31 花の香り	01 無
32 開花期	07 晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30041号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Spiraea japonica L. f. Minspiz07
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張性、樹高はかなり低、葉全体の形は長卵形、葉先端の形は鋭形、葉身長は短、葉身幅は狭、新葉の色は178C、斑の有無は無、葉柄の長さは短、花序のタイプは複散房花序、花房の大きさは小、花形は一重咲、花の大きさはやや小、主な花色は73C、花卉の形は円形、花糸の色はピンク、花の香りは無、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Minspiz07」は、対照品種「ワルブマ」と比較して、新梢の色が淡紅であること、新葉の色が178Cであること、主な花色が73Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Hortival Diffusion S.A.S.
les Fontaines de l'Aunay Beaufort-en-Vallee 49250 Beaufort-en-Anjou, France
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Patrick PINEAU
- 7 出願公表の年月日 令和元年8月30日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Spiraea japonica L. f.
Minspiz07

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 開張性
02 樹高	02 かなり低
03 枝の太さ	03 細
04 新梢の色	03 淡紅
05 節間長	04 やや短
06 葉全体の形	03 長卵形
07 葉先端の形	02 鋭形
08 葉基部の形	02 鋭形
09 葉縁の形	02 鋭鋸歯
10 葉身長	03 短
11 葉身幅	03 狭
12 新葉の色	RHSカラーチャート 178C
13 成葉表面の色	02 黄緑
14 斑の有無	01 無
15 斑のパターン	
16 斑色	
17 斑色の変化性	

Spiraea japonica L. f.
Minspiz07

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の毛の有無	01 無
19 葉柄の長さ	03 短
20 花序のタイプ	02 複散房花序
21 花房の大きさ	03 小
22 花形	01 一重咲
23 花の大きさ	04 やや小
24 花色数	01 単色
25 蕾の色	RHSカラーチャート 72A
26 主な花色	RHSカラーチャート 73C
27 その他の花色	
28 花弁の形	04 円形
29 花弁数	05 中
30 花糸の色	02 ピンク
31 花の香り	01 無
32 開花期	08 かなり晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30042号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Spiraea japonica L. f. Walplum
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張性、樹高はやや低、葉全体の形は長卵形、葉先端の形は鋭尖形、葉身長は中、葉身幅はやや狭、新葉の色は187B、斑の有無は無、葉柄の長さは短、花序のタイプは複散房花序、花房の大きさは中、花形は一重咲、花の大きさはやや大、主な花色は71B、花弁の形は倒卵形、花糸の色はピンク、花の香りは無、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Walplum」は、対照品種「Goldflame」と比較して、新葉の色が187Bであること、成葉表面の色が緑であること、主な花色が71Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Walberton Plants Limited
Yapton Lane, Walberton, West Sussex, BN18 0AS, United Kingdom
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
David R. Tristram
- 7 出願公表の年月日 令和2年4月13日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Spiraea japonica L. f.
Walplum

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30042号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 開張性
02 樹高	04 やや低
03 枝の太さ	04 やや細
04 新梢の色	09 その他（褐）
05 節間長	06 やや長
06 葉全体の形	03 長卵形
07 葉先端の形	01 鋭尖形
08 葉基部の形	02 鋭形
09 葉縁の形	02 鋭鋸歯
10 葉身長	05 中
11 葉身幅	04 やや狭
12 新葉の色	RHSカラーチャート 187B
13 成葉表面の色	03 緑
14 斑の有無	01 無
15 斑のパターン	
16 斑色	
17 斑色の変化性	

Spiraea japonica L. f.
Walplum

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の毛の有無	01 無
19 葉柄の長さ	03 短
20 花序のタイプ	02 複散房花序
21 花房の大きさ	05 中
22 花形	01 一重咲
23 花の大きさ	06 やや大
24 花色数	01 単色
25 蕾の色	RHSカラーチャート 61A
26 主な花色	RHSカラーチャート 71B
27 その他の花色	
28 花弁の形	03 倒卵形
29 花弁数	05 中
30 花糸の色	02 ピンク
31 花の香り	01 無
32 開花期	07 晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30043号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sutera Roth WINSUSNOGL
- 3 登録品種の特性の概要
草型は斜上型、草丈は中、茎の長さはやや短、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間長はやや長、葉型は単葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉柄の長さは短、葉身の表面の主な色は緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さは長、花の幅は広、花の主な色は85C、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の長さは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「WINSUSNOGL」は、対照品種「DANCOP37」と比較して、草型が斜上型であること、草丈が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
WinGen, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Benjamin Winslow
- 7 出願公表の年月日 令和4年3月1日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Betty Blue」に「Scopia Great Asure」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 斜上型
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 茎のアントシアニン着色の 強弱	01 無又は極弱
05 節間長	06 やや長
06 葉型	01 単葉
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	04 やや狭
09 葉身の長さ／幅	04 やや小
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉身の最大幅の位置	02 中央部と基部の間
12 若葉の主な色（成葉の色と明確に異なる場合）	
13 葉身の表面の主な色	03 緑
14 葉身の斑の有無	01 無
15 葉身の周縁の切れ込みの深さ（単葉の品種に限る。）	04 やや浅
16 花型	01 一重
17 花の長さ	07 長

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	07 広
19 花の色数	01 1
20 花の主な色	RHSカラーチャート 85C
21 花の二次色	
22 花冠裂片の幅	09 極広
23 花冠裂片の先端の形	02 円形
24 花冠裂片の向き（一重品種に限る。）	02 平
25 花筒の長さ	05 中
26 花筒喉部の主な色（一重咲きの品種に限る。）	02 黄橙

1 品種登録の番号及び年月日 第30044号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sutera Roth WINSUSNOGB

3 登録品種の特性の概要

草型は水平型、草丈はやや低、茎の長さは短、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、節間長は中、葉型は単葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉柄の長さはやや短、葉身の表面の主な色は緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さはやや長、花の幅はやや広、花の主な色はNN155D、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の長さは中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WINSUSNOGB」は、対照品種「DANCOP40」と比較して、花筒の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

WinGen, L.L.C.

6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Benjamin Winslow

7 出願公表の年月日 令和4年3月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	03 水平型
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	03 短
04 茎のアントシアニン着色の 強弱	02 かなり弱
05 節間長	05 中
06 葉型	01 単葉
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の長さ／幅	03 小
10 葉柄の長さ	04 やや短
11 葉身の最大幅の位置	02 中央部と基部の間
12 若葉の主な色（成葉の色と明確に異なる場合）	
13 葉身の表面の主な色	03 緑
14 葉身の斑の有無	01 無
15 葉身の周縁の切れ込みの深さ（単葉の品種に限る。）	04 やや浅
16 花型	01 一重
17 花の長さ	06 やや長

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	06 やや広
19 花の色数	01 1
20 花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
21 花の二次色	
22 花冠裂片の幅	09 極広
23 花冠裂片の先端の形	02 円形
24 花冠裂片の向き（一重品種に限る。）	02 平
25 花筒の長さ	05 中
26 花筒喉部の主な色（一重咲きの品種に限る。）	02 黄橙

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30045号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Triticum aestivum L. みなみのやわら（ミミノワラ）
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半立～中、出穂期はやや早、穂の形は紡錘状、穂の長さは中、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや長、穂の色は着色、原麦粒の色は赤、まき性は春まき型、稈の長さはやや短、ふの色は褐、粒の形は中、千粒重はやや大、うるち・もちの別はうるち、成熟期はやや早、粒質は硝子質である。
出願品種「みなみのやわら」は、対照品種「ミナミノカオリ」と比較して、護穎の肩部の形がやや下がる～水平であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高田 兼則 渡邊 美貴子 石川 直幸 伴 雄介 加藤 啓太 船附 稚子 中
村 俊樹 石川 吾郎 齋藤 美香
- 7 出願公表の年月日 平成31年2月13日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ミナミノカオリ」に「モチ性春のあけぼの」及び「和系RB3667」を戻し交配した系統同士を交配し、選抜したものである。

Triticum aestivum L.
 みなみのやわら

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 子葉しょうのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 草姿	04 半立～中
03 反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度	07 高
04 出穂期	04 やや早
05 止め葉の葉しょうの白粉の強弱	05 中
06 止め葉の白粉の強弱	03 弱
07 穂の白粉の強弱	06 やや強
08 穂首の白粉の強弱	05 中
09 草丈	04 やや低
10 穂首直下の節間の髓の厚さ	01 無又は極薄
11 穂の形	05 紡錘状
12 粒着密度	06 やや密
13 穂の長さ	05 中
14 芒の有無	03 長芒有り
15 穂の先端の芒の長さ	06 やや長
16 穂の色	02 着色
17 穂軸の先端凸部表面の毛の多少	01 無又は極少

Triticum aestivum L.
 みなみのやわら

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 護穎の肩部の幅	03 狭
19 護穎の肩部の形	04 やや下がる～水平
20 護穎の嘴の長さ	07 長
21 護穎の嘴の形	02 直～やや曲がる
22 護穎の内側の毛の多少	05 中
23 原麦粒の色	02 赤
24 原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡	07 濃
25 まき性	03 春まき型
26 Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	01 バンド1
27 Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	02 バンド7+8
28 Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	05 バンド2. 2+12
29 稈の長さ	04 やや短
30 ふの色	04 褐
31 粒の形	03 中
32 千粒重	06 やや大
33 うるち・もちの別	01 うるち
34 成熟期	04 やや早

Triticum aestivum L.
みなみのやわら

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 粒質	03 硝子質

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30046号 令和6年1月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Triticum aestivum L. はるみずき (ハルミズキ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半立～中、出穂期は早、穂の形は紡錘状、穂の長さは長、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや長、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は春まき型、稈の長さはやや短、ふの色は黄、粒の形は中、千粒重は中、うるち・もちの別はうるち、成熟期はやや早、粒質は硝子質である。
出願品種「はるみずき」は、対照品種「せときらら」と比較して、穂の白粉の強弱が中であること、草丈がやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「ミナミノカオリ」と比較して、穂の長さが長であること、穂の色が白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高田 兼則 渡邊 美貴子 石川 直幸 船附 稚子 伴 雄介 加藤 啓太 池田 達哉
- 7 出願公表の年月日 平成31年2月13日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ミナミノカオリ」と「ふくほのか」の準同質遺伝子系統のF1に「ふくほのか」の準同質遺伝子系統を交配し、選抜したものである。

Triticum aestivum L.
はるみずき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 子葉しょうのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 草姿	04 半立～中
03 反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度	07 高
04 出穂期	03 早
05 止め葉の葉しょうの白粉の強弱	05 中
06 止め葉の白粉の強弱	03 弱
07 穂の白粉の強弱	05 中
08 穂首の白粉の強弱	05 中
09 草丈	04 やや低
10 穂首直下の節間の髓の厚さ	01 無又は極薄
11 穂の形	05 紡錘状
12 粒着密度	04 やや粗
13 穂の長さ	07 長
14 芒の有無	03 長芒有り
15 穂の先端の芒の長さ	06 やや長
16 穂の色	01 白
17 穂軸の先端凸部表面の毛の多少	01 無又は極少

Triticum aestivum L.
はるみずき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 護穎の肩部の幅	03 狭
19 護穎の肩部の形	03 やや下がる
20 護穎の嘴の長さ	05 中
21 護穎の嘴の形	03 やや曲がる
22 護穎の内側の毛の多少	03 少
23 原麦粒の色	02 赤
24 原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡	07 濃
25 まき性	03 春まき型
26 Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	02 バンド2
27 Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	02 バンド7+8
28 Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	04 バンド5+10
29 稈の長さ	04 やや短
30 ふの色	02 黄
31 粒の形	03 中
32 千粒重	05 中
33 うるち・もちの別	01 うるち
34 成熟期	04 やや早

Triticum aestivum L.
はるみずき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 粒質	03 硝子質

1 品種登録の番号及び年月日 第30047号 令和6年1月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. Na113

3 登録品種の特性の概要

第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱は中、第一葉の先端の形は円形、葉の数は多、葉の緑色の濃淡は中、雄穂の開花時期はかなり晩、雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）はやや弱、やくのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、雄穂の主軸と一次枝梗の角度はやや小、雄穂の一次枝梗の反りは直～やや外反、雄穂の一次枝梗の数はかなり少、絹糸の抽出期は極晩、絹糸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、絹糸の色は緑、仮根のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、草丈Ⅰはやや長、葉身の幅はやや狭、雌穂の長さはやや短、雌穂の直径はやや小、雌穂の重さはかなり軽、雌穂の粒列数は少、粒質はフリント、雌穂の粒の先端部の主な色1は黄橙、雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）は黄橙、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱である。

出願品種「Na113」は、対照品種「Na50」と比較して、雌穂の芯の直径が中であること、雌穂の重さがかなり軽であること等で区別性が認められる。対照品種「CHU68」と比較して、絹糸の抽出期が極晩であること、絹糸の色が緑であること、穂柄の長さがやや長であること、雌穂の直径がやや小であること、雌穂の粒列数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「Mi62」と比較して、草丈Ⅰがやや長であること、雌穂の重さがかなり軽であること、雌穂の粒列数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

玉置宏之 佐藤尚 間野吉郎 黄川田智洋 アキリ亘 三ツ橋昇平

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Na50」に「1L#18a」を交配し、「Na50」を6回戻し交配後に2回自植を行い育成したものである。

Zea mays L.
Na113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
02 第一葉の先端の形	03 円形
03 葉の数	07 多
04 葉の緑色の濃淡	05 中
05 葉身の周縁の波打ちの強弱	02 中
06 葉の着生角度	04 やや小
07 葉身の反り	05 外反
08 茎の屈曲の強弱	01 無又は極弱
09 雄穂の開花時期	08 かなり晩
10 雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
11 雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）	04 やや弱
12 やくのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
13 雄穂の主軸と一次枝梗の角度	04 やや小
14 雄穂の一次枝梗の反り	02 直～やや外反
15 雄穂の一次枝梗の数	02 かなり少
16 絹糸の抽出期	09 極晩
17 絹糸のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱

Zea mays L.
Na113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 絹糸の色	01 緑
19 仮根のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
20 雄穂の小穂の粗密	05 中
21 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 節間のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 雄穂の最下枝梗着生部からの主軸の長さ	07 長
24 雄穂の最上枝梗着生部からの主軸の長さ	05 中
25 雄穂の一次枝梗の長さ	06 やや長
26 草丈 I	06 やや長
27 草丈 II	
28 草丈と雌穂着生位置の比	05 中
29 葉身の幅	04 やや狭
30 穂柄の長さ	06 やや長
31 雌穂の長さ	04 やや短
32 雌穂の直径	04 やや小
33 雌穂の芯の直径	05 中
34 雌穂の数	01 1

Zea mays L.
Na113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 雌穂の重さ	02 かなり軽
36 雌穂の形	02 円錐～円筒形
37 雌穂の粒列数	03 少
38 雌穂の粒の色数（スイートコーン及びワキシコーン品種に限る。）	
39 粒の黄色の濃淡（スイートコーン品種に限る。）	
40 粒の長さ（スイートコーン品種に限る。）	
41 粒の幅（スイートコーン品種に限る。）	
42 粒質	01 フリント
43 雌穂の粒の縮みの強弱（スイートコーン品種に限る。）	
44 雌穂の粒の先端部の主な色1	04 黄橙
45 雌穂の粒の先端部の主な色2	
46 雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）	04 黄橙
47 雌穂の粒の側面の色2（スイートコーン品種を除く。）	
48 ポップコーンの形（ポップコーン品種に限る。）	
49 雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 粒の甘味	
51 すず紋病抵抗性	

Zea mays L.
Na113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ごま葉枯病抵抗性	