

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30048号 令和6年2月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Begonia x hiemalis Fotsch USAmiF
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の中ろくの長さはかなり長、葉身の幅は広、葉身の表面の色は濃緑、葉身の裏面の色は淡緑、葉身の基部の裂片の重なりは僅かに重なる、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は鈍鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、ほう葉の大きさはやや大、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はやや多、花の長さは中、花の幅は中、花の色数は2、外花卉の表面の周縁部の色は21C;46C(外縁部)、外花卉の表面の中央部の色は21C、内花卉の表面の周縁部の色は21A;46C(外縁部)、内花卉の表面の中央部の色は21A、内花卉の裏面の中央部の色は23D、内花卉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「USAmiF」は、対照品種「オレンジストーン」と比較して、葉身の中ろくの長さがかなり長であること、外花卉の表面の周縁部の色が21C;46C(外縁部)であること等で区別性が認められる。対照品種「アンバーストーン」と比較して、葉身の中ろくの長さがかなり長であること、花卉の数（八重品種に限る。）がやや多であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
宇佐美竜雄
愛知県愛西市本部田町本西207番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
宇佐美竜雄
- 7 出願公表の年月日 令和2年4月2日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の品種の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30048号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 株の幅	05 中
03 葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
04 葉身の中ろくの長さ	08 かなり長
05 葉身の幅	07 広
06 葉身の表面の色	03 濃緑
07 葉身の裏面の色	01 淡緑
08 葉身の基部の裂片の重なり	07 僅かに重なる
09 葉身の先端部の角度	03 鋭角
10 葉身の周縁の欠刻の形	03 鈍鋸歯状
11 葉身の周縁の欠刻の深さ	03 浅
12 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
13 ほう葉の大きさ	06 やや大
14 ほう葉の色	02 赤と緑
15 花型	02 八重
16 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
17 花の長さ	05 中

Begonia x hiemalis Fotsch
USAmiF

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	05 中
19 花の色数	02 2
20 外花卉の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 21C;46C (外縁部)
21 外花卉の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 21C
22 外花卉の周縁の欠刻の深さ	01 無又は極浅
23 内花卉の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 21A;46C (外縁部)
24 内花卉の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 21A
25 内花卉の裏面の周縁部の色	RHSカラーチャート 23C;46C (外縁部)
26 内花卉の裏面の中央部の色	RHSカラーチャート 23D
27 内花卉の周縁の欠刻の深さ	01 無又は極浅
28 内花卉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第30049号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bupleurum rotundifolium L. ヤベブプレ1号 (ヤベブプレ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎のアントシアニン着色は弱、茎の側枝数は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ/幅の比は中、葉の緑色の濃淡は中、花序軸の長さは中、花柄の長さはかなり長、複散形花序の幅は広、散形花序の数は中、小総ほう片の長さは中、小総ほう片の幅はやや広、小総ほう片の緑色の濃淡は中、小花柄の再分化の有無は有、小花柄の長さは中、小花柄数はやや少、小ほうは有、開花の早晩性は中である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ヤベブプレ1号」は、対照品種「グリフティ（普通種）」と比較して、小花柄の再分化の有無が有であること、小ほうの有であること等で区別性が認められる。対照品種「グリフティ（晩生種）」と比較して、小花柄の再分化の有無が有であること、小ほうの有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

矢部恵彦
静岡県牧之原市大江652番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

矢部恵彦

7 出願公表の年月日 平成30年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「グリフティ（普通種）」の変異株である。

Bupleurum rotundifolium L.
ヤベブプレ1号

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30049号
01 草姿	01 立性	
02 草丈	05 中	
03 茎のアントシアニン着色	03 弱	
04 茎の側枝数	05 中	
05 葉の長さ	05 中	
06 葉の幅	05 中	
07 葉の長さ/幅の比	05 中	
08 葉の緑色の濃淡	03 中	
09 花序軸の長さ	05 中	
10 花柄の長さ	08 かなり長	
11 複散形花序の幅	07 広	
12 散形花序の数	05 中	
13 小総ほう片の長さ	05 中	
14 小総ほう片の幅	06 やや広	
15 小総ほう片の緑色の濃淡	03 中	
16 小花柄の再分化の有無	09 有	
17 小花柄の長さ	05 中	

Bupleurum rotundifolium L.
ヤベブプレ1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 小花柄数 19 小ほう 20 開花の早晩性	04 やや少
	09 有
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30050号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don Sunfs 82311

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は強、茎の一次分枝の数は中、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はかなり小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色はN80A、花の目の有無は有、花の目の大きさは小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は79A、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunfs 82311」は、対照品種「Suncatha 2439」と比較して、花の表面の主な色がN80Aであること、花の内側の目の色が79Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

波多江紀彦

7 出願公表の年月日 令和3年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の変異株である。

Catharanthus roseus (L.) G. Don
Sunfs 82311

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30050号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 株の幅	04 やや狭
04 茎のアントシアニン着色の強弱	07 強
05 茎の一次分枝の数	05 中
06 茎の二次分枝の数	02 かなり少
07 葉の長さ	03 短
08 葉の幅	03 狭
09 葉の形	03 楕円形
10 葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）	05 中
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の模様	
13 葉の斑の色	
14 葉柄の長さ	04 やや短
15 副花冠の有無	01 無
16 花の直径	02 かなり小
17 花弁の重なり	01 離れる

Catharanthus roseus (L.) G. Don
Sunfs 82311

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の表面の色数（目の色を除く。）	01 1
19 花の表面の主な色	RHSカラーチャート N80A
20 花の表面の二次色	
21 花の表面の二次色の分布	
22 花の表面の二次色の割合	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	03 小
25 花の目の色数	01 1
26 花の目の輪郭の明瞭度（目の色が一色の品種に限る。）	02 不明瞭
27 花の内側の目の色	RHSカラーチャート 79A
28 花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）	
29 花の外側の目の輪郭の明瞭度（目の色が二色の品種に限る。）	
30 花床筒上部の環状部の有無	03 有
31 花床筒上部の色	06 紫
32 花弁の幅	02 かなり狭
33 花弁の形	01 狭長楕円形又は倒披針形
34 花弁の切れ込みの有無	01 無

Catharanthus roseus (L.) G. Don
Sunfs 82311

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の波打ちの強弱 36 花卉の対称性 37 開花期	01 無又は極弱
	02 対称

1 品種登録の番号及び年月日 第30051号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 秀岳（シュウガク）

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は舟底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5B、開花習性は4月～6月咲き（夏ギク）、各開花習性における早晩性はかなり晩、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「秀岳」は、対照品種「秀楽」と比較して、頭花の直径（摘らいしたもの）が大であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）が多であること等で区別性が認められる。対照品種「孔明」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の直径（摘らいしたもの）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「月の浦」に育成者所有の黄色系輪ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
秀岳

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	04 紫
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	02 かなり斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	03 短
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
秀岳

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 9A
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	07 大
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

Chrysanthemum L.
秀岳

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	01 極短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	02 2
41 頭花の舌状花の主要な形	02 舟底状
42 頭花の舌状花の二次的な形	03 さじ状
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	05 中
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	07 先端部1/4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	03 平形
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	08 かなり長
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 5A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
秀岳

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 5B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 7A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 6A
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	02 かなり早
96 開花習性	01 4月～6月咲き（夏ギク）
97 各開花習性における早晩性	08 かなり晩
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	07 多
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

秀岳

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）

05 水平

105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞
ぎくに限る）

106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の觀賞
ぎくに限る）

107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）

108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）

109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）

110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）

1 品種登録の番号及び年月日 第30052号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. 秀おぎと (シュウギト)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、開花習性は4月～6月咲き（夏ギク）、各開花習性における早晩性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀おぎと」は、対照品種「秀ゆづる」と比較して、花盤の直径（デージー型の一重及び半八重品種に限る）がやや小であること、自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）がかなり早であること、各開花習性における早晩性が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「秀はくのか」に育成者所有の白色系小ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.

秀おごと

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	04 紫
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	02 かなり斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	07 長
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

Chrysanthemum L.

秀おぎと

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	09 極多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	02 かなり狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート NN155A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

Chrysanthemum L.

秀おぎと

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	02 かなり少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

Chrysanthemum L.

秀おぎと

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.

秀おごと

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	02 平
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

秀おぎと

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	02 かなり早
96 開花習性	01 4月～6月咲き（夏ギク）
97 各開花習性における早晩性	07 晩
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

秀おぎと

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質

1 品種登録の番号及び年月日 第30053号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. 風泉（フウセン）

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや高、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は主に1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は中、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さは長、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は少、花柄の長さは長、頭花の向きは直立、頭花の型は八重、頭花の直径はやや小、頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）は中、舌状花の長さは中、舌状花の中間部の横断面の形は中程度の内曲、舌状花の先端の形は尖り状、舌状花の表面の色数は3以上、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「風泉」は、対照品種「純愛」と比較して、小葉の幅が広であること、舌状花の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「なまはげパープル」と比較して、小葉の幅が広であること、舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）が強く内曲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社華金剛
奈良県御所市佐田175

6 登録品種の育成をした者の氏名

鷲澤康二

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dahlia Cav.
風泉

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	06 やや高
03 茎の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
04 葉の型	03 主に1回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	02 中
06 葉の長さ	06 やや長
07 葉の幅	06 やや広
08 葉の長さ／幅	06 やや高
09 葉の色	02 緑
10 葉の光沢の強弱	03 弱
11 葉の表面のしわの強弱	01 平滑又は極弱
12 葉の葉脈の凹凸	02 平
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	07 長
15 小葉の幅	07 広
16 小葉の基部の形	01 鋭形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	03 少

Dahlia Cav.
風泉

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	06 やや深
19 花柄の長さ	07 長
20 花柄の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
21 葉群に対する頭花の位置	01 葉群の下
22 頭花の向き	01 直立
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	04 やや小
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	05 中
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	05 中
31 舌状花の長さ	05 中
32 舌状花の幅	04 やや狭
33 舌状花の長さ／幅	06 やや高
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

Dahlia Cav.
風泉

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03 3 以上
36 舌状花の中間部の横断面の形	04 中程度の内曲
37 舌状花の中間部の横断面の形2	
38 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	03 強く内曲
39 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）2	
40 舌状花の周縁部の巻き方	04 平（巻かない）
41 舌状花の周縁が巻く部分の位置	
42 舌状花の縦断面の形	03 外反
43 舌状花の縦方向の湾曲する位置	01 先端部から1/4
44 舌状花の湾曲の強弱	05 中
45 舌状花のねじれの強弱	01 無又は極弱
46 舌状花の先端の形	01 尖り状
47 舌状花の表面の色数	03 3 以上
48 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 75C
49 舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155B
50 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	07 基部1/4
51 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）2	

Dahlia Cav.
風泉

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	02 ぼかし
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 1C
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	08 基部
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。） 2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	02 ぼかし
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の变化	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第30054号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. YD656

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや大、ぎ球茎の長さはやや長、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さは短、花茎の太さは中、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅はやや広、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は中、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は中、セパルの模様はぼかしと斑点、セパルの主な色はNN155C、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78B、セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）はN81A、ペタルの縦断面の形は外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155C、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78B、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は有、リップの目の型はIV型、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、リップの主な色は155C、リップの中央部の色は12A、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78C、リップの目の色（目のある品種に限る。）はN186D、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN78B, N79C（縁部、条）、リップの周縁の波打ちの強弱は強、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「YD656」は、対照品種「スイートピンキー モモコ」と比較して、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱が中であること、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が大であること等で区別性が認められる。対照品種「ジョイア」と比較して、リップの目の有無が有であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がN78B, N79C（縁部、条）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野一丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

スイートピンキーにジョリーラビットを交配し、選抜したものである。

Dendrobium Sw.
YD656

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	06 やや大
02 ギ球茎の向き	03 半直立
03 ギ球茎の長さ	06 やや長
04 ギ球茎の太さ	03 細
05 ギ球茎の縦断面の形	01 線形
06 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
07 着花ギ球茎の齡	02 2年以上
08 葉の長さ	05 中
09 葉の幅	05 中
10 葉の形	02 楕円形
11 葉の緑色の濃淡	05 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の模様	
14 葉の斑の色	
15 葉の毛の有無	01 無
16 葉の毛の色	
17 花序の着生位置	01 全体

Dendrobium Sw.
YD656

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の着き方	02 先端のみ
19 1花茎の花数	03 少
20 花茎の長さ	03 短
21 花茎の太さ	05 中
22 花茎の向き	02 斜上
23 小花柄の長さ	03 短
24 小花柄の太さ	04 やや細
25 花型	02 抱え・平咲き
26 花の距の長さ	03 短
27 花の長さ	05 中
28 花の幅	06 やや広
29 花の香りの有無	09 有
30 ドーサルセパルの縦断面の形	07 外反
31 ドーサルセパルの長さ	05 中
32 ドーサルセパルの幅	05 中
33 ドーサルセパルの正面の形	02 楕円形
34 ドーサルセパルの横断面の形	06 やや外反

Dendrobium Sw.
YD656

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルのねじれの強弱	01 無又は極弱
36 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	05 中
37 ラテラルセパルの縦断面の形	06 やや外反
38 ラテラルセパルの長さ	05 中
39 ラテラルセパルの幅	04 やや狭
40 ラテラルセパルの正面の形	02 楕円形
41 ラテラルセパルの横断面の形	07 外反
42 ラテラルセパルのねじれの強弱	01 無又は極弱
43 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	05 中
44 セパルの色数	03 3
45 セパルの模様	09 ぼかしと斑点
46 セパルの主な色	RHSカラーチャート NN155C
47 セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	05 中
48 セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート N78B
49 セパルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
50 セパルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
51 セパルの網目の色（網目のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD656

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N81A
53 ペタルの縦断面の形	07 外反
54 ペタルの長さ	05 中
55 ペタルの幅	04 やや狭
56 ペタルの正面の形	03 卵形
57 ペタルの横断面の形	06 やや外反
58 ペタルのねじれの強弱	02 かなり弱
59 ペタルの周縁の波打ちの強弱	05 中
60 ペタルの色数	02 2
61 ペタルの模様	02 ぼかし
62 ペタルの主な色	RHSカラーチャート NN155C
63 ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	05 中
64 ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート N78B
65 ペタルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
66 ペタルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
67 ペタルの網目の色（網目のある品種に限る。）	
68 ペタルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD656

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの長さ	04 やや短
70 リップの幅	08 かなり広
71 リップの側裂片の有無	01 無
72 リップの形（側裂片がない品種に限る。）	02 円形
73 リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）	01 無
74 側裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
75 中央裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
76 リップの湾曲の型	
77 リップの目の有無	09 有
78 リップの目の型	04 IV型
79 リップの色数	03 3
80 リップの模様	02 ぼかし
81 リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	07 大
82 リップの主な色	RHSカラーチャート 155C
83 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 12A
84 リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート N78C
85 リップの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD656

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの条線の色（条線のある品種に限る。）	
87 リップの網目の色（網目のある品種に限る。）	
88 リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	
89 リップの目の色（目のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N186D
90 リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）	RHSカラーチャート N78B, N79C（縁部、条）
91 リップのねじれの強弱	01 無又は弱
92 リップの周縁の波打ちの強弱	03 強
93 リップの周縁の切れ込みの粗密	01 無又は極粗
94 リップのカルスの有無	01 無
95 リップの毛の多少	02 中
96 ずい柱の長さ	03 短
97 花粉のうの色	RHSカラーチャート N78B
98 開花期	02 早

1 品種登録の番号及び年月日 第30055号

令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. YD716

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや大、ぎ球茎の長さはやや長、ぎ球茎の太さはやや細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや太、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや長、花の幅は広、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は極外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は中、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN78B、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はNN155D、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN78B、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はNN155D、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は有、リップの目の型はIV型、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、リップの主な色はNN155A、リップの中央部の色は15C、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78B、リップの目の色（目のある品種に限る。）はN186D、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）は56C、N186D（縁部、条）、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「YD716」は、対照品種「ブリリアントスマイル ロイヤル」と比較して、ドーサルセパルの横断面の形が極外反であること、リップの中央部の色が15Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ワイルドアプローズ」と比較して、ドーサルセパルの横断面の形が極外反であること、リップの中央部の色が15Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野一丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

ブリリアントスマイルにチャームレディを交配し、選抜したものである。

Dendrobium Sw.
YD716

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	06 やや大
02 り球茎の向き	03 半直立
03 り球茎の長さ	06 やや長
04 り球茎の太さ	04 やや細
05 り球茎の縦断面の形	01 線形
06 り球茎の横断面の形	01 楕円形
07 着花り球茎の齡	02 2年以上
08 葉の長さ	05 中
09 葉の幅	06 やや広
10 葉の形	02 楕円形
11 葉の緑色の濃淡	05 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の模様	
14 葉の斑の色	
15 葉の毛の有無	01 無
16 葉の毛の色	
17 花序の着生位置	01 全体

Dendrobium Sw.
YD716

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の着き方	02 先端のみ
19 1花茎の花数	03 少
20 花茎の長さ	02 かなり短
21 花茎の太さ	06 やや太
22 花茎の向き	02 斜上
23 小花柄の長さ	03 短
24 小花柄の太さ	04 やや細
25 花型	02 抱え・平咲き
26 花の距の長さ	03 短
27 花の長さ	06 やや長
28 花の幅	07 広
29 花の香りの有無	09 有
30 ドーサルセパルの縦断面の形	05 平
31 ドーサルセパルの長さ	06 やや長
32 ドーサルセパルの幅	04 やや狭
33 ドーサルセパルの正面の形	02 楕円形
34 ドーサルセパルの横断面の形	09 極外反

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルのねじれの強弱	01 無又は極弱
36 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
37 ラテラルセパルの縦断面の形	05 平
38 ラテラルセパルの長さ	05 中
39 ラテラルセパルの幅	04 やや狭
40 ラテラルセパルの正面の形	02 楕円形
41 ラテラルセパルの横断面の形	08 かなり外反
42 ラテラルセパルのねじれの強弱	01 無又は極弱
43 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	05 中
44 セパルの色数	02 2
45 セパルの模様	02 ぼかし
46 セパルの主な色	RHSカラーチャート N78B
47 セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	05 中
48 セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155D
49 セパルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
50 セパルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
51 セパルの網目の色（網目のある品種に限る。）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	
53 ペタルの縦断面の形	06 やや外反
54 ペタルの長さ	06 やや長
55 ペタルの幅	04 やや狭
56 ペタルの正面の形	03 卵形
57 ペタルの横断面の形	07 外反
58 ペタルのねじれの強弱	01 無又は極弱
59 ペタルの周縁の波打ちの強弱	05 中
60 ペタルの色数	02 2
61 ペタルの模様	02 ぼかし
62 ペタルの主な色	RHSカラーチャート N78B
63 ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	05 中
64 ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155D
65 ペタルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
66 ペタルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
67 ペタルの網目の色（網目のある品種に限る。）	
68 ペタルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD716

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの長さ	05 中
70 リップの幅	09 極広
71 リップの側裂片の有無	01 無
72 リップの形（側裂片がない品種に限る。）	02 円形
73 リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）	01 無
74 側裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
75 中央裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
76 リップの湾曲の型	
77 リップの目の有無	09 有
78 リップの目の型	04 IV型
79 リップの色数	03 3
80 リップの模様	02 ぼかし
81 リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	07 大
82 リップの主な色	RHSカラーチャート NN155A
83 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 15C
84 リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート N78B
85 リップの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD716

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの条線の色（条線のある品種に限る。）	
87 リップの網目の色（網目のある品種に限る。）	
88 リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	
89 リップの目の色（目のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N186D
90 リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）	RHSカラーチャート 56C, N186D（縁部、条）
91 リップのねじれの強弱	01 無又は弱
92 リップの周縁の波打ちの強弱	02 中
93 リップの周縁の切れ込みの粗密	01 無又は極粗
94 リップのカルスの有無	01 無
95 リップの毛の多少	02 中
96 ずい柱の長さ	03 短
97 花粉のうの色	RHSカラーチャート N78A
98 開花期	02 早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30056号 令和6年2月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dichroa febrifuga Lour. MY-001
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張、樹高はやや低、枝の斑点の有無は無、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の長さ／幅はかなり大、葉身の最大幅の位置は先端、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の基部の形は鋭形、葉縁の鋸歯の粗密は密、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の斑の有無は無、花序の高さは中、花序の幅は狭、つぼみの形は円形、つぼみの主な色は97B、花の直径は大、花型は一重、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の主な色は98C、花弁の二次色の有無は有、花弁の二次色は100D、果実の長さは中、果実の直径は中、果実の主な色は102Aである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「MY-001」は、対照品種「碧のひとみ」と比較して、葉身の長さ／幅がかなり大であること、葉縁の鋸歯の粗密が密であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
宮崎勇樹
千葉県旭市入野1455
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
宮崎勇樹
- 7 出願公表の年月日 平成30年2月13日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の在来系統の変異株である。

Dichroa febrifuga Lour.
MY-001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張
02 樹高	04 やや低
03 節間長	03 中
04 枝の斑点の有無	01 無
05 枝の斑点の多少	
06 枝の斑点の色	
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	03 狭
09 葉身の長さ／幅	08 かなり大
10 葉身の最大幅の位置	01 先端
11 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
12 葉身の基部の形	02 鋭形
13 葉縁の鋸歯の粗密	04 密
14 葉身の緑色の濃淡	02 中
15 葉身の斑の有無	01 無
16 葉身の斑の色	
17 葉身の光沢	01 無又は極弱

Dichroa febrifuga Lour.
MY-001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の毛	02 粗
19 花序の高さ	03 中
20 花序の幅	02 狭
21 花序の花の数	03 中
22 つぼみの形	02 円形
23 つぼみの主な色	RHSカラーチャート 97B
24 花の直径	04 大
25 花型	01 一重
26 花弁の長さ	03 中
27 花弁の幅	03 中
28 花弁の形	04 狭楕円形
29 花弁の曲がり	03 外曲
30 花弁の主な色	RHSカラーチャート 98C
31 花弁の二次色の有無	09 有
32 花弁の二次色	RHSカラーチャート 100D
33 やくの色（雄ずいが有の品種に限る。）	RHSカラーチャート 102A
34 花糸の色（雄ずいが有の品種に限る。）	RHSカラーチャート 102C

MY-001

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 0 5 6 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30057号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Epipremnum pinnatum (L.) Engl. テルノエスプリ (テルノエスプリ)

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや短、茎の太さは中、茎の色数は1、茎の主な色は150C、茎の毛の有無は無、節間長はやや短、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の厚さは中、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は漸鋭尖形、葉身の基部の形は切形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身のしわの有無は有、葉身の裏面の突起の有無は有、葉身の模様の有無は有、葉身の模様は掃け込み、葉身の色数は2、葉身の主な色は144A、葉身の二次色は154D、葉柄の長さは中、葉柄の主な色は150Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「テルノエスプリ」は、対照品種「ハッピーデー」と比較して、葉身の基部の形が切形であること、葉身の裏面の突起の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伊藤輝則

愛知県弥富市富島1丁目92番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤輝則

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「テルノシャンゼリゼ」の変異株である。

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
テルノエスプリ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30057号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	04 やや短
02 茎の太さ	05 中
03 茎の色数	01 1
04 茎の主な色	RHSカラーチャート 150C
05 茎の二次色	
06 茎の毛の有無	01 無
07 節間長	04 やや短
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	05 中
10 葉身の厚さ	05 中
11 葉身の形	02 卵形
12 葉身の先端部の形	01 漸鋭尖形
13 葉身の基部の形	02 切形
14 葉身の切れ込みの有無	01 無
15 葉身のしわの有無	09 有
16 葉身の裏面の突起の有無	09 有
17 葉身の模様の有無	09 有

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
テルノエスプリ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の模様	01 掃け込み
19 葉身の掃け込みの大きさ	02 中
20 葉身の色数	02 2
21 葉身の主な色	RHSカラーチャート 144A
22 葉身の二次色	RHSカラーチャート 154D
23 葉身の三次色	
24 葉身の四次色	
25 葉柄の長さ	05 中
26 葉柄の主な色	RHSカラーチャート 150C
27 株の基部の葉における葉身の主な色	RHSカラーチャート 143A
28 株の基部の葉における葉身の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 154A

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30058号 令和6年2月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. テルノラブソング (テルノラブソング)
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さはかなり短、茎の太さは中、茎の色数は1、茎の主な色は150D、茎の毛の有無は無、節間長はかなり短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の厚さはやや厚、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の基部の形は切形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身のしわの有無は有、葉身の裏面の突起の有無は有、葉身の模様の有無は有、葉身の模様は掃け込み、葉身の色数は3、葉身の主な色は150D、葉身の二次色は144C、葉身の三次色は137B、葉柄の長さは中、葉柄の主な色は155Aである。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「テルノラブソング」は、対照品種「テルノファンファール」と比較して、茎の主な色が150Dであること、葉身の裏面の突起の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「マーブル クイーン (豊明花き)」と比較して、葉身のしわの有無が有であること、葉身の裏面の突起の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
伊藤輝則
愛知県弥富市富島1丁目92番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
伊藤輝則
- 7 出願公表の年月日 令和3年5月6日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「テルノシャングリラ」の変異株である。

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
テルノラブソング

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	02 かなり短
02 茎の太さ	05 中
03 茎の色数	01 1
04 茎の主な色	RHSカラーチャート 150D
05 茎の二次色	
06 茎の毛の有無	01 無
07 節間長	02 かなり短
08 葉身の長さ	04 やや短
09 葉身の幅	04 やや狭
10 葉身の厚さ	06 やや厚
11 葉身の形	02 卵形
12 葉身の先端部の形	02 鋭尖形
13 葉身の基部の形	02 切形
14 葉身の切れ込みの有無	01 無
15 葉身のしわの有無	09 有
16 葉身の裏面の突起の有無	09 有
17 葉身の模様の有無	09 有

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
テルノラブソング

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の模様	01 掃け込み
19 葉身の掃け込みの大きさ	03 大
20 葉身の色数	03 3
21 葉身の主な色	RHSカラーチャート 150D
22 葉身の二次色	RHSカラーチャート 144C
23 葉身の三次色	RHSカラーチャート 137B
24 葉身の四次色	
25 葉柄の長さ	05 中
26 葉柄の主な色	RHSカラーチャート 155A
27 株の基部の葉における葉身の主な色	RHSカラーチャート NN155B
28 株の基部の葉における葉身の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 137B

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30059号 令和6年2月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. シエスタ (シエスタ)
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さはやや長、茎の太さは中、茎の色数は2、茎の主な色は151D、茎の二次色は141B、茎の毛の有無は無、節間長はやや長、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の厚さはやや薄、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は漸鋭尖形、葉身の基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身のしわの有無は無、葉身の裏面の突起の有無は無、葉身の模様の有無は有、葉身の模様は掃け込み、葉身の色数は3、葉身の主な色は137A、葉身の二次色は150D、葉身の三次色は144A、葉柄の長さは中、葉柄の主な色は150Dである。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「シエスタ」は、対照品種「バレンシア」と比較して、茎の主な色が151Dであること、葉柄の主な色が150Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岡部望
愛知県刈谷市下重原町1丁目18番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岡部望
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ゴールデン」の変異株である。

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
シエスタ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30059号
01 茎の長さ	06 やや長	
02 茎の太さ	05 中	
03 茎の色数	02 2	
04 茎の主な色	RHSカラーチャート 151D	
05 茎の二次色	RHSカラーチャート 141B	
06 茎の毛の有無	01 無	
07 節間長	06 やや長	
08 葉身の長さ	06 やや長	
09 葉身の幅	05 中	
10 葉身の厚さ	04 やや薄	
11 葉身の形	02 卵形	
12 葉身の先端部の形	01 漸鋭尖形	
13 葉身の基部の形	03 心形	
14 葉身の切れ込みの有無	01 無	
15 葉身のしわの有無	01 無	
16 葉身の裏面の突起の有無	01 無	
17 葉身の模様の有無	09 有	

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
シエスタ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の模様	01 掃け込み
19 葉身の掃け込みの大きさ	02 中
20 葉身の色数	03 3
21 葉身の主な色	RHSカラーチャート 137A
22 葉身の二次色	RHSカラーチャート 150D
23 葉身の三次色	RHSカラーチャート 144A
24 葉身の四次色	
25 葉柄の長さ	05 中
26 葉柄の主な色	RHSカラーチャート 150D
27 株の基部の葉における葉身の主な色	RHSカラーチャート 137A
28 株の基部の葉における葉身の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 150D

1 品種登録の番号及び年月日 第30060号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Epipremnum pinnatum (L.) Engl. テルノワカクサ (テルノワカサ)

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、茎の太さはやや太、茎の色数は1、茎の主な色は144A、茎の毛の有無は無、節間長は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の厚さは中、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は漸鋭尖形、葉身の基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身のしわの有無は無、葉身の裏面の突起の有無は無、葉身の模様の有無は無、葉身の色数は1、葉身の主な色はN144C、葉柄の長さはやや長、葉柄の主な色はN144Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「テルノワカクサ」は、対照品種「ライム」と比較して、茎の主な色が144Aであること、株の基部の葉における葉身の主な色が144Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伊藤輝則
愛知県弥富市富島1丁目92番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤輝則

7 出願公表の年月日 令和3年8月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

「テルノカーニバル」の変異株である。

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
テルノワカクサ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30060号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 茎の太さ	06 やや太
03 茎の色数	01 1
04 茎の主な色	RHSカラーチャート 144A
05 茎の二次色	
06 茎の毛の有無	01 無
07 節間長	05 中
08 葉身の長さ	06 やや長
09 葉身の幅	06 やや広
10 葉身の厚さ	05 中
11 葉身の形	02 卵形
12 葉身の先端部の形	01 漸鋭尖形
13 葉身の基部の形	03 心形
14 葉身の切れ込みの有無	01 無
15 葉身のしわの有無	01 無
16 葉身の裏面の突起の有無	01 無
17 葉身の模様の有無	01 無

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
テルノワカクサ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の模様	
19 葉身の掃け込みの大きさ	
20 葉身の色数	01 1
21 葉身の主な色	RHSカラーチャート N144C
22 葉身の二次色	
23 葉身の三次色	
24 葉身の四次色	
25 葉柄の長さ	06 やや長
26 葉柄の主な色	RHSカラーチャート N144D
27 株の基部の葉における葉身の主な色	RHSカラーチャート 144B
28 株の基部の葉における葉身の二次色（二次色のある品種に限る。）	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30061号 令和6年2月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. テルノリンダ (テルリンダ)
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さは長、茎の太さはやや太、茎の色数は1、茎の主な色は139A、茎の毛の有無は無、節間長は長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の厚さは中、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身のしわの有無は有、葉身の裏面の突起の有無は無、葉身の模様の有無は無、葉身の色数は1、葉身の主な色は137A、葉柄の長さはやや長、葉柄の主な色は144Aである。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「テルノリンダ」は、対照品種「パーフェクトグリーン」と比較して、葉身のしわの有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
伊藤輝則
愛知県弥富市富島1丁目92番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
伊藤輝則
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「テルノバンピー」の変異株である。

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
テルノリンダ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30061号
01 茎の長さ	07 長	
02 茎の太さ	06 やや太	
03 茎の色数	01 1	
04 茎の主な色	RHSカラーチャート 139A	
05 茎の二次色		
06 茎の毛の有無	01 無	
07 節間長	07 長	
08 葉身の長さ	06 やや長	
09 葉身の幅	06 やや広	
10 葉身の厚さ	05 中	
11 葉身の形	02 卵形	
12 葉身の先端部の形	02 鋭尖形	
13 葉身の基部の形	03 心形	
14 葉身の切れ込みの有無	01 無	
15 葉身のしわの有無	09 有	
16 葉身の裏面の突起の有無	01 無	
17 葉身の模様の有無	01 無	

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
テルノリンダ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の模様	
19 葉身の掃け込みの大きさ	
20 葉身の色数	01 1
21 葉身の主な色	RHSカラーチャート 137A
22 葉身の二次色	
23 葉身の三次色	
24 葉身の四次色	
25 葉柄の長さ	06 やや長
26 葉柄の主な色	RHSカラーチャート 144A
27 株の基部の葉における葉身の主な色	RHSカラーチャート 139A
28 株の基部の葉における葉身の二次色（二次色のある品種に限る。）	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30062号 令和6年2月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hordeum vulgare L. フクミファイバー (フクミファイバー)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中間、稈の長さは中、出穂期はやや早、穂のろう質の多少は少、草丈は中、穂の条数は3以上、穂の形は平行、穂の長さは中、うるち・もちの別はもち、千粒重(原麦粒)は小、まき性は秋まき性である。
出願品種「フクミファイバー」は、対照品種「イチバンボシ」と比較して、うるち・もちの別がもちであること、穀粒硬度がかなり硬であること、 β グルカン含量が極多であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
吉岡 藤治 高橋 飛鳥 杉田 知彦 柳澤 貴司 長嶺 敬
- 7 出願公表の年月日 平成31年2月13日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「四R系3755」に「四系9814」を交配し、選抜したものである。

Hordeum vulgare L.
フクミファイバー

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30062号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 稈の長さ	05 中
03 葉しょうの毛の有無	01 無
04 止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱	03 弱
05 植物体の反曲した止め葉の多少	03 少
06 止め葉の葉しょう表面のろう質の多少	05 中
07 出穂期	04 やや早
08 芒の先端のアントシアニン着色の強弱	03 弱
09 開閉花受粉性	01 開花受粉性
10 穂のろう質の多少	03 少
11 穂の向き	01 立
12 草丈	05 中
13 穂の条数	02 3以上
14 穂の形	05 平行
15 穂の粒着の粗密	05 中
16 穂の長さ	05 中
17 芒の長さ	

Hordeum vulgare L.
フクミファイバー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 穂軸の長さ	
19 穂軸の曲がりの強弱	03 弱
20 穂の不稔小穂の発育	
21 不稔小穂の向き	
22 穀粒に比べた中央小穂の芒を含む護穎の長さ	01 短
23 穀粒の小穂軸の毛の型	02 長
24 穀粒のふの有無	01 無
25 穀粒の外穎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
26 穀粒の外穎背面内側面の脈沿いの突起の多少	03 少
27 穀粒の縦溝の毛の有無	01 無
28 穀粒のりん皮の着き方	01 正面
29 穀粒の糊粉層の色	01 白色
30 うるち・もちの別	02 もち
31 穂発芽性	
32 千粒重(原麦粒)	03 小
33 まき性	01 秋まき性
34 穀粒硬度	08 かなり硬

Hordeum vulgare L.
フクミファイバー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 麦芽エキスの多少（ビール用品種に限る。）	
36 コールバツハ数（ビール用品種に限る。）	
37 ジアスターゼ力（ビール用品種に限る。）	
38 穀粒のプロアントシアニジンの有無	
39 穀粒のリポキシゲナーゼ（lox）活性の有無	
40 β グルカン含量	09 極多
41 D-ホルデインのHor-3座の遺伝子の発現	
42 C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現1	
43 C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現2	
44 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現1	
45 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現2	
46 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現3	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30063号 令和6年2月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. マーチ2 (マーチ2)
- 3 登録品種の特性の概要
生育型は非つる性、樹型は半直立、樹高は中、茎の帯化の有無は無、茎の色は緑、葉身の長さはかなり長、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の形は楕円形、葉身の基部の形は鈍形、葉身のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は緑、葉身の二次色は無、葉柄の色は黒、花序の型は平型、花序の両性花の明瞭度は強、花序の装飾花の配列は一列、装飾花の直径は極大、装飾花のがく片の数は4～5、装飾花のがく片の先端の形は円形、装飾花のがく片の重なりは強、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無はすべてのがく片に有、装飾花のがく片の主な色はNN155A（低pH区;N87B）、装飾花のがく片の二次色はN81C（低pH区;NN155A）、両性花の花弁の色は淡青である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「マーチ2」は、対照品種「スプリングエンジェルピンクエレガンス」と比較して、葉身の幅がやや広であること、装飾花のがく片の色数が2色以上であること等で区別性が認められる。対照品種「スプリングエンジェルフリルエレガンス」と比較して、装飾花のがく片の色数が2色以上であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
久保田正夫
群馬県伊勢崎市国定町1-141-42
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
久保田正夫
- 7 出願公表の年月日 平成30年8月14日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のHydrangea chinensis(在来系統)に育成者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
マーチ2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	03 横長
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	03 中
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	01 白系
11 葉身の長さ	08 かなり長
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
マーチ2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	04 黒
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	06 やや高
30 花序の幅	07 広
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	01 一列
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	02 かなり少

Hydrangea L.
マーチ2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	09 極大
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	09 極長
40 装飾花のがく片の幅	09 極広
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	04 強
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

Hydrangea L.
マーチ2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート NN155A (低pH区;N87B)
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート N81C (低pH区;NN155A)
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部 (低pH区;下半分)
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	05 中 (低pH区;小)
57 装飾花の小花柄の色	06 紫 (低pH区;淡緑)
58 両性花の花弁の色	07 淡青
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30064号 令和6年2月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. WOA-1
- 3 登録品種の特性の概要
生育型は非つる性、樹型は半直立、樹高はかなり高、茎の帯化の有無は無、茎の色は緑、葉身の長さは長、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の形は楕円形、葉身の基部の形は鈍形、葉身のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は淡緑、葉身の二次色は無、葉柄の色は黒、花序の型は平型～球型、花序の両性花の明瞭度は無又は弱、装飾花の直径はかなり大、装飾花のがく片の数は4～5、装飾花のがく片の先端の形は凹形、装飾花のがく片の重なりは中、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無はすべてのがく片に有、装飾花のがく片の主な色は106Dである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「WOA-1」は、対照品種「スプリングエンジェルピンクエレガンス」と比較して、花序の両性花の明瞭度が無又は弱であること、開花始期がかなり早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
小内晶代
群馬県みどり市笠懸町鹿3739番地4
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小内晶代
- 7 出願公表の年月日 平成31年4月8日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「グリュンヘルツ」に育成者所有の台湾トキワアジサイの系統を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
WOA-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	08 かなり高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	07 長
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
WOA-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	02 淡緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	04 黒
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	06 やや高
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	03 中
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
WOA-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	08 かなり大
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	07 長
40 装飾花のがく片の幅	09 極広
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	02 中
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	01 無
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
WOA-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 106D
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	06 紫
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	02 かなり早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30065号 令和6年2月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. WOK-1
- 3 登録品種の特性の概要
生育型は非つる性、樹型は半直立、樹高はかなり高、茎の帯化の有無は無、茎の色は緑及び黒（二次色;緑）、葉身の長さは長、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の形は楕円形、葉身の基部の形は鈍形、葉身のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は淡緑、葉身の二次色は無、葉柄の色は黒、花序の型は平型、花序の両性花の明瞭度は強、花序の装飾花の配列は二列以上、装飾花の直径はかなり大、装飾花のがく片の数は3～4、装飾花のがく片の先端の形は凹形、装飾花のがく片の重なりは中、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無はすべてのがく片に有、装飾花のがく片の主な色は100D、両性花の花弁の色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「WOK-1」は、対照品種「スプリングエンジェルピンクエレガンス」と比較して、樹高がかなり高であること、花序の装飾花の配列が二列以上であること等で区別性が認められる。対照品種「WONAIK-0」と比較して、装飾花のがく片の横断面の形が平であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
小内敬一
群馬県みどり市笠懸町鹿3739番地4
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小内敬一
- 7 出願公表の年月日 令和元年6月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ラブラーハートピンク」に育成者所有の台湾トキワアジサイの系統を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
WOK-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	08 かなり高
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	06 緑及び黒（二次色;緑）
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	01 小
10 茎の皮目の色	01 白系
11 葉身の長さ	07 長
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
WOK-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	02 淡緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	04 黒
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	06 やや高
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	02 二列以上
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	03 少

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	08 かなり大
36 装飾花のがく片の数	01 3～4
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	08 かなり長
40 装飾花のがく片の幅	09 極広
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	01 無
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
WOK-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 100D
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	06 紫
58 両性花の花弁の色	05 紫
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第30066号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow H222HM

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の成長最適温度は25℃、菌糸体の温度別成長量(30℃)は中、菌さんの縦断面の形は丸山形、菌さんの直径はやや小、菌さんの高さは極大、菌さんの直径／高さはかなり大、菌さんの中央部の色は灰茶(199C)、菌さん周縁部の色は灰茶(199D)、菌さん表面の斑紋の大きさは大、菌さん表面の斑紋の分布は全体、菌さん表面の斑紋の明瞭度は明瞭、菌さんの硬さは軟、ひだの並び方は直、ひだの密度は密、ひだの色は淡橙黄(N155D)、菌柄の形は中太、菌柄の長さはかなり長、菌さんの直径／菌柄の長さは大、菌柄の最大径は中、菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径は小、菌柄の色は黄白(155D)、菌柄の毛羽の有無は有、菌柄の硬さは中、子実体の平均乾燥重量は極重、発生処理までの期間中は、菌搔きから子実体収穫までの期間中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「H222HM」は、対照品種「中野N-SD」と比較して、菌さんの直径がやや小であること、菌さん表面の斑紋の大きさが大であること、ひだの並び方が直であること等で区別性が認められる。対照品種「KX-BS025号」と比較して、菌糸体の温度別成長量(20℃)がやや遅であること、菌さん表面の斑紋の大きさが大であること、菌さん表面の斑紋の明瞭度が明瞭であること等で区別性が認められる。対照品種「大木0h-494」と比較して、菌さんの直径がやや小であること、ひだの並び方が直であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社北研
栃木県下都賀郡壬生町中央町13番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山内隆弘 関谷暢 後藤史和

7 出願公表の年月日 令和4年10月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有株どおしを交配し、選抜したものである。

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow
H222HM

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30066号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌叢表面の着色の有無	01 無
02 菌叢裏面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の成長最適温度	06 25℃
04 菌糸体の温度別成長量 (10℃)	03 遅
05 菌糸体の温度別成長量 (15℃)	05 中
06 菌糸体の温度別成長量 (20℃)	04 やや遅
07 菌糸体の温度別成長量 (25℃)	05 中
08 菌糸体の温度別成長量 (30℃)	05 中
09 菌さんの縦断面の形	03 丸山形
10 菌さんの直径	04 やや小
11 菌さんの高さ	09 極大
12 菌さんの直径／高さ	08 かなり大
13 菌さんの中央部の色	05 灰茶 (199C)
14 菌さん周縁部の色	05 灰茶 (199D)
15 菌さん表面の斑紋の大きさ	03 大
16 菌さん表面の斑紋の分布	02 全体
17 菌さん表面の斑紋の明瞭度	03 明瞭

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow
H222HM

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30066号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 菌さんの硬さ	03 軟
19 ひだの並び方	01 直
20 ひだの密度	03 密
21 ひだの色	03 淡橙黄 (N155D)
22 菌柄の形	03 中太
23 菌柄の長さ	08 かなり長
24 菌さんの直径／菌柄の長さ	07 大
25 菌柄の最大径	05 中
26 菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径	03 小
27 菌柄の色	02 黄白 (155D)
28 菌柄の毛羽の有無	09 有
29 菌柄の硬さ	05 中
30 子実体の平均乾燥重量	09 極重
31 発生処理までの期間	05 中
32 菌掻きから子実体収穫までの期間	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30067号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lathyrus odoratus L. 真白麻呂 (マシロマロ)

3 登録品種の特性の概要

草型は高性、茎の最小径は太、茎の最大径は太、茎のアントシアン発現の有無は無、節間長はかなり長、複葉対数は1、葉形は広卵形、葉の波打ち程度はやや強、着葉角度は斜上、葉長は長、葉幅は広、たく葉の大きさは大、葉の色は中、ふ入り葉の有無は無、葉柄着生部の色は無、葉柄の長さはかなり長、花の着生密度は中、花の向きは斜上、花形はウェーブ、花径はやや大、旗弁長はやや長、旗弁幅は広、翼弁長は長、翼弁幅は広、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部の色はNN155C、旗弁中央部の色はNN155C、翼弁上部の色はNN155C、翼弁中央部の色はNN155C、舟弁中央部の色はNN155C、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は弱、旗弁の数は1、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、がくの色は無、雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さは中、花柄の長さはやや短、一花房当たりの花数はやや少、花の香りは中、開花の習性は春咲き性である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「真白麻呂」は、対照品種「スーパーホワイト」と比較して、葉柄着生部の色が無であること、花形がウェーブであること等で区別性が認められる。対照品種「ロイヤル 白花」と比較して、葉柄着生部の色が無であること、花形がウェーブであること、花径はやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村薫 倉永泰代 長友広明 郡司定雄 中岡直士

7 出願公表の年月日 令和2年4月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ステラ」に「スーパーミッドブルー」を交配し、選抜したものである。

Lathyrus odoratus L.
真白麻呂

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	07 高性
02 草丈	07 高
03 茎の最小径	07 太
04 茎の最大径	07 太
05 茎のアントシアン発現の有無	01 無
06 茎のアントシアン発現の程度	
07 茎の毛の多少	03 少
08 第一次分枝の発達程度	04 やや少
09 節間長	08 かなり長
10 複葉対数	01 1
11 葉形	03 広卵形
12 葉の波打ち程度	06 やや強
13 着葉角度	01 斜上
14 葉長	07 長
15 葉幅	07 広
16 たく葉の大きさ	07 大
17 葉の色	05 中

Lathyrus odoratus L.
真白麻呂

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 ふ入り葉の有無	01 無
19 葉柄着生部の色	01 無
20 葉柄の長さ	08 かなり長
21 花の着生密度	05 中
22 花の向き	01 斜上
23 花形	03 ウェーブ
24 花径	06 やや大
25 旗弁長	06 やや長
26 旗弁幅	07 広
27 翼弁長	07 長
28 翼弁幅	07 広
29 舟弁長	05 中
30 舟弁幅	05 中
31 花弁の斑紋の有無	01 無
32 旗弁上部の色	RHSカラーチャート NN155C
33 旗弁中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
34 旗弁下部の色	RHSカラーチャート NN155C

Lathyrus odoratus L.
真白麻呂

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 翼弁上部の色	RHSカラーチャート NN155C
36 翼弁中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
37 翼弁下部の色	RHSカラーチャート NN155C
38 舟弁上部の色	RHSカラーチャート NN155C
39 舟弁中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
40 舟弁下部の色	RHSカラーチャート NN155C
41 旗弁の斑紋の形	
42 旗弁の斑紋の色	
43 旗弁の地色	
44 翼弁の斑紋の形	
45 翼弁の地色	
46 旗弁の形	01 全縁
47 翼弁の内曲	03 弱
48 旗弁の数	01 1
49 翼弁の数	01 2
50 がくの形	02 鐘状
51 がくの大きさ	06 やや大

Lathyrus odoratus L.
真白麻呂

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がくの色	01 無
53 雌ずいの有無	09 有
54 雄ずいの数	02 1 0
55 花柄の太さ	05 中
56 小花柄の太さ	06 やや太
57 花柄の長さ	04 やや短
58 小花柄の長さ	04 やや短
59 一花房当たりの花数	04 やや少
60 花の香り	05 中
61 開花の習性	02 春咲き性
62 冬咲き性の開花期の早晩	
63 春咲き性の開花期の早晩	05 中
64 夏咲き性の開花期の早晩	
65 耐寒性	
66 耐暑性	
67 病害抵抗性	
68 虫害抵抗性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30068号 令和6年2月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Medicago sativa L. ケレス2 (ケレス2)
- 3 登録品種の特性の概要
秋の草型は中間、春の草丈は中、開花始期は早、紫花を持つ株の割合はかなり低、複色花を持つ株の割合はかなり高、白花を持つ株の割合は無又は極低、秋期休眠性1は休眠評点3である。
出願品種「ケレス2」は、対照品種「ケレス」と比較して、アルファルファそばかす病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ハルワカバ」と比較して、アルファルファそばかす病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条5丁目1番8号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
横山寛 谷津英樹 高山光男
- 7 出願公表の年月日 平成29年4月14日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
個体選抜由来の9個体から合成品種法により育成されたものである。

Medicago sativa L.
ケレス2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 秋の草型	05 中間
02 は種当年の秋分から二週間後の草丈	05 中
03 は種当年の秋分から六週間後の草丈	05 中
04 春の草丈	05 中
05 開花始期	03 早
06 紫花を持つ株の割合	02 かなり低
07 複色花を持つ株の割合	08 かなり高
08 白花を持つ株の割合	01 無又は極低
09 茎の長さ	05 中
10 一番刈り後の草丈	05 中
11 二番刈り後の草丈	05 中
12 三番刈り後の草丈	
13 四番刈り後の草丈	
14 は種翌年の秋分の二週間後の草丈	05 中
15 は種翌年の秋分の六週間後の草丈	05 中
16 秋期休眠性1	03 休眠評点3
17 秋期休眠性2	

Medicago sativa L.
ケレス2

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30068号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30069号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oxalis L. TF955

3 登録品種の特性の概要

草型はほふく性、草丈は低、球根全体の形は卵形、球根の大きさは小、球根の色は茶、主茎地下部の長さはかなり短、主茎地下部の色はその他（白）、葉の発生位置は伸長した主茎から、単葉と複葉の別は複葉、複葉の形は三出葉、小葉全体の形は倒披針形、小葉先端の形は心臓形、小葉先端の切れ込みの有無は有、小葉先端の切れ込みの程度は浅、小葉基部の形は鋭形、複葉の大きさはやや小、小葉の長さは短、小葉の幅は狭、新葉表面の色は黄緑、成熟葉表面の色は緑、成熟葉裏面の色は緑、成熟葉の斑の有無は無、葉柄の長さは無又は極短、花序の形は単生、花の向きは上向き、花形は盃形、花卉の重なるの有無は有、花卉の重なるの程度は弱、花径は中、単色と複色の別は複色、花卉表面の色はNN155D、花卉裏面の色はNN155D、花底の色は6A、花卉全体の形は倒三角形、花卉先端の形は切形、一重・八重の別は一重、がく片の形は披針形、柱頭の高さは下段雄ずいより低い、やくの色は黄、柱頭の色は白、花柄の太さは細、花柄の長さは短、花の位置は上位、一花序当りの花数は1、花つきは多、開花時期は秋～春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TF955」は、対照品種「TF751」と比較して、花卉表面の色がNN155Dであること、花卉表面の複色が56Aであること等で区別性が認められる。対照品種「バリアベリスホワイト」と比較して、小葉全体の形が倒披針形であること、単色と複色の別が複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小山瞬 向井豊

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Oxalis L.
TF955

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30069号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 ほふく性
02 草丈	03 低
03 球根の有無	09 有
04 球根のタイプ	01 りん茎
05 球根全体の形	02 卵形
06 球根の大きさ	03 小
07 球根の色	03 茶
08 子球根の発生位置	02 主茎地下部節
09 母球根の宿存性	01 消耗
10 木本性と草本性の別	09 草本性
11 伸長茎の有無	09 有
12 主茎地下部の太さ	03 細
13 主茎地上部の太さ	02 かなり細
14 主茎地下部の長さ	02 かなり短
15 主茎地上部の長さ	03 短
16 主茎地下部の色	09 その他（白）
17 主茎地上部の色	02 緑

Oxalis L.
TF955

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 ほふく茎の色	03 茶
19 主茎地上部の毛の多少	03 少
20 ほふく茎の毛の多少	03 少
21 主茎地上部の分枝性	09 極多
22 ほふく茎・地下茎の分枝性	05 中
23 主茎地上部の節間長	03 短
24 ほふく茎の節間長	05 中
25 葉の発生位置	02 伸長した主茎から
26 単葉と複葉の別	09 複葉
27 複葉の形	01 三出葉
28 小葉全体の形	03 倒披針形
29 小葉先端の形	05 心臓形
30 小葉先端の切れ込みの有無	09 有
31 小葉先端の切れ込みの程度	03 浅
32 小葉基部の形	01 鋭形
33 葉面の凹凸	01 平滑
34 葉面の反りの有無	09 有

Oxalis L.
TF955

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30069号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉面の反りの程度	03 弱
36 葉縁鋸齒	01 無
37 葉の開閉	01 無
38 複葉の大きさ	04 やや小
39 小葉の長さ	03 短
40 小葉の幅	03 狭
41 新葉表面の色	01 黄緑
42 新葉の斑の色	(斑なし)
43 成熟葉表面の色	02 緑
44 成熟葉裏面の色	02 緑
45 成熟葉の葉脈の明瞭・不明瞭	03 不明瞭
46 成熟葉の斑の有無	01 無
47 成熟葉の斑の形	
48 斑の色数	
49 成熟葉の斑の色	
50 斑の安定度	
51 葉の光沢	01 無

Oxalis L.
TF955

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30069号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 葉の厚さ	02 かなり薄
53 一株当りの葉数	09 極多
54 葉のビロード感	03 弱
55 成熟葉表面の毛	01 無
56 成熟葉裏面の毛	09 有
57 葉柄の太さ	03 細
58 葉柄の長さ	01 無又は極短
59 小葉と葉柄の長さの比	01 極小
60 葉柄中間部の色	01 黄緑
61 葉柄基部の色	01 黄緑
62 葉柄の毛	09 有
63 牽引根の有無	01 無
64 牽引根の大きさ	
65 花序の形	02 単生
66 花の向き	01 上向き
67 花形	01 盃形
68 花弁の重なるの有無	09 有

Oxalis L.
TF955

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 花弁の重なり の程度	03 弱
70 夜閉性	09 有
71 花径	05 中
72 単色と複色の別	09 複色
73 花弁表面の色	RHSカラーチャート NN155D
74 花弁裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 花底の色	RHSカラーチャート 6A
76 脈の色	RHSカラーチャート NN155D
77 花弁表面の複色	RHSカラーチャート 56A
78 花弁裏面の複色	RHSカラーチャート 56A
79 複色の形	01 半覆輪
80 花弁全体の形	02 倒三角形
81 花弁先端の形	03 切形
82 花弁の厚さ	05 中
83 一重・八重の別	01 一重
84 がく片の形	01 披針形
85 がく片の大きさ	05 中

Oxalis L.
TF955

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30069号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
86 がくの色	01 黄緑
87 雌雄ずいの二型性	01 無
88 柱頭の高さ	05 下段雄ずいより低い
89 花糸の色	01 白
90 やくの色	01 黄
91 花粉の色	01 黄
92 柱頭の色	01 白
93 雄ずいの数	01 10
94 花柄の太さ	03 細
95 小花柄の太さ	(小花柄なし。(形質97、101、103、105について同様))
96 花柄の長さ	03 短
97 小花柄の長さ	
98 花の位置	07 上位
99 花柄中間部の色	03 紅緑
100 花柄基部の色	03 紅緑
101 小花柄の色	
102 花柄の強弱	05 中

Oxalis L.
TF955

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 小花柄の強弱	
104 花柄の毛の有無	09 有
105 小花柄の毛の有無	
106 一花序当りの花数	01 1
107 一花序当りの花数の多少	
108 花つき	07 多
109 花の香り	01 無
110 一年生・多年生の別	03 球根植物
111 発芽期	02 冬緑型
112 開花時期	07 秋～春
113 開花期間	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30070号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume ML Renya

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや長、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色はやや強、花の側面の形は平、花の縦径は長、花の横径は広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は2D、ドーサルセパルの覆色はN74D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅はやや広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は2D、ペタルの覆色はN74D、ペタルの覆色の面積はかなり小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや長、リップの側裂片の形はIV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色は2C、中央裂片の覆色はNN74A、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色は2A、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は71A、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ML Renya」は、対照品種「ゴールドエンアポロン」と比較して、ラテラルセパルの覆色が71Bであること、ペタルの覆色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「キヌの太陽」と比較して、ラテラルセパルの覆色が71Bであること、ペタルの覆色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡辺武夫
栃木県栃木市都賀町家中2971番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺武夫

7 出願公表の年月日 令和4年7月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「マキ ワタナベ」に「キヌの太陽」を交配し、選抜したものである。

Phalaenopsis Blume
ML Renya

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	06 やや長
02 植物体の花序の数	02 1又は2
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	05 中
05 葉の形	03 かなり細長い
06 葉の最大幅の位置	03 先端部
07 葉の先端の形	02 鈍形
08 葉の先端の対称性	02 非対称
09 葉の向き	03 斜上
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	03 緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
14 花序の型	02 総状
15 花序の長さ	07 長
16 花序の花数	04 やや少
17 花茎の長さ	06 やや長

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	03 太
19 花茎のアントシアニンの着色	04 やや強
20 花の側面の形	02 平
21 花の縦径	07 長
22 花の横径	07 広
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	07 長
26 ドーサルセパルの幅	07 広
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	03 外曲
30 ドーサルセパルの横断面の形	03 凸形
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート 2D
34 ドーサルセパルの覆色	RHSカラーチャート N74D

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	01 無
39 ドーサルセパルの縞斑の色	
40 ドーサルセパルの網斑の密度	01 無
41 ドーサルセパルの網斑の色	
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート 3D
43 ラテラルセパルの覆色	RHSカラーチャート 71B
44 ラテラルセパルの斑点の数	01 無
45 ラテラルセパルの斑点の色	
46 ラテラルセパルの縞斑の数	01 無
47 ラテラルセパルの縞斑の色	
48 ラテラルセパルの網斑の密度	01 無
49 ラテラルセパルの網斑の色	
50 ペタルの長さ	06 やや長
51 ペタルの幅	06 やや広

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	03 横長
53 ペタルの最大幅の位置	01 基部
54 ペタルの縦断面の形	02 平
55 ペタルの横断面の形	02 平
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSカラーチャート 2D
59 ペタルの覆色	RHSカラーチャート N74D
60 ペタルの覆色の面積	02 かなり小
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	01 無
65 ペタルの縞斑の色	
66 ペタルの網斑の密度	01 無
67 ペタルの網斑の色	
68 リップの中央裂片の長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の幅	05 中
70 リップの中央裂片の形	01 三角形
71 リップのヒゲの有無	09 有
72 リップのヒゲの長さ	06 やや長
73 リップの中央裂片の突起又は稜	01 無又は小
74 リップの側裂片の形	04 IV型
75 リップの側裂片の巻き込み	02 中
76 リップの側裂片の大きさ	07 広
77 中央裂片の地色	RHSカラーチャート 2C
78 中央裂片の覆色	RHSカラーチャート NN74A
79 中央裂片の斑点の数	01 無
80 中央裂片の斑点の大きさ	
81 中央裂片の斑点の色	
82 中央裂片の縞斑の数	01 無
83 中央裂片の縞斑の色	
84 中央裂片の網斑の密度	01 無
85 中央裂片の網斑の色	

Phalaenopsis Blume
ML Renya

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 側裂片の地色	RHSカラーチャート 2A
87 側裂片の覆色	
88 側裂片の斑点の数	01 無
89 側裂片の斑点の色	
90 側裂片の縞斑の数	04 多
91 側裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 71A
92 側裂片の網斑の密度	01 無
93 側裂片の網斑の色	
94 リップのカルス	02 盛り上る
95 カルスの色	RHSカラーチャート 13C
96 カルスの毛の有無	01 無
97 ずい柱の色	RHSカラーチャート 1C

1 品種登録の番号及び年月日 第30071号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume Green Hat

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや長、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は中、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は150D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は150D、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色は150C、中央裂片の覆色は71A、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色は150B、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は71A、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Green Hat」は、対照品種「ライムライト」と比較して、ペタルの正面の形が極横長であること、中央裂片の地色が150Cであること等で区別性が認められる。対照品種「キヌの太陽」と比較して、ラテラルセパルの表面の地色が150Dであること、ペタルの表面の地色が150Dであること、側裂片の地色が150Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡辺武夫
栃木県栃木市都賀町家中2971番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺武夫

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Emeraude」に「キヌの太陽」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	06 やや長
02 植物体の花序の数	03 2
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉の形	03 かなり細長い
06 葉の最大幅の位置	03 先端部
07 葉の先端の形	01 鋭形
08 葉の先端の対称性	02 非対称
09 葉の向き	05 水平
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	03 緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
14 花序の型	03 複総状
15 花序の長さ	06 やや長
16 花序の花数	05 中
17 花茎の長さ	06 やや長

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	02 中
19 花茎のアントシアニンの着色	03 中
20 花の側面の形	02 平
21 花の縦径	06 やや長
22 花の横径	06 やや広
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	06 やや長
26 ドーサルセパルの幅	06 やや広
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	03 外曲
30 ドーサルセパルの横断面の形	03 凸形
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート 150D
34 ドーサルセパルの覆色	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	01 無
39 ドーサルセパルの縞斑の色	
40 ドーサルセパルの網斑の密度	01 無
41 ドーサルセパルの網斑の色	
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート 150D
43 ラテラルセパルの覆色	
44 ラテラルセパルの斑点の数	01 無
45 ラテラルセパルの斑点の色	
46 ラテラルセパルの縞斑の数	01 無
47 ラテラルセパルの縞斑の色	
48 ラテラルセパルの網斑の密度	01 無
49 ラテラルセパルの網斑の色	
50 ペタルの長さ	05 中
51 ペタルの幅	06 やや広

Phalaenopsis Blume
Green Hat

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	01 極横長
53 ペタルの最大幅の位置	02 中央部
54 ペタルの縦断面の形	02 平
55 ペタルの横断面の形	02 平
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSカラーチャート 150D
59 ペタルの覆色	
60 ペタルの覆色の面積	
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	01 無
65 ペタルの縞斑の色	
66 ペタルの網斑の密度	01 無
67 ペタルの網斑の色	
68 リップの中央裂片の長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の幅	06 やや広
70 リップの中央裂片の形	01 三角形
71 リップのヒゲの有無	09 有
72 リップのヒゲの長さ	07 長
73 リップの中央裂片の突起又は稜	01 無又は小
74 リップの側裂片の形	05 V型
75 リップの側裂片の巻き込み	02 中
76 リップの側裂片の大きさ	07 広
77 中央裂片の地色	RHSカラーチャート 150C
78 中央裂片の覆色	RHSカラーチャート 71A
79 中央裂片の斑点の数	01 無
80 中央裂片の斑点の大きさ	
81 中央裂片の斑点の色	
82 中央裂片の縞斑の数	01 無
83 中央裂片の縞斑の色	
84 中央裂片の網斑の密度	01 無
85 中央裂片の網斑の色	

Phalaenopsis Blume
Green Hat

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 側裂片の地色	RHSカラーチャート 150B
87 側裂片の覆色	
88 側裂片の斑点の数	01 無
89 側裂片の斑点の色	
90 側裂片の縞斑の数	04 多
91 側裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 71A
92 側裂片の網斑の密度	01 無
93 側裂片の網斑の色	
94 リップのカルス	02 盛り上る
95 カルスの色	RHSカラーチャート 6B
96 カルスの毛の有無	01 無
97 ずい柱の色	RHSカラーチャート 144D

1 品種登録の番号及び年月日 第30072号 令和6年2月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum turgidum L. subsp. *dicoccoides* (Korn. ex Asch. & Graebn.) Thell. x
Triticum turgidum L. subsp. *durum* (Desf.) Husn.
発掘のごほうび (ハクツノゴホビ)

3 登録品種の特性の概要

子葉しょうのアントシアニンの着色はかなり弱、草姿は半ほふく～ほふく、反曲した止葉を持つ個体の出現頻度は無又は極低、出穂期は早、止め葉の葉耳のアントシアニンの着色は強、止め葉の葉しょうの白粉はやや強、止め葉の白粉はやや強、稈の最上部の節に着生する毛はやや密、穂首の白粉は無又は極弱、穂の白粉は無又は極弱、草丈はかなり高、穂の先端の芒の長さは長、芒の長さは穂より長い、護穎の形は狭楕円形、護穎のくちばしの曲がり方は無、護穎の外側表面の毛の有無は無、穂首直下の節間の髓の厚さは薄、芒の色は淡褐、穂の長さは中、穂の着色は濃い、成熟期はかなり早、ふの色は褐、穂の粒着の粗密は粗、原麦粒の刷毛の長さは長、原麦粒の形はかなり細長い、原麦粒の色は白、原麦粒のフェノール反応による着色はやや濃、千粒重は小、まき性は春まき型である。

出願品種「発掘のごほうび」は、対照品種「セトデュール」と比較して、稈の長さが長であること、穂の長さが中であること、穂の粒着の粗密が粗であること、原麦粒の形がかなり細長いであること、原麦粒のフェノール反応による着色がやや濃であること等で区別性が認められる。対照品種「AC Navigator」と比較して、出穂期が早であること、稈の長さが長であること、原麦粒のフェノール反応による着色がやや濃であること等で区別性が認められる。対照品種「エンマーコムギKU495」と比較して、出穂期が早であること、穂の先端の芒の長さが長であること、穂の着色が濃いであること、ふの色が褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

丹野研一
滋賀県栗東市林167
廣瀬敬一郎
滋賀県蒲生郡日野町中道1-52クリスタル華102
宇都宮育里
広島県広島市安佐北区真亀四丁目3-57-401

6 登録品種の育成をした者の氏名

丹野研一 廣瀬敬一郎 宇都宮育里

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「エンマーコムギ野生種 KU8941」に「マカロニコムギ PI639471」を交配し、選抜したものである。

Triticum turgidum L. subsp. dicoccoides (Korn. ex Asch. & Graebn.) Thell. x Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.

発掘のごほうび

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 0 0 7 2 号
01 子葉しょうのアントシアニンの着色 02 草姿 03 反曲した止葉を持つ個体の出現頻度 04 出穂期 05 止め葉の葉耳のアントシアニンの着色 06 止め葉の葉しょうの白粉 07 止め葉の白粉 08 稈の最上部の節に着生する毛 09 穂首の白粉 10 穂の白粉 11 草丈 12 稈の長さ 13 穂の芒の着生状態 14 穂の先端の芒の長さ 15 芒の長さ 16 護穎の形 17 護穎の肩部の形	02	かなり弱
	08	半ほふく～ほふく
	01	無又は極艇
	03	早
	07	強
	06	やや強
	06	やや強
	06	やや密
	01	無又は極弱
	01	無又は極弱
	08	かなり高
	07	長
	04	全体に着生
	07	長
	03	穂より長い
	03	狭楕円形
	03	水平

Triticum turgidum L. subsp. dicoccoides (Korn. ex Asch. & Graebn.) Thell. x Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.

発掘のごほうび

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 0 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 護穎の肩部の幅	05 中
19 護穎のくちばしの長さ	04 やや短
20 護穎のくちばしの曲がり方	01 無
21 護穎の外側表面の毛の有無	01 無
22 穂首直下の節間の髓の厚さ	01 薄
23 芒の色	02 淡褐
24 穂の長さ	05 中
25 穂の着色	03 濃い
26 成熟期	02 かなり早
27 ふの色	04 褐
28 穂の粒着の粗密	03 粗
29 原麦粒の刷毛の長さ	05 長
30 原麦粒の形	03 かなり細長い
31 原麦粒の色	01 白
32 原麦粒のフェノール反応による着色	06 やや濃
33 千粒重	03 小
34 まき性	03 春まき型

Triticum turgidum L. subsp. dicoccoides (Korn. ex Asch. & Graebn.) Thell. x Triticum
turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.
発掘のごほうび

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30072号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現 36 Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	