

1 品種登録の番号及び年月日 第30108号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. ムーンライト オブ トリニティ (ムーンライト オブ トリニティ)

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は斜上、茎の長さはかなり短、葉の長さは極短、葉の幅はかなり狭、葉の斑の有無は有、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形は普通咲き、花型は一重、花の長さは極短、花の幅は極狭、花筒の長さはかなり短、上唇弁の幅は極狭、上唇弁の表面の主な色はNN155C、下唇弁の裂片の表面の主な色はNN155C、下唇弁の基部の表面の主な色は155A、下唇弁のスポットの有無は有、下唇弁のスポットの大きさはかなり小、下唇弁のスポットの色は4C、花筒の外側の色はNN155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ムーンライト オブ トリニティ」は、対照品種「アールグレイ」と比較して、草姿（叢生品種に限る）が斜上であること、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

西尾昌直
愛知県豊田市稲武町馬野9番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

西尾昌直

7 出願公表の年月日 令和4年6月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

「アールグレイ」の変異株である。

Antirrhinum L.
ムーンライト オブ トリニティ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	09 叢生型
02 草姿（叢生品種に限る）	03 斜上
03 茎の長さ	02 かなり短
04 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
05 葉の長さ	01 極短
06 葉の幅	02 かなり狭
07 葉の斑の有無	09 有
08 葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）	
09 葉の裏面のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の毛じの粗密	07 強
11 花序の長さ（草型が上位節型の品種に限る。）	
12 花序の粗密（草型が上位節型の品種に限る。）	
13 花の形	01 普通咲き
14 花型	01 一重
15 花の長さ	01 極短
16 花の幅	01 極狭
17 花筒の長さ	02 かなり短

Antirrhinum L.
ムーンライト オブ トリニティ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 上唇弁の幅	01 極狭
19 上唇弁の脈の明瞭度	06 やや強
20 上唇弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
21 上唇弁の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
22 花筒に対する下唇弁の中央裂片の向き	07 やや下垂
23 下唇弁の中央裂片の幅	01 極狭
24 下唇弁の裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
25 下唇弁の裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
26 下唇弁の基部の表面の主な色	RHSカラーチャート 155A
27 下唇弁のスポットの有無	09 有
28 下唇弁のスポットの大きさ	02 かなり小
29 下唇弁のスポットの色	RHSカラーチャート 4C
30 花筒の外側の色	RHSカラーチャート NN155C
31 開花始期（種子繁殖性品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30109号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 勝浦1号 (カツラゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは中、節間長は極短、枝梢のとげの多少はかなり多、葉身の形は披針形、葉身の大きさはやや小、網脈の鮮明度は不明、翼葉の形は紡錘形、葉柄の長さは短、葉柄の太さはやや細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは軽、花卉の形は紡錘形、花卉の色(花蕾の外側)は帯紫、花卉の数は5枚、花糸の数は中、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多、子房の形は扁球、果実の形は扁球、果実の重さは軽、果皮の色は黄、油胞の大きさは小、果面の粗滑はやや粗、果皮の厚さは中、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは小、さじょう(果肉)の色は黄橙、果汁の多少は多、甘味は低、苦味の有無は無、酸味は低、種子数はやや少、胚の色は淡緑、胚の数は多胚、成熟期はやや早である。

出願品種「勝浦1号」は、対照品種「スダチ(本田系)」と比較して、成熟期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「スダチ(緑香系)」と比較して、成熟期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳島県
徳島県徳島市万代町1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

津村哲宏 新見恵理 林加奈 安宅雅和

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のスダチの変異株である。

Citrus L.
勝浦1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	07 開張
02 枝梢の密度	05 中
03 樹の大きさ	05 中
04 樹勢	05 中
05 枝梢の太さ	05 中
06 枝梢の長さ	03 短
07 節間長	01 極短
08 幼葉の色	04 帯紫
09 枝梢のとげの多少	08 かなり多
10 葉身の形	01 披針形
11 葉身先端の形	02 鈍尖形
12 葉身基部の形	03 鈍形
13 葉身の波状の程度	05 中
14 葉身の大きさ	04 やや小
15 葉身長	05 中
16 葉身幅	03 狭
17 葉形指数	05 中

Citrus L.
勝浦1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の厚さ	06 やや厚
19 網脈の鮮明度	01 不明
20 翼葉の形	03 紡錘形
21 翼葉の長さ	05 中
22 翼葉の幅	04 やや狭
23 葉柄の長さ	03 短
24 葉柄の太さ	04 やや細
25 花序の形成	01 単生
26 花(蕾)の重さ	03 軽
27 花弁の形	01 紡錘形
28 花弁の長さ	05 中
29 花弁の幅	05 中
30 花弁の色（花蕾の外側）	03 帯紫
31 花弁の数	02 5枚
32 花糸の数	05 中
33 花糸の分離の程度	02 一部合一
34 花粉の多少	07 多

Citrus L.
勝浦1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 子房の形	03 扁球
36 花柱の形	01 直
37 果実の形	03 扁球
38 果形指数	06 やや大
39 果頂部の形	02 平坦
40 果頂部放射条溝の有無	01 無
41 果頂部の凹環の有無	09 有
42 果梗部の形	05 やや凹
43 果梗部放射条溝の多少	04 やや少
44 果心の充実度	05 中
45 果心の大きさ	04 やや小
46 果実の重さ	03 軽
47 果皮の色	03 黄
48 アルベドの色	01 白
49 油胞の大きさ	03 小
50 油胞の密度	08 かなり密
51 油胞の凹凸	01 凹

Citrus L.
勝浦1号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30109号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 果面の粗滑	06 やや粗
53 果皮の厚さ	05 中
54 果皮歩合	06 やや大
55 剥皮の難易	05 中
56 じょうのう膜の硬さ	03 軟
57 さじょうの形	02 中
58 さじょうの大きさ	03 小
59 さじょう（果肉）の色	04 黄橙
60 果汁の多少	07 多
61 甘味	03 低
62 苦味の有無	01 無
63 酸味	03 低
64 種子数	04 やや少
65 胚の色	03 淡緑
66 胚の数	02 多胚
67 発芽期	05 中
68 開花期	05 中

Citrus L.
勝浦1号

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 1 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 四季咲き性の有無 70 成熟期	01 無
	04 やや早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30110号 令和6年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus limon (L.) Burm. f. 小笠原グリーンフラッシュ (オガサラグリーンフラッシュ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は中間、樹の大きさは大、樹勢は強、枝梢の太さはやや太、節間長は中、枝梢のとげの多少は少、葉身の形は楕円形、葉身の大きさは大、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は無、葉柄の長さは短、葉柄の太さはやや太、花序の形成は総状、花(蕾)の重さはやや重、花弁の形は紡錘形、花弁の色(花蕾の外側)は帯紫、花弁の数は5枚、花糸の数は多、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多、子房の形は長球、果実の形は長球、果実の重さは中、果皮の色は淡黄、油胞の大きさはやや小、果面の粗滑は滑、果皮の厚さはやや厚、剥皮の難易はやや難、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は細長、さじょうの大きさは大、さじょう(果肉)の色は黄、果汁の多少はやや多、甘味はやや低、苦味の有無は無、酸味はやや低、種子数は無、成熟期は晩である。
出願品種「小笠原グリーンフラッシュ」は、対照品種「菊池レモン」と比較して、種子数が無であること等で区別性が認められる。対照品種「リスボン」と比較して、酸味はやや低であること、種子数が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
東京都
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
池田行謙 荒井那由他
- 7 出願公表の年月日 令和3年6月15日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「菊池レモン」の変異株である。

Citrus limon (L.) Burm. f.
小笠原グリーンフラッシュ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	05 中間
02 枝梢の密度	05 中
03 樹の大きさ	07 大
04 樹勢	07 強
05 枝梢の太さ	06 やや太
06 枝梢の長さ	06 やや長
07 節間長	05 中
08 幼葉の色	02 淡緑
09 枝梢のとげの多少	03 少
10 葉身の形	03 楕円形
11 葉身先端の形	02 鈍尖形
12 葉身基部の形	03 鈍形
13 葉身の波状の程度	05 中
14 葉身の大きさ	07 大
15 葉身長	06 やや長
16 葉身幅	05 中
17 葉形指数	03 小

Citrus limon (L.) Burm. f.
小笠原グリーンフラッシュ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の厚さ	05 中
19 網脈の鮮明度	03 明瞭
20 翼葉の形	01 無
21 翼葉の長さ	
22 翼葉の幅	
23 葉柄の長さ	03 短
24 葉柄の太さ	06 やや太
25 花序の形成	02 総状
26 花(蕾)の重さ	06 やや重
27 花弁の形	01 紡錘形
28 花弁の長さ	06 やや長
29 花弁の幅	05 中
30 花弁の色（花蕾の外側）	03 帯紫
31 花弁の数	02 5 枚
32 花糸の数	07 多
33 花糸の分離の程度	02 一部合一
34 花粉の多少	07 多

Citrus limon (L.) Burm. f.
小笠原グリーンフラッシュ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 子房の形	01 長球
36 花柱の形	01 直
37 果実の形	01 長球
38 果形指数	01 極小
39 果頂部の形	04 突
40 果頂部放射条溝の有無	01 無
41 果頂部の凹環の有無	01 無
42 果梗部の形	03 球面
43 果梗部放射条溝の多少	01 無
44 果心の充実度	07 密
45 果心の大きさ	01 極小
46 果実の重さ	05 中
47 果皮の色	02 淡黄
48 アルベドの色	01 白
49 油胞の大きさ	04 やや小
50 油胞の密度	08 かなり密
51 油胞の凹凸	01 凹

Citrus limon (L.) Burm. f.
小笠原グリーンフラッシュ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果面の粗滑	03 滑
53 果皮の厚さ	06 やや厚
54 果皮歩合	05 中
55 剥皮の難易	06 やや難
56 じょうのう膜の硬さ	04 やや軟
57 さじょうの形	03 細長
58 さじょうの大きさ	07 大
59 さじょう（果肉）の色	03 黄
60 果汁の多少	06 やや多
61 甘味	04 やや低
62 苦味の有無	01 無
63 酸味	04 やや低
64 種子数	01 無
65 胚の色	
66 胚の数	
67 発芽期	02 かなり早
68 開花期	01 極早

Citrus limon (L.) Burm. f.
小笠原グリーンフラッシュ

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 1 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 四季咲き性の有無 70 成熟期	09 有
	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30111号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. あおさん (アサソ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さはやや太、節間長はやや長、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身の大きさは中、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはやや短、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは重、花弁の形は紡錘形、花弁の色は白、花弁の数は5枚、花糸の数はやや少、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、子房の形は扁球、果実の形はやや扁平、果実の重さはやや軽、果皮の色は橙、油胞の大きさは中、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さは中、果皮歩合はやや小、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、多、甘味はかなり高、酸味は中、種子数は無、成熟期は晩である。

出願品種「あおさん」は、対照品種「林温州」と比較して、果皮の厚さが中であること、甘味がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「青島温州」と比較して、果形指数が中であること、果皮歩合がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

湯川知明
和歌山県有田郡湯浅町青木388

6 登録品種の育成をした者の氏名

湯川知明

7 出願公表の年月日 令和3年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「興津早生」の変異株である。

Citrus unshiu Marcow.
あおさん

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30111号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	07 開張
02 枝梢の密度	04 やや粗
03 樹の大きさ	05 中
04 樹勢	05 中
05 枝梢の太さ	06 やや太
06 枝梢の長さ	04 やや短
07 節間長	06 やや長
08 枝梢のとげの多少	01 無
09 葉身の形	02 紡錘形
10 葉身先端の形	03 鋭形
11 葉身基部の形	02 鋭形
12 葉身波状の程度	03 弱
13 葉身の大きさ	05 中
14 葉身長	06 やや長
15 葉身幅	05 中
16 葉形指数	07 大
17 葉の厚さ	05 中

Citrus unshiu Marcow.
あおさん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 網脈の鮮明度	03 明瞭
19 翼葉の形	02 痕跡
20 葉柄の長さ	04 やや短
21 葉柄の太さ	05 中
22 花序の形成	01 単生
23 花(蕾)の重さ	07 重
24 花弁の形	01 紡錘形
25 花弁の長さ	05 中
26 花弁の幅	05 中
27 花弁の色	01 白
28 花弁の数	02 5枚
29 花糸の数	04 やや少
30 花糸の分離の程度	02 一部合一
31 花粉の多少	03 少
32 子房の形	02 扁球
33 花柱の形	01 直
34 果実の形	03 やや扁平

Citrus unshiu Marcow.
あおさん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果形指数	05 中
36 果頂部の形	02 平坦
37 果頂部放射条溝の有無	01 無
38 果頂部の凹環の有無	05 不明瞭
39 果梗部の形	02 切平面
40 果梗部放射条溝の多少	02 かなり少
41 果心の充実度	05 中
42 果心の大きさ	04 やや小
43 果実の重さ	04 やや軽
44 果皮の色	02 橙
45 アルベドの色	02 淡黄
46 油胞の大きさ	05 中
47 油胞の密度	04 やや疎
48 油胞の凹凸	03 凸
49 果面の粗滑	04 やや滑
50 果皮の厚さ	05 中
51 果皮歩合	04 やや小

Citrus unshiu Marcow.
あおさん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 剥皮の難易	03 易
53 じょうのう膜の硬さ	03 軟
54 さじょうの形	02 中
55 さじょうの大きさ	05 中
56 さじょう（果肉）の色	02 濃橙
57 果汁の多少	05 中
58 甘味	08 かなり高
59 酸味	05 中
60 種子数	01 無
61 胚の色	03 淡緑
62 胚の数	02 多胚
63 発芽期	07 晩
64 開花期	07 晩
65 成熟期	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30112号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. Zo11050

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は三出複葉、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は突形、花の着き方は単花、小花柄の長さはやや短、花の向きは上向き、花型は八重、花の直径は中、花の香りは無又は極弱、がく片の長さはやや長、がく片の幅は中、がく片の形はへら形、がく片の横断面の形は凸形、がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は無又は極弱、がく片の先端部の形は突形、がく片の周縁部の波打ちは弱、がく片の表面の色数は2以上、がく片の表面の主な色は138A、がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）はN144A、がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）は脈沿い、がく片の裏面の色数は2以上、がく片の裏面の主な色は145B、がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）は150D、がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）は脈沿い、弁化した仮雄ずいの有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Zo11050」は、対照品種「ダッチェスオブエディンバラ」と比較して、がく片の表面の主な色が138Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

J. van Zoest Beheer B.V.

Reijerskoop 148, 2771BT Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wim Snoeijer

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Clematis L.
Zo11050

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30112号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	05 中
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	05 中
06 葉型	02 三出複葉
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	03 狭
09 葉身の形	02 卵形
10 葉身の先端の形	02 突形
11 葉身の基部の形	02 鈍形
12 葉身の周縁の形	02 波状
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の裂片の数	
15 葉身の切れ込みの深さ	
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
Zo11050

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	02 中
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	03 先端部
21 小花柄の長さ	04 やや短
22 花の向き	01 上向き
23 花型	03 八重
24 花の直径	05 中
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	06 やや長
31 がく片の幅	05 中
32 がく片の形	06 へら形
33 がく片の横断面の形	03 凸形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	

Clematis L.
Zo11050

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	01 無又は極弱
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	03 3 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 138A
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N144A
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	04 脈沿い
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 145B
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 150D
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	04 脈沿い

Clematis L.
Zo11050

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	09 有
55 弁化した仮雄ずいの多少	01 極少
56 弁化した仮雄ずいの主な色	01 緑白（二次色：緑）
57 花糸の色	01 白
58 花糸の色2	
59 やくの色	03 淡黄
60 やくの色2	
61 柱頭の色	01 白
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	01 前年伸長枝
64 開花始期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第30113号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. 星めぐり (ホシメグリ)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は羽状複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は心臓形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さはやや短、花の向きは上向き、花型は一重、花の直径はやや大、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は平形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は6枚のみ、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は重なる、花の香りは無又は極弱、がく片の長さはやや長、がく片の幅は中、がく片の形は楕円形、がく片の横断面の形は凸形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は平、がく片の先端部の形は鋭先形、がく片の周縁部の波打ちは弱、がく片の表面の色数は1、がく片の表面の主な色は94C、がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）は中央に向け淡色化、がく片の裏面の色数は2以上、がく片の裏面の主な色は92B、がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）はNN155C、がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）は中斑、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「星めぐり」は、対照品種「セム」と比較して、がく片の表面の主な色が94Cであること、柱頭の色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社及川フラグリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

及川辰幸

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ナイトベール」に「ロコーコラ」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
星めぐり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	07 強
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	05 羽状複葉
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	04 やや狭
09 葉身の形	06 心臓形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	04 心形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	01 2
15 葉身の切れ込みの深さ	07 深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
星めぐり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	03 先端部
21 小花柄の長さ	04 やや短
22 花の向き	01 上向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	06 やや大
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	03 6枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	03 重なる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	06 やや長
31 がく片の幅	05 中
32 がく片の形	03 楕円形
33 がく片の横断面の形	03 凸形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	05 平

Clematis L.
星めぐり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	01 鋭先形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	01 1
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 94C
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	01 中央に向け淡色化
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 92B
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155C
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑

Clematis L.
星めぐり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	01 白
58 花糸の色2	
59 やくの色	03 淡黄
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30114号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. 夜明け前 (ヨアケマエ)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は2回羽状複葉、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さはやや長、花の向きは横向き、花型は一重、花の直径は中、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は平行、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は6枚のみ、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は重なる、花の香りは無又は極弱、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片の形は楕円形、がく片の横断面の形は凸形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は平、がく片の先端部の形は突形、がく片の周縁部の波打ちは中、がく片の表面の色数は1、がく片の表面の主な色は90A、がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）は均一、がく片の裏面の色数は2以上、がく片の裏面の主な色は91A、がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）はNN155C、がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）は中斑、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「夜明け前」は、対照品種「セム」と比較して、葉型が2回羽状複葉であること、がく片の表面の主な色が90Aであること、柱頭の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ナイトベール」と比較して、がく片の形が楕円形であること、がく片の表面の主な色が90Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社及川フラグリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
及川辰幸

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ナイトベール」に「雪小町」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
夜明け前

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	05 中
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	06 2回羽状複葉
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の形	02 卵形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	02 鈍形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の裂片の数	
15 葉身の切れ込みの深さ	
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
夜明け前

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	03 先端部
21 小花柄の長さ	06 やや長
22 花の向き	02 横向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	05 中
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	03 6枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	03 重なる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	05 中
31 がく片の幅	05 中
32 がく片の形	03 楕円形
33 がく片の横断面の形	03 凸形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	05 平

Clematis L.
夜明け前

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	05 中
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	09 有
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	01 極弱
41 がく片の表面の色数	01 1
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 90A
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	02 均一
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 91A
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155C
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑

Clematis L.
夜明け前

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	01 白、08 紫
58 花糸の色2	
59 やくの色	08 紫
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30115号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. マリア ルージュ (マリア ルージュ)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は羽状複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は心臟形、葉身の先端の形は円形、花の着き方は単花、小花柄の長さはやや長、花の向きは横向き、花型は一重、花の直径はやや小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は凹形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は離れる、花の香りは無又は極弱、がく片の長さは中、がく片の幅はやや広、がく片の形は倒卵形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は内曲、がく片の先端部の形は鈍形、がく片の周縁部の波打ちは中、がく片の表面の色数は2以上、がく片の表面の主な色は71A、がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）はN155B、がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）は中斑（基部のみ）、がく片の裏面の色数は2以上、がく片の裏面の主な色は70B、がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）はN155B、がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）は中斑、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マリア ルージュ」は、対照品種「ソーダーテイヤ」と比較して、葉型が羽状複葉であること、やくの色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ワレンバーグ」と比較して、葉型が羽状複葉であること、がく片の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社及川フラググリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

及川辰幸

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ナイトベール」に「マダムジュリアコレボン」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
マリア ルージュ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	05 中
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	05 羽状複葉
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	04 やや狭
09 葉身の形	06 心臓形
10 葉身の先端の形	04 円形
11 葉身の基部の形	04 心形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	01 2
15 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
マリア ルージュ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30115号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	02 中間部
21 小花柄の長さ	06 やや長
22 花の向き	02 横向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	04 やや小
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	01 凹形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	01 4枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	01 離れる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	05 中
31 がく片の幅	06 やや広
32 がく片の形	05 倒卵形
33 がく片の横断面の形	01 凹形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	03 内曲

Clematis L.
マリア ルージュ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
35	がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36	がく片の先端部の形	04 鈍形
37	がく片の基部の形	01 1 型
38	がく片の周縁部の波打ち	05 中
39	がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40	がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41	がく片の表面の色数	02 2 以上
42	がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 71A
43	がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44	がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N155B
45	がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑（基部のみ）
46	がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47	がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48	がく片の裏面の色数	02 2 以上
49	がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 70B
50	がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N155B
51	がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑

Clematis L.
マリア ルージュ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30115号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	04 黄緑
58 花糸の色2	
59 やくの色	08 紫
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30116号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. ソングス (ソグス)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は羽状複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は心臓形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さは中、花の向きは横向き、花型は一重、花の直径はやや大、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は平形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は6枚のみ、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は離れる、花の香りは無又は極弱、がく片の長さはやや長、がく片の幅は中、がく片の形はひし形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は外曲、がく片の先端部の形は突形、がく片の周縁部の波打ちは中、がく片の表面の色数は1、がく片の表面の主な色は77A、がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）は中央に向け淡色化、がく片の裏面の色数は1、がく片の裏面の主な色はN77B、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ソングス」は、対照品種「アレクサンドリト」と比較して、葉型が羽状複葉であること、開花始期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ソリダルノシィチェ」と比較して、葉型が羽状複葉であること、がく片の表面の主な色が77Aであること、やくの色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社及川フラググリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

及川辰幸

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ナイトベール」に「コンテスドブショウ」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
ソングス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	06 やや強
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	05 羽状複葉
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	04 やや狭
09 葉身の形	06 心臓形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	04 心形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	01 2
15 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
16 葉身の表面の主な色	04 濃緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
ソングス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	02 中間部
21 小花柄の長さ	05 中
22 花の向き	02 横向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	06 やや大
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	03 6枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	01 離れる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	06 やや長
31 がく片の幅	05 中
32 がく片の形	04 ひし形
33 がく片の横断面の形	01 凹形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	07 外曲

Clematis L.
ソングス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	05 中
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	01 1
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 77A
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	01 中央に向け淡色化
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	01 1
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート N77B
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	

Clematis L.
ソングス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	04 黄緑
58 花糸の色2	
59 やくの色	03 淡黄
60 やくの色2	
61 柱頭の色	01 白
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30117号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. きりさめ (キリサメ)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は羽状複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は心臓形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さは中、花の向きは横向き、花型は一重、花の直径はやや小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は平形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4～6枚、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は重なる、花の香りは無又は極弱、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片の形はひし形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は強く外曲、がく片の先端部の形は突形、がく片の周縁部の波打ちは弱、がく片の表面の色数は2以上、がく片の表面の主な色は92A、がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）はN78A、がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）は脈沿い、がく片の裏面の色数は2以上、がく片の裏面の主な色は92B、がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）はN155B、がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）は中斑、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「きりさめ」は、対照品種「流星」と比較して、がく片の形がひし形であること、がく片の表面の主な色が92Aであること、やくの色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社及川フラググリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

及川辰幸

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ナイトベール」に「マダムジュリアコレボン」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
きりさめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	05 中
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	05 羽状複葉
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	04 やや狭
09 葉身の形	06 心臓形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	04 心形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	02 3又は4
15 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
きりさめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	02 中間部
21 小花柄の長さ	05 中
22 花の向き	02 横向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	04 やや小
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	02 4～6枚
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	03 重なる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	05 中
31 がく片の幅	05 中
32 がく片の形	04 ひし形
33 がく片の横断面の形	01 凹形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	09 強く外曲

Clematis L.
きりさめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 92A
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N78A
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	04 脈沿い
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 92B
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N155B
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑

Clematis L.
きりさめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N78A
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	04 脈沿い
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	01 白
58 花糸の色2	
59 やくの色	08 紫
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30118号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. アフロボーイ (アフロボーイ)

3 登録品種の特性の概要

草型は無つる性、草姿（無つる性品種に限る。）は直立、葉型は羽状複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は披針形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さは短、花の向きは上向き、花型は半八重、花の直径は中、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は平行、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4～6枚、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は離れる、花の香りは無又は極弱、がく片の長さは中、がく片の幅はやや狭、がく片の形は倒卵形、がく片の横断面の形は凸形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は内曲、がく片の先端部の形は突形、がく片の周縁部の波打ちは弱、がく片の表面の色数は1、がく片の表面の主な色はN89A、がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）は均一、がく片の裏面の色数は1、がく片の裏面の主な色は94C、弁化した仮雄ずいの有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アフロボーイ」は、対照品種「アフロディテ」と比較して、葉型が羽状複葉であること、がく片の長さが中であること、弁化した仮雄ずいの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社及川フラググリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

及川辰幸

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「アフロディテ」の変異株である。

Clematis L.
アフロ ボーイ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 無つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	01 直立
03 草勢（つる性品種に限る。）	
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	05 中
06 葉型	05 羽状複葉
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の形	01 披針形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	01 鋭形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	01 2
15 葉身の切れ込みの深さ	07 深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
アフロ ボーイ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	02 中間部
21 小花柄の長さ	03 短
22 花の向き	01 上向き
23 花型	02 半八重
24 花の直径	05 中
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	02 4～6枚
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	01 離れる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	05 中
31 がく片の幅	04 やや狭
32 がく片の形	05 倒卵形
33 がく片の横断面の形	03 凸形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	03 内曲

Clematis L.
アフロ ボーイ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	01 1
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート N89A
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	02 均一
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	01 1
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 94C
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	

Clematis L.
アフロ ボーイ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	09 有
55 弁化した仮雄ずいの多少	06 やや多
56 弁化した仮雄ずいの主な色	08 青紫
57 花糸の色	((雄ずいなし))
58 花糸の色2	
59 やくの色	((雄ずいなし))
60 やくの色2	
61 柱頭の色	((雌ずいなし))
62 花柱の色	((雌ずいなし))
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30119号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. Z014100

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は2回羽状複葉、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は披針形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さはやや短、花の向きは下向き、花型は一重、花の直径は小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は鐘形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、花の香りは弱、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片の形は卵形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）はやや強、がく片の先端部の形は鋭先形、がく片の周縁部の波打ちは無又は極弱、がく片の表面の色数は1、がく片の表面の主な色は9A、がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）は均一、がく片の裏面の色数は1、がく片の裏面の主な色は12A、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Z014100」は、対照品種「コーリー」と比較して、草勢（つる性品種に限る。）が強であること、がく片の表面の主な色が9Aであること、がく片の裏面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

J. van Zoest Beheer B.V.

Reijerskoop 148, 2771BT Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Zoest

7 出願公表の年月日 令和元年10月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の変異株である。

Clematis L.
Z014100

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	07 強
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	07 密
06 葉型	06 2回羽状複葉
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の形	01 披針形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	02 鈍形
12 葉身の周縁の形	05 鋸歯状
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	02 3又は4
15 葉身の切れ込みの深さ	03 浅
16 葉身の表面の主な色	02 淡緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
Z014100

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	02 中
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	02 中間部
21 小花柄の長さ	04 やや短
22 花の向き	03 下向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	03 小
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	02 鐘形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	01 4枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	
29 花の香り	02 弱
30 がく片の長さ	04 やや短
31 がく片の幅	03 狭
32 がく片の形	01 卵形
33 がく片の横断面の形	01 凹形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	

Clematis L.
Z014100

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	06 やや強
36 がく片の先端部の形	01 鋭先形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	01 無又は極弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	01 1
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 9A
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	02 均一
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	01 1
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 12A
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	

Clematis L.
Z014100

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	04 黄緑
58 花糸の色2	
59 やくの色	04 黄
60 やくの色2	
61 柱頭の色	02 黄
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	03 当年伸長枝
64 開花始期	08 かなり晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30120号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler HS903

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の生長最適温度は25℃、菌糸体の温度別成長速度（10℃ C/日）は中、菌糸体の温度別成長速度（15℃ C/日）は中、菌糸体の温度別成長速度（20℃ C/日）はやや速、菌糸体の温度別生長速度（25℃/日）は中、菌糸体の温度別生長速度（30℃/日）は中、菌さんの縦断面形は丸山形、菌さんの大きさはやや小、菌さん表面の地色は褐色

（200D）、菌さんの厚さは中、菌さんの硬さは硬、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさはやや小、りん皮の着色の有無は有、ひだの形は離柄三角形、ひだの並び方は波状・ちぢれ、ひだの幅はかなり狭、ひだの密度は密、ひだの色は淡黄色（159D）、菌柄の形は基部に向かって太い、菌柄の長さは中、菌柄の太さはやや太、菌柄の表面の着色の有無は有、菌柄の毛羽の密度は中、菌柄の毛羽の着色の有無は有、菌柄の硬さは硬、菌柄の色は淡黄色（27C）、菌さん直径の菌柄の長さに対する比は中、子実体の平均乾燥重量は軽、発生処理までの期間はかなり短、発生処理から収穫最盛期までの期間は短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HS903」は、対照品種「北研603号」と比較して、ひだの並び方が波状・ちぢれであること、ひだのちぢれ割合（率）が極多であること等で区別性が認められる。対照品種「HS73」と比較して、菌さんの縦断面形が丸山形であること、ひだの並び方が波状・ちぢれであること、ひだのちぢれ割合（率）が極多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社北研
栃木県下都賀郡壬生町中央町13番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山内隆弘 佐々木洋介 後藤史和

7 出願公表の年月日 令和3年2月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「HS705」に「HS729」を交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
HS903

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	04 やや粗
02 菌叢表面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の生長最適温度	05 25℃
04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	05 中
05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	05 中
06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	06 やや速
07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)	05 中
08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)	05 中
09 菌さんの縦断面形	03 丸山形
10 菌さんの大きさ	04 やや小
11 菌さん表面の地色	03 褐色 (200D)
12 菌さんの厚さ	05 中
13 菌さんの直径／厚さ	03 小
14 菌さんの硬さ	03 硬
15 りん皮の付着部位	02 周縁
16 りん皮の大きさ	04 やや小
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
HS903

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30120号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	01 離柄三角形
20 ひだの並び方	02 波状・ちぢれ
21 ひだのちぢれ割合（率）	05 極多
22 ひだの幅	02 かなり狭
23 ひだの密度	03 密
24 ひだの色	02 淡黄色（159D）
25 菌柄の形	01 基部に向かって太い
26 菌柄の長さ	05 中
27 菌柄の太さ	06 やや太
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	02 中
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	05 硬
32 菌柄の色	01 淡黄色（27C）
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	05 中
34 子実体の平均乾燥重量	03 軽

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
HS903

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	02 かなり短
	03 短

1 品種登録の番号及び年月日 第30121号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler HS905

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の生長最適温度は25℃、菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）はやや速、菌糸体の温度別成長速度（15° C/日）は中、菌糸体の温度別成長速度（20° C/日）はやや速、菌糸体の温度別生長速度（25℃/日）は中、菌糸体の温度別生長速度（30℃/日）は中、菌さんの縦断面形は凹形、菌さんの大きさは中、菌さん表面の地色は黄褐色

（199C）、菌さんの厚さは中、菌さんの硬さは硬、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは大、りん皮の着色の有無は有、ひだの形は離柄三角形、ひだの並び方は波状・ちぢれ、ひだの幅はやや狭、ひだの密度は密、ひだの色は淡黄色（159D）、菌柄の形は基部に向かって太い、菌柄の長さは中、菌柄の太さはやや太、菌柄の表面の着色の有無は有、菌柄の毛羽の密度は中、菌柄の毛羽の着色の有無は有、菌柄の硬さは硬、菌柄の色は淡橙色（29D）、菌さん直径の菌柄の長さに対する比はやや大、子実体の平均乾燥重量は軽、発生処理までの期間はかなり短、発生処理から収穫最盛期までの期間は短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HS905」は、対照品種「HS903」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）がやや速であること、菌さんの縦断面形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「HS73」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）がやや速であること、菌さんの縦断面形が凹形であること、ひだの並び方が波状・ちぢれであること、ひだのちぢれ割合（率）が極多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社北研
栃木県下都賀郡壬生町中央町13番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山内隆弘 佐々木洋介 後藤史和

7 出願公表の年月日 令和3年2月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「HS705」に「HS729」を交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
HS905

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30121号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	04 やや粗
02 菌叢表面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の生長最適温度	05 25℃
04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	06 やや速
05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	05 中
06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	06 やや速
07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)	05 中
08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)	05 中
09 菌さんの縦断面形	01 凹形
10 菌さんの大きさ	05 中
11 菌さん表面の地色	02 黄褐色 (199C)
12 菌さんの厚さ	05 中
13 菌さんの直径／厚さ	04 やや小
14 菌さんの硬さ	03 硬
15 りん皮の付着部位	02 周縁
16 りん皮の大きさ	07 大
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
HS905

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30121号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	01 離柄三角形
20 ひだの並び方	02 波状・ちぢれ
21 ひだのちぢれ割合（率）	05 極多
22 ひだの幅	04 やや狭
23 ひだの密度	03 密
24 ひだの色	02 淡黄色（159D）
25 菌柄の形	01 基部に向かって太い
26 菌柄の長さ	05 中
27 菌柄の太さ	06 やや太
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	02 中
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	05 硬
32 菌柄の色	02 淡橙色（29D）
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	06 やや大
34 子実体の平均乾燥重量	03 軽

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
HS905

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	02 かなり短
	03 短

1 品種登録の番号及び年月日 第30122号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler 菌興102号 (キノコ102ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の生長最適温度は21℃、菌糸体の温度別成長速度(10℃C/日)は極遅、菌糸体の温度別成長速度(15℃C/日)は遅、菌糸体の温度別成長速度(20℃C/日)は遅、菌糸体の温度別生長速度(25℃C/日)は遅、菌糸体の温度別生長速度(30℃C/日)は中、菌さんの縦断面形は凹形、菌さんの大きさはやや大、菌さん表面の地色は赤茶色(200B)、菌さんの厚さは厚、菌さんの硬さは中、りん皮の付着部位は全体、りん皮の大きさは小、りん皮の着色の有無は有、ひだの形は離柄三角形、ひだの並び方は波状・ちぢれ、ひだの幅は狭、ひだの密度は密、ひだの色は淡黄橙色、菌柄の形は基部に向かって太い、菌柄の長さはやや長、菌柄の太さは極太、菌柄の表面の着色の有無は有、菌柄の毛羽の密度は密、菌柄の毛羽の着色の有無は有、菌柄の硬さは硬、菌柄の色は隠橙色

(165C)、菌さん直径の菌柄の長さに対する比はやや大、子実体の平均乾燥重量は極重、発生処理までの期間は長、発生処理から収穫最盛期までの期間は極長である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「菌興102号」は、対照品種「菌興118号」と比較して、菌さんの大きさがやや大であること、菌さんの厚さが厚であること、子実体の平均乾燥重量が極重であること等で区別性が認められる。対照品種「菌興115号」と比較して、菌さんの縦断面形が凹形であること、菌さんの大きさがやや大であること、菌さんの厚さが厚であること、子実体の平均乾燥重量が極重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安1丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

寺島和寿 黒田誠 佐々木明正 東田拓也 長谷部公三郎

7 出願公表の年月日 令和3年6月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「TMI-1944」に「TMI-1448」を交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
 菌興102号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30122号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	05 中
02 菌叢表面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の生長最適温度	01 21℃
04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	01 極遅
05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	03 遅
06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	03 遅
07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)	03 遅
08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)	05 中
09 菌さんの縦断面形	01 凹形
10 菌さんの大きさ	06 やや大
11 菌さん表面の地色	04 赤茶色 (200B)
12 菌さんの厚さ	07 厚
13 菌さんの直径／厚さ	01 極小
14 菌さんの硬さ	02 中
15 りん皮の付着部位	01 全体
16 りん皮の大きさ	03 小
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
菌興102号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	01 離柄三角形
20 ひだの並び方	02 波状・ちぢれ
21 ひだのちぢれ割合（率）	05 極多
22 ひだの幅	03 狭
23 ひだの密度	03 密
24 ひだの色	03 淡黄橙色
25 菌柄の形	01 基部に向かって太い
26 菌柄の長さ	06 やや長
27 菌柄の太さ	09 極太
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	03 密
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	05 硬
32 菌柄の色	03 隠橙色（165C）
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	06 やや大
34 子実体の平均乾燥重量	09 極重

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
菌興102号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	07 長
	09 極長

1 品種登録の番号及び年月日 第30123号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lobularia Desv. INLBUPIP19

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株幅は狭、茎の分枝の粗密はやや密、茎の色は緑、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花序の小花数はやや少、小花の直径は中、がく片の形は卵形、がく片の緑色の濃淡は中、花弁の長さは中、花弁の幅はやや広、開花初期の花弁の色はN81C;N81D(中央部)、開花盛期の花弁の色はN81Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「INLBUPIP19」は、対照品種「パープルストリームImp」と比較して、花序の小花数がやや少であること、開花初期の花弁の色がN81C;N81D(中央部)であること等で区別性が認められる。対照品種「イースターボンネット バイオレット」と比較して、花序の直径がやや大であること、開花初期の花弁の色がN81C;N81D(中央部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者の所属する法人の所有する育成系統を交配し、選抜したものである。

Lobularia Desv.
INLBUIP19

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30123号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	03 低
02 株幅	03 狭
03 茎の分枝の粗密	04 やや密
04 茎の基部の太さ	02 中
05 茎の色	02 緑
06 茎の毛の有無	09 有
07 葉の長さ	03 短
08 葉の幅	05 中
09 葉の形	02 楕円形
10 葉の横断面の形	02 平
11 葉の周縁の形	01 全縁
12 葉の先端の形	02 鋭形
13 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
14 葉の斑の有無	01 無
15 葉の毛の有無	09 有
16 花序の直径	06 やや大
17 花序の小花数	04 やや少

Lobularia Desv.
INLBUIP19

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 小花の直径	05 中
19 小花柄の長さ	04 やや長
20 小花柄の緑色の濃淡	02 中
21 小花柄のアントシアニン着色の有無	01 無
22 がく片の形	01 卵形
23 がく片の緑色の濃淡	02 中
24 がく片のアントシアニン着色の有無	09 有
25 がく片の毛の有無	09 有
26 花弁の長さ	03 中
27 花弁の幅	04 やや広
28 花弁の形	01 広卵形
29 開花初期の花弁の色	RHSカラーチャート N81C;N81D(中央部)
30 開花盛期の花弁の色	RHSカラーチャート N81A

1 品種登録の番号及び年月日 第30124号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACVINT

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりは一部重なる、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度はかなり弱、花柄の長さはやや短、花序の幅は中、最大花の幅は中、小花柄の長さは短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はやや多、上部花卉の幅は中、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色はN66B、上部花卉の表面の中央部の色はN66B、上部花卉の模様の明瞭度は中、上部花卉の模様の形は条と斑点、上部花卉の最大の斑点の大きさはやや小、上部花卉の基部の複色部の有無は無、下部花卉の表面の周縁部の色はN66C、下部花卉の表面の中央部の色はN66C、下部花卉の裏面の色は69C:73A(周縁部;ぼかし)、下部花卉の模様の明瞭度はやや弱、下部花卉の模様の形は斑点のみ、下部花卉の基部の複色部の有無は有、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）はN66Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACVINT」は、対照品種「PACROCKY」と比較して、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、花卉の不規則な条や斑点の有無が有であること、下部花卉の基部の複色部の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「フリースタイル ピンク」と比較して、花卉の不規則な条や斑点の有無が有であること、下部花卉の基部の複色部の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Am Fiebig 14, 01561 Thienendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和2年11月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統により集団育種したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	05 中
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	06 やや広
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	04 やや狭
09 葉身の形	04 ツタバ形
10 葉身の切れ込みの深さ	03 浅
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉身の基部の重なり	07 一部重なる
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	05 緑～濃緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	02 かなり弱

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30124号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	01 基部付近
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	01 小
20 花柄の長さ	04 やや短
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
22 花序の長さ	05 中
23 花序の幅	05 中
24 一花序の開花数	02 かなり少
25 最大花の長さ	05 中
26 最大花の幅	05 中
27 小花柄の長さ	03 短
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
29 小花柄の突起の有無	01 無
30 花型	02 八重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	
32 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
33 横から見た花の断面の形	02 平
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	09 有

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.
PACVINT

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N66C
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N66B
37 がくの反転の強弱	02 中
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
39 上部花弁の幅	05 中
40 上部花弁の形	04 へら形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N66B
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N66B
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 69C:71D(周縁部;ぼかし)
45 上部花弁の模様の明瞭度	05 中
46 上部花弁の模様の形	03 条と斑点
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	04 やや小
48 上部花弁の斑点の色	RHSカラーチャート N57A
49 上部花弁の基部の複色部の有無	01 無
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	
51 上部花弁の基部の複色部の色	

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.
PACVINT

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30124号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N66C
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N66C
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 69C:73A(周縁部;ぼかし)
55 下部花弁の模様の明瞭度	04 やや弱
56 下部花弁の模様の形	04 斑点のみ
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	04 やや小
58 下部花弁の基部の複色部の有無	09 有
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	04 やや小
60 下部花弁の基部の複色部の色	03 青桃
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	RHSカラーチャート N66C
62 開花始期	

1 品種登録の番号及び年月日 第30125号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PEQZ0043

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は腎臓形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は無又は極弱、花柄の長さは短、花序の幅は中、最大花の幅はやや狭、小花柄の長さはやや短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は弱、小花柄の突起の有無は有、花型は一重、下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）は触れる、上部花弁の幅はやや広、上部花弁の先端の形は全縁、上部花弁の表面の周縁部の色はN57C、上部花弁の表面の中央部の色はN57B、上部花弁の模様の明瞭度は中、上部花弁の模様の形は条と斑点、上部花弁の最大の斑点の大きさは大、上部花弁の基部の複色部の有無は有、上部花弁の基部の複色部の大きさはやや大、下部花弁の表面の周縁部の色はN57C、下部花弁の表面の中央部の色はN57B、下部花弁の裏面の色は67D、下部花弁の模様の明瞭度は中、下部花弁の模様の形は斑点のみ、下部花弁の基部の複色部の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PEQZ0043」は、対照品種「キャンディー ローズスプラッシュ」と比較して、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、花型が一重であること等で区別性が認められる。対照品種「PACSWIROS」と比較して、花型が一重であること、下部花弁の裏面の色が67Dであること、下部花弁の基部の複色部の色が青桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mitch Hanes

7 出願公表の年月日 令和2年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30125号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	03 低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	03 狭
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	04 やや狭
09 葉身の形	01 腎臓形
10 葉身の切れ込みの深さ	05 中
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
12 葉身の基部の重なり	03 やや開く
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	04 緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	01 無又は極弱

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30125号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	
20 花柄の長さ	03 短
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 花序の長さ	04 やや短
23 花序の幅	05 中
24 一花序の開花数	04 やや少
25 最大花の長さ	04 やや短
26 最大花の幅	04 やや狭
27 小花柄の長さ	04 やや短
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	03 弱
29 小花柄の突起の有無	09 有
30 花型	01 一重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	03 触れる
32 花弁の数（八重品種に限る。）	
33 横から見た花の断面の形	01 凹
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30125号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	01 無又は弱
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
39 上部花弁の幅	06 やや広
40 上部花弁の形	04 へら形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N57C
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N57B
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 67D
45 上部花弁の模様の明瞭度	05 中
46 上部花弁の模様の形	03 条と斑点
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	07 大
48 上部花弁の斑点の色	RHSカラーチャート N45A
49 上部花弁の基部の複色部の有無	09 有
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	06 やや大
51 上部花弁の基部の複色部の色	04 淡紫

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30125号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N57C
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N57B
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 67D
55 下部花弁の模様の明瞭度	05 中
56 下部花弁の模様の形	04 斑点のみ
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	05 中
58 下部花弁の基部の複色部の有無	09 有
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	06 やや大
60 下部花弁の基部の複色部の色	03 青桃
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	
62 開花始期	

1 品種登録の番号及び年月日 第30126号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PEQZ0047

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は円形、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の基部の重なりは一部重なる、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は弱、花柄の長さは短、花序の幅は中、最大花の幅は中、小花柄の長さはやや短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はかなり強、小花柄の突起の有無は有、花型は一重、下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）は離れる、上部花弁の幅は中、上部花弁の先端の形は全縁、上部花弁の表面の周縁部の色はN45B、上部花弁の表面の中央部の色はN45B、上部花弁の模様の明瞭度は中、上部花弁の模様の形は条のみ、上部花弁の基部の複色部の有無は無、下部花弁の表面の周縁部の色はN45B、下部花弁の表面の中央部の色はN45B、下部花弁の裏面の色は45B、下部花弁の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花弁の基部の複色部の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PEQZ0047」は、対照品種「カンテデレッズ」と比較して、葉身の形が円形であること、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「カンテ オラン」と比較して、上部花弁の表面の周縁部の色がN45Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Rosentalstrasse. 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mitch Hanes

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30126号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	03 低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	03 狭
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	02 中
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	03 狭
09 葉身の形	03 円形
10 葉身の切れ込みの深さ	04 やや浅
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
12 葉身の基部の重なり	07 一部重なる
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	06 濃緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	03 弱

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30126号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	02 中間部
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	02 やや小
20 花柄の長さ	03 短
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花序の長さ	04 やや短
23 花序の幅	05 中
24 一花序の開花数	02 かなり少
25 最大花の長さ	05 中
26 最大花の幅	05 中
27 小花柄の長さ	04 やや短
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
29 小花柄の突起の有無	09 有
30 花型	01 一重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	01 離れる
32 花弁の数（八重品種に限る。）	
33 横から見た花の断面の形	01 凹
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30126号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	01 無又は弱
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	03 弱
39 上部花弁の幅	05 中
40 上部花弁の形	03 倒三角形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N45B
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N45B
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 45B
45 上部花弁の模様の明瞭度	05 中
46 上部花弁の模様の形	01 条のみ
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	
48 上部花弁の斑点の色	
49 上部花弁の基部の複色部の有無	01 無
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	
51 上部花弁の基部の複色部の色	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30126号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N45B
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N45B
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 45B
55 下部花弁の模様の明瞭度	01 無又は極弱
56 下部花弁の模様の形	
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	
58 下部花弁の基部の複色部の有無	01 無
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	
60 下部花弁の基部の複色部の色	
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	
62 開花始期	

1 品種登録の番号及び年月日 第30127号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group ヤシャヒメローズ (ヤシャヒメローズ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の形は円形、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりは一部重なる、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は弱、花柄の長さはやや短、花序の幅はやや広、最大花の幅は中、小花柄の長さはやや長、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）は多、上部花卉の幅はやや狭、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色は68B、上部花卉の表面の中央部の色は68B、上部花卉の模様の明瞭度はやや強、上部花卉の模様の形は条と斑点、上部花卉の最大の斑点の大きさはかなり小、上部花卉の基部の複色部の有無は有、上部花卉の基部の複色部の大きさはかなり大、下部花卉の表面の周縁部の色は68B、下部花卉の表面の中央部の色は68B、下部花卉の裏面の色は75C、下部花卉の模様の明瞭度は中、下部花卉の模様の形は斑点のみ、下部花卉の基部の複色部の有無は有、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）は68Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヤシャヒメローズ」は、対照品種「キャンディー ローズスプラッシュ」と比較して、花卉の数（八重品種に限る。）が多であること、上部花卉の最大の斑点の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大島邦彦
岐阜県揖斐郡大野町公郷853-5

6 登録品種の育成をした者の氏名

大島邦彦

7 出願公表の年月日 令和2年7月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ミルフィールドローズ」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30127号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	04 やや低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	06 やや広
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	06 やや広
09 葉身の形	03 円形
10 葉身の切れ込みの深さ	04 やや浅
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉身の基部の重なり	07 一部重なる
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	04 緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	03 弱

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30127号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	01 基部付近
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	02 やや小
20 花柄の長さ	04 やや短
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 花序の長さ	05 中
23 花序の幅	06 やや広
24 一花序の開花数	03 少
25 最大花の長さ	05 中
26 最大花の幅	05 中
27 小花柄の長さ	06 やや長
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
29 小花柄の突起の有無	01 無
30 花型	02 八重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	
32 花弁の数（八重品種に限る。）	07 多
33 横から見た花の断面の形	02 平
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	01 無又は弱
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
39 上部花弁の幅	04 やや狭
40 上部花弁の形	04 へら形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 68B
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 68B
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート N155B:73C(周縁部)
45 上部花弁の模様の明瞭度	06 やや強
46 上部花弁の模様の形	03 条と斑点
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	02 かなり小
48 上部花弁の斑点の色	RHSカラーチャート 67A
49 上部花弁の基部の複色部の有無	09 有
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	08 かなり大
51 上部花弁の基部の複色部の色	01 白

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30127号
52 下部花弁の表面の周縁部の色 53 下部花弁の表面の中央部の色 54 下部花弁の裏面の色 55 下部花弁の模様の明瞭度 56 下部花弁の模様の形 57 下部花弁の最大の斑点の大きさ 58 下部花弁の基部の複色部の有無 59 下部花弁の基部の複色部の大きさ 60 下部花弁の基部の複色部の色 61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。） 62 開花始期		RHSカラーチャート 68B
		RHSカラーチャート 68B
		RHSカラーチャート 75C
		05 中
		04 斑点のみ
		02 かなり小
		09 有
		05 中
		03 青桃
		RHSカラーチャート 68B

1 品種登録の番号及び年月日 第30128号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group SWEPIN

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の形は腎臓形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は無又は極弱、花柄の長さはやや短、花序の幅はやや広、最大花の幅は中、小花柄の長さは中、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はかなり強、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はかなり少、上部花卉の幅は広、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色は75C、上部花卉の表面の中央部の色はN45B、上部花卉の模様の明瞭度はやや強、上部花卉の模様の形は条と斑点、上部花卉の最大の斑点の大きさはかなり大、上部花卉の基部の複色部の有無は有、上部花卉の基部の複色部の大きさは中、下部花卉の表面の周縁部の色は75C、下部花卉の表面の中央部の色は53C、下部花卉の裏面の色は75C、下部花卉の模様の明瞭度はやや強、下部花卉の模様の形は斑点のみ、下部花卉の基部の複色部の有無は有、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）はN45Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SWEPIN」は、対照品種「キャンディー ローズスプラッシュ」と比較して、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、下部花卉の表面の周縁部の色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「PACSWIROS」と比較して、葉身の長さが中であること、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和2年11月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統により集団育種したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	03 低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	04 やや狭
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	06 やや広
09 葉身の形	01 腎臓形
10 葉身の切れ込みの深さ	03 浅
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉身の基部の重なり	03 やや開く
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	05 緑～濃緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	01 無又は極弱

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30128号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	
20 花柄の長さ	04 やや短
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 花序の長さ	05 中
23 花序の幅	06 やや広
24 一花序の開花数	04 やや少
25 最大花の長さ	05 中
26 最大花の幅	05 中
27 小花柄の長さ	05 中
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
29 小花柄の突起の有無	01 無
30 花型	02 八重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	
32 花弁の数（八重品種に限る。）	02 かなり少
33 横から見た花の断面の形	01 凹
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30128号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	01 無又は弱
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
39 上部花弁の幅	07 広
40 上部花弁の形	04 へら形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 75C
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N45B
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 75C:67A(まだら)
45 上部花弁の模様の明瞭度	06 やや強
46 上部花弁の模様の形	03 条と斑点
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	08 かなり大
48 上部花弁の斑点の色	RHSカラーチャート N57A
49 上部花弁の基部の複色部の有無	09 有
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	05 中
51 上部花弁の基部の複色部の色	04 淡紫

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30128号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 75C
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 53C
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 75C
55 下部花弁の模様の明瞭度	06 やや強
56 下部花弁の模様の形	04 斑点のみ
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	08 かなり大
58 下部花弁の基部の複色部の有無	09 有
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	05 中
60 下部花弁の基部の複色部の色	03 青桃
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	RHSカラーチャート N45B
62 開花始期	

1 品種登録の番号及び年月日 第30129号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACANPIN

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は腎臓形、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度はやや強、花柄の長さは中、花序の幅はやや広、最大花の幅は中、小花柄の長さは中、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はやや弱、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）は少、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色はN66D、上部花卉の表面の中央部の色はN66D、上部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、上部花卉の基部の複色部の有無は有、上部花卉の基部の複色部の大きさは大、下部花卉の表面の周縁部の色はN66D、下部花卉の表面の中央部の色はN66D、下部花卉の裏面の色は75B、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は有、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）はN66Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACANPIN」は、対照品種「PACSITA」と比較して、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和2年11月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統により集団育種したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	03 低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	04 やや狭
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の形	01 腎臓形
10 葉身の切れ込みの深さ	02 かなり浅
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉身の基部の重なり	03 やや開く
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	04 緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	06 やや強

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30129号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	02 中間部
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	04 やや大
20 花柄の長さ	05 中
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 花序の長さ	06 やや長
23 花序の幅	06 やや広
24 一花序の開花数	06 やや多
25 最大花の長さ	05 中
26 最大花の幅	05 中
27 小花柄の長さ	05 中
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
29 小花柄の突起の有無	01 無
30 花型	02 八重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	
32 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
33 横から見た花の断面の形	02 平
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	01 無又は弱
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
39 上部花弁の幅	06 やや広
40 上部花弁の形	04 へら形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N66D
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N66D
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 75B
45 上部花弁の模様の明瞭度	01 無又は極弱
46 上部花弁の模様の形	
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	
48 上部花弁の斑点の色	
49 上部花弁の基部の複色部の有無	09 有
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	07 大
51 上部花弁の基部の複色部の色	01 白

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30129号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N66D
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N66D
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 75B
55 下部花弁の模様の明瞭度	01 無又は極弱
56 下部花弁の模様の形	
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	
58 下部花弁の基部の複色部の有無	09 有
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	03 小
60 下部花弁の基部の複色部の色	01 白
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	RHSカラーチャート N66D
62 開花始期	

1 品種登録の番号及び年月日 第30130号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACCHOFIRE

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は腎臓形、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は褐紫、葉身の二次色（環状紋を除く。）は緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は無又は極弱、花柄の長さはやや短、花序の幅はやや広、最大花の幅は中、小花柄の長さはやや短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はやや強、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はかなり少、上部花卉の幅は広、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色は44B、上部花卉の表面の中央部の色は44B、上部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、上部花卉の基部の複色部の有無は無、下部花卉の表面の周縁部の色は44B、下部花卉の表面の中央部の色は44B、下部花卉の裏面の色は40C、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は無、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）は44Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACCHOFIRE」は、対照品種「PACABEL」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度が無又は極弱であること、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルズアイ レッド」と比較して、花型が八重であること、上部花卉の表面の中央部の色が44Bであること、下部花卉の基部の複色部の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和2年11月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統により集団育種したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	03 低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	04 やや狭
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の形	01 腎臓形
10 葉身の切れ込みの深さ	04 やや浅
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉身の基部の重なり	03 やや開く
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	08 褐紫
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	04 緑
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	01 無又は極弱

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30130号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	
20 花柄の長さ	04 やや短
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 花序の長さ	05 中
23 花序の幅	06 やや広
24 一花序の開花数	05 中
25 最大花の長さ	05 中
26 最大花の幅	05 中
27 小花柄の長さ	04 やや短
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
29 小花柄の突起の有無	01 無
30 花型	02 八重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	
32 花弁の数（八重品種に限る。）	02 かなり少
33 横から見た花の断面の形	01 凹
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30130号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	02 中
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
39 上部花弁の幅	07 広
40 上部花弁の形	04 へら形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 44B
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 44B
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 40C
45 上部花弁の模様の明瞭度	01 無又は極弱
46 上部花弁の模様の形	
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	
48 上部花弁の斑点の色	
49 上部花弁の基部の複色部の有無	01 無
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	
51 上部花弁の基部の複色部の色	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30130号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 44B
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 44B
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 40C
55 下部花弁の模様の明瞭度	01 無又は極弱
56 下部花弁の模様の形	
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	
58 下部花弁の基部の複色部の有無	01 無
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	
60 下部花弁の基部の複色部の色	
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	RHSカラーチャート 44B
62 開花始期	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30131号 令和6年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACTIOCOMCOR
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は長円形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は無又は極弱、花柄の長さはやや短、花序の幅は中、最大花の幅はやや広、小花柄の長さは短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はかなり強、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はかなり少、上部花卉の幅は広、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色は58B、上部花卉の表面の中央部の色は58B、上部花卉の模様の明瞭度は弱、上部花卉の模様の形は条と斑点、上部花卉の最大の斑点の大きさは大、上部花卉の基部の複色部の有無は有、上部花卉の基部の複色部の大きさは中、下部花卉の表面の周縁部の色はN57B、下部花卉の表面の中央部の色はN57B、下部花卉の裏面の色は58C、下部花卉の模様の明瞭度はやや弱、下部花卉の模様の形は斑点のみ、下部花卉の基部の複色部の有無は有、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）はN57Aである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「PACTIOCOMCOR」は、対照品種「キャンディー ローズスプラッシュ」と比較して、上部花卉の表面の周縁部の色が58Bであること、上部花卉の基部の複色部の色が橙赤であること等で区別性が認められる。対照品種「PEQZ0043」と比較して、上部花卉の表面の周縁部の色が58Bであること、上部花卉の基部の複色部の色が橙赤であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Elsner pac Jungpflanzen GbR
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Martin Geibel
- 7 出願公表の年月日 令和2年11月10日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統により集団育種したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	04 やや低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	04 やや狭
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	02 中
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の形	02 長円形
10 葉身の切れ込みの深さ	05 中
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉身の基部の重なり	01 大きく開く
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	06 濃緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	01 無又は極弱

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	
20 花柄の長さ	04 やや短
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	05 中
22 花序の長さ	06 やや長
23 花序の幅	05 中
24 一花序の開花数	04 やや少
25 最大花の長さ	06 やや長
26 最大花の幅	06 やや広
27 小花柄の長さ	03 短
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
29 小花柄の突起の有無	01 無
30 花型	02 八重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	
32 花弁の数（八重品種に限る。）	02 かなり少
33 横から見た花の断面の形	01 凹
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	01 無又は弱
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
39 上部花弁の幅	07 広
40 上部花弁の形	04 へら形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 58B
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 58B
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 52A
45 上部花弁の模様の明瞭度	03 弱
46 上部花弁の模様の形	03 条と斑点
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	07 大
48 上部花弁の斑点の色	RHSカラーチャート 45B
49 上部花弁の基部の複色部の有無	09 有
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	05 中
51 上部花弁の基部の複色部の色	03 橙赤

Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.)L'Her.
PACTIOCOMCOR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N57B
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N57B
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 58C
55 下部花弁の模様の明瞭度	04 やや弱
56 下部花弁の模様の形	04 斑点のみ
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	04 やや小
58 下部花弁の基部の複色部の有無	09 有
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	06 やや大
60 下部花弁の基部の複色部の色	02 橙赤
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	RHSカラーチャート N57A
62 開花始期	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30132号 令和6年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACTIOHOPISPL
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は無又は極弱、花柄の長さは中、花序の幅はやや広、最大花の幅は中、小花柄の長さは中、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はかなり強、小花柄の突起の有無は有、花型は一重、下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）は触れる、上部花弁の幅はやや広、上部花弁の先端の形は全縁、上部花弁の表面の周縁部の色は67C、上部花弁の表面の中央部の色は67C、上部花弁の模様の明瞭度は中、上部花弁の模様の形は条と斑点、上部花弁の最大の斑点の大きさは中、上部花弁の基部の複色部の有無は有、上部花弁の基部の複色部の大きさは中、下部花弁の表面の周縁部の色は67C、下部花弁の表面の中央部の色は67C、下部花弁の裏面の色はN66C、下部花弁の模様の明瞭度は中、下部花弁の模様の形は斑点のみ、下部花弁の基部の複色部の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「PACTIOHOPISPL」は、対照品種「PELZ012352」と比較して、下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）が触れるであること、上部花弁の表面の中央部の色が67Cであること等で区別性が認められる。対照品種「キャンディー ローズス プラッシュ」と比較して、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、花型が一重であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Elsner pac Jungpflanzen GbR
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Martin Geibel
- 7 出願公表の年月日 令和2年11月10日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統により集団育種したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30132号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	03 低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	05 中
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の形	04 ツタバ形
10 葉身の切れ込みの深さ	05 中
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
12 葉身の基部の重なり	03 やや開く
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	05 緑～濃緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	01 無又は極弱

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	
20 花柄の長さ	05 中
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 花序の長さ	05 中
23 花序の幅	06 やや広
24 一花序の開花数	05 中
25 最大花の長さ	05 中
26 最大花の幅	05 中
27 小花柄の長さ	05 中
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
29 小花柄の突起の有無	09 有
30 花型	01 一重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	03 触れる
32 花弁の数（八重品種に限る。）	
33 横から見た花の断面の形	02 平
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	01 無又は弱
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	05 中
39 上部花弁の幅	06 やや広
40 上部花弁の形	04 へら形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 67C
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 67C
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート N66C
45 上部花弁の模様の明瞭度	05 中
46 上部花弁の模様の形	03 条と斑点
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	05 中
48 上部花弁の斑点の色	RHSカラーチャート 45B
49 上部花弁の基部の複色部の有無	09 有
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	05 中
51 上部花弁の基部の複色部の色	02 赤桃

Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.)L'Her.
PACTIOHOPISPL

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 67C
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 67C
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート N66C
55 下部花弁の模様の明瞭度	05 中
56 下部花弁の模様の形	04 斑点のみ
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	04 やや小
58 下部花弁の基部の複色部の有無	09 有
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	05 中
60 下部花弁の基部の複色部の色	03 青桃
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	
62 開花始期	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30133号 令和6年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACTIOPISPL
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は腎臓形、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度はかなり弱、花柄の長さはやや短、花序の幅はやや広、最大花の幅はやや狭、小花柄の長さはやや短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は中、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はかなり少、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色は68A、上部花卉の表面の中央部の色は68A、上部花卉の模様の明瞭度は中、上部花卉の模様の形は条と斑点、上部花卉の最大の斑点の大きさは中、上部花卉の基部の複色部の有無は有、上部花卉の基部の複色部の大きさは中、下部花卉の表面の周縁部の色は68A、下部花卉の表面の中央部の色は68A、下部花卉の裏面の色は73B、下部花卉の模様の明瞭度は中、下部花卉の模様の形は斑点のみ、下部花卉の基部の複色部の有無は有、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）は68Aである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「PACTIOPISPL」は、対照品種「キャンディー ローズスプラッシュ」と比較して、葉身の切れ込みの深さがやや深であること、最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Elsner pac Jungpflanzen GbR
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Martin Geibel
- 7 出願公表の年月日 令和2年11月10日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統により集団育種したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	03 低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	06 やや広
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の形	01 腎臓形
10 葉身の切れ込みの深さ	06 やや深
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉身の基部の重なり	03 やや開く
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	05 緑～濃緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	02 かなり弱

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30133号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	02 中間部
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	03 中
20 花柄の長さ	04 やや短
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	03 弱
22 花序の長さ	06 やや長
23 花序の幅	06 やや広
24 一花序の開花数	05 中
25 最大花の長さ	04 やや短
26 最大花の幅	04 やや狭
27 小花柄の長さ	04 やや短
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	05 中
29 小花柄の突起の有無	01 無
30 花型	02 八重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	
32 花弁の数（八重品種に限る。）	02 かなり少
33 横から見た花の断面の形	02 平
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30133号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	01 無又は弱
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
39 上部花弁の幅	06 やや広
40 上部花弁の形	04 へら形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 68A
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 68A
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 73B
45 上部花弁の模様の明瞭度	05 中
46 上部花弁の模様の形	03 条と斑点
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	05 中
48 上部花弁の斑点の色	RHSカラーチャート N57B
49 上部花弁の基部の複色部の有無	09 有
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	05 中
51 上部花弁の基部の複色部の色	04 淡紫

Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.)L'Her.
PACTIOPISPL

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 68A
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 68A
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 73B
55 下部花弁の模様の明瞭度	05 中
56 下部花弁の模様の形	04 斑点のみ
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	04 やや小
58 下部花弁の基部の複色部の有無	09 有
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	05 中
60 下部花弁の基部の複色部の色	03 青桃
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	RHSカラーチャート 68A
62 開花始期	

1 品種登録の番号及び年月日 第30134号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACTIOVIO

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は腎臓形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は中、花柄の長さはやや短、花序の幅はやや広、最大花の幅は中、小花柄の長さはやや短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は強、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はかなり少、上部花卉の幅は中、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色はN74A、上部花卉の表面の中央部の色はN74A、上部花卉の模様の明瞭度はかなり弱、上部花卉の模様の形は条のみ、上部花卉の基部の複色部の有無は有、上部花卉の基部の複色部の大きさは大、下部花卉の表面の周縁部の色はN74A、下部花卉の表面の中央部の色はN74A、下部花卉の裏面の色は72C、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は無、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）はN74Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACTIOVIO」は、対照品種「PACLETTA」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度が中であること、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、がくの反転の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種

「CHAM11212」と比較して、がくの反転の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「PACLICE」と比較して、がくの反転の強弱が強であること、上部花卉の表面の中央部の色がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和2年11月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統により集団育種したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30134号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	03 低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	04 やや狭
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の形	01 腎臓形
10 葉身の切れ込みの深さ	03 浅
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
12 葉身の基部の重なり	03 やや開く
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	05 緑～濃緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	02 中間部
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	04 やや大
20 花柄の長さ	04 やや短
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 花序の長さ	04 やや短
23 花序の幅	06 やや広
24 一花序の開花数	04 やや少
25 最大花の長さ	05 中
26 最大花の幅	05 中
27 小花柄の長さ	04 やや短
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	07 強
29 小花柄の突起の有無	01 無
30 花型	02 八重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	
32 花弁の数（八重品種に限る。）	02 かなり少
33 横から見た花の断面の形	02 平
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	03 強
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	05 中
39 上部花弁の幅	05 中
40 上部花弁の形	04 へら形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N74A
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N74A
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 72C
45 上部花弁の模様の明瞭度	02 かなり弱
46 上部花弁の模様の形	01 条のみ
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	
48 上部花弁の斑点の色	
49 上部花弁の基部の複色部の有無	09 有
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	07 大
51 上部花弁の基部の複色部の色	01 白

Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.)L'Her.
PACTIOVIO

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N74A
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N74A
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 72C
55 下部花弁の模様の明瞭度	01 無又は極弱
56 下部花弁の模様の形	
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	
58 下部花弁の基部の複色部の有無	01 無
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	
60 下部花弁の基部の複色部の色	
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	RHSカラーチャート N74A
62 開花始期	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30135号 令和6年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACTIOWHISPL
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の形は腎臓形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は無又は極弱、花柄の長さはやや短、花序の幅は中、最大花の幅は中、小花柄の長さは短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はやや強、小花柄の突起の有無は有、花型は一重、下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）は触れる、上部花弁の幅は広、上部花弁の先端の形は全縁、上部花弁の表面の周縁部の色はN155B、上部花弁の表面の中央部の色はN155B、上部花弁の模様の明瞭度は強、上部花弁の模様の形は条と斑点、上部花弁の最大の斑点の大きさは大、上部花弁の基部の複色部の有無は有、上部花弁の基部の複色部の大きさはやや小、下部花弁の表面の周縁部の色はN155B、下部花弁の表面の中央部の色はN155B、下部花弁の裏面の色はN155B、下部花弁の模様の明瞭度は強、下部花弁の模様の形は斑点のみ、下部花弁の基部の複色部の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「PACTIOWHISPL」は、対照品種「PECZ0003」と比較して、小花柄の突起の有無が有であること、横から見た花の断面の形が平であること等で区別性が認められる。対照品種「SWEWHI」と比較して、上部花弁の表面の周縁部の色がN155Bであること、下部花弁の最大の斑点の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Elsner pac Jungpflanzen GbR
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Martin Geibel
- 7 出願公表の年月日 令和2年11月10日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統により集団育種したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	04 やや低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	04 やや狭
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	06 やや広
09 葉身の形	01 腎臓形
10 葉身の切れ込みの深さ	03 浅
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉身の基部の重なり	03 やや開く
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	04 緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	01 無又は極弱

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	
20 花柄の長さ	04 やや短
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 花序の長さ	05 中
23 花序の幅	05 中
24 一花序の開花数	03 少
25 最大花の長さ	05 中
26 最大花の幅	05 中
27 小花柄の長さ	03 短
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
29 小花柄の突起の有無	09 有
30 花型	01 一重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	03 触れる
32 花弁の数（八重品種に限る。）	
33 横から見た花の断面の形	02 平
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	02 中
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
39 上部花弁の幅	07 広
40 上部花弁の形	03 倒三角形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N155B
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N155B
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート N155B:67A(中央部~基部)
45 上部花弁の模様の明瞭度	07 強
46 上部花弁の模様の形	03 条と斑点
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	07 大
48 上部花弁の斑点の色	RHSカラーチャート N57A
49 上部花弁の基部の複色部の有無	09 有
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	04 やや小
51 上部花弁の基部の複色部の色	01 白

Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.)L'Her.
PACTIOWHISPL

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N155B
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート N155B
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート N155B
55 下部花弁の模様の明瞭度	07 強
56 下部花弁の模様の形	04 斑点のみ
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	08 かなり大
58 下部花弁の基部の複色部の有無	01 無
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	
60 下部花弁の基部の複色部の色	
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	
62 開花始期	

1 品種登録の番号及び年月日 第30136号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACTIODARE

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は心臓形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は弱、花柄の長さは短、花序の幅は中、最大花の幅は中、小花柄の長さは短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は強、小花柄の突起の有無は無、花型は一重、下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）は触れる、上部花弁の幅はやや広、上部花弁の先端の形は全縁、上部花弁の表面の周縁部の色は45B、上部花弁の表面の中央部の色は45B、上部花弁の模様の明瞭度はやや弱、上部花弁の模様の形は条のみ、上部花弁の基部の複色部の有無は無、下部花弁の表面の周縁部の色は45B、下部花弁の表面の中央部の色は45B、下部花弁の裏面の色は46C、下部花弁の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花弁の基部の複色部の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACTIODARE」は、対照品種「SIL VILLETТА RED」と比較して、小花柄の突起の有無が無であること、下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）が触れるであること等で区別性が認められる。対照品種「AMRI TRARED」と比較して、葉身の幅がやや狭であること、花型が一重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和2年11月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統により集団育種したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	04 やや低
03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）	
04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）	04 やや狭
05 茎の色（アントシアニンを除く。）	02 緑
06 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	04 やや狭
09 葉身の形	05 心臓形
10 葉身の切れ込みの深さ	05 中
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
12 葉身の基部の重なり	03 やや開く
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉身の主な色（環状紋を除く。）	05 緑～濃緑
15 葉身の二次色（環状紋を除く。）	
16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）	
17 葉身の表面の環状紋の明瞭度	03 弱

Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.)L'Her.
PACTIODARE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の環状紋の位置	02 中間部
19 葉身の環状紋の相対的な大きさ	03 中
20 花柄の長さ	03 短
21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 花序の長さ	04 やや短
23 花序の幅	05 中
24 一花序の開花数	03 少
25 最大花の長さ	05 中
26 最大花の幅	05 中
27 小花柄の長さ	03 短
28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱	07 強
29 小花柄の突起の有無	01 無
30 花型	01 一重
31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）	03 触れる
32 花弁の数（八重品種に限る。）	
33 横から見た花の断面の形	02 平
34 花弁の不規則な条や斑点の有無	01 無

Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.)L'Her.
PACTIODARE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）	
37 がくの反転の強弱	01 無又は弱
38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
39 上部花弁の幅	06 やや広
40 上部花弁の形	03 倒三角形
41 上部花弁の先端の形	01 全縁
42 上部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 45B
43 上部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 45B
44 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 46C
45 上部花弁の模様の明瞭度	04 やや弱
46 上部花弁の模様の形	01 条のみ
47 上部花弁の最大の斑点の大きさ	
48 上部花弁の斑点の色	
49 上部花弁の基部の複色部の有無	01 無
50 上部花弁の基部の複色部の大きさ	
51 上部花弁の基部の複色部の色	

Pelargonium zonale Group x Pelargonium peltatum (L.)L'Her.
PACTIODARE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 下部花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 45B
53 下部花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 45B
54 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 46C
55 下部花弁の模様の明瞭度	01 無又は極弱
56 下部花弁の模様の形	
57 下部花弁の最大の斑点の大きさ	
58 下部花弁の基部の複色部の有無	01 無
59 下部花弁の基部の複色部の大きさ	
60 下部花弁の基部の複色部の色	
61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）	
62 開花始期	

1 品種登録の番号及び年月日 第30137号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scabiosa L. DSCAMKSCOP

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上性、草丈は極高、茎の太さは太、茎の色は緑、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少はかなり多、節間長はかなり長、葉序は対生、葉の向きは斜上、茎葉の複葉化は有、茎葉全体の形は楕円形、茎葉先端の形は円形、葉縁の形Iは複葉状、茎葉の長さは長、茎葉の幅はかなり広、根生葉の複葉化は無、根生葉全体の形は倒被針形、根生葉先端の形は円形、根生葉基部の形はくさび形、根生葉の長さはかなり長、根生葉の幅はやや広、葉表面の色は緑、斑の有無は無、花序の形は頭状花序、一重・八重の別は半八重、花序の高さは中、花序の径はやや広、花序の分枝長はかなり長、花序全体の形は半球形、心花と辺花の顕著な違いは有、辺花数はやや多、辺花の一重、八重の別は一重、辺花裂片先端の形は円形、辺花の長さは中、辺花の幅はやや狭、辺花の単色、複色の別は単色、辺花裂片表面の色はNN155D、辺花裂片裏面の色はNN155D、心花数はかなり多、心花の長さは中、心花の幅はやや狭、心花の単色、複色の別は単色、心花裂片表面の色はNN155D、総苞片の数はやや多、総苞片の形は披針形、総苞片の色は緑、やくの色は黄、花の香りは有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DSCAMKSCOP」は、対照品種「スノーメイデン」と比較して、茎の毛の多少がかなり多であること、辺花の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Scabiosa L.
DSCAMKSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 斜上性
02 草丈	09 極高
03 株幅	08 かなり広
04 茎の太さ	07 太
05 茎の色	02 緑
06 茎の毛の有無	09 有
07 茎の毛の多少	08 かなり多
08 分枝性	09 有
09 分枝の多少	08 かなり多
10 節間長	08 かなり長
11 葉序	01 対生
12 葉の向き	01 斜上
13 茎葉と根生葉の形態の顕著な違い	09 有
14 茎葉の複葉化	09 有
15 茎葉全体の形	04 楕円形
16 茎葉裂片の複葉化	09 有
17 茎葉裂片の形	08 倒被針形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎葉先端の形	04 円形
19 茎葉基部の形	
20 葉縁の形 I	04 複葉状
21 葉縁の波打ち I	09 有
22 葉縁の波打ちの程度 I	03 弱
23 茎葉の長さ	07 長
24 茎葉の幅	08 かなり広
25 茎葉の葉柄の有無	09 有
26 茎葉の葉柄の長さ	02 かなり短
27 根生葉の複葉化	01 無
28 根生葉全体の形	08 倒被針形
29 根生葉裂片の複葉化	01 無
30 根生葉裂片の形	
31 根生葉先端の形	04 円形
32 根生葉基部の形	01 くさび形
33 葉縁の形 II	09 その他（円鋸歯状）
34 葉縁の波打ち II	09 有

Scabiosa L.
DSCAMKSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉縁の波打ちの程度Ⅱ	03 弱
36 根生葉の長さ	08 かなり長
37 根生葉の幅	06 やや広
38 根生葉の葉柄の有無	09 有
39 根生葉の葉柄の長さ	03 短
40 葉表面の色	03 緑
41 葉裏面の色	03 緑
42 斑の有無	01 無
43 斑の形	
44 斑の色	
45 葉の光沢	01 無
46 葉の厚さ	03 薄
47 葉数	03 少
48 葉の硬さ	05 中
49 葉表面の毛の有無	09 有
50 葉表面の毛の多少	03 少
51 葉裏面の毛	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花序の形	01 頭状花序
53 一重・八重の別	02 半八重
54 花の付き方	03 頂生と腋生
55 花序の高さ	05 中
56 花序の径	06 やや広
57 花序の分枝長	08 かなり長
58 花首の長さ	06 やや長
59 花首の強さ	05 中
60 花序の向き	01 上向き
61 花序全体の形	01 半球形
62 心花と辺花の顕著な違い	09 有
63 辺花数	06 やや多
64 辺花の一重，八重の別	01 一重
65 辺花の裂片数	01 5
66 辺花裂片先端の形	01 円形
67 辺花裂片の切れ込み	09 極深
68 辺花裂片の波打ちの程度	03 弱

Scabiosa L.
DSCAMKSCOP

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30137号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
69 辺花の長さ	05 中
70 辺花の幅	04 やや狭
71 辺花裂片の厚さ	03 薄
72 辺花の単色，複色の別	01 単色
73 辺花裂片表面の色	RHSカラーチャート NN155D
74 辺花裂片裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 心花数	08 かなり多
76 心花裂片の切れ込み	07 深
77 心花の長さ	05 中
78 心花の幅	04 やや狭
79 心花の単色，複色の別	01 単色
80 心花裂片表面の色	RHSカラーチャート NN155D
81 心花の蕾状態での表面の色	RHSカラーチャート NN155D
82 がくの色	01 褐色
83 集合果の大きさ	07 大
84 鱗片の顕著さ	01 無
85 がく裂片の顕著さ	01 無

Scabiosa L.
DSCAMKSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 総苞片の数	06 やや多
87 総苞片の裂片化	01 無
88 総苞片の形	03 披針形
89 総苞片の長さ	05 中
90 総苞片の色	02 緑
91 やくの色	01 黄
92 雄ずいの数	01 4本
93 柱頭の突出	09 有
94 花数	07 多
95 花の香り	09 有
96 開花時期	07 晩生

1 品種登録の番号及び年月日 第30138号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scabiosa L. DLVNDRSCOP

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上性、草丈はかなり高、茎の太さはかなり太、茎の色は緑、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少は中、節間長は長、葉序は対生、葉の向きは斜上、茎葉の複葉化は有、茎葉全体の形は卵形被針形、茎葉先端の形は鈍形、葉縁の形Iは複葉状、茎葉の長さはやや長、茎葉の幅は広、根生葉の複葉化は有、根生葉全体の形は倒被針形、根生葉先端の形は円形、根生葉の長さはかなり長、根生葉の幅はかなり広、葉表面の色は緑、斑の有無は無、花序の形は頭状花序、一重・八重の別は半八重、花序の高さは中、花序の径は中、花序の分枝長は長、花序全体の形は半球形、心花と辺花の顕著な違いは有、辺花数は多、辺花の一重、八重の別は一重、辺花裂片先端の形は波状、辺花の長さは中、辺花の幅はやや狭、辺花の単色、複色の別は単色、辺花裂片表面の色はN88C、辺花裂片裏面の色はN88D、心花数は多、心花の長さは中、心花の幅はやや狭、心花の単色、複色の別は単色、心花裂片表面の色は85D、総苞片の数はやや多、総苞片の形は披針形、総苞片の色は緑、やくの色は黄、花の香りは有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLVNDRSCOP」は、対照品種「クイズ ダークブルー」と比較して、心花裂片表面の色が85Dであること、やくの色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Scabiosa L.
DLVNDRSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 斜上性
02 草丈	08 かなり高
03 株幅	07 広
04 茎の太さ	08 かなり太
05 茎の色	02 緑
06 茎の毛の有無	09 有
07 茎の毛の多少	03 少
08 分枝性	09 有
09 分枝の多少	05 中
10 節間長	07 長
11 葉序	01 対生
12 葉の向き	01 斜上
13 茎葉と根生葉の形態の顕著な違い	09 有
14 茎葉の複葉化	09 有
15 茎葉全体の形	07 卵形被針形
16 茎葉裂片の複葉化	01 無
17 茎葉裂片の形	02 広線形

Scabiosa L.
DLVNDRSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎葉先端の形	03 鈍形
19 茎葉基部の形	
20 葉縁の形 I	04 複葉状
21 葉縁の波打ち I	09 有
22 葉縁の波打ちの程度 I	03 弱
23 茎葉の長さ	06 やや長
24 茎葉の幅	07 広
25 茎葉の葉柄の有無	09 有
26 茎葉の葉柄の長さ	02 かなり短
27 根生葉の複葉化	09 有
28 根生葉全体の形	08 倒被針形
29 根生葉裂片の複葉化	09 有
30 根生葉裂片の形	03 長楕円形
31 根生葉先端の形	04 円形
32 根生葉基部の形	
33 葉縁の形 II	09 その他（円鋸歯状）
34 葉縁の波打ち II	01 無

Scabiosa L.
DLVNDRSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉縁の波打ちの程度Ⅱ	
36 根生葉の長さ	08 かなり長
37 根生葉の幅	08 かなり広
38 根生葉の葉柄の有無	09 有
39 根生葉の葉柄の長さ	02 かなり短
40 葉表面の色	03 緑
41 葉裏面の色	03 緑
42 斑の有無	01 無
43 斑の形	
44 斑の色	
45 葉の光沢	01 無
46 葉の厚さ	04 やや薄
47 葉数	04 やや少
48 葉の硬さ	05 中
49 葉表面の毛の有無	09 有
50 葉表面の毛の多少	03 少
51 葉裏面の毛	09 有

Scabiosa L.
DLVNDRSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花序の形	01 頭状花序
53 一重・八重の別	02 半八重
54 花の付き方	03 頂生と腋生
55 花序の高さ	05 中
56 花序の径	05 中
57 花序の分枝長	07 長
58 花首の長さ	06 やや長
59 花首の強さ	05 中
60 花序の向き	01 上向き
61 花序全体の形	01 半球形
62 心花と辺花の顕著な違い	09 有
63 辺花数	07 多
64 辺花の一重，八重の別	01 一重
65 辺花の裂片数	01 5
66 辺花裂片先端の形	03 波状
67 辺花裂片の切れ込み	09 極深
68 辺花裂片の波打ちの程度	03 弱

Scabiosa L.
DLVNDRSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 辺花の長さ	05 中
70 辺花の幅	04 やや狭
71 辺花裂片の厚さ	03 薄
72 辺花の単色，複色の別	01 単色
73 辺花裂片表面の色	RHSカラーチャート N88C
74 辺花裂片裏面の色	RHSカラーチャート N88D
75 心花数	07 多
76 心花裂片の切れ込み	07 深
77 心花の長さ	05 中
78 心花の幅	04 やや狭
79 心花の単色，複色の別	01 単色
80 心花裂片表面の色	RHSカラーチャート 85D
81 心花の蕾状態での表面の色	RHSカラーチャート 144D
82 がくの色	01 褐色
83 集合果の大きさ	06 やや大
84 鱗片の顕著さ	01 無
85 がく裂片の顕著さ	01 無

Scabiosa L.
DLVNDRSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 総苞片の数	06 やや多
87 総苞片の裂片化	01 無
88 総苞片の形	03 披針形
89 総苞片の長さ	06 やや長
90 総苞片の色	02 緑
91 やくの色	01 黄
92 雄ずいの数	01 4本
93 柱頭の突出	09 有
94 花数	07 多
95 花の香り	09 有
96 開花時期	08 かなり晩生

1 品種登録の番号及び年月日 第30139号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scabiosa L. DCANDYSCOP

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上性、草丈はかなり高、茎の太さはかなり太、茎の色は緑、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少はやや多、節間長は長、葉序は対生、葉の向きは斜上、茎葉の複葉化は有、茎葉全体の形は卵形被針形、茎葉先端の形は鈍形、葉縁の形Ⅰは複葉状、茎葉の長さはやや短、茎葉の幅はやや狭、根生葉の複葉化は有、根生葉全体の形は長楕円形、根生葉先端の形は鈍形、根生葉の長さはかなり長、根生葉の幅は中、葉表面の色は緑、斑の有無は無、花序の形は頭状花序、一重・八重の別は半八重、花序の高さはやや低、花序の径はやや広、花序の分枝長はやや長、花序全体の形は半球形、心花と辺花の顕著な違いは有、辺花数はやや多、辺花の一重、八重の別は一重、辺花裂片先端の形は波状、辺花の長さは中、辺花の幅はやや狭、辺花の単色、複色の別は単色、辺花裂片表面の色は55A、辺花裂片裏面の色は55B、心花数はやや多、心花の長さはやや長、心花の幅はやや狭、心花の単色、複色の別は単色、心花裂片表面の色は53C、総苞片の数はかなり多、総苞片の形は広線形、総苞片の色は緑、やくの色は黄、花の香りは有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DCANDYSCOP」は、対照品種「クイズ サーモンピンク」と比較して、辺花裂片先端の形が波状であること、辺花裂片表面の色が55Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Scabiosa L.
DCANDYSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 斜上性
02 草丈	08 かなり高
03 株幅	07 広
04 茎の太さ	08 かなり太
05 茎の色	02 緑
06 茎の毛の有無	09 有
07 茎の毛の多少	05 中
08 分枝性	09 有
09 分枝の多少	06 やや多
10 節間長	07 長
11 葉序	01 対生
12 葉の向き	01 斜上
13 茎葉と根生葉の形態の顕著な違い	09 有
14 茎葉の複葉化	09 有
15 茎葉全体の形	07 卵形被針形
16 茎葉裂片の複葉化	01 無
17 茎葉裂片の形	02 広線形

Scabiosa L.
DCANDYSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎葉先端の形	03 鈍形
19 茎葉基部の形	
20 葉縁の形 I	04 複葉状
21 葉縁の波打ち I	09 有
22 葉縁の波打ちの程度 I	03 弱
23 茎葉の長さ	04 やや短
24 茎葉の幅	04 やや狭
25 茎葉の葉柄の有無	09 有
26 茎葉の葉柄の長さ	02 かなり短
27 根生葉の複葉化	09 有
28 根生葉全体の形	03 長楕円形
29 根生葉裂片の複葉化	01 無
30 根生葉裂片の形	03 長楕円形
31 根生葉先端の形	03 鈍形
32 根生葉基部の形	
33 葉縁の形 II	04 複葉状
34 葉縁の波打ち II	09 有

Scabiosa L.
DCANDYSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉縁の波打ちの程度Ⅱ	03 弱
36 根生葉の長さ	08 かなり長
37 根生葉の幅	05 中
38 根生葉の葉柄の有無	09 有
39 根生葉の葉柄の長さ	02 かなり短
40 葉表面の色	03 緑
41 葉裏面の色	02 淡緑
42 斑の有無	01 無
43 斑の形	
44 斑の色	
45 葉の光沢	01 無
46 葉の厚さ	03 薄
47 葉数	04 やや少
48 葉の硬さ	05 中
49 葉表面の毛の有無	09 有
50 葉表面の毛の多少	03 少
51 葉裏面の毛	09 有

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花序の形	01 頭状花序
53 一重・八重の別	02 半八重
54 花の付き方	03 頂生と腋生
55 花序の高さ	04 やや低
56 花序の径	06 やや広
57 花序の分枝長	06 やや長
58 花首の長さ	04 やや短
59 花首の強さ	07 強
60 花序の向き	01 上向き
61 花序全体の形	01 半球形
62 心花と辺花の顕著な違い	09 有
63 辺花数	06 やや多
64 辺花の一重，八重の別	01 一重
65 辺花の裂片数	01 5
66 辺花裂片先端の形	03 波状
67 辺花裂片の切れ込み	09 極深
68 辺花裂片の波打ちの程度	05 中

Scabiosa L.
DCANDYSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 辺花の長さ	05 中
70 辺花の幅	04 やや狭
71 辺花裂片の厚さ	03 薄
72 辺花の単色，複色の別	01 単色
73 辺花裂片表面の色	RHSカラーチャート 55A
74 辺花裂片裏面の色	RHSカラーチャート 55B
75 心花数	06 やや多
76 心花裂片の切れ込み	07 深
77 心花の長さ	06 やや長
78 心花の幅	04 やや狭
79 心花の単色，複色の別	01 単色
80 心花裂片表面の色	RHSカラーチャート 53C
81 心花の蕾状態での表面の色	RHSカラーチャート 60B
82 がくの色	01 褐色
83 集合果の大きさ	08 かなり大
84 鱗片の顕著さ	01 無
85 がく裂片の顕著さ	01 無

Scabiosa L.
DCANDYSCOP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 総苞片の数	08 かなり多
87 総苞片の裂片化	01 無
88 総苞片の形	02 広線形
89 総苞片の長さ	05 中
90 総苞片の色	02 緑
91 やくの色	01 黄
92 雄ずいの数	01 4本
93 柱頭の突出	01 無
94 花数	07 多
95 花の香り	09 有
96 開花時期	08 かなり晩生

1 品種登録の番号及び年月日 第30140号 令和6年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. くろひめ2号 (クヒメ2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は早、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は3、成葉の鋸歯の形は両側直線形と両側凸形が混在、成熟始期はやや晩、果房の大きさはやや小、果房の着粒密度はやや密、穂梗の長さは極長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさはかなり小、果粒の形は球形、果皮の色は青黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは厚、果皮と果肉の分離性は易、肉質は塊状、果汁の甘味は中、果汁の多少は多、果実の香りは無、熟しょうの色は赤褐、花振るいの多少は少である。

出願品種「くろひめ2号」は、対照品種「リュウキュウガネブ」と比較して、成葉の大きさが中であること、果房の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「ヤマ・ソービニオン」と比較して、新しょうの節間の上面の色が赤と緑であること、成熟始期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

NPO法人紫葛の会
岡山県岡山市中区山崎289-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

若山裕司

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「リュウキュウガネブ」に「ザラジェンジェ」を交配し、選抜したものである。

Vitis L.
くろひめ2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 ほう芽期	03 早
02 幼しょうの先端の葉の開度	02 わずかに開く
03 幼しょうの先端の綿毛の密度	07 密
04 幼しょうの先端の綿毛のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
05 幼しょうの先端の絨毛の密度	07 密
06 若葉の表面の色	01 黄緑
07 若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度	07 密
08 若葉裏面の主脈上の絨毛の密度	07 密
09 新しょうの向き	03 斜上
10 新しょうの節間の上面の色	02 赤と緑
11 新しょうの節間の下面の色	01 緑
12 新しょうの節の上面の色	02 赤と緑
13 新しょうの節の下面の色	01 緑
14 新しょうの節間の絨毛の密度	05 中
15 新しょうの巻きひげの長さ	05 中
16 花穂の長さ	05 中
17 花性	03 両性

Vitis L.
くろひめ2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 成葉の大きさ	05 中
19 成葉の形	02 くさび形
20 成葉の表面の凹凸の強弱	06 やや強
21 成葉の裂片数	02 3
22 成葉の上裂刻の深さ	04 やや浅
23 成葉の上裂片の重なり（裂刻のある品種に限る。）	01 開く
24 成葉の葉柄側裂刻の重なり	02 広く開く
25 成葉の鋸歯の長さ	06 やや長
26 成葉の鋸歯の長さ／基部幅	04 やや小
27 成葉の鋸歯の形	05 両側直線形と両側凸形が混在
28 成葉表面の主脈のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
29 成葉裏面の主脈間の綿毛の密度	05 中
30 成葉裏面の主脈上の絨毛の密度	01 無又は極粗
31 成葉の主脈に対する葉柄の長さ	01 短い
32 成熟始期	06 やや晩
33 果房の大きさ	04 やや小
34 果房の着粒密度	06 やや密

Vitis L.
くろひめ2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 穂梗の長さ	09 極長
36 穂梗の色	01 淡緑
37 果粒の大きさ	02 かなり小
38 果粒の形1	02 球形
39 果粒の形2	
40 果皮の色	09 青黒
41 果粉の多少	07 多
42 脱粒の難易	01 難
43 果皮の厚さ	07 厚
44 果皮と果肉の分離性	07 易
45 果肉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
46 果肉の硬さ	01 軟
47 肉質	07 塊状
48 果汁の甘味	05 中
49 果汁の多少	03 多
50 果実の香り	01 無
51 種子の有無	03 有

Vitis L.
くろひめ2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 熟しょうの色 53 花振るいの多少	04 赤褐
	03 少