

1 品種登録の番号及び年月日 第30169号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ajuga L. Piotrek01

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株幅はかなり狭、茎の数は少、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、葉身の形は狭楕円形、葉身の色は灰緑、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の主な色は白、葉身の波打ちは無又は極弱、葉身の凹凸は無又は極弱、葉身の切れ込みの深さは無又は極浅、花序の長さはかなり短、花序の幅は狭、小花の数はかなり少、小花の長さは短、小花の縦径は極小、小花の横径は極小、下唇弁の色はN88B、下唇弁の中央裂片の幅は極狭、下唇弁の中央裂片の形はⅡ型である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Piotrek01」は、対照品種「ディクシーチップ」と比較して、葉身の色が灰緑であること等で区別性が認められる。対照品種「バニラチップ」と比較して、株幅がかなり狭であること、葉身の形が狭楕円形であること、下唇弁の色がN88Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piotr Szczesny

Vondellaan 182, 2741 XB Waddinxveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Piotr Szczesny

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チョコレートチップ」の変異株である。

Ajuga L.
Piotrek01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 斜上
02 草丈	02 かなり低
03 株幅	02 かなり狭
04 茎の数	02 少
05 茎の長さ	02 かなり短
06 茎の太さ	02 細
07 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
08 茎の毛の有無	01 無
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	02 かなり狭
11 葉身の形	04 狭楕円形
12 葉身の色	04 灰緑
13 葉身のアントシアニンの着色	03 中
14 葉身の斑の有無	09 有
15 葉身の斑の主な色	01 白
16 葉身の斑の二次色	
17 葉身の光沢の有無	01 無

Ajuga L.
Piotrek01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の毛の有無	01 無
19 葉身の波打ち	01 無又は極弱
20 葉身の凹凸	01 無又は極弱
21 葉身の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
22 花序の数	04 やや少
23 花序の長さ	02 かなり短
24 花序の幅	03 狭
25 花序軸の太さ	01 極細
26 花序の段数	01 極少
27 小花の数	02 かなり少
28 小花の粗密	03 中
29 小花の長さ	02 短
30 小花の縦径	01 極小
31 小花の横径	01 極小
32 下唇弁の向き	01 水平
33 下唇弁の色	RHSカラーチャート N88B
34 下唇弁の条線の有無	09 有

Ajuga L.
Piotrek01

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 1 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 下唇弁の中央裂片の幅 36 下唇弁の中央裂片の形 37 花の香りの有無 38 開花の早晩	01 極狭
	02 II型
	01 無
	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30170号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ajuga L. カミホン LAT (カミホン LAT)

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、株幅は中、茎の数は極多、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉の長さは中、葉の幅は広、葉身の形は楕円形、葉身の色は緑、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の主な色は淡緑、葉身の波打ちは中、葉身の凹凸は無又は極弱、葉身の切れ込みの深さは浅、花序の長さはかなり短、花序の幅は狭、小花の数はかなり少、小花の長さは短、小花の縦径は中、小花の横径は小、下唇弁の色はN89D、下唇弁の中央裂片の幅は狭、下唇弁の中央裂片の形はI型である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「カミホン LAT」は、対照品種「バーガンディグロー」と比較して、葉身の色が緑であること、葉身の斑の主な色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「バニラチップ」と比較して、株幅が中であること、葉身の斑の主な色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

未来アグリス株式会社
愛知県長久手市山越606番地
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野 隆

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「キャトリンズジャイアント」の変異株である。

Ajuga L.
カミホン LAT

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 水平
02 草丈	03 低
03 株幅	05 中
04 茎の数	05 極多
05 茎の長さ	06 やや長
06 茎の太さ	03 中
07 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
08 茎の毛の有無	01 無
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	07 広
11 葉身の形	03 楕円形
12 葉身の色	02 緑
13 葉身のアントシアニンの着色	02 弱
14 葉身の斑の有無	09 有
15 葉身の斑の主な色	03 淡緑
16 葉身の斑の二次色	
17 葉身の光沢の有無	09 有

Ajuga L.
カミホン LAT

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の毛の有無	09 有
19 葉身の波打ち	03 中
20 葉身の凹凸	01 無又は極弱
21 葉身の切れ込みの深さ	02 浅
22 花序の数	03 少
23 花序の長さ	02 かなり短
24 花序の幅	03 狭
25 花序軸の太さ	02 細
26 花序の段数	01 極少
27 小花の数	02 かなり少
28 小花の粗密	04 密
29 小花の長さ	02 短
30 小花の縦径	03 中
31 小花の横径	02 小
32 下唇弁の向き	02 斜め
33 下唇弁の色	RHSカラーチャート N89D
34 下唇弁の条線の有無	09 有

Ajuga L.
カミホン LAT

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 下唇弁の中央裂片の幅 36 下唇弁の中央裂片の形 37 花の香りの有無 38 開花の早晩	02 狭
	01 I 型
	01 無
	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30171号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ajuga L. ライムブルー (ライムブルー)

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、株幅はやや広、茎の数は極多、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は楕円形、葉身の色は淡緑、葉身の斑の有無は無、葉身の波打ちは中、葉身の凹凸は弱、葉身の切れ込みの深さは無又は極浅、花序の長さは長、花序の幅は中、小花の数は中、小花の長さは中、小花の縦径は極大、小花の横径は大、下唇弁の色は93C、下唇弁の中央裂片の幅は中、下唇弁の中央裂片の形はI型である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ライムブルー」は、対照品種「アジュガレプタンス」と比較して、葉身の色が淡緑であること、花序の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「キャトリンズジャイアント」と比較して、茎の数が極多であること、葉身の色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

林博俊
群馬県沼田市原町88番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

林博俊

7 出願公表の年月日 令和3年5月6日

8 登録品種の育成の経過の概要

「マーブルライム」の変異株である。

Ajuga L.
ライムブルー

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30171号
01 草姿	02 水平	
02 草丈	05 中	
03 株幅	06 やや広	
04 茎の数	05 極多	
05 茎の長さ	06 やや長	
06 茎の太さ	03 中	
07 茎のアントシアニン着色の有無	09 有	
08 茎の毛の有無	09 有	
09 葉の長さ	05 中	
10 葉の幅	06 やや広	
11 葉身の形	03 楕円形	
12 葉身の色	01 淡緑	
13 葉身のアントシアニンの着色	03 中	
14 葉身の斑の有無	01 無	
15 葉身の斑の主な色		
16 葉身の斑の二次色		
17 葉身の光沢の有無	09 有	

Ajuga L.
ライムブルー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の毛の有無	09 有
19 葉身の波打ち	03 中
20 葉身の凹凸	02 弱
21 葉身の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
22 花序の数	07 多
23 花序の長さ	07 長
24 花序の幅	05 中
25 花序軸の太さ	03 中
26 花序の段数	03 中
27 小花の数	05 中
28 小花の粗密	03 中
29 小花の長さ	03 中
30 小花の縦径	05 極大
31 小花の横径	04 大
32 下唇弁の向き	02 斜め
33 下唇弁の色	RHSカラーチャート 93C
34 下唇弁の条線の有無	09 有

Ajuga L.
ライムブルー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 下唇弁の中央裂片の幅 36 下唇弁の中央裂片の形 37 花の香りの有無 38 開花の早晩	03 中
	01 I 型
	09 有
	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第30172号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ルミエール (ルミール)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は狭楕円形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は有、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや小、花冠の形は漏斗形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN81D、花冠の内面上部の色は76C、花冠の外面上部の色はN81C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルミエール」は、対照品種「ソレイユ」と比較して、花冠裂片の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「ルーチェ」と比較して、花冠の形が漏

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社T&Gバイオナーサリー
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林3-22

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋俊一

7 出願公表の年月日 平成30年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.
ルミエール

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30172号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
01 草姿	01 立性	
02 茎の長さ	07 長	
03 茎の太さ	06 やや太	
04 茎の横断面の形	01 円形	
05 茎の緑色の濃淡	03 淡	
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有	
07 茎の節数	05 中	
08 節間長	06 やや長	
09 側枝の有無	09 有	
10 茎の一節側枝発生数	02 かなり少	
11 茎の二節以上の側枝発生数	03 少	
12 最長葉の着生位置	02 中央	
13 葉の長さ	06 やや長	
14 葉の幅	05 中	
15 葉の形	07 狭楕円形	
16 葉の横断面の形	02 水平	
17 葉の縦断面の形	02 水平	

Gentiana L.
ルミエール

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30172号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	05 中
21 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	04 やや少
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	03 少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	04 やや少
27 花型	01 一重
28 花冠の長さ	05 中
29 花筒部の直径	04 やや小
30 花冠の形	02 漏斗形
31 花冠の先端の直径	05 中
32 花冠の先端の反り	07 外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート N81D
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート 76C

Gentiana L.
ルミエール

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30172号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート N81C
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	01 無又は極粗
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	02 5
42 花冠裂片の長さ	07 長
43 花冠裂片の幅	06 やや広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	03 小

Gentiana L.
ルミエール

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	01 円筒形
	01 狭披針形
	03 正常
	02 へら形
	03 早
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30173号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 安代27-2219 (アシロ27-2219)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは中、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の形は卵形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さは長、花筒部の直径は大、花冠の形は漏斗形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はNN155C、花冠の内面上部の色は地色:NN155C、副裂片及びその下部:94C、花冠の外面上部の色は地色:NN155C、副裂片及びその下部:94C、花冠裂片の表面の斑点の粗密はかなり密、花冠の外面上部の斑点の粗密は中、花冠裂片の数は6以上、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は中、がく筒の形は漏斗形、やくの発達の状態は正常、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「安代27-2219」は、対照品種「クリスタルアシロ」と比較して、花冠裂片の表面の斑点の粗密がかなり密であること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「新雪」と比較して、茎の長さが中であること、花冠の内面上部の色が地色:NN155C、副裂片及びその下部:94Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

八幡平市

岩手県八幡平市野駄第21地割170番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

日影孝志 阿部潤 北口輝男 高橋亮 高村祐太郎 鈴木里奈

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「クリスタルアシロ」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Gentiana L.
安代27-2219

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	05 中
03 茎の太さ	06 やや太
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	04 やや少
08 節間長	04 やや短
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	03 少
11 茎の二節以上の側枝発生数	02 かなり少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	05 中
14 葉の幅	06 やや広
15 葉の形	02 卵形
16 葉の横断面の形	01 内曲
17 葉の縦断面の形	03 外反

Gentiana L.
安代27-2219

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30173号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	05 中
21 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	04 やや少
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	02 かなり少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	05 中
27 花型	01 一重
28 花冠の長さ	07 長
29 花筒部の直径	07 大
30 花冠の形	02 漏斗形
31 花冠の先端の直径	07 大
32 花冠の先端の反り	07 外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート NN155C
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート 地色:NN155C、副裂片及びその下部:94C

Gentiana L.
安代27-2219

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 地色：NN155C、副裂片及びその下部：94C
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	08 かなり密
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	07 密
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	05 中
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	02 緑
41 花冠裂片の数	03 6以上
42 花冠裂片の長さ	07 長
43 花冠裂片の幅	06 やや広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	04 中裂形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	05 中

Gentiana L.
安代27-2219

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	03 漏斗形
	01 狭披針形
	03 正常
	02 へら形
	08 かなり晩
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30174号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 森の紅 (モリノクレイ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数の中、茎の二節以上の側枝発生数の中、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや多、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや小、花冠の先端の反りは直、花冠裂片の表面の色はN80D、花冠の内面上部の色はNN155B（地色）、N80D（上部）、花冠の外面上部の色はN80B、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「森の紅」は、対照品種「森の舞姫」と比較して、花冠の先端の直径がやや小であること、花冠裂片の表面の色がN80Dであること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ファーストラブ」と比較して、茎の一節側枝発生数の中であること、花冠裂片の表面の色がN80Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

特定非営利活動法人西和賀農業振興センター
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

南川信一 石川誠 戸巻守

7 出願公表の年月日 令和2年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.

森の紅

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	07 長
03 茎の太さ	06 やや太
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	05 中
08 節間長	06 やや長
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	05 中
11 茎の二節以上の側枝発生数	05 中
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	06 やや長
14 葉の幅	06 やや広
15 葉の形	04 披針形
16 葉の横断面の形	01 内曲
17 葉の縦断面の形	03 外反

Gentiana L.
森の紅

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30174号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	05 中
21 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	03 少
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	02 かなり少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	06 やや多
27 花型	01 一重
28 花冠の長さ	05 中
29 花筒部の直径	05 中
30 花冠の形	01 釣鐘形
31 花冠の先端の直径	04 やや小
32 花冠の先端の反り	05 直
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート N80D
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート NN155B（地色）、N80D（上部）

Gentiana L.
森の紅

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート N80B
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	01 無又は極粗
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	02 かなり粗
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	02 5
42 花冠裂片の長さ	05 中
43 花冠裂片の幅	05 中
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	01 鋭形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	04 やや小

Gentiana L.
森の紅

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	01 円筒形
	01 狭披針形
	03 正常
	02 へら形
	05 中
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30175号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 西京の瑞雲 (サイキョウノズイウン)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は漏斗形、花冠の先端の直径はかなり大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN89D、花冠の内面上部の色は91D（地色）、N89D（上部）、花冠の外面上部の色は94A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはかなり長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは中、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「西京の瑞雲」は、対照品種「深山秋」と比較して、花冠裂片の表面の色がN89Dであること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「スカイブルーしなの4号晩々生」と比較して、花冠の先端の直径がかなり大であること、花冠の外面のしま模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県
山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤田淳史 岡田知子 尾関仁志 友廣大輔 川野祐輔

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.
西京の瑞雲

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	08 かなり長
03 茎の太さ	06 やや太
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
07 茎の節数	05 中
08 節間長	06 やや長
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	02 かなり少
11 茎の二節以上の側枝発生数	02 かなり少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	07 長
14 葉の幅	07 広
15 葉の形	03 広披針形
16 葉の横断面の形	01 内曲
17 葉の縦断面の形	03 外反

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	05 中
21 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	04 やや少
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	02 かなり少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	05 中
27 花型	01 一重
28 花冠の長さ	05 中
29 花筒部の直径	06 やや大
30 花冠の形	02 漏斗形
31 花冠の先端の直径	08 かなり大
32 花冠の先端の反り	07 外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート N89D
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート 91D（地色）、N89D（上部）

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 94A
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	01 無又は極粗
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	02 かなり粗
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	02 5
42 花冠裂片の長さ	08 かなり長
43 花冠裂片の幅	06 やや広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	01 鋭形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	03 淡
49 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
50 がく筒の長さ	05 中
51 がく筒の直径	05 中

Gentiana L.
西京の瑞雲

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 1 7 5 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30176号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. いわてDfG PB-1号 (いわてDfG PB-1コウリ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは中、茎の緑色の濃淡はやや淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は極少、茎の二節以上の側枝発生数は中、最長葉の着生位置は上1/3、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は狭披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は単生、花序の着生位置は頂部及び腋部、花型は八重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは極外反、花冠裂片の表面の色は96A、花冠の内面上部の色は96A、花冠の外面上部の色は94B、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや長、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は漏斗形、やくの発達の状態は完全退化、開花期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「いわてDfG PB-1号」は、対照品種「Bzc-1」と比較して、葉の形が狭披針形であること、花型が八重であること等で区別性が認められる。対照品種「07B11 奥ダブルブルー」と比較して、花冠裂片の表面の色が96Aであること、花冠裂片の表面の斑点の粗密が無又は極粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村浩美 川戸善徳 内藤善美 阿部弘 小田島雅 佐々木忍 小澤傑 西原昌宏
伊藤敦美 渡辺藍子 後藤史奈

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.
いわてDfG PB-1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	05 中
03 茎の太さ	04 やや細
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	04 やや淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	04 やや少
08 節間長	05 中
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	01 極少
11 茎の二節以上の側枝発生数	05 中
12 最長葉の着生位置	01 上1/3
13 葉の長さ	05 中
14 葉の幅	03 狭
15 葉の形	05 狭披針形
16 葉の横断面の形	01 内曲
17 葉の縦断面の形	03 外反

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30176号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	07 濃
21 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
22 花序の型	01 単生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	
27 花型	02 八重
28 花冠の長さ	05 中
29 花筒部の直径	05 中
30 花冠の形	01 釣鐘形
31 花冠の先端の直径	07 大
32 花冠の先端の反り	09 極外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 96A
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート 96A

Gentiana L.
いわてDfG PB-1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 94B
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	01 無又は極粗
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	05 中
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	01 白
41 花冠裂片の数	02 5
42 花冠裂片の長さ	05 中
43 花冠裂片の幅	06 やや広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
50 がく筒の長さ	06 やや長
51 がく筒の直径	04 やや小

Gentiana L.
いわてDfG PB-1号

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30176号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	03 漏斗形	
	01 狭披針形	
	01 完全退化	
	07 晩	
	05 中	

1 品種登録の番号及び年月日 第30177号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 心美雅（コミヤビ）

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや短、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は極少、茎の二節以上の側枝発生数はやや少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は広披針形、葉脈の数は単脈、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無は有、花序の型は単生、花序の着生位置は頂部及び腋部、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN80B、花冠の内面上部の色はN80B、花冠の外面上部の色はN80C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅は極広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや大、がく筒の形は漏斗形、やくの発達の状態は正常、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「心美雅」は、対照品種「心美舞」と比較して、花冠裂片の表面の色がN80Bであること、花冠の内面上部の斑点の粗密がかなり粗であること等で区別性が認められる。対照品種「福寿盃」と比較して、葉の形が広披針形であること、花冠裂片の表面の色がN80Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

筑前あさくら農業協同組合
福岡県朝倉市甘木221-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

行徳寛昭

7 出願公表の年月日 令和3年12月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「心美静」に「長寿」を交配し、選抜したものである。

Gentiana L.
心美雅

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	04 やや短
03 茎の太さ	04 やや細
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	04 やや少
08 節間長	04 やや短
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	01 極少
11 茎の二節以上の側枝発生数	04 やや少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	05 中
14 葉の幅	05 中
15 葉の形	03 広披針形
16 葉の横断面の形	02 水平
17 葉の縦断面の形	03 外反

Gentiana L.
心美雅

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30177号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
18 葉のねじれの有無	01	無
19 葉脈の数	01	単脈
20 葉の緑色の濃淡	04	やや淡
21 葉のアントシアニン着色の有無	09	有
22 花序の型	01	単生
23 花序の着生位置	02	頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）		
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）		
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）		
27 花型	01	一重
28 花冠の長さ	05	中
29 花筒部の直径	07	大
30 花冠の形	01	釣鐘形
31 花冠の先端の直径	07	大
32 花冠の先端の反り	07	外反
33 花冠裂片の表面の色		RHSカラーチャート N80B
34 花冠の内面上部の色		RHSカラーチャート N80B

Gentiana L.
心美雅

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート N80C
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	01 無又は極粗
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	02 かなり粗
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	02 5
42 花冠裂片の長さ	06 やや長
43 花冠裂片の幅	09 極広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	03 淡
49 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
50 がく筒の長さ	05 中
51 がく筒の直径	06 やや大

Gentiana L.
心美雅

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	03 漏斗形
	02 披針形
	03 正常
	02 へら形
	09 極晩
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30178号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. チョウフウイエキン (チョウフウイキン)

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は茶、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は心形2、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色は139A、成葉表面の色は139A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は強、成葉表面の光沢は強、新葉表面の毛は有(白)、成葉表面の毛は有(白)、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは太、葉柄の長さは長、葉柄の色は濃緑、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは上向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりは重なる、花冠の長径は中、つぼみの色は1B、単色・複色の別は三色、複色のタイプはバンド、花卉のバンド1の色は44A、花卉のバンド2の色は32A、花卉のバンド3の色は14B、花卉の脈の明瞭さは明瞭(橙)、花卉のバンド1の幅は狭、花卉のバンド2の幅はやや狭、花卉のバンド3の幅はやや広、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは無、花卉の長さは中、花卉の幅は中、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは二色、ずい柱基部の色は31B、ずい柱先端の色は18A、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色はその他(淡黄)、花柱枝の毛は有(白及び黄)、柱頭の色は黄、花糸の長さは中、花糸の色は黄、やくの色は黄、花柄上部の太さは太、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は137C、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは中、花柄下部の色は137C、副がくの形はその他(狭楕円形)、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は濃緑、がく筒の形は碗形、がく筒の長さは中、がく筒の色は緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有(白)、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「チョウフウイエキン」は、対照品種「イエローマジック」と比較して、ずい柱基部の色が31Bであること、柱頭の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「チョイベ」と比較して、つぼみの色が1Bであること、花卉のバンド1の色が44Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

後藤昭辞
愛知県江南市勝佐町東郷235番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

後藤昭辞

7 出願公表の年月日 令和4年7月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hibiscus L.
 チョウフウイエキン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 立性
02 樹高	03 低木
03 樹皮の亀裂の形	03 線状
04 樹皮の色	02 茶
05 枝の粗密	05 中
06 枝の出方	03 上向き
07 枝の色	02 緑
08 枝の皮目	05 中
09 枝の毛	09 有（白）
10 葉全体の形	07 心形
11 葉先端の形	04 鋭形
12 葉基部の形	05 心形 2
13 葉縁の形	03 鈍鋸齒
14 異葉性	01 無
15 葉身の長さ	05 中
16 葉身の幅	05 中
17 葉の厚さ	05 中

Hibiscus L.
 チョウフウイエキン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 新葉表面の色	RHSカラーチャート 139A
19 成葉表面の色	RHSカラーチャート 139A
20 新葉裏面の色	RHSカラーチャート NN137A
21 成葉裏面の色	RHSカラーチャート NN137B
22 斑の有無	01 無
23 斑のタイプ	
24 斑の色	
25 新葉表面の光沢	07 強
26 成葉表面の光沢	07 強
27 新葉裏面の光沢	05 中
28 成葉裏面の光沢	05 中
29 新葉表面の毛	09 有（白）
30 成葉表面の毛	09 有（白）
31 新葉裏面の毛	09 有（白）
32 成葉裏面の毛	09 有（白）
33 葉脈の形	03 掌状型
34 葉脈の凹凸	09 明瞭

Hibiscus L.
 チョウフウイエキン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉柄の溝	03 溝広
36 葉柄の太さ	07 太
37 葉柄の長さ	07 長
38 葉柄の色	04 濃緑
39 葉柄の毛	09 有（白）
40 托葉の形	01 線状披針形
41 托葉の宿存性	05 中
42 托葉の長さ	05 中
43 托葉の幅	05 中
44 托葉の色	03 緑
45 花冠の向き	01 上向き
46 花冠の開き方	03 平開
47 花冠の型	01 一重咲き
48 花弁の重なり	07 重なる
49 花冠の長径	05 中
50 花冠の短径	
51 つばみの色	RHSカラーチャート 1B

Hibiscus L.
チョウフウイエキン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 単色・複色の別	03 三色
53 単色花の色	
54 複色のタイプ	01 バンド
55 花弁のバンド1の色	RHSカラーチャート 44A
56 花弁のバンド2の色	RHSカラーチャート 32A
57 花弁のバンド3の色	RHSカラーチャート 14B
58 花弁のバンド4の色	
59 花弁のバンド5の色	
60 花弁の縦条の地色	
61 花弁の縦条の色	
62 花弁のブロッチの地色	
63 花弁のブロッチの色	
64 花弁の脈の明瞭さ	09 明瞭（橙）
65 花弁のバンド1の幅	03 狭
66 花弁のバンド2の幅	04 やや狭
67 花弁のバンド3の幅	06 やや広
68 花弁のバンド4の幅	

Hibiscus L.
 チョウフウイエキン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 花弁のバンド5の幅	
70 花弁全体の形	02 扇型
71 花弁先端の切れ込み	03 弱
72 花弁縁のひだの多少	05 中
73 花弁基部の翼の有無	01 無
74 花弁のねじれ	01 無
75 花弁の長さ	05 中
76 花弁の幅	05 中
77 花弁の数	03 少
78 花弁の光沢	01 無
79 ずい柱の弁化の有無	01 無
80 ずい柱のよじれ	01 無
81 ずい柱の曲り	01 無
82 ずい柱の下垂性	01 無
83 ずい柱の太さ	05 中
84 ずい柱の長さ	05 中
85 ずい柱の色のタイプ	02 二色

Hibiscus L.
 チョウフウイエキン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 ずい柱基部の色	RHSカラーチャート 31B
87 ずい柱中間部の色	RHSカラーチャート 18A
88 ずい柱先端の色	RHSカラーチャート 18A
89 ずい柱先端裂片の数	01 5 裂
90 花柱枝の開出	02 斜
91 花柱枝の長さ	04 やや短
92 花柱枝の色	09 その他（淡黄）
93 花柱枝の毛	09 有（白及び黄）
94 柱頭の色	01 黄
95 花糸の長さ	05 中
96 花糸のずい柱着生の位置	02 1/4
97 花糸の色	02 黄
98 やくの色	01 黄
99 花柄上部の形態	01 直線
100 花柄上部の太さ	07 太
101 花柄上部の長さ	05 中
102 花柄上部の色	RHSカラーチャート 137C

Hibiscus L.
 チョウフウイエキン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 花柄上部の毛	09 有（白）
104 花柄下部の形態	01 直線
105 花柄下部の太さ	05 中
106 花柄下部の長さ	05 中
107 花柄下部の色	RHSカラーチャート 137C
108 花柄下部の毛	09 有（白）
109 副がくの形	09 その他（狭楕円形）
110 副がくの開放の方向	02 やや接着
111 副がくの長さ-1	07 長
112 副がくの長さ-2	05 中
113 副がくの幅	07 広
114 副がくの色	04 濃緑
115 副がくの毛	09 有（白）
116 がく筒の形	04 碗形
117 がく筒の太さ	07 太
118 がく筒の長さ	05 中
119 がく筒の色	03 緑

チョウフウイエキン

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30178号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30179号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. チョウフウカル (チョウフカル)

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は茶、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は心形2、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色は137A、成葉表面の色はNN137B、斑の有無は無、新葉表面の光沢は弱、成葉表面の光沢は弱、新葉表面の毛は有(白)、成葉表面の毛は有(白)、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは長、葉柄の色は黄緑、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは上向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花弁の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色は154D, 173D(花弁の縁部)、単色・複色の別は三色、複色のタイプはバンド、花弁のバンド1の色は187A、花弁のバンド2の色は45B、花弁のバンド3の色は13B、花弁の脈の明瞭さは明瞭(橙)、花弁のバンド1の幅はやや狭、花弁のバンド2の幅はやや狭、花弁のバンド3の幅はやや狭、花弁全体の形は扇型、花弁のねじれは無、花弁の長さは中、花弁の幅は広、花弁の数は少、花弁の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは二色、ずい柱基部の色は53A、ずい柱先端の色は23B、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色はその他(淡黄)、花柱枝の毛は有

(赤)、柱頭の色は赤、花糸の長さは中、花糸の色はオレンジ、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は143C、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は143C、副がくの形は披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有(白)、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「チョウフウカル」は、対照品種「フレアオレンジ」と比較して、つぼみの色が154D, 173D(花弁の縁部)であること、花弁のバンド3の色が13Bであること等で区別性が認められる。対照品種「NEW APOLLO」と比較して、ずい柱先端の色が23Bであること、柱頭の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

後藤昭辞
愛知県江南市勝佐町東郷235番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

後藤昭辞

7 出願公表の年月日 令和4年7月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「フレアオレンジ」の変異株である。

Hibiscus L.
 チョウフウカル

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30179号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 立性
02 樹高	03 低木
03 樹皮の亀裂の形	03 線状
04 樹皮の色	02 茶
05 枝の粗密	05 中
06 枝の出方	03 上向き
07 枝の色	02 緑
08 枝の皮目	03 少
09 枝の毛	09 有（白）
10 葉全体の形	07 心形
11 葉先端の形	04 鋭形
12 葉基部の形	05 心形2
13 葉縁の形	03 鈍鋸齒
14 異葉性	01 無
15 葉身の長さ	05 中
16 葉身の幅	05 中
17 葉の厚さ	05 中

Hibiscus L.
チョウフウカル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 新葉表面の色	RHSカラーチャート 137A
19 成葉表面の色	RHSカラーチャート NN137B
20 新葉裏面の色	RHSカラーチャート 137C
21 成葉裏面の色	RHSカラーチャート 137B
22 斑の有無	01 無
23 斑のタイプ	
24 斑の色	
25 新葉表面の光沢	03 弱
26 成葉表面の光沢	03 弱
27 新葉裏面の光沢	03 弱
28 成葉裏面の光沢	03 弱
29 新葉表面の毛	09 有（白）
30 成葉表面の毛	09 有（白）
31 新葉裏面の毛	09 有（白）
32 成葉裏面の毛	09 有（白）
33 葉脈の形	03 掌状型
34 葉脈の凹凸	09 明瞭

Hibiscus L.
 チョウフウカル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉柄の溝	03 溝広
36 葉柄の太さ	05 中
37 葉柄の長さ	07 長
38 葉柄の色	01 黄緑
39 葉柄の毛	09 有（白）
40 托葉の形	01 線状披針形
41 托葉の宿存性	05 中
42 托葉の長さ	05 中
43 托葉の幅	05 中
44 托葉の色	03 緑
45 花冠の向き	01 上向き
46 花冠の開き方	03 平開
47 花冠の型	01 一重咲き
48 花弁の重なり	07 重なる
49 花冠の長径	03 小
50 花冠の短径	
51 つばみの色	RHSカラーチャート 154D, 173D(花弁の縁部)

Hibiscus L.
 チョウフウカル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 単色・複色の別	03 三色
53 単色花の色	
54 複色のタイプ	01 バンド
55 花弁のバンド1の色	RHSカラーチャート 187A
56 花弁のバンド2の色	RHSカラーチャート 45B
57 花弁のバンド3の色	RHSカラーチャート 13B
58 花弁のバンド4の色	
59 花弁のバンド5の色	
60 花弁の縦条の地色	
61 花弁の縦条の色	
62 花弁のブロッチの地色	
63 花弁のブロッチの色	
64 花弁の脈の明瞭さ	09 明瞭（橙）
65 花弁のバンド1の幅	04 やや狭
66 花弁のバンド2の幅	04 やや狭
67 花弁のバンド3の幅	04 やや狭
68 花弁のバンド4の幅	

Hibiscus L.
 チョウフウカル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 花弁のバンド5の幅	
70 花弁全体の形	02 扇型
71 花弁先端の切れ込み	03 弱
72 花弁縁のひだの多少	05 中
73 花弁基部の翼の有無	01 無
74 花弁のねじれ	01 無
75 花弁の長さ	05 中
76 花弁の幅	07 広
77 花弁の数	03 少
78 花弁の光沢	01 無
79 ずい柱の弁化の有無	01 無
80 ずい柱のよじれ	03 弱
81 ずい柱の曲り	01 無
82 ずい柱の下垂性	01 無
83 ずい柱の太さ	05 中
84 ずい柱の長さ	05 中
85 ずい柱の色のタイプ	02 二色

Hibiscus L.
チョウフウカル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 ずい柱基部の色	RHSカラーチャート 53A
87 ずい柱中間部の色	RHSカラーチャート 23B
88 ずい柱先端の色	RHSカラーチャート 23B
89 ずい柱先端裂片の数	01 5 裂
90 花柱枝の開出	02 斜
91 花柱枝の長さ	06 やや長
92 花柱枝の色	09 その他（淡黄）
93 花柱枝の毛	09 有（赤）
94 柱頭の色	03 赤
95 花糸の長さ	05 中
96 花糸のずい柱着生の位置	03 1/3
97 花糸の色	03 オレンジ
98 やくの色	01 黄
99 花柄上部の形態	01 直線
100 花柄上部の太さ	05 中
101 花柄上部の長さ	05 中
102 花柄上部の色	RHSカラーチャート 143C

Hibiscus L.
チョウフウカル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 花柄上部の毛	09 有（白）
104 花柄下部の形態	01 直線
105 花柄下部の太さ	05 中
106 花柄下部の長さ	07 長
107 花柄下部の色	RHSカラーチャート 143C
108 花柄下部の毛	09 有（白）
109 副がくの形	03 披針形
110 副がくの開放の方向	02 やや接着
111 副がくの長さ-1	05 中
112 副がくの長さ-2	05 中
113 副がくの幅	07 広
114 副がくの色	03 緑
115 副がくの毛	09 有（白）
116 がく筒の形	03 鐘形
117 がく筒の太さ	05 中
118 がく筒の長さ	05 中
119 がく筒の色	03 緑

Hibiscus L.
チョウフウカル

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30179号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30180号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Passiflora edulis Sims 沖縄情熱PF1号 (オキナヅショウネツPF1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや長、蜜腺の位置は葉身に接する、がく片の長さはやや短、花卉の長さはやや短、喉部の環状斑の色の濃淡は無又は淡、副花冠の直径は小、副花冠の環状紫斑の有無は有、副花冠の環状紫斑の幅はやや広、副花冠の先端部の斑点の有無は無、果実の大きさは中、果実の長さは中、果実の直径は中、果皮の色は鮮赤、種子の大きさはやや大、果肉の色は黄橙、果実の甘味は高、果実の酸味はやや低、収穫期は晩である。

出願品種「沖縄情熱PF1号」は、対照品種「ルビースター」と比較して、果点の明瞭さが極明瞭であること、果実の甘味が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山城秀正

沖縄県糸満市西崎町3丁目34番地

山城大

No.55-1, Section 4, Nanjing East Road, Songshan District, Taipei City, 105,
Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

玉城正智 山城秀正 山城大

7 出願公表の年月日 令和3年11月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の自然交雑実生から選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30180号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 つるの色	05 紫
02 葉身の長さ	05 中
03 葉身の幅	06 やや広
04 葉身先端裂片の幅	05 中
05 葉身の切れ込みの深さ	06 やや深
06 葉身の緑色の濃淡	05 中
07 葉身の凹凸の有無	09 有
08 葉身の凹凸の強弱	03 弱
09 葉柄の長さ	06 やや長
10 蜜腺の位置	01 葉身に接する
11 ほう葉の長さ	05 中
12 がく片の長さ	04 やや短
13 がく片の幅	04 やや狭
14 花弁の長さ	04 やや短
15 花弁の幅	05 中
16 喉部の環状斑の色の濃淡	01 無又は淡
17 副花冠の直径	01 小

Passiflora edulis Sims

沖縄情熱PF1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 副花冠の環状紫斑の有無	09 有
19 副花冠の環状紫斑の幅	06 やや広
20 副花冠の環状紫斑の色の濃淡	06 やや濃
21 副花冠の先端部の斑点の有無	01 無
22 果実の大きさ	05 中
23 果実の長さ	05 中
24 果実の直径	05 中
25 果実の長さ／直径	04 やや細
26 果皮の色	02 鮮赤
27 果点の明瞭さ	03 極明瞭
28 果皮の厚さ	06 やや厚
29 種子の大きさ	06 やや大
30 珠柄の色	01 白黄
31 果肉の色	04 黄橙
32 果汁の多少	07 多
33 果実の甘味	07 高
34 果実の酸味	04 やや低

Passiflora edulis Sims

沖縄情熱PF1号

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 1 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 収穫始期 36 収穫期	07 晩
	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30181号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume 311NR

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は中、花茎のアントシアニンの着色はやや弱、花の側面の形は凸形、花の縦径は中、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はN88B、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN88A、ドーサルセパルの網斑の密度は低、ドーサルセパルの網斑の色はN88A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はN88B、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は少、ペタルの縞斑の色はN88A、ペタルの網斑の密度は低、ペタルの網斑の色はN88A、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はN89A、中央裂片の覆色はN92C、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色は155C、側裂片の覆色はN89A, N92C（縁部）、側裂片の斑点の数は多、側裂片の斑点の色はN92A、側裂片の縞斑の数は無、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「311NR」は、対照品種「ウエディングプロムナード」と比較して、ペタルの表面の地色がN88Bであること、中央裂片の地色がN89Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石原産業株式会社
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目3番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

湯木俊次 三位正洋 Chin Dong Poh

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ウエディングプロムナード」にツユクサ由来の遺伝子を導入した形質転換体から選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	05 中
02 植物体の花序の数	01 1
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	05 中
05 葉の形	03 かなり細長い
06 葉の最大幅の位置	02 中央部
07 葉の先端の形	02 鈍形
08 葉の先端の対称性	02 非対称
09 葉の向き	03 斜上
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	01 黄緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
14 花序の型	03 複総状
15 花序の長さ	05 中
16 花序の花数	05 中
17 花茎の長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	02 中
19 花茎のアントシアニンの着色	02 やや弱
20 花の側面の形	03 凸形
21 花の縦径	05 中
22 花の横径	05 中
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	06 やや長
26 ドーサルセパルの幅	05 中
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	02 平
30 ドーサルセパルの横断面の形	02 平
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート N88B
34 ドーサルセパルの覆色	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	04 やや少
39 ドーサルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート N88A
40 ドーサルセパルの網斑の密度	03 低
41 ドーサルセパルの網斑の色	RHSカラーチャート N88A
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート N88B
43 ラテラルセパルの覆色	
44 ラテラルセパルの斑点の数	03 少
45 ラテラルセパルの斑点の色	RHSカラーチャート N88A
46 ラテラルセパルの縞斑の数	05 中
47 ラテラルセパルの縞斑の色	RHSカラーチャート N88A
48 ラテラルセパルの網斑の密度	01 無
49 ラテラルセパルの網斑の色	
50 ペタルの長さ	04 やや短
51 ペタルの幅	04 やや狭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	05 中
53 ペタルの最大幅の位置	02 中央部
54 ペタルの縦断面の形	02 平
55 ペタルの横断面の形	02 平
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSカラーチャート N88B
59 ペタルの覆色	
60 ペタルの覆色の面積	
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	03 少
65 ペタルの縞斑の色	RHSカラーチャート N88A
66 ペタルの網斑の密度	03 低
67 ペタルの網斑の色	RHSカラーチャート N88A
68 リップの中央裂片の長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の幅	04 やや狭
70 リップの中央裂片の形	01 三角形
71 リップのヒゲの有無	09 有
72 リップのヒゲの長さ	03 短
73 リップの中央裂片の突起又は稜	02 中
74 リップの側裂片の形	05 V型
75 リップの側裂片の巻き込み	02 中
76 リップの側裂片の大きさ	05 同等
77 中央裂片の地色	RHSカラーチャート N89A
78 中央裂片の覆色	RHSカラーチャート N92C
79 中央裂片の斑点の数	01 無
80 中央裂片の斑点の大きさ	
81 中央裂片の斑点の色	
82 中央裂片の縞斑の数	01 無
83 中央裂片の縞斑の色	
84 中央裂片の網斑の密度	01 無
85 中央裂片の網斑の色	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 側裂片の地色	RHSカラーチャート 155C
87 側裂片の覆色	RHSカラーチャート N89A, N92C (縁部)
88 側裂片の斑点の数	04 多
89 側裂片の斑点の色	RHSカラーチャート N92A
90 側裂片の縞斑の数	01 無
91 側裂片の縞斑の色	
92 側裂片の網斑の密度	01 無
93 側裂片の網斑の色	
94 リップのカルス	02 盛り上る
95 カルスの色	RHSカラーチャート 13A
96 カルスの毛の有無	01 無
97 ずい柱の色	RHSカラーチャート N88B

1 品種登録の番号及び年月日 第30182号 令和6年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (DC.) Quel. HKPLE10

3 登録品種の特性の概要

菌さんの縦断面の形は凹形、菌さんの直径は極大、菌さんの高さは極大、菌さんの中央部の色は淡灰黄(199D)、菌さんの周縁部の色は淡灰黄(199D)、菌さん表面の模様は無、菌さんの硬さは中、ひだの並び方は直、ひだの幅はやや狭、菌柄の菌さんへの付き方は偏心性、菌柄の形は太短、菌柄の長さは極長、菌柄の太さは太、菌柄の色は黄白(158D)、菌柄の表面のササクレの有無は有、菌柄の硬さは硬、有効茎数はかなり少、発生処理までの期間は長である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「HKPLE10」は、対照品種「PLE-3号」と比較して、菌さんの直径が極大であること、菌さん表面の模様が無であること、子実体の平均乾燥重量が極重であること等で区別性が認められる。対照品種「ホクトPLE-2号」と比較して、菌さんの直径が極大であること、菌さん表面の模様が無であること、菌柄の最大直径ー菌さん基部の菌柄の直径がやや小であること、子実体の平均乾燥重量が極重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクト株式会社
長野県長野市南堀138番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高野めぐみ 宍戸穂高 石川真梨子

7 出願公表の年月日 令和5年6月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有株どうしを交配し、選抜したものである。

Pleurotus eryngii (DC.) Quel.
HKPLE10

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30182号	
重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質	重要な形質に係る特性
01 菌叢表面の着色の有無	01 無
02 菌叢裏面の着色の有無	09 有
03 菌糸体の成長最適温度	04 26℃
04 菌糸体の温度別成長量 (10℃)	03 遅
05 菌糸体の温度別成長量 (15℃)	03 遅
06 菌糸体の温度別成長量 (20℃)	05 中
07 菌糸体の温度別成長量 (25℃)	07 速
08 菌糸体の温度別成長量 (30℃)	07 速
09 菌さんの縦断面の形	02 凹形
10 菌さんの直径	09 極大
11 菌さんの高さ	09 極大
12 菌さんの直径／高さ	03 小
13 菌さんの中央部の色	04 淡灰黄 (199D)
14 菌さんの周縁部の色	04 淡灰黄 (199D)
15 菌さん表面の模様	01 無
16 菌さん表面の突起	01 無
17 菌さん表面の斑紋の分布	

Pleurotus eryngii (DC.) Quel.
HKPLE10

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 1 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 菌さんの硬さ	05 中
19 ひだの並び方	01 直
20 ひだの幅	04 やや狭
21 ひだの色	04 淡灰黄 (161D)
22 ひだの長さ	05 中
23 菌柄の菌さんへの付き方	02 偏心性
24 菌柄の形	05 太短
25 菌柄の長さ	09 極長
26 菌さんの直径／菌柄の長さ	06 やや大
27 菌柄の太さ	07 太
28 菌柄の最大直径－菌さん基部の菌柄の直径	04 やや小
29 菌柄の色	02 黄白 (158D)
30 菌柄の表面のササクレの有無	09 有
31 菌柄の硬さ	07 硬
32 有効茎数	02 かなり少
33 子実体の平均乾燥重量	09 極重
34 発生処理までの期間	07 長

Pleurotus eryngii (DC.) Quel.
HKPLE10

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 1 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 菌搔きから子実体収穫までの期間	06 やや長