

1 品種登録の番号及び年月日 第30236号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Abelia R. Br. PF-2

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「PF-2」は、対照品種「WEV02」と比較して、節間長が極短であること、葉身長がやや短であること、斑色の季節変化が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ホープレイズ」と比較して、節間長が極短であること、新葉の斑色が36Aであること、花色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Panoramic Farm, Inc.
3110 Tarlton Mill Road, Marshville, NC 28103, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Randall Dale Lindsey

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

8 登録品種の育成の経過の概要
「KALEIDOSCOPE」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30236号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張性
02 樹高	02 かなり低
03 枝の太さ	05 中
04 新梢の色	04 赤褐
05 分枝性	07 密
06 節間長	01 極短
07 葉全体の形	03 卵形
08 葉先端の形	01 鋭形
09 葉基部の形	02 鈍形
10 葉身長	04 やや短
11 葉身幅	05 中
12 新葉表面の色	03 緑
13 成葉表面の色	02 黄緑
14 葉色の季節変化	01 無
15 変化後の葉色	
16 斑の有無	09 有
17 斑のパターン	04 覆輪

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 斑の色数	01 1 色
19 新葉の斑色	RHSカラーチャート 36A
20 葉の主たる斑色	RHSカラーチャート 27A
21 葉の2次の斑色	
22 斑色の季節変化	09 有
23 変化後の斑色	02 紅
24 葉の毛の多少	01 無
25 葉の光沢	09 有
26 葉柄の長さ	03 短
27 花序のタイプ	01 集散花序
28 花の向き	03 上向き
29 花形	01 一重咲
30 花冠の形	02 鐘状
31 花径	04 やや小
32 花の長さ	06 やや長
33 蕾の色	RHSカラーチャート 77B
34 花色	RHSカラーチャート NN155C

Abelia R. Br.
PF-2

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30236号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
35 花筒の色	RHSカラーチャート NN155D	
36 がく片の長さ	05 中	
37 がく片の色	02 淡紅	
38 がく片数	05 中	
39 花数	02 かなり少	
40 花の香り	03 弱	
41 開花期	06 やや晩	
42 開花期間		
43 落葉性		
44 耐寒性		
45 耐暑性		
46 病害抵抗性		
47 虫害抵抗性		

1 品種登録の番号及び年月日 第30237号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Abelia R. Br. Keycarn

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Keycarn」は、対照品種「コンフェティー」と比較して、葉基部の形が円形であること、新葉の斑色が9Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ABELOPS」と比較して、新葉の斑色が9Dであること、蕾の色が2Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ホープレイズ」と比較して、新葉の斑色が9Dであること、花色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemens Keyzers
Walbeckerdyck 2, 47625 Kevelaer, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Klemens Keyzers

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Prostata」の変異株である。

Abelia R. Br.
Keycarn

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張性
02 樹高	03 低
03 枝の太さ	04 やや細
04 新梢の色	04 赤褐
05 分枝性	07 密
06 節間長	02 かなり短
07 葉全体の形	03 卵形
08 葉先端の形	01 鋭形
09 葉基部の形	03 円形
10 葉身長	04 やや短
11 葉身幅	04 やや狭
12 新葉表面の色	03 緑
13 成葉表面の色	03 緑
14 葉色の季節変化	01 無
15 変化後の葉色	
16 斑の有無	09 有
17 斑のパターン	04 覆輪

Abelia R. Br.
Keycarn

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 斑の色数	01 1 色
19 新葉の斑色	RHSカラーチャート 9D
20 葉の主たる斑色	RHSカラーチャート 4C
21 葉の2次の斑色	
22 斑色の季節変化	01 無
23 変化後の斑色	
24 葉の毛の多少	01 無
25 葉の光沢	09 有
26 葉柄の長さ	03 短
27 花序のタイプ	01 集散花序
28 花の向き	05 横向き
29 花形	01 一重咲
30 花冠の形	02 鐘状
31 花径	03 小
32 花の長さ	05 中
33 蕾の色	RHSカラーチャート 2C
34 花色	RHSカラーチャート NN155B

Abelia R. Br.
Keycarn

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花筒の色	RHSカラーチャート NN155C
36 がく片の長さ	05 中
37 がく片の色	02 淡紅
38 がく片数	05 中
39 花数	03 少
40 花の香り	03 弱
41 開花期	06 やや晩
42 開花期間	
43 落葉性	
44 耐寒性	
45 耐暑性	
46 病害抵抗性	
47 虫害抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30238号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Abelia R. Br. Keylad

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Keylad」は、対照品種「KEYLIB」と比較して、葉身長がやや短であること、葉の主たる斑色が1D（覆輪）であること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ホープレイズ」と比較して、葉の主たる斑色が1D（覆輪）であること、花色がNN155Dであること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemens Keyzers
Walbeckerdyck 2, 47625 Kevelaer, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Klemens Keyzers

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Prostata」の変異株である。

Abelia R. Br.
Keylad

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30238号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張性
02 樹高	03 低
03 枝の太さ	05 中
04 新梢の色	04 赤褐
05 分枝性	07 密
06 節間長	03 短
07 葉全体の形	03 卵形
08 葉先端の形	01 鋭形
09 葉基部の形	03 円形
10 葉身長	04 やや短
11 葉身幅	05 中
12 新葉表面の色	03 緑
13 成葉表面の色	03 緑
14 葉色の季節変化	01 無
15 変化後の葉色	
16 斑の有無	09 有
17 斑のパターン	02 掃込み斑、04 覆輪

Abelia R. Br.
Keylad

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 斑の色数	02 2色
19 新葉の斑色	RHSカラーチャート 1D
20 葉の主たる斑色	RHSカラーチャート 1D（覆輪）
21 葉の2次の斑色	RHSカラーチャート 138D（掃込み斑）
22 斑色の季節変化	09 有
23 変化後の斑色	01 淡紅
24 葉の毛の多少	01 無
25 葉の光沢	09 有
26 葉柄の長さ	02 かなり短
27 花序のタイプ	01 集散花序
28 花の向き	05 横向き
29 花形	01 一重咲
30 花冠の形	02 鐘状
31 花径	05 中
32 花の長さ	06 やや長
33 蕾の色	RHSカラーチャート 2C
34 花色	RHSカラーチャート NN155D

Abelia R. Br.
Keylad

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花筒の色	RHSカラーチャート NN155C
36 がく片の長さ	07 長
37 がく片の色	02 淡紅
38 がく片数	05 中
39 花数	02 かなり少
40 花の香り	05 中
41 開花期	08 かなり晩
42 開花期間	
43 落葉性	
44 耐寒性	
45 耐暑性	
46 病害抵抗性	
47 虫害抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30239号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Abelia R. Br. Keyfly

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Keyfly」は、対照品種「KALEIDOSCOPE」と比較して、葉色の季節変化が無であること、葉の主たる斑色が143Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ABELOPS」と比較して、葉色の季節変化が無であること、新葉の斑色が32Bであること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「KEYLIB」と比較して、葉の主たる斑色が143Bであること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemens Keysers
Walbeckerdyck 2, 47625 Kevelaer, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Klemens Keysers

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ABELOPS」の変異株である。

Abelia R. Br.
Keyfly

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30239号	
重　　要　　な　　形　　質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張性
02 樹高	03 低
03 枝の太さ	06 やや太
04 新梢の色	04 赤褐
05 分枝性	07 密
06 節間長	02 かなり短
07 葉全体の形	03 卵形
08 葉先端の形	01 鋭形
09 葉基部の形	03 円形
10 葉身長	05 中
11 葉身幅	06 やや広
12 新葉表面の色	03 緑
13 成葉表面の色	03 緑
14 葉色の季節変化	01 無
15 変化後の葉色	
16 斑の有無	09 有
17 斑のパターン	04 覆輪

Abelia R. Br.
Keyfly

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30239号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 斑の色数	01 1色
19 新葉の斑色	RHSカラーチャート 32B
20 葉の主たる斑色	RHSカラーチャート 143B
21 葉の2次の斑色	
22 斑色の季節変化	09 有
23 変化後の斑色	03 褐
24 葉の毛の多少	01 無
25 葉の光沢	09 有
26 葉柄の長さ	03 短
27 花序のタイプ	01 集散花序
28 花の向き	03 上向き
29 花形	01 一重咲
30 花冠の形	02 鐘状
31 花径	06 やや大
32 花の長さ	06 やや長
33 蕾の色	RHSカラーチャート 1D, 77D (ぼかし)
34 花色	RHSカラーチャート NN155D

Abelia R. Br.
Keyfly

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花筒の色	RHSカラーチャート NN155C
36 がく片の長さ	07 長
37 がく片の色	02 淡紅
38 がく片数	05 中
39 花数	03 少
40 花の香り	03 弱
41 開花期	08 かなり晩
42 開花期間	
43 落葉性	
44 耐寒性	
45 耐暑性	
46 病害抵抗性	
47 虫害抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30240号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Abelia R. Br. OPSTAL103

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「OPSTAL103」は、対照品種「KALEIDOSCOPE」と比較して、新葉の斑色が38Bであること、葉の主たる斑色が1Cであること、花の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「ABELOPS」と比較して、新葉の斑色が38Bであること、花の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「コンフェティー」と比較して、葉基部の形が円形であること、葉身幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ron van Opstal Holding B.V.

Sint Willebrordusstraat 3, 4882NM Klein Zundert, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ron van Opstal

7 出願公表の年月日 平成29年8月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ABELOPS」の変異株である。

Abelia R. Br.
OPSTAL103

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30240号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張性
02 樹高	03 低
03 枝の太さ	05 中
04 新梢の色	04 赤褐
05 分枝性	07 密
06 節間長	03 短
07 葉全体の形	03 卵形
08 葉先端の形	02 鈍形
09 葉基部の形	03 円形
10 葉身長	04 やや短
11 葉身幅	05 中
12 新葉表面の色	03 緑
13 成葉表面の色	03 緑
14 葉色の季節変化	09 有
15 変化後の葉色	09 その他（暗緑）
16 斑の有無	09 有
17 斑のパターン	04 覆輪

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 斑の色数	02 2色
19 新葉の斑色	RHSカラーチャート 38B
20 葉の主たる斑色	RHSカラーチャート 1C
21 葉の2次の斑色	RHSカラーチャート 38C
22 斑色の季節変化	01 無
23 変化後の斑色	
24 葉の毛の多少	03 少
25 葉の光沢	09 有
26 葉柄の長さ	02 かなり短
27 花序のタイプ	01 集散花序
28 花の向き	03 上向き
29 花形	01 一重咲
30 花冠の形	02 鐘状
31 花径	03 小
32 花の長さ	03 短
33 蕾の色	RHSカラーチャート 1D, NN74D(ぼかし)
34 花色	RHSカラーチャート NN155C

Abelia R. Br.
OPSTAL103

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30240号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花筒の色	RHSカラーチャート NN155B
36 がく片の長さ	07 長
37 がく片の色	01 濃桃
38 がく片数	05 中
39 花数	03 少
40 花の香り	03 弱
41 開花期	06 やや晩
42 開花期間	
43 落葉性	
44 耐寒性	
45 耐暑性	
46 病害抵抗性	
47 虫害抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30241号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Anthurium Schott ANTHEUYK

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ANTHEUYK」は、対照品種「ANTHEOCMA」と比較して、仏炎苞の形が広卵形であること、仏炎苞の裂片の有無が有であること、仏炎苞の端部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Anthura B.V.
Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 令和2年4月2日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「ANTHDATAM」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30241号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	03 小
02 葉身の長さ	02 かなり短
03 葉身の幅	03 狭
04 葉身の形	05 卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	02 ほぼ直角
08 葉身の先端の形	03 広鋭形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉身の表面の凹凸の強弱	03 弱
11 葉柄の長さ	03 短
12 花茎の長さ	03 短
13 花茎の太さ	03 細
14 花茎の緑色の濃淡	04 やや淡
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	04 やや上位
17 仏炎苞の大きさ	02 かなり小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30241号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	05 広卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	03 円形
23 仏炎苞の先端の形	03 広鋭形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート 52D
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート 49D;144C(裂片下部)
26 仏炎苞の光沢の強弱	05 中
27 仏炎苞の凹凸の強弱	03 弱
28 仏炎苞の横断面の形	02 平
29 仏炎苞の花柄との角度	03 鈍角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	03 短
32 肉穂花序の太さ	04 やや細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	03 弱く内曲

Anthurium Schott
ANTHEUYK

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 肉穂花序の先細りの強弱 36 開やく直前の肉穂花序の基部の主な色 37 開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色 38 開やく直後の肉穂花序の基部の主な色 39 開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色	05 中
	04 桃
	03 橙
	04 桃
	03 橙

1 品種登録の番号及び年月日 第30242号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Anthurium Schott ANTHFABLO

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ANTHFABLO」は、対照品種「ANTHECWIE」と比較して、仏炎苞の光沢の強弱が中であること、肉穂花序の先細りの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Anthura B. V.
Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30242号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	04 やや小
02 葉身の長さ	02 かなり短
03 葉身の幅	03 狭
04 葉身の形	04 やや狭卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	01 鋭
08 葉身の先端の形	05 鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉身の表面の凹凸の強弱	05 中
11 葉柄の長さ	03 短
12 花茎の長さ	04 やや短
13 花茎の太さ	03 細
14 花茎の緑色の濃淡	05 中
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	04 やや上位
17 仏炎苞の大きさ	03 小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30242号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	05 広卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	03 円形
23 仏炎苞の先端の形	06 広鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート 44B
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート 44D
26 仏炎苞の光沢の強弱	05 中
27 仏炎苞の凹凸の強弱	04 やや弱
28 仏炎苞の横断面の形	01 内曲
29 仏炎苞の花柄との角度	02 直角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	03 短
32 肉穂花序の太さ	03 細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	03 弱く内曲

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30242号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 肉穂花序の先細りの強弱 36 開やく直前の肉穂花序の基部の主な色 37 開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色 38 開やく直後の肉穂花序の基部の主な色 39 開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色	06 やや強
	01 白～淡黄
	02 黄
	01 白～淡黄
	02 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第30243号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHFUBE

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ANTHFUBE」は、対照品種「ANTHCUFPA」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色が褐であること等で区別性が認められる。対照品種「RIJN200449」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、仏炎苞の端部の形が鈍形であること、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色が白～淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30243号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	04 やや小
02 葉身の長さ	03 短
03 葉身の幅	04 やや狭
04 葉身の形	04 やや狭卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	01 鋭
08 葉身の先端の形	05 鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉身の表面の凹凸の強弱	05 中
11 葉柄の長さ	04 やや短
12 花茎の長さ	04 やや短
13 花茎の太さ	03 細
14 花茎の緑色の濃淡	07 濃
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	07 強
16 仏炎苞の葉に対する位置	04 やや上位
17 仏炎苞の大きさ	04 やや小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30243号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	05 広卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	02 鈍形
23 仏炎苞の先端の形	06 広鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート 187A
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート 183A
26 仏炎苞の光沢の強弱	07 強
27 仏炎苞の凹凸の強弱	06 やや強
28 仏炎苞の横断面の形	03 外曲
29 仏炎苞の花柄との角度	03 鈍角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	03 短
32 肉穂花序の太さ	04 やや細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	03 弱く内曲

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30243号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 肉穂花序の先細りの強弱 36 開やく直前の肉穂花序の基部の主な色 37 開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色 38 開やく直後の肉穂花序の基部の主な色 39 開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色	05 中
	01 白～淡黄
	07 緑
	01 白～淡黄
	08 褐

1 品種登録の番号及び年月日 第30244号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Anthurium Schott 紅かんざし (ベニカンザシ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「紅かんざし」は、対照品種「RYN2010043」と比較して、仏炎苞の裂片の有無が有であること、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色が黄であること、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
神谷政臣
愛知県刈谷市東境町新林90-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
神谷政臣

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Anthurium Schott
紅かんざし

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	03 小
02 葉身の長さ	01 極短
03 葉身の幅	02 かなり狭
04 葉身の形	03 狭卵形
05 葉身の裂片の有無	01 無
06 葉身の裂片の重なり	
07 葉身の先端部の角度	01 鋭
08 葉身の先端の形	04 狭鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	03 淡
10 葉身の表面の凹凸の強弱	03 弱
11 葉柄の長さ	03 短
12 花茎の長さ	02 かなり短
13 花茎の太さ	01 極細
14 花茎の緑色の濃淡	03 淡
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	01 極下位
17 仏炎苞の大きさ	01 極小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30244号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	02 鈍形
23 仏炎苞の先端の形	06 広鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート N45A
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート N45B;146A(下部)
26 仏炎苞の光沢の強弱	05 中
27 仏炎苞の凹凸の強弱	05 中
28 仏炎苞の横断面の形	02 平
29 仏炎苞の花柄との角度	03 鈍角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	01 極短
32 肉穂花序の太さ	02 かなり細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	05 直

1 品種登録の番号及び年月日 第30245号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees MYAST021

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYAST021」は、対照品種「SAKAST049」と比較して、一次側枝の長さが短であること、外側の舌状花の表面の主な色がN81Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
磯部知里 木下博文 天野良紀

7 出願公表の年月日 令和4年3月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
「松本スカーレット」に「プチパープル」を交配し、選抜したものである。

Callistephus chinensis (L.) Nees
MYAST021

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 株幅	04 やや狭
03 一次側枝の数	03 少
04 二次側枝の数	03 少
05 一次側枝の発生位置	03 主に上部
06 節数	03 少
07 茎のアントシアニンの着色	04 強
08 一次側枝の長さ	03 短
09 一次側枝の主茎に対する角度	02 やや小
10 葉柄の長さ	04 やや短
11 葉身の長さ	03 短
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の長さ／幅	03 低
14 葉身の緑色の濃淡	02 中
15 頭花の型	03 八重
16 舌状花の数	05 中
17 頭花の直径	03 小

Callistephus chinensis (L.) Nees
MYAST021

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頭花の高さ	03 低
19 外側の舌状花の長さ	03 短
20 外側の舌状花の幅	04 やや狭
21 外側の舌状花の長さ／幅	03 低
22 外側の舌状花の形	01 舌状
23 外側の舌状花の縦断面の湾曲	01 内曲
24 外側の舌状花の横断面の形	01 凹形
25 外側の舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N81A
26 外側の舌状花の表面の二次色	
27 外側の舌状花の表面の二次色の分布	01 無
28 外側の舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート N81B
29 内側の舌状花の形（八重品種に限る。）	01 舌状
30 内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）	01 内曲
31 内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）	01 凹形
32 内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）	RHSカラーチャート N81A
33 内側の舌状花の表面の二次色（八重品種に限る。）	
34 内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）	01 無

Callistephus chinensis (L.) Nees
MYAST021

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 2 4 5 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30246号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST059

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKAST059」は、対照品種「福陽」と比較して、葉柄の長さが中であること、頭花の直径が大であること、外側の舌状花の表面の主な色が67Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤智博

7 出願公表の年月日 令和4年5月13日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 株幅	04 やや狭
03 一次側枝の数	03 少
04 二次側枝の数	03 少
05 一次側枝の発生位置	01 主に下部
06 節数	04 やや少
07 茎のアントシアニンの着色	03 中
08 一次側枝の長さ	05 中
09 一次側枝の主茎に対する角度	02 やや小
10 葉柄の長さ	05 中
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の長さ／幅	03 低
14 葉身の緑色の濃淡	02 中
15 頭花の型	03 八重
16 舌状花の数	06 やや多
17 頭花の直径	07 大

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頭花の高さ	08 かなり高
19 外側の舌状花の長さ	05 中
20 外側の舌状花の幅	06 やや広
21 外側の舌状花の長さ／幅	03 低
22 外側の舌状花の形	01 舌状、02 さじ状 (01舌状 (一次);02さじ状 (二次))
23 外側の舌状花の縦断面の湾曲	01 内曲
24 外側の舌状花の横断面の形	01 凹形
25 外側の舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 67A
26 外側の舌状花の表面の二次色	
27 外側の舌状花の表面の二次色の分布	01 無
28 外側の舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート 71B
29 内側の舌状花の形 (八重品種に限る。)	01 舌状
30 内側の舌状花の縦断面の湾曲 (八重品種に限る。)	01 内曲
31 内側の舌状花の横断面の形 (八重品種に限る。)	01 凹形
32 内側の舌状花の表面の主な色 (八重品種に限る。)	RHSカラーチャート 67B
33 内側の舌状花の表面の二次色 (八重品種に限る。)	
34 内側の舌状花の表面の二次色の分布 (八重品種に限る。)	01 無

SAKAST059

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30246号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30247号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. PLANOV014

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「PLANOV014」は、対照品種「KLEDG18267」と比較して、花卉の主な色がNN78Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plantinova SL

Rafael Martinez Valls, 16 08348 Cabrils, Barcelona, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lena Thiede

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
PLANOV014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	02 かなり低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	03 短
10 茎の太さ	03 細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
PLANOV014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	04 やや短
30 がくの幅	02 かなり狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	03 中
34 がくのアントシアニン着色の分布	03 がく全体

Dianthus caryophyllus L.
PLANOV014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	03 小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	02 かなり少
40 花冠の高さ	02 かなり低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	06 やや深
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	03 狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN78B
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 71A

Dianthus caryophyllus L.
PLANOV014

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30247号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	03 中
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	05 倒卵形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30248号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. ミルキーリップ (ミルキーリップ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ミルキーリップ」は、対照品種「パティシエール」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること等で区別性が認められる。対照品種「さくらフロマージュ」と比較して、がくの形が鐘形であること、花冠下部の側面の形が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋睦宏 斉藤貴文 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「プラムタルト」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
ミルキーリップ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	05 中
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	03 短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
ミルキーリップ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	03 鋭尖
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	03 鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
ミルキーリップ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート N57C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート NN155D

Dianthus caryophyllus L.
ミルキーリップ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	04 広
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30249号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. リトルウィッチ (リトルウィッチ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「リトルウィッチ」は、対照品種「CFPC キャミ」と比較して、葉の長さ
中であること、花卉の二次色が60Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋睦宏 斉藤貴文 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「CFPC キャミ」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
リトルウィッチ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30249号
01 茎の長さ		
02 草丈	03 低	
03 植物体の粗密	03 密	
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上	
05 つばみ又は花のない側枝の有無		
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数		
07 花房形成した側枝の割合		
08 節間の数		
09 節間の長さ	02 かなり短	
10 茎の太さ	04 やや細	
11 茎の横断面の形	02 やや角張る	
12 茎の中空の有無	01 無	
13 葉の形	03 線形	
14 葉の長さ	05 中	
15 葉の幅	03 狭	
16 葉の巻き	03 反曲	
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹	

Dianthus caryophyllus L.
リトルウィッチ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	02 かなり狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
リトルウィッチ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30249号
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭	
	03 短	
	02 八重	
	04 やや小	
	03 少	
	03 低	
	03 やや凸	
	02 平	
	03 タイプ3	
	02 中	
	02 中	
	05 鈍鋭混在	
	03 浅	
	04 やや短	
	04 やや狭	
	RHSカラーチャート NN155D	
	RHSカラーチャート 60A	

Dianthus caryophyllus L.
リトルウィッチ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	03 中
53 花弁の条の多少	03 中
54 花弁の斑点の多少	02 少
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30250号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. ハニーハント (ハニハント)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ハニーハント」は、対照品種「ルミナリア」と比較して、花卉の主な色が1Cであること、花卉の二次色がN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋睦宏 斉藤貴文 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ルミナリア」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
ハニーハント

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	04 強い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
ハニーハント

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	02 かなり狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
ハニーハント

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	04 タイプ 4
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 1C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート N155C

Dianthus caryophyllus L.
ハニーハント

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	03 中
53 花弁の条の多少	02 少
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	04 黄
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30251号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. SAKCAR113

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKCAR113」は、対照品種「BARSALE」と比較して、ほう葉の外裂片の先端の長さが長であること、花卉の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイポットアモーレ」と比較して、ほう葉の外裂片の先端の長さが長であること、花卉の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「スイートジュエル」と比較して、花冠下部の側面の形が凹であること、花卉の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	03 低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	04 長
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	03 中
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	03 強
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	04 やや浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 62A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30252号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. 海老名 MK 3号 (エビナ MK 3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「海老名 MK 3号」は、対照品種「サキーネベビーピンク」と比較して、ほう葉の外裂片のがくに対する密着度が密着であること、花卉の切れ込みの深さがやや深であること、花卉の条の多少が中であること等で区別性が認められる。対照品種「海老名 MK 2号」と比較して、花卉の切れ込みの深さがやや深であること、花卉の覆輪部の幅が無であること、花卉の条の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

菅野政夫

神奈川県茅ヶ崎市萩園1649-11

菅野雅子

神奈川県茅ヶ崎市萩園1649-11

6 登録品種の育成をした者の氏名

菅野政夫 菅野雅子

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.

海老名 MK 3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	03 短
10 茎の太さ	03 細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	03 反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.

海老名 MK 3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	05 倒卵形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	04 やや短
30 がくの幅	02 かなり狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.

海老名 MK 3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	03 小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	03 多
46 花弁の縁の形	04 鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	06 やや深
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 62A
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 69D

Dianthus caryophyllus L.

海老名 MK 3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	03 中
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	05 倒卵形
60 子房の下部の色	02 黄系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 0 2 5 3 号 令和 6 年 6 月 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus L. KLEDP19309

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KLEDP19309」は、対照品種「PEMAN PV 4」と比較して、がくのアントシアニンの着色が強であること、花卉の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Lena Thiede Nils Klemm

7 出願公表の年月日 令和 2 年 1 1 月 1 0 日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus L.
KLEDP19309

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	03 低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	03 短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	03 角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus L.
KLEDP19309

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	01 弱
20 葉の縁の繊毛の有無	09 有
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	04 やや短
30 がくの幅	01 極狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	04 強
34 がくのアントシアニン着色の分布	03 がく全体

Dianthus L.
KLEDP19309

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	01 一重
38 花の直径	03 小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	
40 花冠の高さ	02 かなり低
41 花冠上部の側面の形	02 平
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	04 タイプ 4
44 花弁の波打ち	03 強
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 72A
51 花弁の二次色	

Dianthus L.
KLEDP19309

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	03 緑
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし
66 開花期	02 かなり早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30254号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Eryngium L. Kolmblula

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Kolmblula」は、対照品種「ビッグブルー」と比較して、花の数がやや多
であること等で区別性が認められる。対照品種「E. planum」と比較して、総ほう片の
着生角度が斜上であること、頭状花序の高さがやや高であること等で区別性が認められ
る。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Kolster Holding B.V.
Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Peter R. Kolster

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Eryngium L.
Kolmbulula

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 節間長	05 中
03 茎の太さ	02 やや細
04 茎の下部の色	01 淡緑
05 茎の上部の色	01 淡緑
06 一次側枝基部の高さ／草丈	04 やや小
07 一次側枝の数	04 やや少
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	05 中
10 葉身の形	02 掌状
11 葉身の表面の色	RHSカラーチャート NN137A
12 葉身の葉脈の色	RHSカラーチャート N155A
13 葉身の裏面の色	01 淡緑
14 葉縁の切れ込みの深さ	07 深
15 葉縁のとげの数	07 多
16 葉縁のとげの強弱	05 中
17 頂花の位置	05 中

Eryngium L.
Kolmbulula

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 総状花序の長さ	03 短
19 総状花序の幅	04 やや狭
20 花の数	06 やや多
21 花柄の長さ	05 中
22 花柄の太さ	02 やや細
23 花柄の色	04 紫
24 総ほう片の着生角度	01 斜上
25 総ほう片の大きさ	02 かなり小
26 総ほう片の数	05 中
27 総ほう片の形	03 線形
28 総ほう片の縁の形	03 欠刻鋸歯状
29 総ほう片の色	RHSカラーチャート 94B
30 総ほう片の葉脈の色	RHSカラーチャート 94D
31 総ほう片の切れ込みの数	06 やや多
32 頭状花序の高さ	06 やや高
33 頭状花序の直径	04 やや小
34 頭状花序の形	01 卵形

Kolmbulula

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 2 5 4 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30255号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 鹿児島6号 (カコシマ6コウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「鹿児島6号」は、対照品種「さがほのか」と比較して、果柄の長さが極長であること、第1番果と第2番果の果形の差が中であること等で区別性が認められる。対照品種「あまおとめ」と比較して、第1番果と第2番果の果形の差が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鹿児島県
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中義弘 藤崎成博 桑鶴紀充 永田茂穂 竹牟禮穰 永吉実孝 橋口健一郎 古
江広治 福元伸一

7 出願公表の年月日 平成30年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
「かおり野」に「紅ほっぺ」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
鹿児島6号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	05 中
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	09 極大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
鹿児島6号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	09 極長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
22 花の数	07 多
23 果柄の長さ	09 極長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	07 大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
鹿児島6号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	08 かなり大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	05 中
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	02 落ち込み中
46 そう果の密度	01 粗
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	02 弱
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがく片の大きさ	04 やや大
51 果実からのへた離れの難易	07 難

Fragaria L.
鹿児島6号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	07 硬
53 果肉の色	02 淡桃
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	03 早
57 果実の成熟期	03 早
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	08 かなり高
60 酸度	04 やや低
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30256号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 栃木iW1号 (トチギ iW1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「栃木iW1号」は、対照品種「和田初こい」と比較して、果実の形が楔形であること、果実の成熟期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「あそのこゆき」と比較して、頂小葉の基部の形が鈍角であること、果実の形が楔形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
栃木県
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名
中西達郎 鶴見理沙 大橋隆 石原良行

7 出願公表の年月日 平成30年4月24日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統に育成系統を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
栃木iW1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 葉の粗密	05 中
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	07 大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	02 鈍角
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

Fragaria L.
栃木iW1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	06 やや長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花の数	07 多
23 果柄の長さ	07 長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	02 やや横長
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
栃木iW1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	06 やや大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	09 楔形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	01 黄白
40 果皮の着色のむらの強弱	02 弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	03 狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	04 強
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがく片の大きさ	02 やや小
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
栃木iW1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	01 白
54 果心の色	01 白
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	04 やや早
57 果実の成熟期	04 やや早
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	08 かなり高
60 酸度	05 中
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30257号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 栃木i37号 (トキ`i37コ`ウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「栃木i37号」は、対照品種「佐賀i5号」と比較して、花の数がかかなり少であること、果実の成熟期が極早であること、酸度がかかなり低であること等で区別性が認められる。対照品種「紅ほっぺ」と比較して、たく葉のアントシアニン着色の強弱が弱であること、果実の形が心臓形であること、果実の成熟期が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栃木県
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林泰弘 重野貴 大橋隆 畠山昭嗣 飯村一成 中西達郎 植木正明 豊田明奈
永嶋麻美 齋藤容徳 鶴見理沙 小島夏実 大橋幸雄

7 出願公表の年月日 平成30年11月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「栃木32号」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
栃木i37号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	05 中
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	06 やや大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	06 やや大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	02 鈍角
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

Fragaria L.
栃木i37号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	06 やや長
20 葉柄の毛じの向き	02 やや上向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	03 弱
22 花の数	02 かなり少
23 果柄の長さ	06 やや長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	02 接する
27 花冠に対するがく片の大きさ	03 大
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
栃木i37号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	07 大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	03 心臓形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	02 落ち込み中
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	01 陥入
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがく片の大きさ	03 同等
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
栃木i37号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	09 極硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	01 極早
57 果実の成熟期	01 極早
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	06 やや高
60 酸度	02 かなり低
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30258号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 安代29-2005 (アシロ29-2005)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「安代29-2005」は、対照品種「07B11 奥 ダブルブルー」と比較して、葉の形が広披針形であること、花冠裂片の表面の色が94Cであること等で区別性が認められる。対照品種「いわてDfG PB-1号」と比較して、茎の長さがやや短であること、葉の形が広披針形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
八幡平市
岩手県八幡平市野駄第21地割170番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋亮 高村祐太郎 鈴木里奈 日影孝志

7 出願公表の年月日 令和3年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	04 やや短
03 茎の太さ	05 中
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
07 茎の節数	04 やや少
08 節間長	04 やや短
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	02 かなり少
11 茎の二節以上の側枝発生数	03 少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	05 中
14 葉の幅	05 中
15 葉の形	03 広披針形
16 葉の横断面の形	01 内曲
17 葉の縦断面の形	03 外反

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30258号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	05 中
21 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	05 中
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	02 かなり少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	04 やや少
27 花型	02 八重
28 花冠の長さ	06 やや長
29 花筒部の直径	06 やや大
30 花冠の形	01 釣鐘形
31 花冠の先端の直径	09 極大
32 花冠の先端の反り	07 外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 94C
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート 94C

Gentiana L.
安代29-2005

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30258号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 94D
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	01 無又は極粗
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	03 粗
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	02 5
42 花冠裂片の長さ	06 やや長
43 花冠裂片の幅	06 やや広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	01 鋭形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	05 中

Gentiana L.
安代29-2005

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	03 漏斗形
	01 狭披針形
	01 完全退化
	09 極晩
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30259号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 安代29-2030 (アシロ29-2030)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「安代29-2030」は、対照品種「07B11 奥 ダブルブルー」と比較して、葉の形が披針形であること、花冠裂片の表面の色が96Cであること等で区別性が認められる。対照品種「いわてDfG PB-1号」と比較して、葉の形が披針形であること、花冠裂片の表面の色が96Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
八幡平市
岩手県八幡平市野駄第21地割170番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋亮 高村祐太郎 鈴木里奈 日影孝志

7 出願公表の年月日 令和3年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.
安代29-2030

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	05 中
03 茎の太さ	04 やや細
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	05 中
08 節間長	05 中
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	02 かなり少
11 茎の二節以上の側枝発生数	04 やや少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	05 中
14 葉の幅	05 中
15 葉の形	04 披針形
16 葉の横断面の形	01 内曲
17 葉の縦断面の形	02 水平

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30259号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	05 中
21 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	03 少
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	02 かなり少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	05 中
27 花型	02 八重
28 花冠の長さ	06 やや長
29 花筒部の直径	07 大
30 花冠の形	01 釣鐘形
31 花冠の先端の直径	09 極大
32 花冠の先端の反り	07 外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 96C
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート 96C（上部）、97D（下部）

Gentiana L.
安代29-2030

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 97A
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	05 中
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	03 粗
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	03 粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	02 5
42 花冠裂片の長さ	06 やや長
43 花冠裂片の幅	07 広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	01 鋭形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	05 中

Gentiana L.
安代29-2030

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	03 漏斗形
	01 狭披針形
	01 完全退化
	09 極晩
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30260号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 安代29-2059 (アシロ29-2059)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「安代29-2059」は、対照品種「06P1 奥 ダブルピンク」と比較して、葉の形が狭披針形であること、花冠裂片の数が6以上であること等で区別性が認められる。対照品種「ももずきんちゃん」と比較して、花型が八重であること、花冠裂片の表面の色が76Aであること等で区別性が認められる。対照品種「メルヘンアシロ」と比較して、花型が八重であること、花冠裂片の数が6以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
八幡平市
岩手県八幡平市野駄第21地割170番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋亮 高村祐太郎 鈴木里奈 日影孝志

7 出願公表の年月日 令和3年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.
安代29-2059

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	06 やや長
03 茎の太さ	05 中
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	05 中
08 節間長	04 やや短
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	02 かなり少
11 茎の二節以上の側枝発生数	04 やや少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	06 やや長
14 葉の幅	04 やや狭
15 葉の形	05 狭披針形
16 葉の横断面の形	02 水平
17 葉の縦断面の形	02 水平

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30260号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	05 中
21 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	04 やや少
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	02 かなり少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	05 中
27 花型	02 八重
28 花冠の長さ	05 中
29 花筒部の直径	07 大
30 花冠の形	01 釣鐘形
31 花冠の先端の直径	09 極大
32 花冠の先端の反り	09 極外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 76A
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート 77B（上部）、NN155D（下部）

Gentiana L.
安代29-2059

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 76A
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	07 密
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	06 やや密
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	03 6以上
42 花冠裂片の長さ	05 中
43 花冠裂片の幅	08 かなり広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	06 やや大

Gentiana L.
安代29-2059

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	03 漏斗形
	01 狭披針形
	01 完全退化
	09 極晩
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30261号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 安代29-2065 (アシロ29-2065)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「安代29-2065」は、対照品種「06P1 奥 ダブルピンク」と比較して、茎の長さがやや長であること、葉の形が狭披針形であること等で区別性が認められる。対照品種「ももずきんちゃん」と比較して、葉の形が狭披針形であること、花型が八重であること等で区別性が認められる。対照品種「メルヘンアシロ」と比較して、葉の長さが長であること、花型が八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
八幡平市
岩手県八幡平市野駄第21地割170番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋亮 高村祐太郎 鈴木里奈 日影孝志

7 出願公表の年月日 令和3年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.
安代29-2065

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	06 やや長
03 茎の太さ	05 中
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	04 やや少
08 節間長	05 中
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	01 極少
11 茎の二節以上の側枝発生数	04 やや少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	07 長
14 葉の幅	04 やや狭
15 葉の形	05 狭披針形
16 葉の横断面の形	02 水平
17 葉の縦断面の形	02 水平

Gentiana L.
安代29-2065

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30261号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	05 中
21 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	04 やや少
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	03 少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	05 中
27 花型	02 八重
28 花冠の長さ	06 やや長
29 花筒部の直径	06 やや大
30 花冠の形	01 釣鐘形
31 花冠の先端の直径	09 極大
32 花冠の先端の反り	09 極外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート N82B
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート N82B（上部）、 NN155B（下部）

Gentiana L.
安代29-2065

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 76A
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	07 密
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	07 密
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	03 6以上
42 花冠裂片の長さ	05 中
43 花冠裂片の幅	07 広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	05 中

Gentiana L.
安代29-2065

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	03 漏斗形
	01 狭披針形
	01 完全退化
	09 極晩
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30262号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 安代29-2073 (アシロ29-2073)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「安代29-2073」は、対照品種「06P1 奥 ダブルピンク」と比較して、茎の長さがやや長であること、花筒部の直径が大であること等で区別性が認められる。対照品種「ももずきんちゃん」と比較して、花型が八重であること、花筒部の直径が大であること等で区別性が認められる。対照品種「メルヘンアシロ」と比較して、花型が八重であること、花冠裂片の幅が広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
八幡平市
岩手県八幡平市野駄第21地割170番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋亮 高村祐太郎 鈴木里奈 日影孝志

7 出願公表の年月日 令和3年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.
安代29-2073

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	06 やや長
03 茎の太さ	05 中
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	04 やや少
08 節間長	05 中
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	01 極少
11 茎の二節以上の側枝発生数	03 少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	05 中
14 葉の幅	05 中
15 葉の形	04 披針形
16 葉の横断面の形	02 水平
17 葉の縦断面の形	02 水平

Gentiana L.
安代29-2073

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30262号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	05 中
21 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	04 やや少
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	02 かなり少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	05 中
27 花型	02 八重
28 花冠の長さ	05 中
29 花筒部の直径	07 大
30 花冠の形	01 釣鐘形
31 花冠の先端の直径	09 極大
32 花冠の先端の反り	09 極外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート N82C
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート N82C（上部）、 NN155B（下部）

Gentiana L.
安代29-2073

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 76B
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	03 粗
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	06 やや密
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	03 6以上
42 花冠裂片の長さ	05 中
43 花冠裂片の幅	07 広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
50 がく筒の長さ	05 中
51 がく筒の直径	06 やや大

Gentiana L.
安代29-2073

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	03 漏斗形
	01 狭披針形
	01 完全退化
	09 極晩
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30263号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 安代29-2075 (アシロ29-2075)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「安代29-2075」は、対照品種「07B11 奥 ダブルブルー」と比較して、茎の長さがやや長であること、葉の形が披針形であること、花冠裂片の数が6以上であること等で区別性が認められる。対照品種「いわてDfG PB-1号」と比較して、葉の形が披針形であること、花冠裂片の数が6以上であること等で区別性が認められる。対照品種「シャインブルー アシロ」と比較して、花型が八重であること、花筒部の直径が大であること、花冠裂片の数が6以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
八幡平市
岩手県八幡平市野駄第21地割170番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋亮 高村祐太郎 鈴木里奈 日影孝志

7 出願公表の年月日 令和3年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.
安代29-2075

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	06 やや長
03 茎の太さ	04 やや細
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	05 中
08 節間長	04 やや短
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	02 かなり少
11 茎の二節以上の側枝発生数	03 少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	05 中
14 葉の幅	05 中
15 葉の形	04 披針形
16 葉の横断面の形	01 内曲
17 葉の縦断面の形	02 水平

Gentiana L.
安代29-2075

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30263号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	09 有
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
21 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	03 少
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	01 極少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	05 中
27 花型	02 八重
28 花冠の長さ	05 中
29 花筒部の直径	07 大
30 花冠の形	01 釣鐘形
31 花冠の先端の直径	09 極大
32 花冠の先端の反り	09 極外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート N95C
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート N95D（上部）、97C（下部）

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30263号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 96C
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	06 やや密
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	05 中
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	03 6以上
42 花冠裂片の長さ	04 やや短
43 花冠裂片の幅	06 やや広
44 花冠裂片の形	03 広三角形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	06 やや大

Gentiana L.
安代29-2075

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	03 漏斗形
	01 狭披針形
	01 完全退化
	09 極晩
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30264号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 安代29-2076 (アシロ29-2076)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「安代29-2076」は、対照品種「07B11 奥 ダブルブルー」と比較して、花冠裂片の表面の色がN95Cであること、花冠裂片の数が6以上であること等で区別性が認められる。対照品種「いわてDfG PB-1号」と比較して、花冠の先端の直径が極大であること、花冠裂片の数が6以上であること等で区別性が認められる。対照品種「シャインブルー アシロ」と比較して、葉の形が狭披針形であること、花型が八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
八幡平市
岩手県八幡平市野駄第21地割170番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋亮 高村祐太郎 鈴木里奈 日影孝志

7 出願公表の年月日 令和3年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.
安代29-2076

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	06 やや長
03 茎の太さ	04 やや細
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	05 中
08 節間長	05 中
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	02 かなり少
11 茎の二節以上の側枝発生数	04 やや少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	06 やや長
14 葉の幅	04 やや狭
15 葉の形	05 狭披針形
16 葉の横断面の形	01 内曲
17 葉の縦断面の形	02 水平

Gentiana L.
安代29-2076

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30264号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	07 濃
21 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	03 少
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	02 かなり少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	05 中
27 花型	02 八重
28 花冠の長さ	05 中
29 花筒部の直径	07 大
30 花冠の形	01 釣鐘形
31 花冠の先端の直径	09 極大
32 花冠の先端の反り	09 極外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート N95C
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート N95C（上部）、97C（下部）

Gentiana L.
安代29-2076

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 96C
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	07 密
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	03 粗
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	03 粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	03 6以上
42 花冠裂片の長さ	05 中
43 花冠裂片の幅	07 広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	06 やや大

Gentiana L.
安代29-2076

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	03 漏斗形
	01 狭披針形
	01 完全退化
	09 極晩
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30265号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. すみさやか (すみやか)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「すみさやか」は、対照品種「フクユタカ」と比較して、子実のへその色が黄であること、リポキシゲナーゼアイソザイムの有無が全欠であること等で区別性が認められる。対照品種「サチユタカ」と比較して、茎の長さが長であること、リポキシゲナーゼアイソザイムの有無が全欠であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高田 吉丈 小松 邦彦 佐山 貴司 山下 謙一郎 猿田 正恭

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「フクユタカ」に「FKB4L F1」を交配して選抜したものである。

Glycine max (L.) Merr.

すみさやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	05 中
03 伸育型	01 有限
04 分枝の数	06 やや多
05 草姿	03 斜上
06 茎の毛じの色	01 白
07 茎の長さ	07 長
08 茎の節数	07 多
09 葉の表面の凹凸の強弱	
10 小葉の数	01 3枚葉
11 側小葉の形	03 鋭先卵形
12 側小葉の大きさ	05 中
13 葉の緑色の濃淡	
14 花の色	02 紫
15 最下着きょう節位の高さ	05 中
16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）	
17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）	

Glycine max (L.) Merr.
すみさやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）	
19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）	
20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）	
21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）	
22 さやの数	
23 裂きょうの難易	03 易
24 熟さやの色の濃淡	03 淡
25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）	06 やや大
26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）	
27 子実の形	01 球
28 種皮の色数	01 1色
29 種皮の地色	01 黄白
30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	01 無
32 子実のへその色	02 黄
33 胎座残の色	
34 子実の子葉の色	01 黄

Glycine max (L.) Merr.

すみさやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 開花始期	07 晩
36 成熟期	07 晩
37 生態型	03 秋大豆型
38 粗タンパク含有率	06 やや高
39 7Sタンパク質サブユニットの有無	08 全有
40 リボキシゲナーゼアイソザイムの有無	01 全欠
41 ヘソ周辺の着色抵抗性	
42 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A系統)	
43 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A2系統)	
44 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (B系統)	
45 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (C系統)	
46 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (D系統)	
47 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (E系統)	
48 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース1)	
49 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース3)	
50 ハスモンヨトウ抵抗性 (抗生性)	
51 ハスモンヨトウ抵抗性 (非選好性)	

1 品種登録の番号及び年月日 第30266号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. あまはづき (アマハヅキ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「あまはづき」は、対照品種「ベニアズマ」と比較して、茎のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱が弱であること、ネコブセンチュウ抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「べにはるか」と比較して、茎のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、塊根の直径に対する皮層の厚さがかなり薄であること、塊根の肉の主な色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

藏之内利和 田口和憲 西中未央 片山健二 高田明子 中村善行 藤田敏郎

7 出願公表の年月日 令和3年8月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

「からゆたか」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Ipomoea batatas (L.) Lam.

あまはづき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 開張
02 茎の一次側枝の長さ	05 中
03 節間長	05 中
04 茎の太さ	05 中
05 茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
06 茎の先端のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
07 節のアントシアニンの着色	02 弱
08 茎の先端の毛の粗密	02 粗
09 葉身の大きさ	05 中
10 葉身の裂片の数	03 5
11 葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）	
12 葉身の裂片の深さ	01 極浅
13 葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）	02 緑
14 葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）	
15 葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）	
16 葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）	

Ipomoea batatas (L.) Lam.

あまはづき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）	
19 葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）	01 無又は極弱
20 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ	06 やや大
21 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱	03 弱
22 葉身の蜜腺のアントシアニンの着色	07 強
23 新葉の表面の主な色	02 淡緑
24 新葉の裏面の主な色	02 淡緑
25 葉柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
26 葉柄の長さ	07 長
27 花冠の直径	
28 花冠の色	
29 塊根の形	02 楕円形
30 塊根の長さ／幅	05 中
31 塊根の数	05 中
32 塊根の大きさ	06 やや大
33 塊根の直径に対する皮層の厚さ	02 かなり薄
34 塊根の表皮の主な色	07 赤

Ipomoea batatas (L.) Lam.

あまはづき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊根の表皮の主な色 (2)	
36 塊根の表皮の二次色	07 紫
37 塊根の肉の主な色	03 黄
38 塊根の肉の主な色の濃淡	03 濃
39 塊根の肉の二次色	
40 塊根の目の深さ	01 浅
41 蒸しいもの肉の色	06 黄
42 蒸しいもの肉の色 (2)	
43 でん粉の歩留	06 やや高
44 黒斑病抵抗性	04 やや強
45 つる割病抵抗性	04 やや強
46 ネコブセンチュウ抵抗性	05 強

1 品種登録の番号及び年月日 第30267号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. にこまる環1号（ニコマルカンゴウ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「にこまる環1号」は、対照品種「にこまる」と比較して、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、成熟期がやや晩であること、穂発芽性在中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
竹内 善信 田村 克徳 片岡 知守 中西 愛 佐藤 宏之 田村 泰章 黒木 慎
石川 寛 安部 匡

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
「コシヒカリ環1号」に「にこまる」を交配し、「にこまる」を戻し交配したものである。

Oryza sativa L.
にこまる環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	06 やや長
14 葉身の幅	04 やや狭
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
にこまる環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	05 中
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	06 やや太
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	05 中
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	04 やや少
32 芒の有無	01 無
33 初期の芒の色	
34 芒の分布	

Oryza sativa L.
にこまる環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	06 やや晩
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	

Oryza sativa L.
にこまる環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	06 やや大
54 粳の長さ	05 中
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	06 やや大
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	05 中間
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
 にこまる環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	05 中
71 耐倒伏性	04 やや弱
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pii
74 葉いもちほ場抵抗性	06 やや強
75 穂いもちほ場抵抗性	04 やや弱
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	06 やや強
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	01 極低
84 高温登熟性	
85 着粒密度	

1 品種登録の番号及び年月日 第30268号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. たちはるか環1号 (たちるかかん1ごう)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「たちはるか環1号」は、対照品種「たちはるか」と比較して、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。対照品種「あきまさり」と比較して、葉いもちほ場抵抗性が極強であること、穂いもちほ場抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
竹内 善信 田村 克徳 片岡 知守 中西 愛 佐藤 宏之 田村 泰章 黒木 慎
石川 寛 安部 匡

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
「コシヒカリ環1号」に「たちはるか」を交配し、「たちはるか」を戻し交配したものである。

Oryza sativa L.
 たちはるか環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	04 やや狭
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
 たちはるか環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	07 晩
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	06 やや太
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	04 やや短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	05 中
32 芒の有無	01 無
33 初期の芒の色	
34 芒の分布	

Oryza sativa L.
 たちはるか環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	03 褐
38 後期の芒の色	
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	07 晩
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	

Oryza sativa L.
たちはるか環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	06 やや大
54 粳の長さ	06 やや長
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	06 やや大
59 玄米の長さ	06 やや長
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	03 低崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
 たちはるか環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	06 やや難
71 耐倒伏性	07 強
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pii
74 葉いもちほ場抵抗性	09 極強
75 穂いもちほ場抵抗性	07 強
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	04 やや弱
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	01 極低
84 高温登熟性	
85 着粒密度	

1 品種登録の番号及び年月日 第30269号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. しふくのみのもり (シクミリ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「しふくのみのもり」は、対照品種「萌えのみり」と比較して、穂数がやや少であること、葉いもちほ場抵抗性が強であること、高温登熟性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ひとめぼれ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、穂数がやや少であること、耐倒伏性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「ふくひびき」と比較して、穂数がやや少であること、障害型耐冷性の中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田 久稔 山口 誠之 横上 晴郁 津田 直人 藤村 健太郎 福畠 陽 梶 亮太
中込 弘二

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「奥羽406号」に「ふくひびき」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
しふくのみり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	05 中
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	01 立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
しふくのみり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	05 中
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	06 やや太
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	03 短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	04 やや少
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	03 上半分のみ

Oryza sativa L.
しふくのみり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	02 短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	01 1 型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	05 中
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
しふくのみり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	05 中
54 粳の長さ	05 中
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	06 やや広
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	07 完全崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
しふくのみり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	05 中
70 穂発芽性	05 中
71 耐倒伏性	08 かなり強
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pii
74 葉いもちほ場抵抗性	07 強
75 穂いもちほ場抵抗性	07 強
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	05 中
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	03 外国稲型 (Stvb-i)
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現 (酒米品種に限る。)	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	06 やや強
85 着粒密度	

1 品種登録の番号及び年月日 第30270号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. にこまるBL1号 (ニコマルBL1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「にこまるBL1号」は、対照品種「にこまる」と比較して、葉いもちほ場抵抗性が強であること、穂いもちほ場抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、葉いもちほ場抵抗性が強であること、穂いもちほ場抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹内 善信 田村 克徳 片岡 知守 中西 愛 佐藤 宏之 田村 泰章 坂井 真
梶 亮太

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「にこまる」に「みねはるか」を交配し、「にこまる」を5回戻し交配したものである。

Oryza sativa L.
 にこまるBL1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	
14 葉身の幅	
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
 にこまるBL1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	05 中
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	06 やや太
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	05 中
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	05 中
32 芒の有無	01 無
33 初期の芒の色	
34 芒の分布	

Oryza sativa L.
にこまるBL1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	06 やや晩
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	

Oryza sativa L.
 にこまるBL1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	06 やや大
54 粳の長さ	05 中
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	04 低崩壊～中間
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
にこまるBL1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	05 中
71 耐倒伏性	05 中
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pii
74 葉いもちほ場抵抗性	07 強
75 穂いもちほ場抵抗性	06 やや強
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	04 やや弱
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	

1 品種登録の番号及び年月日 第30271号 令和6年6月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pelargonium crispum (P. J. Bergius) L'Her. PACCASSIS

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「PACCASSIS」は、対照品種「PACBLUEBE」と比較して、下部花卉の中央の模様が極大であること等で区別性が認められる。対照品種「PACPERFU」と比較して、草丈がかなり低であること、下部花卉の中央の模様が極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Elsner pac Jungpflanzen GbR
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Pelargonium crispum (P. J. Bergius) L'Her.
PACCASSIS

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30271号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	02 かなり低
02 草丈2	
03 株幅	03 狭
04 葉身の長さ	02 かなり短
05 葉身の幅	03 狭
06 葉身の基部の重なり	01 大きく開く
07 葉身の切れ込み	04 やや浅
08 葉身の周縁部の切れ込み	04 深
09 葉身の斑の有無	01 無
10 葉身の緑色の濃淡	04 やや濃
11 花の長さ	03 短
12 花の長さ2	
13 花の幅	03 狭
14 花の幅2	
15 がく片の長さ	02 短
16 がく片の幅	02 狭
17 小花柄のアントシアニンの着色	02 中

Pelargonium crispum (P. J. Bergius) L'Her.
PACCASSIS

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 上部花弁の周縁部の波打ち	01 無又は極弱
19 上部花弁の周縁部の主な色	RHSカラーチャート 75A
20 上部花弁の周縁部と中間部の間の主な色	RHSカラーチャート 187C
21 上部花弁の中間部の主な色	RHSカラーチャート 187A
22 上部花弁の中央の模様	09 極大
23 上部花弁の基部の複色部	01 無又は極小
24 上部花弁の基部の複色部の色	
25 下部花弁の周縁部の主な色	RHSカラーチャート 75B
26 下部花弁の周縁部と中間部の間の主な色	RHSカラーチャート 187C
27 下部花弁の中間部の主な色	RHSカラーチャート 187A
28 下部花弁の中央の模様	09 極大
29 下部花弁の基部の複色部	02 小
30 下部花弁の基部の複色部の色	RHSカラーチャート 75B