

1 品種登録の番号及び年月日 第30405号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. シューメロン (シュメロン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「シューメロン」は、対照品種「ZEMBLA BRASIL」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、頭花の直径（摘らいしたもの）がかなり小であること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の10月咲き黄色デコラ咲きスプレー系統にスプレー系混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
シュューメロン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30405号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 4A
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	02 かなり小
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	04 やや低
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	02 船底状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	03 強い凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部から1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	06 やや強
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 3A
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 142A
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	01 縁部
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

Chrysanthemum L.

シュューメロン

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
69	舌状花の表面の三次色	
70	舌状花の表面の三次色の分布	
71	舌状花の表面の三次色の分布2	
72	舌状花の表面の三次色の型	
73	舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74	舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 4A;144B(縁部)
75	舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 5B;144D(縁部)
76	舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 4A;144D(縁部)
77	花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78	花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79	花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80	花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81	花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82	花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83	花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84	花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85	花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

シュューメロン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に 限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	05 中
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

シューマロン

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質

07 斜下

1 品種登録の番号及び年月日 第30406号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 秀みせん (シュミセン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「秀みせん」は、対照品種「秀あずまや」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「精あやすぎ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること、舌状花の表面の主な色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
「いろり」に10月咲き赤色小菊系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.

秀美せん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	04 やや低
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	03 強
17 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃

Chrysanthemum L.
 秀みせん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19 葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
20 葉の裏面の色（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	03 浅
23 花序の形（叢生でない品種に限る）	02 深いドーム形
24 花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	03 斜上
27 一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	05 中
28 株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 186A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	01 デイジー
32 頭花の直径（摘らいしていないもの）	03 小
33 頭花の直径（摘らいしたもの）	
34 頭花の高さ（摘らいしていないもの）	03 低

Chrysanthemum L.

秀美せん

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）		
36 頭花の花柄の長さ	02	かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02	かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	02	かなり少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）		
40 頭花の舌状花の形の数	01	1
41 頭花の舌状花の主要な形	01	舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形		
43 頭花の舌状花の三次的な形		
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03	斜上
45 舌状花の表面の状態	03	キール
46 舌状花のキールの数	02	2
47 舌状花の花筒の長さ	03	短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07	わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2		
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05	弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06	先端部から1/2まで

Chrysanthemum L.

秀美せん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 61A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30406号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN74C;N155B(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 61A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN74C;N155B(基部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	05 中
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

秀みせん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に 限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
秀美せん

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30406号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）		
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）		
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）		
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）		
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）		
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）		
109 舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）		
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03 浅	

1 品種登録の番号及び年月日 第30407号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 秀こらん (シュウコラン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「秀こらん」は、対照品種「精黄すだれ」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の一次欠刻の深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「長崎AYC1」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
「秀やよみ」に10月咲黄色小菊系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.

秀こらん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	02 かなり小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	05 中
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃

Chrysanthemum L.

秀こらん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19 葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
20 葉の裏面の色（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形（叢生でない品種に限る）	04 散房花序型
24 花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	03 斜上
27 一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 12A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	01 デイジー
32 頭花の直径（摘らいしていないもの）	03 小
33 頭花の直径（摘らいしたもの）	
34 頭花の高さ（摘らいしていないもの）	03 低

Chrysanthemum L.

秀こらん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.

秀こらん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部から1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 弱
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 6A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.

秀こらん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 6C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 6A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 6C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	05 中
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	02 平
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

秀こらん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

秀こらん

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質

03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第30408号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 秀かんらい (シュカンライ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「秀かんらい」は、対照品種「秀いおり」と比較して、舌状花の表面の状態がキールであること、舌状花の花筒の長さがやや短であること、舌状花の表面の主な色が3Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和4年1月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
「秀マリオ」に11月咲黄色小菊系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.

秀かんらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	04 やや低
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃

Chrysanthemum L.

秀かんらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	05 中
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 6A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

Chrysanthemum L.

秀かんらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	04 やや短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.

秀かんらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 3A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.

秀かんらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 4B;145A(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 3A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 4B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	07 大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

秀かんらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	07 8.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

秀かんらい

第30408号

03 浅

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30409号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. シューレッドセレモニー (シュレッドセレモニー)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「シューレッドセレモニー」は、対照品種「セイジュテ」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）が中であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイリップ」と比較して、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が斜上であること、舌状花の表面の状態がうね状であること、舌状花の裏面の色が84Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一
- 7 出願公表の年月日 令和3年11月22日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「シューセレモニー」の変異株である。

Chrysanthemum L.
シューレットセレモニー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	05 水平
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	03 短
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 186C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部から1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部から1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 75A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 84C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75A;NN155C(基部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 84C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）		
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）		05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2		
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）		
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）		
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）		
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）		
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）		06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2		
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）		
96 開花習性		03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晩性		
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）		
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）		
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）		
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）		
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）		

Chrysanthemum L.
シューレツドセレモニー

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30409号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30410号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. シューチェリオ (シュチェリオ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「シューチェリオ」は、対照品種「セイスピース」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、花らの外面の色が65Cであること等で区別性が認められる。対照品種「DELIBONBON」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
「モモコ」に10月咲ポンponsプレー系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
シューチェリオ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	01 広がる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
シューチェリオ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19 葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
20 葉の裏面の色（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	04 やや少
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形（叢生でない品種に限る）	
24 花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	
25 花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	
26 花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	
27 一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	
28 株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 65C
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	
32 頭花の直径（摘らいしていないもの）	
33 頭花の直径（摘らいしたもの）	02 かなり小
34 頭花の高さ（摘らいしていないもの）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	03 低
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	08 かなり密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	03 強い凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	02 基部から1/2まで

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部から1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 75D
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 69D
66 舌状花の表面の二次色の分布	05 基部3/4
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	02 ぼかし

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
69	舌状花の表面の三次色	
70	舌状花の表面の三次色の分布	
71	舌状花の表面の三次色の分布2	
72	舌状花の表面の三次色の型	
73	舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74	舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 69D;75C(先端)
75	舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 155C;69B(縁部)
76	舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 155C;72D(先端部)
77	花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78	花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79	花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80	花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81	花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82	花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83	花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84	花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85	花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に 限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	05 中
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

シューチェリオ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30410号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30411号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 琉の彩美 (リュウノアヤビ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「琉の彩美」は、対照品種「太陽のあさひ」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の先端の形が尖るであること、舌状花の裏面の色がN66D;NN155C(基部)であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県農業協同組合
沖縄県那覇市壺川2-9-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
徳元清春
- 7 出願公表の年月日 令和4年5月6日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の交雑種に「琉のあやか」を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
琉の彩美

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	03 円筒形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	02 かなり小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	05 中
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 187D
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	01 極少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 64B
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート NN155D
66 舌状花の表面の二次色の分布	08 基部
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート N66D;NN155C(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 64B;NN155D(基部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N66D;NN155C(基部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	05 中
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	02 平
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
琉の彩美

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 0 4 1 1 号
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る） 104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る） 105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る） 106 管弁の玉卷きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る） 107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る） 108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る） 109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る） 110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）		

1 品種登録の番号及び年月日 第30412号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. DLFILVIL2

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFILVIL2」は、対照品種「太陽のレモンフリップ」と比較して、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の表面の主な色が155Bであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
「DLFILVIA」の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	02 かなり小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	03 強
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 5D
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	03 少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 155B
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155A
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 155B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	05 強いドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFILVIL2

登 録 番 号

登録品種の植物体の特性記録部

第30412号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30413号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. Dochryjamai
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「Dochryjamai」は、対照品種「ZEMBLA BRASIL」と比較して、舌状花の縦断面の形状が外反であること、舌状花の表面の二次色が154Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Jos Kester
- 7 出願公表の年月日 令和4年3月30日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
Dochryjamai

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	09 極高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	06 やや大
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	03 強
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

Chrysanthemum L.
Dochryjamai

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	05 中
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	06 やや大
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	03 斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 150A
30 頭花の型	04 露心する八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

Chrysanthemum L.
Dochryjamai

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	06 やや多
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	06 外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	01 内曲
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 1A
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 154C
66 舌状花の表面の二次色の分布	01 先端
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 1C;154A(先端部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 3B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 2C;154B(先端部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
Dochryjamai

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Dochryjama i

第30413号

05 水平

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30414号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 精かずま (セカズマ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「精かずま」は、対照品種「けしき」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、葉の基部の形が円形であること、花らの外面の色が9Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久
- 7 出願公表の年月日 令和4年5月13日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の10月中下旬咲き黄色一重系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.

精かずま

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	07 長
09 葉の長さ	07 長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	03 強
17 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃

Chrysanthemum L.

精かずま

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19 葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
20 葉の裏面の色（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形（叢生でない品種に限る）	04 散房花序型
24 花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 9B
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	01 デイジー
32 頭花の直径（摘らいしていないもの）	03 小
33 頭花の直径（摘らいしたもの）	
34 頭花の高さ（摘らいしていないもの）	03 低

Chrysanthemum L.

精かずま

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	01 極少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	03 短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 6A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 3B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 6A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 3B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	05 中
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

精かずま

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に 限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

精かずま

第30414号

03 浅

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30415号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. Dochryballer
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Dochryballer」は、対照品種「セイジユテ」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Jos Kester
- 7 出願公表の年月日 令和4年6月20日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
Dochryballe

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	05 中
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 70B
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	09 極長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	04 窪む
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N74C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30415号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N74C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に 限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Dochryballe

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30415号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30416号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. Dochrymaki

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Dochrymaki」は、対照品種「DLFPER11」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数がやや多であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種「レサイバーピンク」と比較して、舌状花の先端の形が窪むであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。対照品種「セイヨランダ」と比較して、舌状花の先端の形が窪むであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 令和4年6月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
Dochrymaki

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30416号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 65C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	03 少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	04 窪む
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 73D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 69D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 69C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N155B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	06 強い円錐状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	09 有
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	02 かなり小
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	RHSカラーチャート N199A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	07 8.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に 限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Dochrymaki

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質

1 品種登録の番号及び年月日 第30417号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFR0FI3

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFR0FI3」は、対照品種「DLFPER11」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の周縁の二次欠刻の数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「セイロココ」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「Victory」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	01 無又は極小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	05 中
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	05 中
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 68A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	06 やや大
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	03 少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	02 かなり弱
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 75C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 69C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
DLFROFI3

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
		第 3 0 4 1 7 号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）		
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）		
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）		
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）		
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）		
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）		
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）		
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03 浅	

1 品種登録の番号及び年月日 第30418号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. KS13307-03

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KS13307-03」は、対照品種「アークティック」と比較して、花卉の縁の形が波状であること、花卉の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ウエストクリスタル」と比較して、節間の長さがやや長であること、花卉の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名
金丸直明

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統に「ベビードール」を交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
KS13307-03

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30418号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	05 中
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	01 4
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
KS13307-03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つぼみの形	05 倒卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
KS13307-03

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30418号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
KS13307-03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30419号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. KS14001-01
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KS14001-01」は、対照品種「シトラス」と比較して、茎の長さが長であること、花冠下部の側面の形が平であること、花卉の主な形がタイプ3であること等で区別性が認められる。対照品種「KLED13A15」と比較して、茎の長さが長であること、子房の表面が平滑であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
金丸直明
- 7 出願公表の年月日 令和2年1月23日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
KS14001-01

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30419号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	07 長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	03 少
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	03 6
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	03 反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
KS14001-01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	01 無又は極短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
KS14001-01

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30419号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	05 中
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 145D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
KS14001-01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	07 晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30420号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. KS14215-03

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KS14215-03」は、対照品種「イヴァナ オレンジ」と比較して、葉の巻きが強い反曲であること、花卉の切れ込みの深さが極浅であること、花卉の二次色がN57Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名
金丸直明

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
KS14215-03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	05 中
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	03 6
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	04 強い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
KS14215-03

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30420号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つぼみの形	05 倒卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
KS14215-03

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30420号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 20C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート N57B

Dianthus caryophyllus L.
KS14215-03

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30420号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	03 中
53 花弁の条の多少	02 少
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	05 桃
66 開花期	07 晩
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30421号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. HYB20D02
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「HYB20D02」は、対照品種「クレオラ」と比較して、花卉の主な色が37Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Hybrida S.R.L.
Strada Villetta 19, 18038 Sanremo, Italy
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Flavio Sapia
- 7 出願公表の年月日 令和2年6月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
HYB20D02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
HYB20D02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	02 やや鋭尖
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	04 やや短
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
HYB20D02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	04 タイプ 4
44 花弁の波打ち	03 強
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	05 中
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 37C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 27C

Dianthus caryophyllus L.
HYB20D02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	03 中
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30422号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresf20175

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresf20175」は、対照品種「クレオラ」と比較して、がくの裂片の縦軸の形が内反であること、花柱の肩の有無が無であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「HYBTUL」と比較して、つぼみの形が円形であること、がくの裂片の縦軸の形が内反であること、花卉の主な色が68Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresf20175

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30422号	
重　　要　　な　　形　　質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	02 楕円形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	03 凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresf20175

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30422号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	02 円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	02 やや鋭尖
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresf20175

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30422号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	07 高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 68B
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 49B

Dianthus caryophyllus L.
Bresf20175

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	04 大
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30423号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Brez2074
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Brez2074」は、対照品種「イヌイト」と比較して、葉の巻きが弱い反曲であること、花柱の肩の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Brez2074

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Brez2074

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	05 倒卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Brez2074

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	05 中
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Brez2074

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	01 卵形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30424号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresh20129
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「Bresh20129」は、対照品種「ブレイエル」と比較して、花卉の切れ込みの深さがかなり浅であること、花柱の数が3～4本であること、柱頭の色が白に赤ぼかしであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20129

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	04 強い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20129

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	02 円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	07 長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20129

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30424号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	05 中
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	05 中
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 58C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート NN155C

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20129

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30424号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	04 大
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	07 晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30425号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresg20174

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresg20174」は、対照品種「BARALCAZAR」と比較して、葉の横断面の形が凹であること、ほう葉の外裂片のがくに対する密着度が離れるであること等で区別性が認められる。対照品種「Bresf1953」と比較して、ほう葉の外裂片のがくに対する密着度が離れるであること、花柱の数が2本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20174

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	08 かなり太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	04 やや狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	03 凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20174

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20174

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	02 かなり短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	07 多
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	03 強
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 56C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20174

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	01 卵形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30426号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresh20308
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresh20308」は、対照品種「ブレセゾ」と比較して、花卉の主な形がタイプ5であること、花卉の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。対照品種「タイソン」と比較して、花卉の縁の切れ込みの多少が中であること、花柱の数が3～4本であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20308

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	08 かなり太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20308

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	01 卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20308

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30426号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	02 かなり短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	05 タイプ5
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート N57A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20308

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	05 桃
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30427号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresf20348

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresf20348」は、対照品種「パドリード」と比較して、花柱の肩の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「Bresf1923」と比較して、花柱の肩の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresf20348

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	07 長
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresf20348

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	02 やや鋭尖
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresf20348

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 43A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresf20348

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	06 赤
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30428号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresh20517
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresh20517」は、対照品種「パスティス」と比較して、花卉の縁の切れ込みの多少が中であること、花卉の切れ込みの深さがやや浅であること、花卉の主な色が4Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20517

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	07 多
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	01 4
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	01 円形
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20517

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	01 平又はわずかに凸
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20517

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30428号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	04 やや浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	03 狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 4B
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20517

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	04 黄
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30429号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresh20523
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「Bresh20523」は、対照品種「アークティック」と比較して、子房の表面が平滑であること、花柱の数が2本であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20523

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	07 多
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20523

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30429号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20523

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30429号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20523

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	07 晩
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30430号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresg20541
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「Bresg20541」は、対照品種「ビームチェリー」と比較して、つぼみの形が長楕円形であること、花卉の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20541

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30430号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	07 多
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20541

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30430号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	01 平又はわずかに凸
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20541

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30430号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート N57A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20541

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30431号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresg20785
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresg20785」は、対照品種「INGU ギャレット」と比較して、二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数が少であること、花卉の二次色がN57Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20785

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	03 少
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20785

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30431号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20785

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30431号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 3D
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート N57B

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20785

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	02 狭
53 花弁の条の多少	02 少
54 花弁の斑点の多少	02 少
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	04 黄
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30432号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresg20823

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresg20823」は、対照品種「ひめかれん」と比較して、茎の太さがやや細であること、花冠下部の側面の形が平であること、開花期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20823

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	03 少
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20823

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20823

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30432号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155D
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 58B

Dianthus caryophyllus L.
Bresg20823

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	02 狭
53 花弁の条の多少	02 少
54 花弁の斑点の多少	02 少
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30433号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresh20866

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresh20866」は、対照品種「シュプール」と比較して、花卉の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ローサディタ」と比較して、つぼみの形が倒卵形であること、花冠下部の側面の形が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20866

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	05 中
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20866

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30433号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つぼみの形	05 倒卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20866

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30433号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 65C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh20866

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	07 晩
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30434号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. NATcle
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「NATcle」は、対照品種「ディープフェイス」と比較して、ほう葉の内裂片の先端の形が鋭尖であること、柱頭の色が白に紫ぼかしであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
SB TALEE DE COLOMBIA SAS
Cl 95 71 31 To 4 Ap 1401, Bogota, D.C., Colombia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Flavio Sapia
- 7 出願公表の年月日 令和2年11月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
NATcle

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
NATcle

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	03 鋭尖
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	03 鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
NATcle

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30434号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	07 多
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 68D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
NATcle

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30435号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARLIJUA

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「BARLIJUA」は、対照品種「BARLEONOR」と比較して、葉の巻きが反曲が極強であること、つぼみの形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「Bresf1953」と比較して、葉の巻きが反曲が極強であること、柱頭の色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S.A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Angel Cano Vicente

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
BARLIJUA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	08 かなり太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	04 やや狭
16 葉の巻き	05 反曲が極強
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
BARLIJUA

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30435号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	02 円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	03 鋭尖
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
BARLIJUA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	07 多
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 65B
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
BARLIJUA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	05 4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	05 桃
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30436号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. BARLEMSA
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「BARLEMSA」は、対照品種「ロブスター」と比較して、葉の幅が狭であること、花卉のぼかしの大きさが無であること、花柱の数が3～4本であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
BARBERET & BLANC, S.A.
Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Emilio Angel Cano Vicente
- 7 出願公表の年月日 令和2年11月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「BARSAHARA」の変異株である。

Dianthus caryophyllus L.
BARLEMSA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	05 中
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
BARLEMSA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	01 緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つぼみの形	05 倒卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
BARLEMSA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 33B
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 40C

Dianthus caryophyllus L.
BARLEMSA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	02 少
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30437号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. カルミナワイン (カルミワイン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「カルミナワイン」は、対照品種「パソドブレ」と比較して、花卉の切れ込みの深さが極浅であること、花卉の主な色がN45Aであること、花柱の肩の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「タンゴ」と比較して、二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数が少であること、花卉の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名
金丸直明

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「カルミナ」の変異株である。

Dianthus caryophyllus L.
カルミナワイン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	03 少
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	03 6
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	02 楕円形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	03 反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
カルミナワイン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	02 弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	01 裂片の周縁

Dianthus caryophyllus L.
カルミナワイン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート N45A
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 65B

Dianthus caryophyllus L.
カルミナワイン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	03 中
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	07 紫
66 開花期	07 晩
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30438号 令和6年9月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. KS14084-02
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「KS14084-02」は、対照品種「フェミニール」と比較して、花卉の縁の形が鈍鋭混在であること等で区別性が認められる。対照品種「ウエストダイヤモンド」と比較して、花柱の肩の有無が有であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
金丸直明
- 7 出願公表の年月日 令和3年1月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
KS14084-02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	05 中
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	01 4
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
KS14084-02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つぼみの形	05 倒卵形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
KS14084-02

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30438号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 65C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
KS14084-02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30439号 令和6年9月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. KS15189-02

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KS15189-02」は、対照品種「Bresel8648」と比較して、葉の横断面の形が弱い凹であること、葉の色が灰緑であること等で区別性が認められる。対照品種「Bresg20541」と比較して、子房の表面がやや肋状であること、開花期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金丸直明

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
KS15189-02

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 0 4 3 9 号
01 茎の長さ 02 草丈 03 植物体の粗密 04 花の位置 05 つぼみ又は花のない側枝の有無 06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数 07 花房形成した側枝の割合 08 節間の数 09 節間の長さ 10 茎の太さ 11 茎の横断面の形 12 茎の中空の有無 13 葉の形 14 葉の長さ 15 葉の幅 16 葉の巻き 17 葉の横断面の形	06 やや長	
	09 有	
	07 多	
	01 無	
	02 5	
	06 やや長	
	05 中	
	02 やや角張る	
	01 無	
	03 線形	
	05 中	
	02 かなり狭	
	01 無又は反曲が極弱	
	02 弱い凹	

Dianthus caryophyllus L.
KS15189-02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	01 平又はわずかに凸
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
KS15189-02

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30439号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート N57B
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
KS15189-02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	