

1 品種登録の番号及び年月日 第30668号 令和7年1月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 福乃香 (フノカ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「福乃香」は、対照品種「神の穂」と比較して、障害型耐冷性がやや強であること、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）が81%以上であること等で区別性が認められる。対照品種「夢の香」と比較して、出穂期がやや晩であること、障害型耐冷性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「蔵の華」と比較して、穂数の中であること、芒の有無が無であること、穂いもちほ場抵抗性がやや弱であること、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）が81%以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福島県  
福島県福島市杉妻町2番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林恭子 大寺真史 濱名健雄 朽木靖之 佐藤淳平 齋藤隆 佐々木園子 菅野史佳 江上宗信 吉田直史 川島史寛 佐藤郁恵 齋藤真一 佐藤弘一 菅野拓朗 渡邊滉士 遠藤わか菜 小林伸英

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「誉富士」に「出羽の里」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.  
福乃香

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 6 6 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱                                    | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                           | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                       | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                       |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                              | 05 中       |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                      | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                 | 03 裂形      |
| 12 葉舌の色                                                 | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                |            |
| 14 葉身の幅                                                 |            |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                            | 02 立～半立    |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                            | 02 立～半立    |
| 17 稈の向き                                                 | 03 半立      |

Oryza sativa L.  
福乃香

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 6 6 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）                                 |            |
| 19 出穂期                                                  | 06 やや晩     |
| 20 雄性不稔性                                                | 01 無       |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 24 柱頭の色                                                 | 01 白       |
| 25 稈の太さ                                                 | 05 中       |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）                                       | 05 中       |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱                                     |            |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 30 穂の主軸の長さ                                              | 05 中       |
| 31 穂数                                                   | 05 中       |
| 32 芒の有無                                                 | 01 無       |
| 33 初期の芒の色                                               |            |
| 34 芒の分布                                                 |            |

Oryza sativa L.  
福乃香

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 6 6 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 最長芒の長さ                                               |            |
| 36 外穎の毛じ                                                | 05 中       |
| 37 外穎先端の色                                               | 01 白       |
| 38 後期の芒の色                                               |            |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                             | 03 垂れる     |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                            | 09 有       |
| 41 穂の二次枝梗の型                                             | 01 1型      |
| 42 穂型                                                   | 02 紡錘形     |
| 43 穂の抽出度                                                | 09 穂軸もよく抽出 |
| 44 成熟期                                                  | 05 中       |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                           | 07 晩       |
| 46 穎の色                                                  | 01 黄白      |
| 47 穎の模様                                                 | 01 無       |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 51 護穎の長さ                                                | 05 中       |

Oryza sativa L.  
福乃香

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 6 6 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 護穎の色                                                 | 01 黄白      |
| 53 粳の千粒重                                                | 08 かなり大    |
| 54 粳の長さ                                                 | 07 長       |
| 55 粳の幅                                                  | 06 やや広     |
| 56 穎のフェノール反応の有無                                         |            |
| 57 穎のフェノール反応による着色の濃淡                                    |            |
| 58 玄米の千粒重                                               | 07 大       |
| 59 玄米の長さ                                                | 06 やや長     |
| 60 玄米の幅                                                 | 06 やや広     |
| 61 玄米の形                                                 | 02 長円形     |
| 62 玄米の色                                                 | 02 淡褐      |
| 63 胚乳の型                                                 | 03 粳       |
| 64 胚乳のアミロース含量                                           | 05 5型      |
| 65 胚乳の色                                                 | 02 白色半透明   |
| 66 精米のアルカリ崩壊性                                           |            |
| 67 玄米の香り                                                | 01 無又は極弱   |
| 68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                      |            |

Oryza sativa L.  
福乃香

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 6 6 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 69 障害型耐冷性                                               | 06 やや強     |
| 70 穂発芽性                                                 | 05 中       |
| 71 耐倒伏性                                                 | 05 中       |
| 72 脱粒性                                                  | 07 難       |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                        | +          |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                            | 06 やや強     |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                            | 04 やや弱     |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                          |            |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                            |            |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                         |            |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                      |            |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                     |            |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                  | 05 81%以上   |
| 82 グルテリン含量                                              |            |
| 83 カドミウム吸収性                                             |            |
| 84 高温登熟性                                                |            |
| 85 着粒密度                                                 | 04 やや粗     |

Oryza sativa L.  
福乃香

| 登 録 番 号                              |            |
|--------------------------------------|------------|
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部          |            |
| 第 3 0 6 6 8 号                        |            |
| 重 要 な 形 質                            | 重要な形質に係る特性 |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      | 87 セシウム吸収性 |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |