

1 品種登録の番号及び年月日 第30784号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia rhizomatous group EC BEGO 1901

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「EC BEGO 1901」は、対照品種「マソニアーナマクラータ」と比較して、葉身の表面の脈上模様の分布が中央であること、花柄の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Eden Collection B.V.

Siepweg 4, 9611TJ, Sappemeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Obed Smit

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30784号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 横走根茎型
02 草丈	06 やや高
03 葉の型	01 単葉
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	05 中
06 葉身の厚さ	07 厚
07 葉身の形(単葉の品種に限る。)	04 腎臓形
08 葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)	02 葉縁
09 葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)	03 閉じる
10 葉身の先端部の形	03 突形
11 葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)	01 無又は極浅
12 葉身の周縁の形	04 鈍鋸歯状
13 葉身の周縁の鋸歯の深さ	01 極浅
14 葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)	02 かなり弱
15 葉身の表面の色数	03 3色
16 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート 143A
17 葉身の表面の二次色	RHSカラーチャート 200B

Begonia rhizomatous group
EC BEGO 1901

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30784号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の二次色の分布	01 周縁部
19 葉身の表面の三次色	
20 葉身の表面の三次色の分布	
21 葉身の表面の模様の有無	01 無
22 葉身の表面の主な模様の型	
23 葉身の表面の主な模様の分布	
24 葉身の表面の主な模様の色	
25 葉身の表面の二次の模様の型	
26 葉身の表面の二次の模様の分布	
27 葉身の表面の二次の模様の色	
28 葉身の表面の脈上模様の有無	09 有
29 葉身の表面の脈上模様の分布	01 中央
30 葉身の表面の脈上模様の幅	03 広
31 葉身の表面の脈上模様の色	08 暗褐
32 葉身の表面の葉底の色	03 黄緑
33 葉身の表面の毛の粗密	08 かなり密
34 葉身の表面の毛の色	05 紫

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30784号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉身の表面の突起の粗密	03 密
36 葉身の凹凸の強弱	01 無又は極弱
37 葉身の表面の葉底からの不定芽の発生の有無	01 無
38 葉身の裏面の主な色	02 淡緑
39 葉身の裏面の二次色	07 赤紫
40 葉身の裏面の主脈の色	02 淡緑
41 葉柄の長さ	04 やや短
42 葉柄の太さ	05 中
43 葉柄の色	06 赤褐
44 葉柄の模様の有無	09 有
45 葉柄の毛の有無	09 有
46 葉柄の毛の色	01 白
47 葉柄の鱗片の着生の有無	01 無
48 花房の向き	01 上向き
49 花柄の長さ	05 中
50 花柄の分枝回数	02 中
51 雄花の花弁の数	02 4

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30784号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 雄花の直径	02 かなり小
53 雄花の表面の色数	01 1色
54 雄花の外花卉の形	05 円形
55 雄花の外花卉の表面の先端部の色	RHSカラーチャート 144C
56 雄花の外花卉の表面の基部の色	RHSカラーチャート 144C
57 雄花の外花卉の裏面の毛状突起の有無	09 有
58 雄花の外花卉の裏面の毛状突起の色	08 赤
59 雄花の内花卉の表面の先端部の色(2弁花を除く。)	RHSカラーチャート N144D
60 雄花の内花卉の表面の基部の色(2弁花を除く。)	RHSカラーチャート N144D
61 やくの色(八重品種を除く。)	01 黄
62 子房の長さ	02 かなり短
63 子房の幅	03 狭
64 子房の中央部の色	05 橙
65 子房の翼の色	08 赤
66 開花習性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30785号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia rhizomatous group EC BEGO 1902

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「EC BEGO 1902」は、対照品種「マッソニアーナ」と比較して、葉身の表面の二次色が200Bであること等で区別性が認められる。対照品種「EC BEGO 1901」と比較して、雄花の外花卉の表面の先端部の色がN144Aであること、子房の中央部の色が赤であること、子房の翼の色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Eden Collection B.V.

Siepweg 4, 9611TJ, Sappemeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Obed Smit

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30785号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 横走根茎型
02 草丈	06 やや高
03 葉の型	01 単葉
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	05 中
06 葉身の厚さ	07 厚
07 葉身の形(単葉の品種に限る。)	04 腎臓形
08 葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)	02 葉縁
09 葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)	03 閉じる
10 葉身の先端部の形	03 突形
11 葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)	01 無又は極浅
12 葉身の周縁の形	04 鈍鋸歯状
13 葉身の周縁の鋸歯の深さ	01 極浅
14 葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)	02 かなり弱
15 葉身の表面の色数	03 3色
16 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート 143A
17 葉身の表面の二次色	RHSカラーチャート 200B

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30785号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の二次色の分布	01 周縁部
19 葉身の表面の三次色	
20 葉身の表面の三次色の分布	
21 葉身の表面の模様の有無	01 無
22 葉身の表面の主な模様の型	
23 葉身の表面の主な模様の分布	
24 葉身の表面の主な模様の色	
25 葉身の表面の二次の模様の型	
26 葉身の表面の二次の模様の分布	
27 葉身の表面の二次の模様の色	
28 葉身の表面の脈上模様の有無	09 有
29 葉身の表面の脈上模様の分布	01 中央
30 葉身の表面の脈上模様の幅	03 広
31 葉身の表面の脈上模様の色	08 暗褐
32 葉身の表面の葉底の色	03 黄緑
33 葉身の表面の毛の粗密	08 かなり密
34 葉身の表面の毛の色	05 紫

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30785号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉身の表面の突起の粗密	03 密
36 葉身の凹凸の強弱	01 無又は極弱
37 葉身の表面の葉底からの不定芽の発生の有無	01 無
38 葉身の裏面の主な色	02 淡緑
39 葉身の裏面の二次色	07 赤紫
40 葉身の裏面の主脈の色	02 淡緑
41 葉柄の長さ	03 短
42 葉柄の太さ	05 中
43 葉柄の色	06 赤褐
44 葉柄の模様の有無	09 有
45 葉柄の毛の有無	09 有
46 葉柄の毛の色	01 白
47 葉柄の鱗片の着生の有無	01 無
48 花房の向き	01 上向き
49 花柄の長さ	05 中
50 花柄の分枝回数	02 中
51 雄花の花弁の数	02 4

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30785号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 雄花の直径	02 かなり小
53 雄花の表面の色数	01 1色
54 雄花の外花弁の形	05 円形
55 雄花の外花弁の表面の先端部の色	RHSカラーチャート N144A
56 雄花の外花弁の表面の基部の色	RHSカラーチャート 144C
57 雄花の外花弁の裏面の毛状突起の有無	09 有
58 雄花の外花弁の裏面の毛状突起の色	08 赤
59 雄花の内花弁の表面の先端部の色(2弁花を除く。)	RHSカラーチャート N144D
60 雄花の内花弁の表面の基部の色(2弁花を除く。)	RHSカラーチャート N144D
61 やくの色(八重品種を除く。)	01 黄
62 子房の長さ	03 短
63 子房の幅	03 狭
64 子房の中央部の色	08 赤
65 子房の翼の色	09 赤紫
66 開花習性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30786号 令和7年3月3日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Begonia rhizomatous group EC BEGO 2009
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「EC BEGO 2009」は、対照品種「ビッグデコラ」と比較して、葉身の表面の色数が2色であること、葉身の表面の主な色がN200Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Eden Collection B.V.
Siepweg 4, 9611TJ, Sappemeer, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Obed Smit
- 7 出願公表の年月日 令和3年6月15日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30786号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 横走根茎型
02 草丈	05 中
03 葉の型	01 単葉
04 葉の長さ	07 長
05 葉の幅	06 やや広
06 葉身の厚さ	07 厚
07 葉身の形(単葉の品種に限る。)	04 腎臓形
08 葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)	02 葉縁
09 葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)	04 僅かに重なる
10 葉身の先端部の形	03 突形
11 葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)	01 無又は極浅
12 葉身の周縁の形	04 鈍鋸歯状
13 葉身の周縁の鋸歯の深さ	01 極浅
14 葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)	02 かなり弱
15 葉身の表面の色数	02 2色
16 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート N200A
17 葉身の表面の二次色	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30786号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の二次色の分布	
19 葉身の表面の三次色	
20 葉身の表面の三次色の分布	
21 葉身の表面の模様の有無	01 無
22 葉身の表面の主な模様の型	
23 葉身の表面の主な模様の分布	
24 葉身の表面の主な模様の色	
25 葉身の表面の二次の模様の型	
26 葉身の表面の二次の模様の分布	
27 葉身の表面の二次の模様の色	
28 葉身の表面の脈上模様の有無	01 無
29 葉身の表面の脈上模様の分布	
30 葉身の表面の脈上模様の幅	
31 葉身の表面の脈上模様の色	
32 葉身の表面の葉底の色	03 黄緑
33 葉身の表面の毛の粗密	08 かなり密
34 葉身の表面の毛の色	05 紫

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30786号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉身の表面の突起の粗密	03 密
36 葉身の凹凸の強弱	01 無又は極弱
37 葉身の表面の葉底からの不定芽の発生の有無	01 無
38 葉身の裏面の主な色	06 赤
39 葉身の裏面の二次色	
40 葉身の裏面の主脈の色	02 淡緑
41 葉柄の長さ	05 中
42 葉柄の太さ	06 やや太
43 葉柄の色	06 赤褐
44 葉柄の模様の有無	09 有
45 葉柄の毛の有無	09 有
46 葉柄の毛の色	01 白
47 葉柄の鱗片の着生の有無	01 無
48 花房の向き	01 上向き
49 花柄の長さ	04 やや短
50 花柄の分枝回数	02 中
51 雄花の花弁の数	02 4

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30786号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 雄花の直径	02 かなり小
53 雄花の表面の色数	01 1色
54 雄花の外花卉の形	02 卵形
55 雄花の外花卉の表面の先端部の色	RHSカラーチャート 144C
56 雄花の外花卉の表面の基部の色	RHSカラーチャート 144C
57 雄花の外花卉の裏面の毛状突起の有無	09 有
58 雄花の外花卉の裏面の毛状突起の色	08 赤
59 雄花の内花卉の表面の先端部の色(2弁花を除く。)	RHSカラーチャート N144D
60 雄花の内花卉の表面の基部の色(2弁花を除く。)	RHSカラーチャート N144D
61 やくの色(八重品種を除く。)	01 黄
62 子房の長さ	02 かなり短
63 子房の幅	03 狭
64 子房の中央部の色	08 赤
65 子房の翼の色	08 赤
66 開花習性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30787号 令和7年3月3日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Begonia rhizomatous group EC BEGO 2010
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「EC BEGO 2010」は、対照品種「ベニツボミ」と比較して、葉柄の長さがやや短であること、雄花の花弁の数が4であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Eden Collection B.V.
Siepweg 4, 9611TJ, Sappemeer, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Obed Smit
- 7 出願公表の年月日 令和3年6月15日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30787号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 横走根茎型
02 草丈	05 中
03 葉の型	01 単葉
04 葉の長さ	07 長
05 葉の幅	06 やや広
06 葉身の厚さ	07 厚
07 葉身の形(単葉の品種に限る。)	04 腎臓形
08 葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)	02 葉縁
09 葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)	04 僅かに重なる
10 葉身の先端部の形	03 突形
11 葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)	01 無又は極浅
12 葉身の周縁の形	04 鈍鋸歯状
13 葉身の周縁の鋸歯の深さ	01 極浅
14 葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)	02 かなり弱
15 葉身の表面の色数	02 2色
16 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート 137A
17 葉身の表面の二次色	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30787号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の二次色の分布	
19 葉身の表面の三次色	
20 葉身の表面の三次色の分布	
21 葉身の表面の模様の有無	01 無
22 葉身の表面の主な模様の型	
23 葉身の表面の主な模様の分布	
24 葉身の表面の主な模様の色	
25 葉身の表面の二次の模様の型	
26 葉身の表面の二次の模様の分布	
27 葉身の表面の二次の模様の色	
28 葉身の表面の脈上模様の有無	01 無
29 葉身の表面の脈上模様の分布	
30 葉身の表面の脈上模様の幅	
31 葉身の表面の脈上模様の色	
32 葉身の表面の葉底の色	03 黄緑
33 葉身の表面の毛の粗密	08 かなり密
34 葉身の表面の毛の色	05 紫

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30787号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉身の表面の突起の粗密	03 密
36 葉身の凹凸の強弱	01 無又は極弱
37 葉身の表面の葉底からの不定芽の発生の有無	01 無
38 葉身の裏面の主な色	02 淡緑
39 葉身の裏面の二次色	07 赤紫
40 葉身の裏面の主脈の色	02 淡緑
41 葉柄の長さ	04 やや短
42 葉柄の太さ	07 太
43 葉柄の色	06 赤褐
44 葉柄の模様の有無	09 有
45 葉柄の毛の有無	09 有
46 葉柄の毛の色	01 白
47 葉柄の鱗片の着生の有無	01 無
48 花房の向き	01 上向き
49 花柄の長さ	04 やや短
50 花柄の分枝回数	02 中
51 雄花の花弁の数	02 4

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30787号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 雄花の直径	02 かなり小
53 雄花の表面の色数	01 1色
54 雄花の外花卉の形	02 卵形
55 雄花の外花卉の表面の先端部の色	RHSカラーチャート 144C
56 雄花の外花卉の表面の基部の色	RHSカラーチャート 144C
57 雄花の外花卉の裏面の毛状突起の有無	09 有
58 雄花の外花卉の裏面の毛状突起の色	08 赤
59 雄花の内花卉の表面の先端部の色(2弁花を除く。)	RHSカラーチャート N144D
60 雄花の内花卉の表面の基部の色(2弁花を除く。)	RHSカラーチャート N144D
61 やくの色(八重品種を除く。)	01 黄
62 子房の長さ	03 短
63 子房の幅	03 狭
64 子房の中央部の色	05 橙
65 子房の翼の色	08 赤
66 開花習性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30788号 令和7年3月3日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Brassica oleracea L. var. acephala DC. 桃子野マーブル4 (モモノマーブル4)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「桃子野マーブル4」は、対照品種「桃子野マーブル」と比較して、外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。）が白（淡桃色を帯びる）であること、着色葉の中心部の主な色がN77Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
高見昌伸
兵庫県加西市別府町甲998-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高見昌伸
- 7 出願公表の年月日 令和3年3月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「桃子野マーブル」の変異株である。

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
 桃子野マール4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 株の直径	02 かなり小
03 着色葉部が株の直径に占める割合	05 中
04 株の中央部の色	RHSカラーチャート N77C
05 腋芽発生の有無	01 無
06 茎の長さ（腋芽を有する品種に限る。）	
07 茎の太さ（腋芽を有する品種に限る。）	
08 外葉の葉柄の長さ	01 無又は極短
09 外葉の葉柄の着生角度	03 斜上
10 外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱	
11 外葉の形	03 倒卵
12 外葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 外葉の周縁の波打ちの粗密	03 粗
14 外葉の中肋の横断面の形	01 半円
15 葉身のろう質の有無	09 有
16 外葉の葉身の横断面の形	01 凹
17 葉身の表面の凹凸	02 かなり少

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
 桃子野マール4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 外葉の斑の有無	09 有
19 外葉の色数	03 3色
20 外葉の色	
21 外葉の色2	01 緑＋紫
22 外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。）	01 白（淡桃色を帯びる）
23 着色葉の形	03 倒卵
24 着色葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
25 着色葉の周縁の波打ちの粗密	03 粗
26 着色葉の周縁の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
27 着色葉の周縁の切れ込みの粗密	04 やや粗
28 着色葉の中肋の横断面の形	01 半円
29 着色葉の葉柄の長さ	01 無又は極短
30 着色葉の中心部の主な色	RHSカラーチャート N77C
31 着色葉の外縁の色	RHSカラーチャート N77C
32 腋芽の外葉の形	
33 腋芽の外葉の周縁の波打ちの強弱	
34 腋芽の葉の色数	

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
 桃子野マール4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 腋芽の外葉の色	
36 腋芽の外葉の色2	
37 腋芽の着色葉の形	
38 腋芽の着色葉の周縁の波打ちの強弱	
39 腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの深さ	
40 腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの粗密	
41 腋芽の着色葉の中心部の主な色	
42 腋芽の着色葉の外縁の色	
43 着色期	05 中
44 抽だい期	04 やや早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30789号 令和7年3月3日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Brassica oleracea L. var. acephala DC. 桃子野マーブル3 (モモノマーブル3)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「桃子野マーブル3」は、対照品種「桃子野マーブル」と比較して、外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。）が白（淡桃色を帯びる）であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
高見昌伸
兵庫県加西市別府町甲998-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高見昌伸
- 7 出願公表の年月日 令和3年3月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「桃子野マーブル」の変異株である。

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
 桃子野マール3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 株の直径	02 かなり小
03 着色葉部が株の直径に占める割合	05 中
04 株の中央部の色	RHSカラーチャート N77B
05 腋芽発生の有無	01 無
06 茎の長さ（腋芽を有する品種に限る。）	
07 茎の太さ（腋芽を有する品種に限る。）	
08 外葉の葉柄の長さ	01 無又は極短
09 外葉の葉柄の着生角度	03 斜上
10 外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱	
11 外葉の形	03 倒卵
12 外葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 外葉の周縁の波打ちの粗密	01 無又は極粗
14 外葉の中肋の横断面の形	01 半円
15 葉身のろう質の有無	09 有
16 外葉の葉身の横断面の形	01 凹
17 葉身の表面の凹凸	03 少

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
 桃子野マーブル3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 外葉の斑の有無	09 有
19 外葉の色数	03 3色
20 外葉の色	
21 外葉の色2	07 灰緑＋紫
22 外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。）	01 白（淡桃色を帯びる）
23 着色葉の形	03 倒卵
24 着色葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
25 着色葉の周縁の波打ちの粗密	03 粗
26 着色葉の周縁の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
27 着色葉の周縁の切れ込みの粗密	04 やや粗
28 着色葉の中肋の横断面の形	01 半円
29 着色葉の葉柄の長さ	01 無又は極短
30 着色葉の中心部の主な色	RHSカラーチャート 70A
31 着色葉の外縁の色	RHSカラーチャート 70A
32 腋芽の外葉の形	
33 腋芽の外葉の周縁の波打ちの強弱	
34 腋芽の葉の色数	

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
 桃子野マーブル3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 腋芽の外葉の色	
36 腋芽の外葉の色2	
37 腋芽の着色葉の形	
38 腋芽の着色葉の周縁の波打ちの強弱	
39 腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの深さ	
40 腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの粗密	
41 腋芽の着色葉の中心部の主な色	
42 腋芽の着色葉の外縁の色	
43 着色期	05 中
44 抽だい期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30790号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. var. acephala DC. 桃子野マーブル5 (モモノマーブル5)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「桃子野マーブル5」は、対照品種「桃子野マーブル」と比較して、外葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「桃子野マーブル3」と比較して、外葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること、外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。）が淡桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高見昌伸

兵庫県加西市別府町甲998-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

高見昌伸

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「桃子野マーブル」の変異株である。

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
 桃子野マール5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 株の直径	02 かなり小
03 着色葉部が株の直径に占める割合	05 中
04 株の中央部の色	RHSカラーチャート N77B
05 腋芽発生の有無	01 無
06 茎の長さ（腋芽を有する品種に限る。）	
07 茎の太さ（腋芽を有する品種に限る。）	
08 外葉の葉柄の長さ	01 無又は極短
09 外葉の葉柄の着生角度	03 斜上
10 外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱	
11 外葉の形	03 倒卵
12 外葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 外葉の周縁の波打ちの粗密	03 粗
14 外葉の中肋の横断面の形	01 半円
15 葉身のろう質の有無	09 有
16 外葉の葉身の横断面の形	01 凹
17 葉身の表面の凹凸	03 少

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
 桃子野マーブル5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 外葉の斑の有無	09 有
19 外葉の色数	03 3色
20 外葉の色	
21 外葉の色2	07 灰緑＋紫
22 外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。）	03 淡桃
23 着色葉の形	03 倒卵
24 着色葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
25 着色葉の周縁の波打ちの粗密	03 粗
26 着色葉の周縁の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
27 着色葉の周縁の切れ込みの粗密	04 やや粗
28 着色葉の中肋の横断面の形	01 半円
29 着色葉の葉柄の長さ	01 無又は極短
30 着色葉の中心部の主な色	RHSカラーチャート 70A
31 着色葉の外縁の色	RHSカラーチャート 70A
32 腋芽の外葉の形	
33 腋芽の外葉の周縁の波打ちの強弱	
34 腋芽の葉の色数	

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
桃子野マーブル5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 腋芽の外葉の色	
36 腋芽の外葉の色2	
37 腋芽の着色葉の形	
38 腋芽の着色葉の周縁の波打ちの強弱	
39 腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの深さ	
40 腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの粗密	
41 腋芽の着色葉の中心部の主な色	
42 腋芽の着色葉の外縁の色	
43 着色期	05 中
44 抽だい期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第30791号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. var. acephala DC. ヨシタンカペラ (ヨシタンカペラ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ヨシタンカペラ」は、対照品種「k-plantsB01」と比較して、株の中央部の色がN79Cであること、外葉の葉柄の長さが無又は極短であること、着色葉の葉柄の長さが無又は極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社Hanayoshi
兵庫県姫路市豊富町御蔭1553番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名

大塩芳弘

7 出願公表の年月日 令和4年3月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
ヨシタンカペラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	03 低
02 株の直径	02 かなり小
03 着色葉部が株の直径に占める割合	03 小
04 株の中央部の色	RHSカラーチャート N79C
05 腋芽発生の有無	01 無
06 茎の長さ（腋芽を有する品種に限る。）	
07 茎の太さ（腋芽を有する品種に限る。）	
08 外葉の葉柄の長さ	01 無又は極短
09 外葉の葉柄の着生角度	03 斜上
10 外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱	
11 外葉の形	03 倒卵
12 外葉の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
13 外葉の周縁の波打ちの粗密	05 中
14 外葉の中肋の横断面の形	01 半円
15 葉身のろう質の有無	01 無
16 外葉の葉身の横断面の形	02 平
17 葉身の表面の凹凸	03 少

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
ヨシタンカペラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 外葉の斑の有無	09 有
19 外葉の色数	02 2色
20 外葉の色	03 緑
21 外葉の色2	
22 外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。）	01 白（紫色を帯びる）
23 着色葉の形	03 倒卵
24 着色葉の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
25 着色葉の周縁の波打ちの粗密	03 粗
26 着色葉の周縁の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
27 着色葉の周縁の切れ込みの粗密	05 中
28 着色葉の中肋の横断面の形	01 半円
29 着色葉の葉柄の長さ	01 無又は極短
30 着色葉の中心部の主な色	RHSカラーチャート N79C
31 着色葉の外縁の色	RHSカラーチャート N79C
32 腋芽の外葉の形	
33 腋芽の外葉の周縁の波打ちの強弱	
34 腋芽の葉の色数	

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
ヨシタンカペラ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30791号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 腋芽の外葉の色	
36 腋芽の外葉の色2	
37 腋芽の着色葉の形	
38 腋芽の着色葉の周縁の波打ちの強弱	
39 腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの深さ	
40 腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの粗密	
41 腋芽の着色葉の中心部の主な色	
42 腋芽の着色葉の外縁の色	
43 着色期	04 やや早
44 抽だい期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30792号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Brassica oleracea L. var. acephala DC. k-plantsB03

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「k-plantsB03」は、対照品種「バニーレッド」と比較して、草丈がかなり低であること、株の中央部の色が154Dであること、着色葉の外縁の色が157C;144Aであること等で区別性が認められる。対照品種「バニーホワイト」と比較して、株の中央部の色が154Dであること、着色葉の中心部の主な色が84Cであること、着色葉の外縁の色が157C;144Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
久保田高生
群馬県伊勢崎市田部井町一丁目1039番地11

6 登録品種の育成をした者の氏名
久保田高生

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「バニーレッド」の変異株である。

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
k-plantsB03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	02 かなり低
02 株の直径	04 やや小
03 着色葉部が株の直径に占める割合	07 大
04 株の中央部の色	RHSカラーチャート 154D
05 腋芽発生の有無	01 無
06 茎の長さ（腋芽を有する品種に限る。）	
07 茎の太さ（腋芽を有する品種に限る。）	
08 外葉の葉柄の長さ	05 中
09 外葉の葉柄の着生角度	05 水平
10 外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
11 外葉の形	02 円
12 外葉の周縁の波打ちの強弱	09 極強
13 外葉の周縁の波打ちの粗密	08 かなり密
14 外葉の中肋の横断面の形	01 半円
15 葉身のろう質の有無	09 有
16 外葉の葉身の横断面の形	01 凹
17 葉身の表面の凹凸	03 少

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
k-plantsB03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 外葉の斑の有無	01 無
19 外葉の色数	01 1色
20 外葉の色	03 緑
21 外葉の色2	
22 外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。）	
23 着色葉の形	03 倒卵
24 着色葉の周縁の波打ちの強弱	09 極強
25 着色葉の周縁の波打ちの粗密	09 極密
26 着色葉の周縁の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
27 着色葉の周縁の切れ込みの粗密	09 極密
28 着色葉の中肋の横断面の形	01 半円
29 着色葉の葉柄の長さ	07 長
30 着色葉の中心部の主な色	RHSカラーチャート 84C
31 着色葉の外縁の色	RHSカラーチャート 157C;144A
32 腋芽の外葉の形	
33 腋芽の外葉の周縁の波打ちの強弱	
34 腋芽の葉の色数	

Brassica oleracea L. var. acephala DC.
k-plantsB03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 腋芽の外葉の色	
36 腋芽の外葉の色2	
37 腋芽の着色葉の形	
38 腋芽の着色葉の周縁の波打ちの強弱	
39 腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの深さ	
40 腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの粗密	
41 腋芽の着色葉の中心部の主な色	
42 腋芽の着色葉の外縁の色	
43 着色期	04 やや早
44 抽だい期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30793号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Choisya x dewitteana Geerinck PM00RE09

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「PM00RE09」は、対照品種「Aztec Pearl」と比較して、葉長（葉柄を含む。）が極長であること、葉幅が極広であること、先端小葉の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「Londaz」と比較して、枝の粗密が粗であること、葉長（葉柄を含む。）が極長であること、先端小葉の長さが極長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Peter Robert Moore

1 Valley View, Longstock, Stockbridge, Hampshire, SO20 6EF, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Robert Moore

7 出願公表の年月日 平成29年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Aztec Pearl」に育成者所有のChoisya dumosaの系統を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	樹姿が直立、枝の粗密が粗
02 植物体の大きさ	樹高が低
03 茎の形状	新しょうの毛の有無が無
04 茎の大きさ	該当なし
05 茎の色彩	該当なし
06 葉の形状	葉長／葉幅の比がやや大、葉の表面の光沢がかなり弱、葉の腺点の有無が有、葉の腺点の粗密がやや密、小葉の主な枚数が5枚、先端小葉の長さ／幅の比が極大、先端小葉の最大幅の位置が先端部、先端小葉の縦断面の形が外反、先端小葉の波打ちが中、先端小葉の先端の形が円形
07 葉の大きさ	葉長（葉柄を含む。）が極長、葉幅が極広、先端小葉の長さが極長、先端小葉の幅が極狭
08 葉の色彩	新葉表面の主な色がN137Aよりわずかに淡い、葉の表面の主な色がN137Aより明るい
09 花の形状	該当なし
10 花の大きさ	花の直径が大
11 花の色彩	花の色がN155CとN155Dの間であり縁に向かって淡くなる
12 果実の形状	該当なし
13 果実の大きさ	該当なし
14 果実の色彩	該当なし
15 種子の形状	該当なし

Choisya x dewitteana Geerinck
PM00RE09

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30793号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30794号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. サザングレイス (サザングレイス)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サザングレイス」は、対照品種「サザンペガサス」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が多であること、頭花の舌状花の形の数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「セイパレット」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が多であること、頭花の舌状花の形の数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鹿児島県
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
南公宗 今給黎征郎 吉水竜次 若松謙一 新屋敷生男

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
サザングレイス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	07 大
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	04 平形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	06 やや大
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート NN155A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	04 やや少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	07 多
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	02 2
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	03 さじ状
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	09 10週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.

サザングレイス

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30794号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30795号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 秀じんき (シュジンキ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「秀じんき」は、対照品種「きらなみ」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがかなり長であること、花盤の断面の形（ダイジー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「しゅうわくら」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、花盤の断面の形（ダイジー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要
「たまぶき」に黄色系小ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.

秀じんき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	04 紫
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	02 かなり短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	08 かなり長
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.

秀じんき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	05 平らな散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	02 かなり狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	05 中
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 9B
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	02 かなり低

Chrysanthemum L.

秀じんき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	01 極少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	02 かなり少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	07 先端部1/4

Chrysanthemum L.

秀じんき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	01 極弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 5A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 8B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 5A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 8B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	03 小
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	05 強いドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

秀じんき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	05 中
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	07 晩
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

秀じんき

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質

03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第30796号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 黄精はちす (キハチス)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「黄精はちす」は、対照品種「精秋はやと」と比較して、茎の色が紫であること、舌状花の表面の主な色が3Dであること等で区別性が認められる。対照品種「精きんたか」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色が3Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久 岩本勝一

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「精はちす」変異株である。

Chrysanthemum L.

黄精はちす

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 7 9 6 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	04 紫
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
黄精はちす

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	08 かなり多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	08 かなり深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	02 かなり狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	05 中
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 3D
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

Chrysanthemum L.
黄精はちす

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	03 少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	07 先端部1/4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	02 かなり弱
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 3D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
黄精はちす

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 2D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 3D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 2D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	05 中
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

黄精はちす

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	05 中
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	08 かなり晩
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

黄精はちす

第30796号

03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第30797号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. セイレウカホワイト (セイレカホイト)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「セイレウカホワイト」は、対照品種「セイイレルダ」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の表面の緑色の濃淡がやや濃であること等で区別性が認められる。対照品種「セイフレイ」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「セイカイラ」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「セイレウカ」の変異株である。

Chrysanthemum L.
セイレウカホホワイト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	06 やや広
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	08 かなり多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	02 かなり少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 155A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	01 基部1/4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイレウカホワイト

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30797号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30798号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. セイリンツ (セイリンツ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「セイリンツ」は、対照品種「セイマオン」と比較して、たく葉の大きさが中であること、花らしい外面の色が7Aであること等で区別性が認められる。対照品種「セイクリミア」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、葉の周縁の二次欠刻の数が極多であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の黄色系一重咲き育成系統に黄色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイリント

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	09 極高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	02 かなり斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	07 長
10 葉の幅	06 やや広
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	09 極多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 7A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 4B
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 4C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 4B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 4C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	01 11週間
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

セイリンツ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30798号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30799号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. セイアルノ (セアル)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「セイアルノ」は、対照品種「セイレウカ」と比較して、葉の基部の形が円形であること、花盤の断面の形（ダイジー型の品種に限る）が窪むであること等で区別性が認められる。対照品種「セイリポル」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系スプーン咲育成系統にスプーン咲系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイアルノ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	07 多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	02 かなり少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 76C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

Chrysanthemum L.
セイアルノ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）		
36 頭花の花柄の長さ		04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）		02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）		03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）		
40 頭花の舌状花の形の数		01 1
41 頭花の舌状花の主要な形		01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形		
43 頭花の舌状花の三次的な形		
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）		02 かなり斜上
45 舌状花の表面の状態		03 キール
46 舌状花のキールの数		02 2
47 舌状花の花筒の長さ		01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）		04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2		
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）		03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）		02 基部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 69D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色		
70 舌状花の表面の三次色の分布		
71 舌状花の表面の三次色の分布2		
72 舌状花の表面の三次色の型		
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）		01 類似する
74 舌状花の裏面の色		RHSカラーチャート N155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）		RHSカラーチャート 69D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）		RHSカラーチャート N155D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）		07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）		
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）		07 大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）		01 窪む
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）		03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2		
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）		01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）		
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）		

Chrysanthemum L.
セイアルノ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 7 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	02 12週間
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

セイアルノ

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30799号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30800号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. SKE190-0202

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SKE190-0202」は、対照品種「精の奏」と比較して、葉の一次欠刻の深さが極深であること、舌状花の表面の主な色が5Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和6年5月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の黄色系八重咲き系統に黄色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
SKE190-0202

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	02 かなり斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	09 極深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 9A
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	05 中
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	04 やや低
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	02 2
41 頭花の舌状花の主要な形	03 さじ状
42 頭花の舌状花の二次的な形	02 舟底状
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	05 中
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	03 強い凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	04 三角形
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	05 中
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 先端部1/2
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 弱
59 舌状花の長さ	07 長
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	06 やや高
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 5A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 5B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 5A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 5B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	07 8.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	02 7月～9月咲き（夏秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	03 少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

SKE190-0202

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30800号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30801号 令和7年3月3日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. CL-華川 (CL-ハナカワ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「CL-華川」は、対照品種「cl-花園」と比較して、弁化した仮雄ずいの主な色が緑白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長谷川康平
茨城県北茨城市華川町小豆畑138
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
長谷川康平
- 7 出願公表の年月日 令和2年7月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「北浜」の変異株である。

Clematis L.
CL-華川

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	05 中
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	02 三出複葉
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	03 狭
09 葉身の形	02 卵形
10 葉身の先端の形	01 鋭先形
11 葉身の基部の形	02 鈍形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の裂片の数	
15 葉身の切れ込みの深さ	
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
CL-華川

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	03 先端部
21 小花柄の長さ	03 短
22 花の向き	01 上向き
23 花型	02 半八重
24 花の直径	06 やや大
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	05 8枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	03 重なる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	06 やや長
31 がく片の幅	05 中
32 がく片の形	05 倒卵形
33 がく片の横断面の形	01 凹形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	05 平

Clematis L.
CL-華川

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	02 2 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 155C
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 145B
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 155C
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 145A
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑

Clematis L.
CL-華川

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	09 有
55 弁化した仮雄ずいの多少	07 多
56 弁化した仮雄ずいの主な色	01 緑白
57 花糸の色	(雄ずいなし)
58 花糸の色2	
59 やくの色	(雄ずいなし)
60 やくの色2	
61 柱頭の色	(雌ずいなし)
62 花柱の色	(雌ずいなし)
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30802号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. アフロディーテ ナナミール (アフロディーテ ナミール)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「アフロディーテ ナナミール」は、対照品種「流星」と比較して、葉型が単葉であること、がく片の表面の主な色が85Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
落合まな
千葉県山武市白幡1619-24 サンファーム201

6 登録品種の育成をした者の氏名
巢山武彦

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「アフロディテエレガフミナ」に「花炎」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
アフロディーテ ナナミール

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 無つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	02 半直立
03 草勢（つる性品種に限る。）	
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	01 単葉
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	04 やや狭
09 葉身の形	06 心臓形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	04 心形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の裂片の数	
15 葉身の切れ込みの深さ	
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
アフロディーテ ナナミール

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	03 先端部
21 小花柄の長さ	06 やや長
22 花の向き	01 上向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	06 やや大
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	04 6～8枚
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	01 離れる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	06 やや長
31 がく片の幅	05 中
32 がく片の形	03 楕円形
33 がく片の横断面の形	01 凹形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	05 平

Clematis L.
アフロディーテ ナナミール

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	02 2 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 85B
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 155C
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 85A
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 155C
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑

Clematis L.
アフロディーテ ナナミール

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N81B
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	04 脈沿い
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	01 白、08 紫
58 花糸の色2	
59 やくの色	09 青紫
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	01 前年伸長枝
64 開花始期	03 早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30803号 令和7年3月3日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. 池田ベル1号（イダベル1ゴウ）
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「池田ベル1号」は、対照品種「籠口」と比較して、草型が無つる性であること等で区別性が認められる。対照品種「麻理」と比較して、がく片の裏面の主な色が93Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
池田毅
長野県下伊那郡松川町生田2572番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
池田毅
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「麻理」の自然交雑実生から選抜したものである。

Clematis L.
池田ベル1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 無つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	01 直立
03 草勢（つる性品種に限る。）	
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	02 かなり粗
06 葉型	01 単葉
07 葉身の長さ	09 極長
08 葉身の幅	06 やや広
09 葉身の形	03 楕円形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	01 鋭形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	01 2
15 葉身の切れ込みの深さ	05 中
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
池田ベル1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	03 先端部
21 小花柄の長さ	04 やや短
22 花の向き	03 下向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	03 小
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	03 壺形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	01 4枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	
29 花の香り	02 弱
30 がく片の長さ	05 中
31 がく片の幅	03 狭
32 がく片の形	06 へら形
33 がく片の横断面の形	01 凹形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	

Clematis L.
池田ベル1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	05 中
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 91C
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155B
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 93C
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 92C
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	01 覆輪状

Clematis L.
池田ベル1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	01 白
58 花糸の色2	
59 やくの色	04 黄
60 やくの色2	
61 柱頭の色	01 白
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	03 当年伸長枝
64 開花始期	09 極晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30804号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. ルノカ (ルカ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ルノカ」は、対照品種「ワレンバーグ」と比較して、花の側面の形（車形の品種に限る。）が凸形であること、がく片の表面の主な色が90Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社及川フラググリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
及川洋磨

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「マリアコーネリア」に「ドミニカ」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
ルノカ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	05 中
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	06 2回羽状複葉
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の形	02 卵形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	02 鈍形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	01 2
15 葉身の切れ込みの深さ	07 深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
ルノカ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	02 中間部
21 小花柄の長さ	06 やや長
22 花の向き	02 横向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	05 中
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	03 凸形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	01 4枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	02 接する
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	05 中
31 がく片の幅	06 やや広
32 がく片の形	04 ひし形
33 がく片の横断面の形	02 平行
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	07 外曲

Clematis L.
ルノカ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	09 有
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	01 極弱
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 90C
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155B
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート N88C
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 155A
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑

Clematis L.
ルノカ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30804号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	04 黄緑
58 花糸の色2	
59 やくの色	02 黄緑、09 青紫
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	07 晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30805号 令和7年3月3日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. ホワイトライト (ホイトライト)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ホワイトライト」は、対照品種「フロリダ」と比較して、葉型が羽状複葉であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社及川フラググリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
及川洋磨
- 7 出願公表の年月日 令和3年3月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「フロリダ」に「流星」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
ホワイトライト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	07 強
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	05 羽状複葉
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の形	02 卵形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	04 心形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	02 3又は4
15 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
ホワイトライト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	02 中間部
21 小花柄の長さ	04 やや短
22 花の向き	01 上向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	05 中
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	03 6枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	01 離れる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	05 中
31 がく片の幅	03 狭
32 がく片の形	03 楕円形
33 がく片の横断面の形	02 平形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	05 平

Clematis L.
ホワイトライト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	01 無又は極弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 157D
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 86C
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	03 点斑
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 155C
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 86C
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	03 点斑

Clematis L.
ホワイトライト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N81B
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	04 脈沿い（先端部側）
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	01 白、08 紫
58 花糸の色2	
59 やくの色	09 青紫
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	07 晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30806号 令和7年3月3日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. ナイトバード (ナイトバード)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ナイトバード」は、対照品種「セム」と比較して、がく片の表面の主な色が83Bであること、柱頭の色が紫であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社及川フラググリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
及川洋磨
- 7 出願公表の年月日 令和3年3月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「フロリダ」に「流星」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
ナイトバード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	07 強
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	05 羽状複葉
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の形	01 披針形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	01 鋭形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	02 3又は4
15 葉身の切れ込みの深さ	07 深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
ナイトバード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	02 中間部
21 小花柄の長さ	05 中
22 花の向き	01 上向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	05 中
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	03 6枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	01 離れる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	05 中
31 がく片の幅	04 やや狭
32 がく片の形	03 楕円形
33 がく片の横断面の形	02 平形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	05 平

Clematis L.
ナイトバード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 83B
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N81A
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	05 先端
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 85A
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N81A
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	04 脈沿い

Clematis L.
ナイトバード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	01 白、08 紫
58 花糸の色2	
59 やくの色	09 青紫
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	01 前年伸長枝
64 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30807号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. マリアラグーン (マリアラグーン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「マリアラグーン」は、対照品種「アラベラ」と比較して、草型がつる性であること等で区別性が認められる。対照品種「きりさめ」と比較して、がく片の形が倒卵形であること、やくの色が黄緑、青紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ルノカ」と比較して、がく片の形が倒卵形であること、がく片の先端部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社及川フラググリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
及川洋磨

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「マリアコーネリア」に「ホーゲルビーホワイト」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
マリアラグーン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	07 強
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	06 2回羽状複葉
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の形	02 卵形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	02 鈍形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	01 2
15 葉身の切れ込みの深さ	07 深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
マリアラグーン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	02 中間部
21 小花柄の長さ	06 やや長
22 花の向き	02 横向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	04 やや小
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	01 凹形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	02 4～6枚
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	01 離れる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	05 中
31 がく片の幅	05 中
32 がく片の形	05 倒卵形
33 がく片の横断面の形	02 平形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	05 平

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	04 鈍形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 90C
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 92C
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	01 1
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 85B
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	

Clematis L.
マリアラグーン

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30807号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	04 黄緑
58 花糸の色2	
59 やくの色	02 黄緑、09 青紫
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30808号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. ノーザンライツ (ノーザンライツ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ノーザンライツ」は、対照品種「流星」と比較して、がく片の裏面の主な色が91Cであること、やくの色が黄緑、青紫であること等で区別性が認められる。対照品種「きりさめ」と比較して、がく片の表面の主な色が91Cであること、やくの色が黄緑、青紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社及川フラググリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
及川洋磨

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ホワイトプリンスチャールズ」に「マリアコーネリア」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
ノーザンライツ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	07 強
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	05 羽状複葉
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	07 広
09 葉身の形	06 心臓形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	04 心形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	02 3又は4
15 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
ノーザンライツ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	02 中間部
21 小花柄の長さ	05 中
22 花の向き	03 下向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	05 中
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	01 4枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	01 離れる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	06 やや長
31 がく片の幅	05 中
32 がく片の形	05 倒卵形
33 がく片の横断面の形	02 平形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	07 外曲

Clematis L.
ノーザンライツ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	09 有
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	01 極弱
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 91C
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 92A
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	04 脈沿い
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	01 1
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 91C
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	

Clematis L.
ノーザンライツ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	04 黄緑
58 花糸の色2	
59 やくの色	02 黄緑、09 青紫
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30809号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cucumis sativus L. 緑夏 (リョッカ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「緑夏」は、対照品種「極光607」と比較して、メロン黄化えそウイルス抵抗性が中度抵抗性であること等で区別性が認められる。対照品種「エクセレント620」と比較して、メロン黄化えそウイルス抵抗性が中度抵抗性であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
株式会社埼玉原種育成会
埼玉県久喜市菖蒲町新堀2616番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
杉山充啓 川頭洋一 下村晃一郎 吉岡洋輔 野口裕司 望月朗 天野政史

7 出願公表の年月日 令和元年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Cucumis sativus L.

緑夏

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 子葉の長さ	04 やや短
02 子葉の幅／長さ	06 やや大
03 子葉の苦み	09 有
04 草姿	02 無限伸育
05 第15節までの主枝の長さ	05 中
06 第1次側枝の節間長	04 やや短
07 第1次側枝の数	07 多
08 葉身の向き	03 下垂
09 葉身の長さ	05 中
10 葉身の先端裂片の長さ／葉身の長さ	05 中
11 葉身の先端裂片の先端部の形	03 鈍
12 葉身の緑色の濃淡	06 やや濃
13 葉身の凹凸の強弱	05 中
14 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 強
15 葉身の周縁の鋸歯の強弱	01 極弱
16 葉柄の長さ	04 やや長
17 雌花の着生期	04 やや早

Cucumis sativus L.

緑夏

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 0 8 0 9 号
18 性表現型	01 混性型	
19 1節当たりの雌花の数	02 主に1～2	
20 子房のとげの色	01 白	
21 単為結果性	09 有	
22 着果習性	02 主枝側枝型	
23 果実の長さ	06 やや長	
24 果実の直径	04 やや小	
25 果実の長さ／直径	06 やや大	
26 果実の直径に対する心部の大きさ	05 中	
27 果肉の厚さ	02 やや薄	
28 果実の横断面の形	02 やや角張	
29 果実の基部の形	03 鈍形	
30 果実の首の長さ（果実の基部の形が首ありの品種に限る。）		
31 果実の中央部と比較した先端側の直径	02 同等	
32 果実の先端部の形	01 鋭形	
33 収穫適期の果実の地色	03 緑	
34 収穫適期の果実の地色の濃淡（収穫適期の果実の地色が白の品種を除く。）	07 濃	

Cucumis sativus L.

緑夏

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 収穫適期の果皮の光沢の強弱	05 強
36 収穫適期の果実の硬さ	04 やや硬
37 果実の稜の強弱	01 無又は弱
38 果実の縫合線	09 有
39 果実のしわの有無	01 無
40 果実のしわの強弱	
41 果実のとげの型	02 柔毛と刺
42 果実のとげの粗密	03 粗
43 果実のとげの色（子房のとげの色が白の品種に限る。）	02 淡褐
44 果実のいぼの有無	09 有
45 果実のいぼの大きさ	03 小
46 果実の縞の長さ	02 かなり短
47 果実の斑点の有無	01 無
48 果実の斑点の分布	
49 果実の斑点の分布の位置	
50 果実の斑点の粗密	
51 果実の白粉	03 弱

Cucumis sativus L.

緑夏

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果柄の長さ	03 短
53 成熟期の果実の地色	02 黄
54 種子の長さ	03 中
55 黒星病抵抗性	
56 キュウリモザイクウイルス抵抗性	
57 うどんこ病抵抗性	
58 べと病抵抗性	
59 褐斑病抵抗性	
60 CVYV抵抗性	
61 ブッキーニ黄斑モザイクウイルス抵抗性	
62 メロン黄化えそウイルス抵抗性	02 中度抵抗性

1 品種登録の番号及び年月日 第30810号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dicentra Bernh. Matthew 001

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Matthew 001」は、対照品種「Alba」と比較して、外花卉の外面の色が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Pink」と比較して、外花卉の外面の色が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「HORDIVAL」と比較して、外花卉の外面の色が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
OSCO GARDEN JAPAN株式会社
東京都あきる野市草花1137-4

6 登録品種の育成をした者の氏名
Matthew Pryce

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のD. spectabilis（在来系統）の実生から選抜したものである。

Dicentra Bernh.
Matthew 001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	03 低
02 株幅	06 やや広
03 葉群の粗密	05 中
04 地上茎の有無	09 有
05 地上茎の太さ	03 細
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の長さ／幅	04 やや小
09 葉身の表面の地色	02 緑
10 葉身の斑の有無	01 無
11 葉身の表面の斑の色	
12 葉身の切れ込みの強弱	03 弱
13 葉身の白粉	01 無又は極弱
14 小葉の裂片の幅	06 やや広
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉柄の色	01 緑
17 花序の型	01 総状花序

Dicentra Bernh.
Matthew 001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 一花序の花数	04 やや少
19 花茎の長さ	03 短
20 花茎の太さ	07 太
21 花茎の色	01 緑
22 花序軸の長さ（根出花茎の品種に限る。）	
23 花の長さ	05 中
24 花の最大幅	06 やや広
25 花の長さ／最大幅	03 小
26 花の最小幅	02 かなり狭
27 花の最大幅／最小幅	07 大
28 がく片の色	RHSカラーチャート 17C
29 外花卉の外面の色	RHSカラーチャート 69B
30 外花卉の先端部の内面の色	RHSカラーチャート 69B
31 外花卉の先端部の長さ	07 長
32 外花卉の先端部の反りの強弱	07 強
33 内花卉の突起部の色	RHSカラーチャート NN155C

1 品種登録の番号及び年月日 第30811号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diospyros L. 紀州あかね (キシウアカネ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「紀州あかね」は、対照品種「紀州てまり」と比較して、雌雄性が雌花、雄花及び両全花混合であること、果皮の色が橙赤であること、果肉の褐斑の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「太秋」と比較して、果皮の色が橙赤であること、果肉の色が橙であること、果肉の褐斑の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県

和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

野中亜優美 古田貴裕 熊本昌平 小松英雄

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「早秋」に「太秋」を交配し、選抜したものである。

Diospyros L.
紀州あかね

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	05 中
02 樹姿	03 開張
03 枝の長さ	06 やや長
04 枝の太さ	05 中
05 節間長	07 長
06 皮目の数	05 中
07 皮目の大きさ	03 小
08 皮目の形	01 楕円形
09 枝の色	04 赤褐
10 芽の形	01 三角形
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	07 広
13 葉の形	02 卵形
14 葉身の基部の形	04 丸
15 葉身の先端の形	02 鋭
16 雌雄性	03 雌花、雄花及び両全花混合
17 雌花の花冠の大きさ	05 中

Diospyros L.
紀州あかね

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 雌花のがくの形	04 正十字形
19 雌花の花冠裂片の数	01 4
20 果実の大きさ	08 かなり大
21 果実の縦断面の形	04 扁円形
22 果実の横断面の形	03 角形
23 果頂部の形	05 凹形
24 果頂の溝の明瞭度	02 中
25 果頂の条紋の明瞭度	01 無又は弱
26 果頂の裂果性	01 無又は弱
27 果実の縦溝の深さ	01 無又は極浅
28 へた部のしわの多少	03 少
29 ていあ側面の形	02 やや下る
30 へた部の溝の有無	01 無
31 へたすき性	01 無又は弱
32 果実に対するへたの大きさ	04 やや小
33 へたの姿勢	02 斜上
34 へた片の幅	05 中

Diospyros L.
紀州あかね

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果柄の長さ	05 中
36 果柄の太さ	06 やや太
37 果皮の色	03 橙赤
38 果皮の色2	
39 果肉の粗密	05 中
40 果肉の硬さ	05 中
41 果肉の色	03 橙
42 果肉の色2	
43 果肉の褐斑の有無	03 有
44 果肉の褐斑の大きさ	05 中
45 種子の大きさ	06 やや大
46 種子の形	02 卵形
47 種子の色	02 褐
48 雌花の開花期	05 中
49 ほう芽期	05 中
50 成熟期	04 やや早
51 成熟期2	

Diospyros L.
紀州あかね

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 甘渋性 53 脱渋の難易	01 完全甘柿

1 品種登録の番号及び年月日 第30812号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench TSバレッタ (TSバレッタ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TSバレッタ」は、対照品種「COCONUT LIME」と比較して、葉のしわが中であること、舌状花の長さ／幅がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の品種の自然交雑実生から選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	06 やや高
03 多花性	03 弱
04 株の粗密	04 やや粗
05 茎の色	02 緑
06 葉の数	03 少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	05 中
08 葉の幅	05 中
09 葉の長さ／幅	04 やや小
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	05 中
16 葉の光沢	03 中
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30812号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑
19 花柄の毛の粗密	02 粗
20 頭花の直径	05 中
21 頭花の高さ	04 やや低
22 頭花の舌状花の数	05 中
23 頭花の舌状花の基部の向き	03 やや下垂
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	02 かなり短
28 舌状花の幅	03 狭
29 舌状花の長さ／幅	04 やや小
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 155C
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	04 やや外反

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30812号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	04 平
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	02 浅
39 花盤の型	01 デイジー型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	08 かなり大
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	04 やや低
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	04 やや小
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	
46 頭花の直径に対する花盤の直径	06 やや大
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	03 黄
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	01 緑
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	01 無

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30812号
52 花盤内に生じた舌状花卉の数（花盤に舌状花卉を有するダイジー型の品種に限る。） 53 花盤の小花の長さ（アネモネ型の品種に限る。） 54 花盤の小花の幅（アネモネ型の品種に限る。） 55 花盤の小花の反り（アネモネ型の品種に限る。） 56 花盤の小花の筒部の長さ（アネモネ型の品種に限る。） 57 花盤の小花の先端の切れ込み（アネモネ型の品種に限る。） 58 花色の移行性		
	01 無	

1 品種登録の番号及び年月日 第30813号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench モスカリボ (モスカリボ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「モスカリボ」は、対照品種「EC551-571」と比較して、葉の長さ／幅が大であること、花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）が145C;21C(二次色)であること、花盤の小花の先端の切れ込み（アネモネ型の品種に限る。）が無又は極浅であること等で区別性が認められる。対照品種「COCONUT LIME」と比較して、花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）が145C;21C(二次色)であること、花盤の小花の先端の切れ込み（アネモネ型の品種に限る。）が無又は極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30813号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	06 やや高
03 多花性	03 弱
04 株の粗密	03 粗
05 茎の色	02 緑
06 葉の数	07 多
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	05 中
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の長さ／幅	07 大
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	01 無又は極弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30813号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑
19 花柄の毛の粗密	02 粗
20 頭花の直径	07 大
21 頭花の高さ	05 中
22 頭花の舌状花の数	05 中
23 頭花の舌状花の基部の向き	03 やや下垂
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	06 やや長
28 舌状花の幅	04 やや狭
29 舌状花の長さ／幅	06 やや大
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 157D
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	03 平

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30813号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	03 やや凹
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	04 深
39 花盤の型	02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	04 やや小
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	04 やや低
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	04 やや小
46 頭花の直径に対する花盤の直径	04 やや小
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート N163D;144A(二次色)
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 145C;21C(二次色)
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	

Echinacea Moench
モスカリボ

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30813号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30814号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench TSアメリカ (TSアメリカ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TSアメリカ」は、対照品種「サークル フォレスト ピンク」と比較して、葉の幅がやや狭であること、葉の最大幅の位置が中央あるいはわずかに基部側であること、花盤の型がアネモネ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30814号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	07 高
03 多花性	01 極弱
04 株の粗密	02 かなり粗
05 茎の色	02 緑
06 葉の数	08 かなり多
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	05 中
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の長さ／幅	05 中
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	02 弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30814号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑
19 花柄の毛の粗密	01 無又は極粗
20 頭花の直径	07 大
21 頭花の高さ	06 やや高
22 頭花の舌状花の数	05 中
23 頭花の舌状花の基部の向き	03 やや下垂
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	04 大
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	02 小
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	05 中
28 舌状花の幅	04 やや狭
29 舌状花の長さ／幅	06 やや大
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N57C
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	03 平

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30814号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	03 やや凹
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	02 浅
39 花盤の型	02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	09 極大
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	07 高
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	03 小
46 頭花の直径に対する花盤の直径	09 極大
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 144C;64C(二次色)
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート N57C
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30814号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30815号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench オレンジボールびゅう (オレンジボールビュー)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「オレンジボールびゅう」は、対照品種「HOT PAPAYA」と比較して、舌状花の長さが短であること、花盤の小花の筒部の長さ（アネモネ型の品種に限る。）がかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「Balscandin」と比較して、茎の色がかなり紫を帯びた緑であること、葉の最大幅の位置が中央あるいはわずかに基部側であること、花盤の小花の筒部の長さ（アネモネ型の品種に限る。）がかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の品種の自然交雑実生から選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	05 中
03 多花性	04 やや弱
04 株の粗密	04 やや粗
05 茎の色	04 かなり紫を帯びた緑
06 葉の数	03 少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	06 やや長
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の長さ／幅	06 やや大
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	02 弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30815号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	03 かなり紫を帯びた緑
19 花柄の毛の粗密	02 粗
20 頭花の直径	05 中
21 頭花の高さ	05 中
22 頭花の舌状花の数	05 中
23 頭花の舌状花の基部の向き	03 やや下垂
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	03 短
28 舌状花の幅	05 中
29 舌状花の長さ／幅	03 小
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	RHSカラーチャート N34A
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 44A
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	04 やや外反

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30815号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	05 やや凸
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	02 浅
39 花盤の型	02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	03 小
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	03 低
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	04 やや小
46 頭花の直径に対する花盤の直径	06 やや大
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 185A
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート N45A
51 花盤内に生じた舌状花弁の有無（デイジー型の品種に限る。）	

Echinacea Moench
オレンジボールびゅう

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30815号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30816号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench TSイエローソレイユ (TSイエローソレイユ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TSイエローソレイユ」は、対照品種「レモンドロップ」と比較して、舌状花の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Meteor Yellow」と比較して、葉の周縁部の鋸歯が無又は極少であること、頭花の舌状花の数が少であること、舌状花の先端の切れ込みが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の品種の自然交雑実生から選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	04 やや低
03 多花性	05 中
04 株の粗密	05 中
05 茎の色	01 淡緑
06 葉の数	02 かなり少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	06 やや長
08 葉の幅	05 中
09 葉の長さ／幅	05 中
10 葉の最大幅の位置	02 やや基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	01 無又は極弱
16 葉の光沢	02 弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30816号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑
19 花柄の毛の粗密	02 粗
20 頭花の直径	06 やや大
21 頭花の高さ	05 中
22 頭花の舌状花の数	03 少
23 頭花の舌状花の基部の向き	03 やや下垂
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	04 やや短
28 舌状花の幅	03 狭
29 舌状花の長さ／幅	05 中
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 4D
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	04 やや外反

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30816号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	04 平
37 舌状花の先端部の形	03 切形
38 舌状花の先端の切れ込み	02 浅
39 花盤の型	02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	05 中
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	04 やや低
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	03 小
46 頭花の直径に対する花盤の直径	06 やや大
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 150C;6D
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 5D
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	

Echinacea Moench
TSイエローソレイユ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30816号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30817号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench アクアイエローびゅー (アクアイエロービュウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「アクアイエローびゅー」は、対照品種「レモンドロップ」と比較して、舌状花の表面の主な色が18Bであること、舌状花の先端の切れ込みが深であること等で区別性が認められる。対照品種「Meteor Yellow」と比較して、舌状花の長さ／幅が大であること、舌状花の先端部の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30817号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	06 やや高
03 多花性	04 やや弱
04 株の粗密	05 中
05 茎の色	02 緑
06 葉の数	04 やや少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	06 やや長
08 葉の幅	05 中
09 葉の長さ／幅	05 中
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	02 弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30817号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑
19 花柄の毛の粗密	02 粗
20 頭花の直径	06 やや大
21 頭花の高さ	05 中
22 頭花の舌状花の数	05 中
23 頭花の舌状花の基部の向き	03 やや下垂
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	05 中
28 舌状花の幅	03 狭
29 舌状花の長さ／幅	07 大
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 18B
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	04 やや外反

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30817号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	04 平
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	04 深
39 花盤の型	02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	06 やや大
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	04 やや低
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	03 小
46 頭花の直径に対する花盤の直径	06 やや大
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 144C;N25A(二次色)
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 16C
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	

Echinacea Moench
アクアイエローびゅー

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30817号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30818号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench ホワイトグリーンビュー (ホワイトグリーンビュー)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ホワイトグリーンビュー」は、対照品種「COCONUT LIME」と比較して、舌状花の長さ／幅がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 令和元年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の品種の自然交雑実生から選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 半開張
02 草丈	02 かなり低
03 多花性	03 弱
04 株の粗密	04 やや粗
05 茎の色	02 緑
06 葉の数	02 かなり少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	05 中
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の長さ／幅	05 中
10 葉の最大幅の位置	02 やや基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	02 弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30818号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑
19 花柄の毛の粗密	03 中
20 頭花の直径	05 中
21 頭花の高さ	04 やや低
22 頭花の舌状花の数	04 やや少
23 頭花の舌状花の基部の向き	03 やや下垂
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	03 短
28 舌状花の幅	04 やや狭
29 舌状花の長さ／幅	04 やや小
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 155C
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	03 平

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	04 平
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	03 中
39 花盤の型	02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	04 やや小
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	02 かなり低
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	03 小
46 頭花の直径に対する花盤の直径	06 やや大
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 144C;163B(二次色)
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 155B
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	

Echinacea Moench
ホワイトグリーンビュー

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30818号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30819号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench マリアナ (マリアナ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「マリアナ」は、対照品種「Secret Affair」と比較して、葉の周縁部の鋸歯が無又は極少であること、舌状花の長さ／幅が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の品種の自然交雑実生から選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 半開張
02 草丈	03 低
03 多花性	03 弱
04 株の粗密	02 かなり粗
05 茎の色	03 やや紫を帯びた緑
06 葉の数	04 やや少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	04 やや短
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の長さ／幅	04 やや小
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	02 弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑	
19 花柄の毛の粗密	02 粗	
20 頭花の直径	05 中	
21 頭花の高さ	04 やや低	
22 頭花の舌状花の数	03 少	
23 頭花の舌状花の基部の向き	03 やや下垂	
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部	
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無	
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無	
27 舌状花の長さ	03 短	
28 舌状花の幅	04 やや狭	
29 舌状花の長さ／幅	03 小	
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）		
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 53D	
32 舌状花の表面の二次色		
33 舌状花の表面の二次色の分布		
34 舌状花の曲り	04 やや外反	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30819号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	02 弱
36 舌状花の横断面の形	05 やや凸
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	03 中
39 花盤の型	02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	05 中
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	02 かなり低
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	03 小
46 頭花の直径に対する花盤の直径	07 大
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 53C;187C(二次色)
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 53C
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30820号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench オレンジフレアー (オレンジフラー)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「オレンジフレアー」は、対照品種「BALSCERAS」と比較して、舌状花の先端部の形が切形であること、花盤の小花の筒部の長さ（アネモネ型の品種に限る。）がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の品種の自然交雑実生から選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	04 やや低
03 多花性	05 中
04 株の粗密	05 中
05 茎の色	03 やや紫を帯びた緑
06 葉の数	03 少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	05 中
08 葉の幅	03 狭
09 葉の長さ／幅	07 大
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	02 弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30820号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑
19 花柄の毛の粗密	02 粗
20 頭花の直径	04 やや小
21 頭花の高さ	05 中
22 頭花の舌状花の数	05 中
23 頭花の舌状花の基部の向き	04 下垂
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	02 かなり短
28 舌状花の幅	02 かなり狭
29 舌状花の長さ／幅	05 中
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 48C
32 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 145D
33 舌状花の表面の二次色の分布	02 基部から1/4
34 舌状花の曲り	05 かなり外反

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30820号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	04 平
37 舌状花の先端部の形	03 切形
38 舌状花の先端の切れ込み	03 中
39 花盤の型	02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	06 やや大
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	06 やや高
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	04 やや小
46 頭花の直径に対する花盤の直径	09 極大
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 154D;N34A(二次色)
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 51B
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30821号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench オレンジパラソル (オレンジパラソル)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「オレンジパラソル」は、対照品種「Balscandin」と比較して、舌状花の長さ／幅がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の品種の自然交雑実生から選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30821号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	05 中
03 多花性	04 やや弱
04 株の粗密	06 やや密
05 茎の色	02 緑
06 葉の数	02 かなり少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	08 かなり長
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の長さ／幅	06 やや大
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	02 弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑
19 花柄の毛の粗密	02 粗
20 頭花の直径	07 大
21 頭花の高さ	05 中
22 頭花の舌状花の数	03 少
23 頭花の舌状花の基部の向き	03 やや下垂
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	06 やや長
28 舌状花の幅	02 かなり狭
29 舌状花の長さ／幅	08 かなり大
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 34B
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	04 やや外反

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30821号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	03 やや凹
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	03 中
39 花盤の型	02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	05 中
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	04 やや低
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	03 小
46 頭花の直径に対する花盤の直径	05 中
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート N34A;12D(二次色)
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 34A
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	

Echinacea Moench
オレンジパラソル

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30821号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30822号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench リリアンカクテル (リアンカテル)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「リリアンカクテル」は、対照品種「Irresistible」と比較して、舌状花の表面の主な色が45Cであること、舌状花の先端の切れ込みが深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の品種の自然交雑実生から選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30822号
01 草姿	03 半開張	
02 草丈	04 やや低	
03 多花性	03 弱	
04 株の粗密	04 やや粗	
05 茎の色	03 やや紫を帯びた緑	
06 葉の数	02 かなり少	
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	06 やや長	
08 葉の幅	04 やや狭	
09 葉の長さ／幅	06 やや大	
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側	
11 葉の緑色の濃淡	02 中	
12 葉の斑の有無	01 無	
13 葉の斑の色		
14 葉の斑の分布		
15 葉のしわ	03 弱	
16 葉の光沢	02 弱	
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑	
19 花柄の毛の粗密	02 粗	
20 頭花の直径	06 やや大	
21 頭花の高さ	06 やや高	
22 頭花の舌状花の数	03 少	
23 頭花の舌状花の基部の向き	04 下垂	
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部	
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無	
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無	
27 舌状花の長さ	05 中	
28 舌状花の幅	03 狭	
29 舌状花の長さ／幅	06 やや大	
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）		
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 45C	
32 舌状花の表面の二次色		
33 舌状花の表面の二次色の分布		
34 舌状花の曲り	05 かなり外反	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ		01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形		04 平
37 舌状花の先端部の形		02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み		04 深
39 花盤の型		02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）		
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）		06 やや大
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）		
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）		04 やや低
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）		
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）		03 小
46 頭花の直径に対する花盤の直径		07 大
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）		
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）		
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）		RHSカラーチャート 45C
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）		RHSカラーチャート 42B
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）		

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30823号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench Balsomold

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Balsomold」は、対照品種「メローイエロー」と比較して、舌状花の表面の主な色が23Aであること、花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30823号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	04 やや低
03 多花性	05 中
04 株の粗密	06 やや密
05 茎の色	02 緑
06 葉の数	03 少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	06 やや長
08 葉の幅	05 中
09 葉の長さ／幅	05 中
10 葉の最大幅の位置	02 やや基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	05 中
16 葉の光沢	03 中
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30823号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑
19 花柄の毛の粗密	02 粗
20 頭花の直径	07 大
21 頭花の高さ	04 やや低
22 頭花の舌状花の数	06 やや多
23 頭花の舌状花の基部の向き	02 水平
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	04 やや短
28 舌状花の幅	05 中
29 舌状花の長さ／幅	04 やや小
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 23A
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	03 平

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30823号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	02 凹
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	02 浅
39 花盤の型	01 デイジー型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	07 大
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	05 中
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	04 やや小
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	
46 頭花の直径に対する花盤の直径	04 やや小
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	04 橙
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	01 無

Echinacea Moench
Balsomold

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30823号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30824号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench Balsomemyim

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Balsomemyim」は、対照品種「メローイエロー」と比較して、舌状花の表面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Balsomold」と比較して、舌状花の表面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Jianping Ren

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30824号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	02 かなり低
03 多花性	04 やや弱
04 株の粗密	05 中
05 茎の色	02 緑
06 葉の数	03 少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	05 中
08 葉の幅	03 狭
09 葉の長さ／幅	06 やや大
10 葉の最大幅の位置	02 やや基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	02 弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30824号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑
19 花柄の毛の粗密	02 粗
20 頭花の直径	07 大
21 頭花の高さ	04 やや低
22 頭花の舌状花の数	06 やや多
23 頭花の舌状花の基部の向き	02 水平
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	06 やや長
28 舌状花の幅	04 やや狭
29 舌状花の長さ／幅	05 中
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 12A
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	04 やや外反

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30824号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	04 平
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	02 浅
39 花盤の型	01 デイジー型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	06 やや大
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	04 やや低
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	04 やや小
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	
46 頭花の直径に対する花盤の直径	03 小
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	04 橙
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	01 無

Balsomemyim

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30824号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30825号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench Balsomanita

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Balsomanita」は、対照品種「Dixie Scarlet」と比較して、葉の長さ／幅が中であること、舌状花の先端の切れ込みが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「BALSOMSED」と比較して、舌状花の先端の切れ込みが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Jianping Ren

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30825号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	02 かなり低
03 多花性	05 中
04 株の粗密	04 やや粗
05 茎の色	04 かなり紫を帯びた緑
06 葉の数	06 やや多
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	04 やや短
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の長さ／幅	05 中
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	02 弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30825号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	04 紫
19 花柄の毛の粗密	04 密
20 頭花の直径	08 かなり大
21 頭花の高さ	06 やや高
22 頭花の舌状花の数	06 やや多
23 頭花の舌状花の基部の向き	03 やや下垂
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	05 中
28 舌状花の幅	05 中
29 舌状花の長さ／幅	05 中
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 45A
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	04 やや外反

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30825号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	04 平
37 舌状花の先端部の形	01 尖る
38 舌状花の先端の切れ込み	02 浅
39 花盤の型	01 デイジー型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	07 大
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	05 中
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	04 やや小
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	
46 頭花の直径に対する花盤の直径	04 やや小
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	06 赤褐
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	01 無

Balsomanita

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30825号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30826号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench メーブルポイント (メ°ブル°イント)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「メーブルポイント」は、対照品種「オレンジフレアー」と比較して、舌状花の表面の主な色が60Bであること、花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）が184C;145C(二次色)であること等で区別性が認められる。対照品種「TSサマーレッド」と比較して、舌状花の長さがかなり短であること、花盤の小花の先端の切れ込み（アネモネ型の品種に限る。）が深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 令和2年5月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	02 かなり低
03 多花性	05 中
04 株の粗密	05 中
05 茎の色	03 やや紫を帯びた緑
06 葉の数	04 やや少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	04 やや短
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の長さ／幅	05 中
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	03 中
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30826号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	02 やや紫を帯びた緑
19 花柄の毛の粗密	02 粗
20 頭花の直径	04 やや小
21 頭花の高さ	04 やや低
22 頭花の舌状花の数	05 中
23 頭花の舌状花の基部の向き	03 やや下垂
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	02 かなり短
28 舌状花の幅	02 かなり狭
29 舌状花の長さ／幅	06 やや大
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 60B
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	05 かなり外反

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ		01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形		04 平
37 舌状花の先端部の形		03 切形
38 舌状花の先端の切れ込み		04 深
39 花盤の型		02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）		
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）		04 やや小
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）		
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）		01 極低
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）		
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）		03 小
46 頭花の直径に対する花盤の直径		09 極大
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）		
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）		
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）		RHSカラーチャート 184C;145C(二次色)
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）		RHSカラーチャート 58B
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）		

登録品種の植物体の特性記録部

第30826号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30827号 令和7年3月3日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench マヤグリーン (マグリーン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「マヤグリーン」は、対照品種「EC551-571」と比較して、頭花の直径に対する花盤の直径が極大であること、花盤の小花の筒部の長さ（アネモネ型の品種に限る。）がかなり短であること、花盤の小花の先端の切れ込み（アネモネ型の品種に限る。）が浅であること等で区別性が認められる。対照品種「COCONUT LIME」と比較して、頭花の直径に対する花盤の直径が極大であること、花盤の小花の先端の切れ込み（アネモネ型の品種に限る。）が浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30827号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 多花性	03 弱
04 株の粗密	03 粗
05 茎の色	01 淡緑
06 葉の数	04 やや少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	05 中
08 葉の幅	05 中
09 葉の長さ／幅	05 中
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	01 無又は極弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30827号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	01 緑
19 花柄の毛の粗密	03 中
20 頭花の直径	06 やや大
21 頭花の高さ	04 やや低
22 頭花の舌状花の数	04 やや少
23 頭花の舌状花の基部の向き	02 水平
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	03 短
28 舌状花の幅	04 やや狭
29 舌状花の長さ／幅	04 やや小
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 157D
32 舌状花の表面の二次色	
33 舌状花の表面の二次色の分布	
34 舌状花の曲り	03 平

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30827号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	04 平
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	03 中
39 花盤の型	02 アネモネ型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	09 極大
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	04 やや低
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	03 小
46 頭花の直径に対する花盤の直径	09 極大
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 145D;160C(二次色)
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	RHSカラーチャート 157D
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	

マヤグリーン

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質

01 無

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30828号 令和7年3月3日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinacea Moench JS Engeltje
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「JS Engeltje」は、対照品種「Fountain Pink Eye」と比較して、草丈がやや高であること、葉の長さ／幅がかなり大であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Spruyt Select GCV
Mostenveld 30, 9255 Buggenhout, Belgium
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Jan Spruyt
- 7 出願公表の年月日 令和3年11月22日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30828号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	06 やや高
03 多花性	03 弱
04 株の粗密	04 やや粗
05 茎の色	03 やや紫を帯びた緑
06 葉の数	03 少
07 葉の長さ（葉柄を含む。）	08 かなり長
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の長さ／幅	08 かなり大
10 葉の最大幅の位置	01 中央あるいはわずかに基部側
11 葉の緑色の濃淡	02 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の色	
14 葉の斑の分布	
15 葉のしわ	03 弱
16 葉の光沢	02 弱
17 葉の周縁部の鋸歯	01 無又は極少

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30828号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花柄の色	02 やや紫を帯びた緑
19 花柄の毛の粗密	02 粗
20 頭花の直径	07 大
21 頭花の高さ	07 高
22 頭花の舌状花の数	03 少
23 頭花の舌状花の基部の向き	02 水平
24 頭花の舌状花弁の相対的な数	05 全部又はほぼ全部
25 頭花のさじ状花弁の相対的な数	01 無
26 頭花の管状花弁の相対的な数	01 無
27 舌状花の長さ	07 長
28 舌状花の幅	04 やや狭
29 舌状花の長さ／幅	06 やや大
30 舌状花の外面の色（さじ状花弁、管状花弁に限る。）	
31 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 155C
32 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 68B
33 舌状花の表面の二次色の分布	02 基部から1/4
34 舌状花の曲り	04 やや外反

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30828号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のねじれ	01 無又は極弱
36 舌状花の横断面の形	02 凹
37 舌状花の先端部の形	02 丸
38 舌状花の先端の切れ込み	02 浅
39 花盤の型	01 デイジー型
40 花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）	05 中
41 花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）	
42 花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）	04 やや低
43 花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）	
44 花盤の高さ／幅（デイジー型の品種に限る。）	04 やや小
45 花盤の高さ／幅（アネモネ型の品種に限る。）	
46 頭花の直径に対する花盤の直径	03 小
47 花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）	06 赤褐
48 花盤の鱗片の二次色（デイジー型の品種に限る。）	03 橙
49 花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	
50 花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）	
51 花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）	01 無

JS Engeltje

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30828号

[illegible]