

1 品種登録の番号及び年月日 第30829号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Avena sativa L. K42R8

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「K42R8」は、対照品種「九州14号」と比較して、包穎の白粉の多少が少であること、草丈がやや高であること、千粒重が軽であること等で区別性が認められる。対照品種「K78R7」と比較して、第一穎果の小穂軸の長さが長であること、千粒重が軽であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

桂真昭 西本淳 我有満 山下浩 高井智之 波多野哲也 上床修弘 松岡秀道
後藤和美 松岡誠 荒川明 木村貴志

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

「スタンドオーツ」に「九州14号」を交配し、選抜したものである。

Avena sativa L.
K42R8

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 最下位葉の葉しょうの毛の多少	01 無又は極少
03 止め葉下の葉身の周縁の毛の多少	01 無又は極少
04 止め葉が反曲した植物体の出現の多少	02 かなり少
05 出穂期	03 早
06 茎の数	04 やや少
07 茎の最上節の毛の有無	01 無
08 茎の最上節の毛の多少	
09 穂の分枝の向き	04 やや直立～水平
10 包穎の白粉の多少	03 少
11 包穎の長さ	03 短
12 乳熟期の第一穎果の外穎の白粉の多少	01 無又は極少
13 草丈	06 やや高
14 穂の長さ	04 やや短
15 原麦粒の殻の有無	09 有
16 第一穎果の基部の芒の着生の多少	02 かなり少
17 第一穎果の外穎の長さ	04 やや短

K42R8

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30829号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30830号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Avena sativa L. 夏疾風 (ナツハヤテ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「夏疾風」は、対照品種「隼」と比較して、包穎の白粉の多少がやや少であること、第一穎果の小穂軸の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「K78R7」と比較して、草丈が高であること、第一穎果の小穂軸の長さが長であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
桂真昭 立石靖 我有満 山下浩 高井智之 岩堀英晶 上杉謙太 村田岳 松岡秀道 後藤和美 上床修弘 波多野哲也 松岡誠 荒川明 木村貴志 小山内光輔 本多利充 佐久間太 近藤聡 立花正 関根平
- 7 出願公表の年月日 令和元年12月23日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「たちいぶき」に「隼」を交配し、選抜したものである。

Avena sativa L.
夏疾風

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 やや直立
02 最下位葉の葉しょうの毛の多少	03 少
03 止め葉下の葉身の周縁の毛の多少	02 かなり少
04 止め葉が反曲した植物体の出現の多少	08 かなり多
05 出穂期	03 早
06 茎の数	03 少
07 茎の最上節の毛の有無	09 有
08 茎の最上節の毛の多少	01 極少
09 穂の分枝の向き	04 やや直立～水平
10 包穎の白粉の多少	04 やや少
11 包穎の長さ	07 長
12 乳熟期の第一穎果の外穎の白粉の多少	01 無又は極少
13 草丈	07 高
14 穂の長さ	05 中
15 原麦粒の殻の有無	09 有
16 第一穎果の基部の芒の着生の多少	01 無又は極少
17 第一穎果の外穎の長さ	06 やや長

夏疾風

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質

重要な形質に係る特性

02 黄

01 無又は極少

07 長

03 春まき性

04 やや軽

1 品種登録の番号及び年月日 第30831号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ficus carica L. 励広台2号 (レイウダ イコウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「励広台2号」は、対照品種「イスキア ブラック」と比較して、果実の大きさが極小であること、果実くび部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「柵井ドーフィン」と比較して、葉の基部の形が心臓形であること、果実の大きさが極小であること、果実くび部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
広島県
広島県広島市中区基町10番52号

6 登録品種の育成をした者の氏名
山崎安津 薬師寺博 西村遼太郎 軸丸祥大 森田剛成 星野滋 須川瞬 白上典彦

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
既存品種「イスキア ブラック」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Ficus carica L.
 励広台2号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30831号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	07 開張
02 樹の大きさ	04 やや小
03 樹勢	03 弱
04 枝梢の粗密	07 密
05 枝梢の長さ	03 短
06 枝梢の太さ	04 やや細
07 節間長	07 長
08 枝梢の色	02 灰緑
09 皮目の形	04 長楕円～楕円
10 皮目の大きさ	02 かなり小
11 皮目の多少	03 少
12 皮目の鮮明度	05 中
13 分枝数	05 中
14 頂芽の形状	03 長三角
15 頂芽の色	04 赤褐
16 幼葉の色	03 淡緑
17 幼葉主脈の色	07 緑

Ficus carica L.
 励広台2号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30831号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉形	03 心形
19 裂片数	05 5裂
20 裂片の数の変化	01 無
21 裂片の切れ込みの深さ	06 やや深
22 裂片の形	01 ひし形
23 裂片縁部の重なり	03 開く
24 葉の二次欠刻	05 中
25 葉の欠刻底部の突起	05 中
26 上裂片葉縁部の形	02 さざ波状
27 葉の先端の形	02 鋭頭
28 葉の基部の形	03 心臓形
29 葉の大きさ	06 やや大
30 葉の長さ	06 やや長
31 葉の幅	05 中
32 葉の色	05 中
33 葉の表面の毛の多少	07 多
34 葉の裏面の毛の多少	07 多

Ficus carica L.
 励広台2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉柄の長さ	05 中
36 葉柄の太さ	05 中
37 葉柄の色	03 黄緑
38 果形	03 卵
39 果実の大きさ	01 極小
40 果実くび部の形	02 鈍形
41 果実くび部の長さ	03 短
42 果梗の長さ	05 中
43 果梗の太さ	03 細
44 果梗の色	02 淡黄褐
45 果皮の色	09 紫黒
46 果粉の多少	03 少
47 果脈の鮮明度	03 不明瞭
48 果脈の密度	07 密
49 果点コルクの鮮明度	07 明瞭
50 果点コルクの密度	05 中
51 果点コルクの大きさ	05 中

Ficus carica L.
 励広台2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果頂部の目の大きさ	02 かなり小
53 果頂部の目の色	08 紫黒
54 りん片の大きさ	04 やや小
55 りん片の開閉	03 閉
56 りん片の色	08 暗赤紫
57 りん片の凹凸	07 凸
58 果皮の厚さ	03 薄
59 果皮の強さ	07 強
60 花托の色	01 乳白
61 花托の厚さ	03 薄
62 雌花の色	01 淡黄褐
63 果実内部のすきま	03 小
64 雌花の厚さ	01 極薄
65 果肉の密度	05 中
66 果肉の硬度	05 中
67 果汁の量	05 中
68 甘味	04 やや低

Ficus carica L.
励広台2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 酸味 70 発芽期 71 夏果収穫時期 72 秋果収穫時期 73 裂果性	04 やや少
	03 早
	05 中
	04 やや早
	01 無

1 品種登録の番号及び年月日 第30832号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hedera L. 富貴（フキ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「富貴」は、対照品種「ライトフィンガー」と比較して、側裂片先端の形が鋭形であること、葉柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「ライムスター」と比較して、葉裂片の切れ込み程度が深裂であること、葉柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
重野幹夫
愛知県知多郡武豊町大字東大高字浦之島82番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
重野幹夫

7 出願公表の年月日 令和元年7月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ライムスター」の変異株である。

Hedera L.
富貴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹性	01 つる性
02 茎の太さ	05 中
03 茎の長さ	03 短
04 茎の色	04 褐
05 分枝性	05 中
06 節間長	03 短
07 葉全体の形	07 五角形
08 葉裂片の切れ込み程度	04 深裂
09 葉裂片の切れ込み数	04 5 裂
10 底裂片全体の形	05 三角形
11 側裂片全体の形	02 披針形
12 頂裂片全体の形	02 披針形
13 側裂片先端の形	02 鋭形
14 頂裂片先端の形	02 鋭形
15 葉基部の形	05 心形
16 葉のよじれ	02 やや有
17 葉縁の波打ち	01 無

Hedera L.
富貴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の形	01 全縁
19 葉身長	04 やや短
20 葉身幅	05 中
21 葉の厚さ	05 中
22 新葉の色	RHSカラーチャート 149A
23 成葉表面の色	RHSカラーチャート 144C
24 成葉裏面の色	02 黄緑
25 葉色の季節変化	09 有
26 葉色の変化後の色	RHSカラーチャート 200B
27 葉脈の色	03 淡緑
28 葉柄の色	06 褐
29 斑の有無	01 無
30 斑のパターン	
31 斑の色数	
32 葉の主たる斑色	
33 葉の2次の斑色	
34 斑色の変化性	

Hedera L.
富貴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 斑色の季節変化	
36 斑色の変化後の色	
37 成葉表面の光沢	05 中
38 成葉の毛	01 無
39 葉柄の毛	09 有
40 葉柄の長さ	02 かなり短
41 気根の発生	03 易
42 到花の早晩	(開花なし)

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30833号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hedera L. きららの森（キラノリ）
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「きららの森」は、対照品種「ガートルードストース」と比較して、頂裂片先端の形が鋭形であること、葉のよじれがやや有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
廣野さち江
愛知県知多郡美浜町大字野間字小松川10-11
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
廣野さち江
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ガートルードストース」の変異株である。

Hedera L.
 きららの森

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30833号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹性	01 つる性
02 茎の太さ	04 やや細
03 茎の長さ	03 短
04 茎の色	03 緑褐
05 分枝性	06 やや密
06 節間長	03 短
07 葉全体の形	07 五角形
08 葉裂片の切れ込み程度	03 中裂
09 葉裂片の切れ込み数	03 3裂～5裂
10 底裂片全体の形	05 三角形
11 側裂片全体の形	05 三角形
12 頂裂片全体の形	05 三角形
13 側裂片先端の形	03 鈍形
14 頂裂片先端の形	02 鋭形
15 葉基部の形	05 心形
16 葉のよじれ	02 やや有
17 葉縁の波打ち	01 無

Hedera L.
きららの森

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の形	01 全縁
19 葉身長	02 かなり短
20 葉身幅	04 やや狭
21 葉の厚さ	05 中
22 新葉の色	RHSカラーチャート 140A
23 成葉表面の色	RHSカラーチャート 137A
24 成葉裏面の色	04 灰緑
25 葉色の季節変化	01 無
26 葉色の変化後の色	
27 葉脈の色	03 淡緑
28 葉柄の色	05 緑褐
29 斑の有無	09 有
30 斑のパターン	01 覆輪、03 掃込み斑
31 斑の色数	02 2色
32 葉の主たる斑色	RHSカラーチャート 150D
33 葉の2次の斑色	RHSカラーチャート 191A
34 斑色の変化性	03 不変

Hedera L.
きららの森

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 斑色の季節変化	09 有
36 斑色の変化後の色	RHSカラーチャート 59C
37 成葉表面の光沢	04 やや弱
38 成葉の毛	01 無
39 葉柄の毛	09 有
40 葉柄の長さ	02 かなり短
41 気根の発生	03 易
42 到花の早晩	(開花なし)

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30834号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hedera L. 天使のささやき (テンシノササヤキ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「天使のささやき」は、対照品種「ルーテシア」と比較して、節間長がかなり短であること、葉柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
重野幹夫
愛知県知多郡武豊町大字東大高字浦之島82番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
重野幹夫
- 7 出願公表の年月日 令和3年5月6日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ルーテシア」の変異株である。

Hedera L.
天使のささやき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹性	01 つる性
02 茎の太さ	04 やや細
03 茎の長さ	01 極短
04 茎の色	04 褐
05 分枝性	06 やや密
06 節間長	02 かなり短
07 葉全体の形	07 五角形
08 葉裂片の切れ込み程度	03 中裂
09 葉裂片の切れ込み数	04 5 裂
10 底裂片全体の形	05 三角形
11 側裂片全体の形	05 三角形
12 頂裂片全体の形	05 三角形
13 側裂片先端の形	03 鈍形
14 頂裂片先端の形	02 鋭形
15 葉基部の形	05 心形
16 葉のよじれ	01 無
17 葉縁の波打ち	01 無

Hedera L.
天使のささやき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の形	01 全縁
19 葉身長	01 極短
20 葉身幅	03 狭
21 葉の厚さ	05 中
22 新葉の色	RHSカラーチャート 144A
23 成葉表面の色	RHSカラーチャート N134A
24 成葉裏面の色	03 緑
25 葉色の季節変化	01 無
26 葉色の変化後の色	
27 葉脈の色	03 淡緑
28 葉柄の色	05 緑褐
29 斑の有無	09 有
30 斑のパターン	01 覆輪、03 掃込み斑
31 斑の色数	02 2色
32 葉の主たる斑色	RHSカラーチャート 8D
33 葉の2次の斑色	RHSカラーチャート N138C
34 斑色の変化性	03 不変

Hedera L.
天使のささやき

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30834号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30835号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hordeum vulgare L. ハルアカネ (ハルカネ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ハルアカネ」は、対照品種「イチバンボシ」と比較して、草丈がやや長であること、穂の長さがやや長であること、 β グルカン含量がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「トヨノカゼ」と比較して、穂の長さがやや長であること、 β グルカン含量がやや多であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
吉岡藤治 杉田知彦 高橋飛鳥 柳澤貴司 長嶺敬 高山敏之 土井芳憲
- 7 出願公表の年月日 令和2年1月23日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「四R系2252」に「四国裸99号」を交配し、選抜したものである。

Hordeum vulgare L.
ハルアカネ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 稈の長さ	05 中
03 葉しょうの毛の有無	01 無
04 止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱	03 弱
05 植物体の反曲した止め葉の多少	03 少
06 止め葉の葉しょう表面のろう質の多少	05 中
07 出穂期	03 早
08 芒の先端のアントシアニン着色の強弱	03 弱
09 開閉花受粉性	01 開花受粉性
10 穂のろう質の多少	03 少
11 穂の向き	01 立
12 草丈	06 やや長
13 穂の条数	02 3以上
14 穂の形	05 平行
15 穂の粒着の粗密	04 やや粗
16 穂の長さ	06 やや長
17 芒の長さ	05 中

Hordeum vulgare L.
ハルアカネ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 穂軸の長さ	
19 穂軸の曲がりの強弱	03 弱
20 穂の不稔小穂の発育	
21 不稔小穂の向き	
22 穀粒に比べた中央小穂の芒を含む護穎の長さ	01 短
23 穀粒の小穂軸の毛の型	02 長
24 穀粒のふの有無	01 無
25 穀粒の外穎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
26 穀粒の外穎背面内側面の脈沿いの突起の多少	03 少
27 穀粒の縦溝の毛の有無	01 無
28 穀粒のりん皮の着き方	01 正面
29 穀粒の糊粉層の色	01 白色
30 うるち・もちの別	01 うるち
31 穂発芽性	07 難
32 千粒重(原麦粒)	05 中
33 まき性	01 秋まき性
34 穀粒硬度	06 やや硬

Hordeum vulgare L.
ハルアカネ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 麦芽エキスの多少（ビール用品種に限る。）	
36 コールバツハ数（ビール用品種に限る。）	
37 ジアスターゼ力（ビール用品種に限る。）	
38 穀粒のプロアントシアニジンの有無	09 有
39 穀粒のリポキシゲナーゼ（lox）活性の有無	
40 β グルカン含量	06 やや多
41 D-ホルデインのHor-3座の遺伝子の発現	
42 C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現1	
43 C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現2	
44 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現1	
45 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現2	
46 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現3	

1 品種登録の番号及び年月日 第30836号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum vulgare L. ダイキンボシ (ダイキンボシ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ダイキンボシ」は、対照品種「イチバンボシ」と比較して、稈の長さがやや長であること、草丈がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ハルアカネ」と比較して、穀粒硬度が中であること、 β グルカン含量が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉岡藤治 杉田知彦 高橋飛鳥 柳澤貴司 長嶺敬 高山敏之

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「四R系2643」に「四国裸111号」を交配し、選抜したものである。

Hordeum vulgare L.

ダイキンボシ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 8 3 6 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 稈の長さ	06 やや長
03 葉しょうの毛の有無	01 無
04 止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱	03 弱
05 植物体の反曲した止め葉の多少	03 少
06 止め葉の葉しょう表面のろう質の多少	05 中
07 出穂期	03 早
08 芒の先端のアントシアニン着色の強弱	03 弱
09 開閉花受粉性	01 開花受粉性
10 穂のろう質の多少	03 少
11 穂の向き	01 立
12 草丈	06 やや長
13 穂の条数	02 3以上
14 穂の形	05 平行
15 穂の粒着の粗密	05 中
16 穂の長さ	05 中
17 芒の長さ	05 中

Hordeum vulgare L.

ダイキンボシ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 穂軸の長さ	
19 穂軸の曲がりの強弱	03 弱
20 穂の不稔小穂の発育	
21 不稔小穂の向き	
22 穀粒に比べた中央小穂の芒を含む護穎の長さ	01 短
23 穀粒の小穂軸の毛の型	02 長
24 穀粒のふの有無	01 無
25 穀粒の外穎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
26 穀粒の外穎背面内側面の脈沿いの突起の多少	03 少
27 穀粒の縦溝の毛の有無	01 無
28 穀粒のりん皮の着き方	01 正面
29 穀粒の糊粉層の色	01 白色
30 うるち・もちの別	01 うるち
31 穂発芽性	07 難
32 千粒重(原麦粒)	05 中
33 まき性	01 秋まき性
34 穀粒硬度	05 中

Hordeum vulgare L.

ダイキンボシ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 麦芽エキスの多少（ビール用品種に限る。）	
36 コールバツハ数（ビール用品種に限る。）	
37 ジアスターゼ力（ビール用品種に限る。）	
38 穀粒のプロアントシアニジンの有無	09 有
39 穀粒のリポキシゲナーゼ（lox）活性の有無	
40 β グルカン含量	05 中
41 D-ホルデインのHor-3座の遺伝子の発現	
42 C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現1	
43 C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現2	
44 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現1	
45 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現2	
46 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現3	

1 品種登録の番号及び年月日 第30837号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow KB-12

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KB-12」は、対照品種「KB-5」と比較して、菌さんの直径がかなり小であること、菌さんの直径／高さがやや大であること、菌さん表面の斑紋の大きさが中であること、菌さん表面の斑紋の明瞭度が明瞭であること、ひだの並び方が波状・ちぢれであること等で区別性が認められる。対照品種「大木0h-274」と比較して、菌さん周縁部の色が浅灰茶であること、菌さん表面の斑紋の分布が中央であること等で区別性が認められる。対照品種「KX-BS025号」と比較して、ひだの並び方が波状・ちぢれであること、菌柄の最大径が細であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業

和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 畑中智大

7 出願公表の年月日 令和5年8月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有菌株どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30837号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌叢表面の着色の有無	09 有
02 菌叢裏面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の成長最適温度	05 24℃
04 菌糸体の温度別成長量 (10℃)	05 中
05 菌糸体の温度別成長量 (15℃)	05 中
06 菌糸体の温度別成長量 (20℃)	06 やや速
07 菌糸体の温度別成長量 (25℃)	05 中
08 菌糸体の温度別成長量 (30℃)	04 やや遅
09 菌さんの縦断面の形	03 丸山形
10 菌さんの直径	02 かなり小
11 菌さんの高さ	07 大
12 菌さんの直径／高さ	06 やや大
13 菌さんの中央部の色	03 浅灰茶
14 菌さん周縁部の色	03 浅灰茶
15 菌さん表面の斑紋の大きさ	02 中
16 菌さん表面の斑紋の分布	01 中央
17 菌さん表面の斑紋の明瞭度	03 明瞭

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30837号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 菌さんの硬さ	06 やや硬
19 ひだの並び方	02 波状・ちぢれ
20 ひだの密度	02 中
21 ひだの色	01 白
22 菌柄の形	01 細長
23 菌柄の長さ	05 中
24 菌さんの直径／菌柄の長さ	05 中
25 菌柄の最大径	03 細
26 菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径	03 小
27 菌柄の色	01 白
28 菌柄の毛羽の有無	09 有
29 菌柄の硬さ	05 中
30 子実体の平均乾燥重量	08 かなり重
31 発生処理までの期間	05 中
32 菌掻きから子実体収穫までの期間	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30838号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow KB-16

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KB-16」は、対照品種「marmo23号」と比較して、菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径が小であること等で区別性が認められる。対照品種「KB-12」と比較して、菌さんの高さがかなり大であること、菌さんの直径／高さが中であること、ひだの密度が粗であること等で区別性が認められる。対照品種「KB-7T」と比較して、菌さん表面の斑紋の分布が中央であること、ひだの並び方が波状・ちぢれであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業

和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 畑中智大

7 出願公表の年月日 令和5年8月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有菌株どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30838号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌叢表面の着色の有無	09 有
02 菌叢裏面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の成長最適温度	04 23℃
04 菌糸体の温度別成長量 (10℃)	05 中
05 菌糸体の温度別成長量 (15℃)	06 やや速
06 菌糸体の温度別成長量 (20℃)	07 速
07 菌糸体の温度別成長量 (25℃)	05 中
08 菌糸体の温度別成長量 (30℃)	05 中
09 菌さんの縦断面の形	03 丸山形
10 菌さんの直径	02 かなり小
11 菌さんの高さ	08 かなり大
12 菌さんの直径／高さ	05 中
13 菌さんの中央部の色	03 浅灰茶
14 菌さん周縁部の色	03 浅灰茶
15 菌さん表面の斑紋の大きさ	03 大
16 菌さん表面の斑紋の分布	01 中央
17 菌さん表面の斑紋の明瞭度	03 明瞭

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30838号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 菌さんの硬さ	06 やや硬
19 ひだの並び方	02 波状・ちぢれ
20 ひだの密度	01 粗
21 ひだの色	01 白
22 菌柄の形	01 細長
23 菌柄の長さ	04 やや短
24 菌さんの直径／菌柄の長さ	06 やや大
25 菌柄の最大径	04 やや細
26 菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径	03 小
27 菌柄の色	01 白
28 菌柄の毛羽の有無	09 有
29 菌柄の硬さ	05 中
30 子実体の平均乾燥重量	07 重
31 発生処理までの期間	05 中
32 菌掻きから子実体収穫までの期間	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30839号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Iberis L. IBSZ0003
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IBSZ0003」は、対照品種「IBSZ0002」と比較して、側枝の数がかなり少であること、花序の高さがやや高であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Silvan Kamstra
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に品種名称不詳の品種を交配し、選抜したものである。

Iberis L.
IBSZ0003

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	03 低
03 株幅	02 かなり狭
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎のアントシアニンの着色	03 弱
06 茎の毛の有無	01 無
07 側枝の数	02 かなり少
08 葉の長さ	03 短
09 葉の幅	02 かなり狭
10 葉の厚さ	01 薄
11 葉の形	07 倒披針形
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの深さ	
14 葉の毛の有無	01 無
15 葉の緑色の濃淡	02 中
16 葉の斑の有無	01 無
17 葉柄の有無	01 無

Iberis L.
IBSZ0003

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花柄の長さ	02 かなり短
19 花序の型	01 総状花序
20 花序の高さ	06 やや高
21 花序の直径	07 大
22 花の数	06 やや多
23 花の縦径	04 やや短
24 花の横径	05 中
25 花弁の色	RHSカラーチャート NN155C
26 花弁の長さ	05 中
27 花弁の幅	05 中
28 花弁の波打ちの有無	01 無
29 花弁の重なり	02 接する
30 花弁の先端の形	03 円形

1 品種登録の番号及び年月日 第30840号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Iberis L. Balibesndft

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Balibesndft」は、対照品種「IBSZ0002」と比較して、葉の切れ込みの有無が有であること、花序の型が散房花序であること、花卉の重なりが離れるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Scott C. Trees

7 出願公表の年月日 令和4年3月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する育成系統をコルヒチン処理した変異株から選抜したものである。

Iberis L.
Balibesndft

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	03 低
03 株幅	03 狭
04 茎の太さ	06 やや太
05 茎のアントシアニンの着色	05 中
06 茎の毛の有無	01 無
07 側枝の数	06 やや多
08 葉の長さ	05 中
09 葉の幅	07 広
10 葉の厚さ	02 中
11 葉の形	07 倒披針形
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの深さ	01 1/3未満
14 葉の毛の有無	01 無
15 葉の緑色の濃淡	01 淡
16 葉の斑の有無	01 無
17 葉柄の有無	01 無

Iberis L.
Balibesndft

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花柄の長さ	04 やや短
19 花序の型	02 散房花序
20 花序の高さ	03 低
21 花序の直径	06 やや大
22 花の数	04 やや少
23 花の縦径	02 かなり短
24 花の横径	03 狭
25 花弁の色	RHSカラーチャート NN155C
26 花弁の長さ	01 極短
27 花弁の幅	03 狭
28 花弁の波打ちの有無	01 無
29 花弁の重なり	01 離れる
30 花弁の先端の形	02 切形

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30841号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Iberis L. IBSZ0007
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IBSZ0007」は、対照品種「ピンクアイス」と比較して、葉の切れ込みの有無が有であること、花卉の色が85Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Silvan Kamstra
- 7 出願公表の年月日 令和4年6月20日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Iberis L.
IBSZ0007

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	06 やや高
03 株幅	05 中
04 茎の太さ	06 やや太
05 茎のアントシアニンの着色	02 かなり弱
06 茎の毛の有無	01 無
07 側枝の数	07 多
08 葉の長さ	04 やや短
09 葉の幅	04 やや狭
10 葉の厚さ	01 薄
11 葉の形	03 楕円形
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの深さ	01 1/3未満
14 葉の毛の有無	01 無
15 葉の緑色の濃淡	01 淡
16 葉の斑の有無	01 無
17 葉柄の有無	01 無

Iberis L.
IBSZ0007

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花柄の長さ	07 長
19 花序の型	02 散房花序
20 花序の高さ	02 かなり低
21 花序の直径	04 やや小
22 花の数	05 中
23 花の縦径	03 短
24 花の横径	04 やや狭
25 花弁の色	RHSカラーチャート 85B
26 花弁の長さ	03 短
27 花弁の幅	03 狭
28 花弁の波打ちの有無	01 無
29 花弁の重なり	01 離れる
30 花弁の先端の形	03 円形

1 品種登録の番号及び年月日 第30842号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens New Guinea Group SAKIMP064

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKIMP064」は、対照品種「Balbouite」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、葉身の長さがやや短であること、花の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤智博

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	08 かなり高
02 株幅	09 極広
03 茎のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
04 葉柄の長さ	02 かなり短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
06 葉身の長さ	04 やや短
07 葉身の幅	06 やや広
08 葉身の長さ／幅	03 小
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	01 緑
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	
14 葉身の裏面の葉脈の色	01 緑
15 小花柄の長さ	03 短
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	03 弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	05 中
19 花の色数	01 1
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート 75D
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	04 やや小
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート 46A
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	06 やや広
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	04 やや狭
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	04 やや短
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	05 中
30 距の曲がりの強弱	06 やや強

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30843号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens New Guinea Group SAKIMP065
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKIMP065」は、対照品種「Balbouite」と比較して、葉身の長さが短であること、花の目の大きさが極小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤智博
- 7 出願公表の年月日 令和3年1月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	05 中
02 株幅	08 かなり広
03 茎のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
04 葉柄の長さ	02 かなり短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の長さ／幅	05 中
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	01 緑
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	
14 葉身の裏面の葉脈の色	01 緑
15 小花柄の長さ	03 短
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	04 やや狭
19 花の色数	01 1
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート N155B
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	01 極小
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート N66B
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	04 やや狭
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	02 かなり狭
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	04 やや短
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	04 やや浅
30 距の曲がりの強弱	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第30844号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens New Guinea Group SAKIMP066

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKIMP066」は、対照品種「サンハーモニー コンパクトラベンダー」と比較して、花の表面の主な色が58Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤智博

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	07 高
02 株幅	09 極広
03 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
04 葉柄の長さ	02 かなり短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	05 中
08 葉身の長さ／幅	04 やや小
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	01 緑
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	
14 葉身の裏面の葉脈の色	01 緑
15 小花柄の長さ	04 やや短
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	04 やや狭
19 花の色数	02 2
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート 58C
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N75B
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	02 全花卉の基部
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	05 中
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート NN155C
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	05 中
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	04 やや狭
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	04 やや短
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	06 やや深
30 距の曲がりの強弱	04 やや弱

1 品種登録の番号及び年月日 第30845号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens New Guinea Group SAKIMP067

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKIMP067」は、対照品種「SAKIMP013」と比較して、葉身の長さ／幅が中であること、花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）が33Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤智博

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	05 中
02 株幅	07 広
03 茎のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
04 葉柄の長さ	02 かなり短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の長さ／幅	05 中
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	03 弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	02 赤
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	04 やや弱
14 葉身の裏面の葉脈の色	02 赤
15 小花柄の長さ	04 やや短
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	03 弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	04 やや狭
19 花の色数	02 2
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート 55C
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 33A
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	03 全花卉の中央に線状
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	06 やや大
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート N74C(上弁を除く花卉の基部)、53B(下弁基部)
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	05 中
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	03 狭
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	03 短
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	03 浅
30 距の曲がりの強弱	06 やや強

1 品種登録の番号及び年月日 第30846号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens New Guinea Group SAKIMP068

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKIMP068」は、対照品種「SAKIMP050」と比較して、花の幅が中であること、花の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKIMP065」と比較して、株幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤智博

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	04 やや低
02 株幅	06 やや広
03 茎のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
04 葉柄の長さ	02 かなり短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
06 葉身の長さ	04 やや短
07 葉身の幅	05 中
08 葉身の長さ／幅	05 中
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	01 緑
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	
14 葉身の裏面の葉脈の色	01 緑
15 小花柄の長さ	04 やや短
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	05 中
19 花の色数	01 1
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート N155B
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	01 極小
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート 61C
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	05 中
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	03 狭
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	05 中
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	04 やや浅
30 距の曲がりの強弱	06 やや強

1 品種登録の番号及び年月日 第30847号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group SAKIMP069

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKIMP069」は、対照品種「SAKIMP058」と比較して、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、花の表面の主な色がN75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	05 中
02 株幅	08 かなり広
03 茎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
04 葉柄の長さ	01 極短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	05 中
08 葉身の長さ／幅	03 小
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	02 赤
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	02 かなり弱
14 葉身の裏面の葉脈の色	02 赤
15 小花柄の長さ	05 中
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	05 中
19 花の色数	02 2
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート N75C
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート NN74B
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	01 主に上弁
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	05 中
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート NN155B(全花卉の基部)
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	05 中
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	03 狭
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	05 中
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	06 やや深
30 距の曲がりの強弱	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30848号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group SAKIMP070

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKIMP070」は、対照品種「SAKIMP013」と比較して、葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）が中であること、花の表面の主な色がN66Dであること、花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）が45Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	05 中
02 株幅	09 極広
03 茎のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
04 葉柄の長さ	02 かなり短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	05 中
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	06 やや広
08 葉身の長さ／幅	02 かなり小
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	05 中
12 葉身の裏面の葉脈間の色	02 赤
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	05 中
14 葉身の裏面の葉脈の色	02 赤
15 小花柄の長さ	04 やや短
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	03 弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	05 中
19 花の色数	02 2
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート N66D
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 45B
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	03 全花卉の中央に線状
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	04 やや小
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート 72C
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	05 中
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	03 狭
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	04 やや短
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	05 中
30 距の曲がりの強弱	06 やや強

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30849号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens New Guinea Group SAKIMP071
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKIMP071」は、対照品種「SAKIMP012」と比較して、花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Balboufink」と比較して、葉身の長さ／幅がやや小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤智博
- 7 出願公表の年月日 令和4年3月14日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	05 中
02 株幅	08 かなり広
03 茎のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
04 葉柄の長さ	02 かなり短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 葉身の長さ	02 かなり短
07 葉身の幅	05 中
08 葉身の長さ／幅	04 やや小
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	03 弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	02 赤
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	03 弱
14 葉身の裏面の葉脈の色	02 赤
15 小花柄の長さ	04 やや短
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	03 弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	04 やや狭
19 花の色数	02 2
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN74B
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 53A
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	03 全花卉の中央に線状
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	05 中
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート 40A
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	04 やや狭
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	03 狭
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	03 短
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	05 中
30 距の曲がりの強弱	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30850号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lantana L. LAN17302

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「LAN17302」は、対照品種「セイシェルピンク」と比較して、枝の太さがやや細であること、葉幅が中であること、花柄の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「Landmark Sunrise Rose」と比較して、満開時の花色が67Aであること、開花時期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
Thomas Psenner

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「TOP Calippo Mandarin」に育成者が所有する育成系統を交配し、選抜したものである。

Lantana L.
LAN17302

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立型
02 樹高	04 やや低
03 株張り	02 かなり小
04 枝の長さ	03 短
05 枝の太さ	04 やや細
06 枝の色	01 緑色
07 枝のとげの有無	01 無
08 稜の有無	01 無
09 分枝性	06 やや多
10 節間長	03 短
11 葉の形	02 卵形
12 葉身長	05 中
13 葉幅	05 中
14 葉長比	04 やや小
15 葉のつき方	01 対生
16 葉の表面の色	05 緑
17 葉の斑入り	01 無

Lantana L.
LAN17302

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の毛の多少	05 中
19 葉の表面の毛の硬さ	02 硬
20 葉柄長	07 長
21 花房の形	03 平たい球形
22 花房径	08 かなり広
23 花の直径	05 中
24 花筒の長さ	05 中
25 花色の変化の有無	03 3色以上
26 開花始めの花色	RHSカラーチャート 9A
27 開花中期の花色	RHSカラーチャート 31B
28 満開時の花色	RHSカラーチャート 67A
29 小花の中心部の色の変化	09 有
30 開花始めの小花の中心部の色	RHSカラーチャート 9A
31 満開時の小花の中心部の色	RHSカラーチャート 67A
32 ほう葉の形	02 披針形
33 花柄の長さ	03 短
34 一花房当たりの開花数	05 中

Lantana L.
LAN17302

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の香り 36 果実の着生の難易 37 果房の形 38 果実の色 39 開花習性 40 開花時期	03 弱
	09 極難
	03 四季咲き
	08 かなり晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30851号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lantana L. LANZ0026

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「LANZ0026」は、対照品種「LANZ0013」と比較して、葉柄長が中であること、一花房当たりの開花数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名
Wendy Bergman

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
「LANZ0013」の自然交雑実生から選抜したものである。

Lantana L.
LANZ0026

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30851号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立型
02 樹高	04 やや低
03 株張り	02 かなり小
04 枝の長さ	02 かなり短
05 枝の太さ	03 細
06 枝の色	01 緑色
07 枝のとげの有無	01 無
08 稜の有無	01 無
09 分枝性	06 やや多
10 節間長	03 短
11 葉の形	02 卵形
12 葉身長	04 やや短
13 葉幅	04 やや狭
14 葉長比	04 やや小
15 葉のつき方	01 対生
16 葉の表面の色	03 淡緑
17 葉の斑入り	01 無

Lantana L.
LANZ0026

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の毛の多少	05 中
19 葉の表面の毛の硬さ	02 硬
20 葉柄長	05 中
21 花房の形	03 平たい球形
22 花房径	07 広
23 花の直径	04 やや小
24 花筒の長さ	05 中
25 花色の変化の有無	03 3色以上
26 開花始めの花色	RHSカラーチャート 13A
27 開花中期の花色	RHSカラーチャート 28A
28 満開時の花色	RHSカラーチャート 45A
29 小花の中心部の色の変化	09 有
30 開花始めの小花の中心部の色	RHSカラーチャート 13A
31 満開時の小花の中心部の色	RHSカラーチャート 45A
32 ほう葉の形	02 披針形
33 花柄の長さ	05 中
34 一花房当たりの開花数	07 多

Lantana L.
LANZ0026

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の香り 36 果実の着生の難易 37 果房の形 38 果実の色 39 開花習性 40 開花時期	03 弱
	09 極難
	03 四季咲き
	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30852号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lentinula edodes (Berk.) Pegler KS23

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KS23」は、対照品種「森XR2号」と比較して、子実体の平均乾燥重量がやや軽であること等で区別性が認められる。対照品種「森XR1号」と比較して、菌さんの厚さがやや厚であること、菌柄の太さがやや太であること、菌柄の硬さがやや硬であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社かつらぎ産業
和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
久保貴弘 野尻佳吾

7 出願公表の年月日 令和5年8月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者保有株どうしを交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS23

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30852号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	05 中
02 菌叢表面の着色の有無	09 有
03 菌糸体の生長最適温度	04 24℃
04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	06 やや速
05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	05 中
06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	06 やや速
07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)	05 中
08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)	03 遅
09 菌さんの縦断面形	03 丸山形
10 菌さんの大きさ	04 やや小
11 菌さん表面の地色	03 褐色
12 菌さんの厚さ	06 やや厚
13 菌さんの直径／厚さ	02 かなり小
14 菌さんの硬さ	03 硬
15 りん皮の付着部位	01 全体
16 りん皮の大きさ	02 かなり小
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS23

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30852号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	01 離柄三角形
20 ひだの並び方	02 波状・ちぢれ
21 ひだのちぢれ割合（率）	05 極多
22 ひだの幅	02 かなり狭
23 ひだの密度	03 密
24 ひだの色	02 淡黄色
25 菌柄の形	02 円柱
26 菌柄の長さ	04 やや短
27 菌柄の太さ	06 やや太
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	02 中
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	04 やや硬
32 菌柄の色	01 淡黄色
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	05 中
34 子実体の平均乾燥重量	04 やや軽

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	03 短
	03 短

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30853号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lentinula edodes (Berk.) Pegler KS24
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「KS24」は、対照品種「CA902」と比較して、菌さんの大きさが小であること、ひだの並び方が直であること、菌柄の太さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「KS21」と比較して、菌さんの大きさが小であること、ひだの形が離柄三角形であること、菌柄の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「HS73」と比較して、菌さんの縦断面形が平形であること、菌さんの大きさが小であること、菌柄の長さが短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社かつらぎ産業
和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
久保貴弘 野尻佳吾
- 7 出願公表の年月日 令和5年8月22日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者保有株どうしを交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS24

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30853号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	05 中
02 菌叢表面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の生長最適温度	04 24℃
04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	05 中
05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	04 やや遅
06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	05 中
07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)	04 やや遅
08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)	05 中
09 菌さんの縦断面形	02 平形
10 菌さんの大きさ	03 小
11 菌さん表面の地色	03 褐色
12 菌さんの厚さ	03 薄
13 菌さんの直径／厚さ	07 大
14 菌さんの硬さ	03 硬
15 りん皮の付着部位	02 周縁
16 りん皮の大きさ	02 かなり小
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS24

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	01 離柄三角形
20 ひだの並び方	01 直
21 ひだのちぢれ割合（率）	01 極少
22 ひだの幅	02 かなり狭
23 ひだの密度	03 密
24 ひだの色	02 淡黄色
25 菌柄の形	02 円柱
26 菌柄の長さ	03 短
27 菌柄の太さ	05 中
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	02 中
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	03 中
32 菌柄の色	01 淡黄色
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	05 中
34 子実体の平均乾燥重量	02 かなり軽

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS24

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	03 短
	03 短

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30854号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Leucothoe D. Don メルベユ (メルベユ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「メルベユ」は、対照品種「MAKIJAZ」と比較して、冬期の葉群のアントシアニンの着色が弱であること、葉身の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「トリカラー」と比較して、新しょうの枝の色が赤紫であること等で区別性が認められる。対照品種「HOWW」と比較して、新しょうの葉の斑の色が180C（散り斑葉;177A）であること、花序の長さが短であること、ほうの色が赤であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
土田直樹
新潟県新潟市秋葉区下新172番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
土田直樹
- 7 出願公表の年月日 令和元年12月23日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「トリカラー」の変異株である。

Leucothoe D. Don
メルベユ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30854号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張
02 樹高	04 やや低
03 株幅	05 中
04 冬期の葉群のアントシアニンの着色	02 弱
05 新しょうの枝の色	03 赤紫
06 新しょうの葉の主な色	RHSカラーチャート 183A (散り斑葉;177A)
07 新しょうの葉の斑の有無	09 有
08 新しょうの葉の斑の色	RHSカラーチャート 180C (散り斑葉;171A)
09 節間長	03 中
10 枝の太さ	03 中
11 枝のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 葉身の長さ	05 中
13 葉身の幅	03 狭
14 葉身の長さ／幅	06 やや大
15 葉身の最大幅の位置	03 中央部
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	03 鈍形

Leucothoe D. Don
メルベユ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の主な色	RHSカラーチャート NN137A（散り斑葉;NN137B）
19 葉身の斑の有無	09 有
20 葉身の斑の色	RHSカラーチャート 146B（掃け込み）;5D（周縁部）（散り斑葉;5D）
21 葉身の斑の分布	01 周縁部、03 掃け込み（覆輪葉, 散り斑葉混在）
22 葉身の毛の有無	01 無
23 葉身の鋸歯の深さ	01 浅
24 葉身の凹凸	01 無又は極弱
25 葉身のねじれ	01 無又は弱
26 葉柄の長さ	03 中
27 花序の長さ	02 短
28 ほうの色	02 赤
29 ほうの毛の多少	01 少
30 がくの色	RHSカラーチャート NN155A
31 花冠の長さ	03 中
32 花冠筒部の幅	03 中
33 花冠筒部の開口部の幅	02 狭
34 花冠筒部の幅／開口部の幅	03 大

Leucothoe D. Don
メルベユ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠裂片の反りの強弱 36 花冠の色 37 開花始期	02 中
	RHSカラーチャート NN155B
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30855号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lobelia erinus L. LOBZ0023

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「LOBZ0023」は、対照品種「Sunlobe Repin」と比較して、下唇弁の表面の主な色がN81Cであること、下唇弁の表面の白色部が小であること等で区別性が認められる。対照品種「キュラソー コンパクトアメジスト」と比較して、葉の裏面のアントシアニンの着色が強であること、下唇弁の表面の主な色がN81Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mary Lewis

7 出願公表の年月日 令和5年4月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に品種名称不詳の品種を交配し、選抜したものである。

Lobelia erinus L.
LOBZ0023

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 斜上
02 草丈	05 中
03 側枝の長さ	05 中
04 節間長	04 やや短
05 側枝の太さ	03 中
06 側枝の緑色の濃淡	02 中
07 側枝のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
08 側枝の毛	01 無又は極粗
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉縁の鋸歯の深さ	06 やや深
12 葉の形	05 倒卵形
13 葉の表面の緑色の濃淡	02 中
14 葉の裏面のアントシアニンの着色	04 強
15 葉の表面の毛	01 無又は極粗
16 花型	01 一重
17 花の直径（八重品種に限る。）	

Lobelia erinus L.
LOBZ0023

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の色（八重品種に限る。）	
19 花冠の長さ	04 やや短
20 上唇弁の裂片の形	03 倒卵形
21 上唇弁の表面の色	RHSカラーチャート N81C
22 下唇弁の長さ	03 中
23 下唇弁の幅	05 中
24 下唇弁の中央裂片の幅	03 広
25 下唇弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N81C
26 下唇弁の表面の二次色（白色部を除く。二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N81A
27 下唇弁の表面の白色部	03 小
28 下唇弁の表面の白色部の形	01 長形のみ
29 下唇弁の斑紋の有無	09 有
30 下唇弁の斑紋の大きさ	02 中
31 下唇弁の裏面の色	RHSカラーチャート N81D
32 下唇弁の裂片の重なり	03 重なる
33 花筒の外面の色	RHSカラーチャート N81B

1 品種登録の番号及び年月日 第30856号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mandevilla Lindl. MAN216902

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MAN216902」は、対照品種「FISRIX DERED」と比較して、つるの数が無又は少であること、花冠裂片の表面の主な色が46Aであること、花冠裂片の周縁の反りが極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
MBA B. V.
Achterweg 58 a, 1424PR De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Niels Arts

7 出願公表の年月日 令和2年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Mandevilla Lindl.
MAN216902

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉群の粗密	04 やや粗
02 つるの数	01 無又は少
03 若茎の緑色の濃淡	03 濃
04 若茎のアントシアニンの着色	02 弱
05 節間長	02 かなり短
06 茎の毛の有無	01 無
07 葉序	02 十字対生
08 葉柄の長さ	02 中
09 葉柄の緑色の濃淡	03 濃
10 葉柄のアントシアニンの着色	02 弱
11 葉柄の毛の有無	09 有
12 葉身の長さ	04 やや短
13 葉身の幅	05 中
14 葉身の長さ／幅	02 中
15 葉身の最大幅の位置	02 中間部
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	02 円形

Mandevilla Lindl.
MAN216902

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の主な色	05 濃緑
19 葉身の二次色	01 無
20 葉身の二次色の模様	
21 葉身の表面の光沢	02 中
22 葉身の葉脈間の凹凸	01 無又は極弱
23 葉身の表面の毛の有無	01 無
24 葉身の裏面の緑色の濃淡	02 中
25 葉身の裏面の毛の有無	01 無
26 葉身の横断面の形	01 内曲
27 葉縁の波打ち	01 無又は極弱
28 小花柄の長さ	02 中
29 小花柄の緑色の濃淡	02 中
30 小花柄のアントシアニンの着色	02 中
31 小花柄の毛の有無	01 無
32 つぼみの形	02 ひし形
33 花型	01 一重
34 がくの長さ	02 中

Mandevilla Lindl.
MAN216902

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの下部の主な色	04 淡赤
36 がくの上部の主な色	04 淡赤
37 花冠の直径	05 中
38 花筒の長さ	02 中
39 花筒の外面の色	RHSカラーチャート N57B;149C (先端側)
40 花喉部の長さ	01 短
41 花喉部の先端部の幅	02 中
42 花喉部の形	02 鐘型
43 花喉部の外面下部の色	RHSカラーチャート 185C;149C (基部側)
44 花喉部の外面上部の色	RHSカラーチャート 185C
45 花喉部の内面下部の色	RHSカラーチャート N172B
46 花喉部の内面上部の色	RHSカラーチャート 46A
47 花冠裂片の長さ	05 中
48 花冠裂片の幅	04 やや狭
49 花冠裂片の対称性	03 著しく非対称
50 花冠裂片の先端の形	01 鋭尖形
51 花冠裂片の重なり	01 重ならない

Mandevilla Lindl.
MAN216902

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート 46A
53 花冠裂片の表面の二次色の有無	01 無
54 花冠裂片の表面の二次色	
55 花冠裂片の表面の二次色の分布	
56 花冠裂片の表面の二次色の模様	
57 花冠裂片の周縁の反り	01 極弱
58 花冠裂片の周縁の波打ち	02 中
59 花冠裂片の先端部の縦断面の形	02 平
60 花糸の色	02 淡黄
61 やくの色	02 淡黄
62 子房の色	03 淡緑

1 品種登録の番号及び年月日 第30857号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. シャンテ ボルドー (シャンテ ボルドー)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「シャンテ ボルドー」は、対照品種「レッド パープル チルドレン」と比較して、花卉の主な色がN80Aであること等で区別性が認められる。対照品種「レッド チルドレン ツウ」と比較して、花卉の主な色がN80Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ムラカミシード
茨城県笠間市大田町341番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上忠義

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「シャンテ グレープ」に「パープルチルドレン」を交配し、選抜したものである。

Matthiola incana (L.) R. Br.
 シャンテ ボルドー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
02 草型	02 分枝型
03 草丈	06 やや高
04 開花側枝の発生位置	01 主に上部
05 開花側枝の数	03 中
06 茎の硬さの強弱	06 やや強
07 葉数	06 やや多
08 上位葉の向き	03 やや水平
09 下位葉の切れ込みの深さ	05 中
10 葉の長さ	04 やや短
11 葉の幅	05 中
12 葉の形	02 中間形
13 葉の凹凸	07 強
14 葉の毛の有無	09 有
15 八重株と比較した一重株の葉の緑色の類似性	01 類似する
16 葉の緑色の濃淡	02 中
17 花柄の長さ	03 短

Matthiola incana (L.) R. Br.
 シャンテ ボルドー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花穂の長さ	06 やや長
19 花穂の形	02 円筒形
20 花穂の上部の伸長	02 小
21 花穂の花の数	03 少
22 小花柄の長さ	03 短
23 花の直径	05 中
24 花弁の数	03 中
25 八重花と一重花の花色の違いの有無	01 無
26 花の香り	02 弱
27 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
28 花弁の長さ	03 短
29 花弁の幅	04 やや狭
30 花弁の内曲	02 弱
31 花弁のちりめん状のしわ	03 中
32 花弁の主な色	RHSカラーチャート N80A
33 花弁の基部の複色部の有無	01 無
34 花弁の基部の複色部の色	

Matthiola incana (L.) R. Br.
 シャンテ ボルドー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の基部の複色部の大きさ	
36 内花弁の色	RHSカラーチャート N81B
37 一重花の花弁の長さ	05 中
38 一重花の花弁の幅	05 中
39 一重花の花弁の内曲	02 弱
40 一重花の花弁の主な色	RHSカラーチャート N78A
41 一重花の花弁の基部の複色部の有無	01 無
42 一重花の花弁の基部の複色部の色	
43 一重花の花弁の基部の複色部の大きさ	
44 開花始期	04 やや超早
45 開花始期2	
46 八重率	02 中
47 種子の色による八重鑑別の難易	02 難

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30858号 令和7年3月12日
 - 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Matthiola incana (L.) R. Br. シャンテ パープル (シャンテ パープル)
 - 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「シャンテ パープル」は、対照品種「パープルチルドレン」と比較して、花穂の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「シャンテ グレープ」と比較して、花卉の主な色がN81Aであること、一重花の花弁の主な色がN80Aであること、一重花の花弁の基部の複色部の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「ライトパープルサンダー」と比較して、花卉の主な色がN81Aであること、一重花の花弁の主な色がN80Aであること等で区別性が認められる。
 - 4 育成者権の存続期間 25年
 - 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ムラカミシード
茨城県笠間市大田町341番地
 - 6 登録品種の育成をした者の氏名
村上忠義
 - 7 出願公表の年月日 令和4年7月26日
 - 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「ブルーカル」を交配し、選抜したものである。

Matthiola incana (L.) R. Br.
 シャンテ パープル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
02 草型	02 分枝型
03 草丈	05 中
04 開花側枝の発生位置	01 主に上部
05 開花側枝の数	03 中
06 茎の硬さの強弱	06 やや強
07 葉数	05 中
08 上位葉の向き	03 やや水平
09 下位葉の切れ込みの深さ	03 浅
10 葉の長さ	03 短
11 葉の幅	05 中
12 葉の形	01 広形
13 葉の凹凸	05 中
14 葉の毛の有無	09 有
15 八重株と比較した一重株の葉の緑色の類似性	01 類似する
16 葉の緑色の濃淡	02 中
17 花柄の長さ	03 短

Matthiola incana (L.) R. Br.
 シャンテ パープル

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 8 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花穂の長さ 19 花穂の形 20 花穂の上部の伸長 21 花穂の花の数 22 小花柄の長さ 23 花の直径 24 花弁の数 25 八重花と一重花の花色の違いの有無 26 花の香り 27 がくのアントシアニン着色の有無 28 花弁の長さ 29 花弁の幅 30 花弁の内曲 31 花弁のちりめん状のしわ 32 花弁の主な色 33 花弁の基部の複色部の有無 34 花弁の基部の複色部の色	05 中
	02 円筒形
	02 小
	03 少
	03 短
	05 中
	03 中
	01 無
	02 弱
	09 有
	04 やや短
	04 やや狭
	02 弱
	02 弱
	RHSカラーチャート N81A
09 有	
01 白	

Matthiola incana (L.) R. Br.

シャンテ パープル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の基部の複色部の大きさ	01 小
36 内花弁の色	RHSカラーチャート N81B
37 一重花の花弁の長さ	04 やや短
38 一重花の花弁の幅	05 中
39 一重花の花弁の内曲	03 中
40 一重花の花弁の主な色	RHSカラーチャート N80A
41 一重花の花弁の基部の複色部の有無	09 有
42 一重花の花弁の基部の複色部の色	01 白
43 一重花の花弁の基部の複色部の大きさ	01 小
44 開花始期	03 超早
45 開花始期2	
46 八重率	02 中
47 種子の色による八重鑑別の難易	02 難

1 品種登録の番号及び年月日 第30859号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. KSST-ADY

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KSST-ADY」は、対照品種「イエロー ブラウズ」と比較して、花卉の数が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「ディープイエロー アイアン」と比較して、開花始期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KSST-DY」の変異株である。

Matthiola incana (L.) R. Br.
KSST-ADY

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
02 草型	01 1本立ち型
03 草丈	06 やや高
04 開花側枝の発生位置	
05 開花側枝の数	01 無又は極少
06 茎の硬さの強弱	07 強
07 葉数	08 かなり多
08 上位葉の向き	02 斜上
09 下位葉の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	04 やや狭
12 葉の形	03 細形
13 葉の凹凸	07 強
14 葉の毛の有無	09 有
15 八重株と比較した一重株の葉の緑色の類似性	01 類似する
16 葉の緑色の濃淡	02 中
17 花柄の長さ	03 短

Matthiola incana (L.) R. Br.
KSST-ADY

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30859号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花穂の長さ	05 中
19 花穂の形	01 円錐形
20 花穂の上部の伸長	02 小
21 花穂の花の数	07 多
22 小花柄の長さ	03 短
23 花の直径	06 やや大
24 花弁の数	01 極少
25 八重花と一重花の花色の違いの有無	01 無
26 花の香り	03 中
27 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
28 花弁の長さ	04 やや短
29 花弁の幅	04 やや狭
30 花弁の内曲	03 中
31 花弁のちりめん状のしわ	04 強
32 花弁の主な色	RHSカラーチャート 8D
33 花弁の基部の複色部の有無	09 有
34 花弁の基部の複色部の色	02 淡黄

Matthiola incana (L.) R. Br.
KSST-ADY

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30859号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の基部の複色部の大きさ	02 中
36 内花弁の色	RHSカラーチャート 8D
37 一重花の花弁の長さ	05 中
38 一重花の花弁の幅	05 中
39 一重花の花弁の内曲	02 弱
40 一重花の花弁の主な色	RHSカラーチャート 8D
41 一重花の花弁の基部の複色部の有無	09 有
42 一重花の花弁の基部の複色部の色	02 淡黄
43 一重花の花弁の基部の複色部の大きさ	02 中
44 開花始期	06 かなり早
45 開花始期2	
46 八重率	02 中
47 種子の色による八重鑑別の難易	02 難

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30860号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Matthiola incana (L.) R. Br. 八幡ブラウンスプレー (ヤワブラウンスプレー)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「八幡ブラウンスプレー」は、対照品種「サンセット チルドレン」と比較して、花卉の主な色が186Bであること、開花始期が超早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
坊田聡子
千葉県南房総市白浜町滝口5198番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
坊田聡子
- 7 出願公表の年月日 令和4年11月17日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「八幡 ブラウン2号」の変異株である。

Matthiola incana (L.) R. Br.
八幡ブラウンスプレー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
02 草型	02 分枝型
03 草丈	04 やや低
04 開花側枝の発生位置	01 主に上部
05 開花側枝の数	03 中
06 茎の硬さの強弱	07 強
07 葉数	04 やや少
08 上位葉の向き	03 やや水平
09 下位葉の切れ込みの深さ	04 やや浅
10 葉の長さ	03 短
11 葉の幅	05 中
12 葉の形	01 広形
13 葉の凹凸	06 やや強
14 葉の毛の有無	09 有
15 八重株と比較した一重株の葉の緑色の類似性	01 類似する
16 葉の緑色の濃淡	02 中
17 花柄の長さ	03 短

Matthiola incana (L.) R. Br.
八幡ブラウンスプレー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花穂の長さ	06 やや長
19 花穂の形	02 円筒形
20 花穂の上部の伸長	01 極小
21 花穂の花の数	02 かなり少
22 小花柄の長さ	03 短
23 花の直径	04 やや小
24 花弁の数	03 中
25 八重花と一重花の花色の違いの有無	01 無
26 花の香り	02 弱
27 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
28 花弁の長さ	03 短
29 花弁の幅	03 狭
30 花弁の内曲	02 弱
31 花弁のちりめん状のしわ	02 弱
32 花弁の主な色	RHSカラーチャート 186B
33 花弁の基部の複色部の有無	09 有
34 花弁の基部の複色部の色	02 淡黄

Matthiola incana (L.) R. Br.
八幡ブラウンスプレー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の基部の複色部の大きさ	02 中
36 内花弁の色	RHSカラーチャート 186B
37 一重花の花弁の長さ	03 短
38 一重花の花弁の幅	04 やや狭
39 一重花の花弁の内曲	02 弱
40 一重花の花弁の主な色	RHSカラーチャート 186B
41 一重花の花弁の基部の複色部の有無	09 有
42 一重花の花弁の基部の複色部の色	02 淡黄
43 一重花の花弁の基部の複色部の大きさ	02 中
44 開花始期	03 超早
45 開花始期2	
46 八重率	02 中
47 種子の色による八重鑑別の難易	02 難

1 品種登録の番号及び年月日 第30861号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Nemesia Vent. TF1025

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TF1025」は、対照品種「ピンクベリー」と比較して、上唇弁の中央裂片の重なりが離れるであること、上唇弁の主な色が62Aであること、下唇弁の主な色が56Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
宮野伸哉

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Nemesia Vent.
TF1025

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 やや直立
02 草丈	03 低
03 株の幅	06 やや広
04 分枝の粗密	06 やや密
05 茎の太さ	02 中
06 葉身の長さ	04 やや短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の長さ／幅	04 やや低
09 葉身の最大幅の位置	02 中央部と基部の間
10 葉身の周縁の欠刻の数	05 中
11 葉身の周縁の欠刻の深さ	03 浅
12 葉身の斑の有無	01 無
13 葉身の主な色	02 緑
14 葉身の二次色	
15 花序の花の着生の粗密	06 やや密
16 花の香りの強弱	02 中
17 花冠の長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠の幅	05 中
19 花冠の長さ／幅	05 中
20 花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さ	06 やや長
21 上唇弁の中央裂片の重なり	01 離れる
22 上唇弁の側裂片の向き	03 斜上
23 上唇弁の中央裂片に対する側裂片の位置	02 同程度
24 上唇弁の側裂片の先端の形	04 切形
25 上唇弁の主な色	RHSカラーチャート 62A
26 上唇弁の脈の長さ	05 中
27 上唇弁の脈の明瞭度	03 中
28 上唇弁の脈の色	07 青紫
29 上唇弁の基部のブロッチの大きさ	01 無又は極小
30 上唇弁の基部のブロッチの明瞭度	03 弱
31 上唇弁の基部のブロッチの色	02 黄
32 上唇弁の裏面の色	RHSカラーチャート 48D
33 下唇弁の反りの強弱	02 中
34 下唇弁の横断面の湾曲の強弱	02 中

Nemesia Vent.
TF1025

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 下唇弁の波打ちの強弱	04 やや弱
36 下唇弁の切れ込みの強弱	03 弱
37 下唇弁の主な色	RHSカラーチャート 56A
38 下唇弁の二次色	RHSカラーチャート 55A
39 下唇弁の二次色の分布	03 縁部
40 下唇弁の裏面の色	RHSカラーチャート 54D;N155B(基部)
41 下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさ	05 中
42 下唇弁の基部の突起の色	04 濃黄
43 下唇弁の基部の突起の色2	
44 下唇弁の基部の突起の毛の有無	01 無
45 下唇弁の基部の突起の毛の粗密	
46 距の下唇弁に対する相対的な長さ	04 やや短
47 花色の変化	01 無又は弱
48 花序のさく果の結実の粗密	02 かなり粗

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30862号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. ゆみはりづき (ユミハリヅキ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ゆみはりづき」は、対照品種「彩のきずな」と比較して、葉身の幅が中であること、穂数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめひたち」と比較して、胚乳のアミロース含量が4型であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社水稻生産技術研究所
愛知県豊明市阿野町違井20-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
地主建志
- 7 出願公表の年月日 令和2年6月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「JR008」に「JU010」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
ゆみはりづき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	05 中
15 初期の止め葉の姿勢	02 立～半立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
ゆみはりづき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	04 やや早
20 雄性不稔性	
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	03 短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	06 やや長
31 穂数	04 やや少
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	01 先端のみ

Oryza sativa L.
ゆみはりづき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	01 極短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	04 やや早
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
ゆみはりづき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	06 やや大
54 粳の長さ	05 中
55 粳の幅	06 やや広
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	02 半糯
64 胚乳のアミロース含量	04 4 型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	04 低崩壊～中間
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
ゆみはりづき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	08 かなり難
71 耐倒伏性	
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	06 やや密

Oryza sativa L.
ゆみはりづき

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 87 セシウム吸収性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30863号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. コシヒカリ駿河d65Gw (コシカリスカ`d65Gw)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「コシヒカリ駿河d65Gw」は、対照品種「コシヒカリ駿河d60Gg」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ふくまる」と比較して、出穂期がやや早であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
富田因則
静岡県静岡市駿河区大谷836静岡大学大谷宿舎3-21

6 登録品種の育成をした者の氏名
富田因則

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「さちいっぱい」に「コシヒカリ駿河Gg」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河d65Gw

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	07 濃
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	04 やや短
14 葉身の幅	04 やや狭
15 初期の止め葉の姿勢	02 立～半立
16 後期の止め葉の姿勢	04 半立～水平
17 稈の向き	02 立～半立

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河d65Gw

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	04 やや早
20 雄性不稔性	
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	05 中
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	05 中
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	02 上1/4のみ

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河d65Gw

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30863号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	02 短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	04 やや早
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	06 やや長

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河d65Gw

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	07 大
54 粳の長さ	06 やや長
55 粳の幅	07 広
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	06 やや大
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	06 やや広
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5 型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	03 低崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河d65Gw

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	08 かなり難
71 耐倒伏性	
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	04 やや粗

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河d65Gw

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 87 セシウム吸収性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30864号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. コシヒカリ駿河BmsGw (コシカリスカ`BmsGw)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「コシヒカリ駿河BmsGw」は、対照品種「いのちの壺」と比較して、穂数
中であること、玄米の千粒重がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種
「コシヒカリ駿河Gg」と比較して、穂数の中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
富田因則
静岡県静岡市駿河区大谷836静岡大学大谷宿舎3-21

6 登録品種の育成をした者の氏名
富田因則

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「コシヒカリ駿河Bms」に「コシヒカリ駿河Gg」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
コシヒカリ 駿河BmsGw

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	04 やや狭
15 初期の止め葉の姿勢	02 立～半立
16 後期の止め葉の姿勢	04 半立～水平
17 稈の向き	02 立～半立

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河BmsGw

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	04 やや早
20 雄性不稔性	
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	06 やや太
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	07 長
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	05 中
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	02 上1/4のみ

Oryza sativa L.
コシヒカリ 駿河BmsGw

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	01 極短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	05 中
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	06 やや長

Oryza sativa L.
コシヒカリ 駿河BmsGw

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	07 大
54 粳の長さ	06 やや長
55 粳の幅	07 広
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	06 やや大
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	06 やや広
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	05 中間
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河BmsGw

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	08 かなり難
71 耐倒伏性	
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	05 中

Oryza sativa L.
コシヒカリ駿河BmsGw

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30864号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 87 セシウム吸収性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30865号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Physocarpus (Cambess.) Maxim. MINPHYPAN

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MINPHYPAN」は、対照品種「Luteus」と比較して、樹高が極低であること、成葉の表面の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ダーツゴールド」と比較して、樹高が極低であること、幼葉の表面の主な色が154Bであること、成葉の表面の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hortival Diffusion S. A. S.

les Fontaines de l'Aunay Beaufort-en-Vallee 49250 Beaufort-en-Anjou, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Patrick Pineau

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Minange」の変異株である。

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
MINPHYPAN

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 開張
02 樹高	01 極低
03 樹幅	04 やや狭
04 新しょうのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
05 枝の主な色	RHSカラーチャート 144A
06 枝の横断面の形	01 円形
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	03 狭
09 葉身の長さ／幅	05 中
10 葉身の先端部の形	01 鋭形
11 葉身の基部の形	01 鈍形
12 葉身の鋸歯の形	03 円鋸歯状
13 葉身の切れ込みの深さ	07 深
14 幼葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 154B
15 幼葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート 154C
16 成葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 144A
17 成葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート 154D

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
MINPHYPAN

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 成葉の表面の斑の有無	09 有
19 成葉の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	RHSカラーチャート 8B
20 葉身の裏面の毛の有無	01 無
21 葉身の裏面の毛の粗密（毛のある品種に限る。）	
22 葉柄の長さ	03 短
23 葉柄の色	RHSカラーチャート N144A
24 花の直径	04 やや小
25 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C

1 品種登録の番号及び年月日 第30866号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Physocarpus (Cambess.) Maxim. ZLEYel2

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ZLEYel2」は、対照品種「SMNPOTWG」と比較して、葉身の先端部の形が鈍形であること、葉柄の色が165Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Hoogi031」と比較して、幼葉の表面の主な色がN144Aであること、成葉の表面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Plants Nouveau LLC
1220 Selma Street, Mobile, Alabama, 36604, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
David Charles Zlesak

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要
「DONNA MAY」に「Dart's Gold」を交配し、選抜したものである。

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
ZLEVel2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立
02 樹高	02 かなり低
03 樹幅	04 やや狭
04 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
05 枝の主な色	RHSカラーチャート 144C
06 枝の横断面の形	01 円形
07 葉身の長さ	02 かなり短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の長さ／幅	05 中
10 葉身の先端部の形	02 鈍形
11 葉身の基部の形	01 鈍形
12 葉身の鋸歯の形	03 円鋸歯状
13 葉身の切れ込みの深さ	07 深
14 幼葉の表面の主な色	RHSカラーチャート N144A
15 幼葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート 145B
16 成葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 12A
17 成葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート 12C

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
ZLEYel2

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 8 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 成葉の表面の斑の有無 19 成葉の表面の斑の色（斑入り品種に限る。） 20 葉身の裏面の毛の有無 21 葉身の裏面の毛の粗密（毛のある品種に限る。） 22 葉柄の長さ 23 葉柄の色 24 花の直径 25 花卉の表面の主な色	01 無
	01 無
	02 かなり短
	RHSカラーチャート 165B
	04 やや小
	RHSカラーチャート NN155B

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30867号 令和7年3月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Physocarpus (Cambess.) Maxim. Minpourp8
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Minpourp8」は、対照品種「Seward」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、幼葉の表面の主な色が183Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Hortival Diffusion S. A. S.
les Fontaines de l'Aunay Beaufort-en-Vallee 49250 Beaufort-en-Anjou, France
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Patrick PINEAU
- 7 出願公表の年月日 令和3年1月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Dart's Gold」に「Mindia」を交配し、選抜したものである。

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
Minpourp8

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 開張
02 樹高	02 かなり低
03 樹幅	04 やや狭
04 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
05 枝の主な色	RHSカラーチャート 184A
06 枝の横断面の形	01 円形
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	03 狭
09 葉身の長さ／幅	05 中
10 葉身の先端部の形	01 鋭形
11 葉身の基部の形	01 鈍形
12 葉身の鋸歯の形	04 二重鋸歯状
13 葉身の切れ込みの深さ	07 深
14 幼葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 183B
15 幼葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート 151D
16 成葉の表面の主な色	RHSカラーチャート N186C
17 成葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート 148B

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
Minpourp8

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 8 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 成葉の表面の斑の有無	01 無
19 成葉の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
20 葉身の裏面の毛の有無	01 無
21 葉身の裏面の毛の粗密（毛のある品種に限る。）	
22 葉柄の長さ	03 短
23 葉柄の色	RHSカラーチャート 183A
24 花の直径	05 中
25 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C

1 品種登録の番号及び年月日 第30868号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus salicina Lindl. ハニービート (ハニ-ビ-ート)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ハニービート」は、対照品種「ソルダム」と比較して、果皮の地色が黄であること、果肉の色が黄であること、果実の酸味が低であること等で区別性が認められる。対照品種「大石早生」と比較して、果実の大きさが大であること、果実の酸味が低であること、果実の甘味がかなり高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
八重垣英明 末貞佑子 山口正己 澤村豊 土師岳 安達栄介 山根崇嘉 鈴木勝
征 内田誠

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ソルダム」×「オザークプレミア」に「太陽」を交配し、選抜したものである。

Prunus salicina Lindl.
ハニービート

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	05 中
02 樹冠の粗密	05 中
03 枝の発生の向き	03 斜上
04 枝の色の濃淡	07 濃
05 短果枝の長さ	03 短
06 芽の大きさ	04 やや小
07 芽の形	02 鈍形
08 葉芽の着き方	02 やや突出
09 葉身の着生の向き	03 上向
10 葉身の形	01 楕円形
11 葉身の先端の角度	01 鋭
12 葉身の緑色の濃淡	03 淡
13 葉身の光沢の強弱	03 弱
14 葉身の毛の粗密	01 無又は極粗
15 葉身の鋸歯の形	01 鈍鋸歯
16 葉柄の長さ	05 中
17 葉柄の毛じの粗密	05 中

Prunus salicina Lindl.
ハニービート

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の溝の深さ	05 中
19 蜜腺の位置	02 葉身基部と葉柄に同程度
20 花柄の長さ	07 長
21 1年枝の着花の有無	09 有
22 八重咲花の出現頻度	01 無又は極少
23 花の大きさ	08 かなり大
24 花弁の重なり	03 離れる
25 がく片の形	03 卵形
26 花弁の大きさ	05 中
27 花弁の形	02 倒卵形
28 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
29 柱頭のやくに対する位置	05 同位
30 果実の大きさ	07 大
31 果実の形	02 楕円形
32 果実の対称性	02 対称
33 果頂部の形	01 凸
34 梗あいの深さ	04 やや浅

Prunus salicina Lindl.
ハニービート

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果皮の地色	04 黄
36 果皮を覆う色	04 赤
37 果肉の色	04 黄
38 果肉の硬さ	05 中
39 果汁の多少	07 多
40 果実の酸味	03 低
41 果実の甘味	08 かなり高
42 核の粘離	02 半粘性
43 核の大きさ	06 やや大
44 核の横面の形	02 楕円形
45 核の正面の形	01 狭楕円形
46 核の基部から見た形	02 楕円形
47 核の横面の対称性	01 非対称
48 核の最大幅の位置	02 中央
49 核の表面の粗滑	02 やや粗
50 核の基部の幅	05 中
51 核の基部の角度	02 直角

Prunus salicina Lindl.
ハニービート

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 核の頂部の形 53 開花始期 54 成熟期	01 鋭
	04 やや早
	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第30869号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. *culta* (Mak.) Nakai 蒼月 (ソウゲツ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「蒼月」は、対照品種「幸水」と比較して、梗あいの深さが浅であること、果皮の色が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「はつまる」と比較して、雄ずいの数が多いこと、果皮の色が黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高田教臣 齋藤寿広 西尾聡悟 寺上伸吾 加藤秀憲 澤村豊 竹内由季恵 平林
利郎 佐藤明彦 尾上典之

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「なつしずく」に「はつまる」を交配し、選抜したものである。

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
蒼月

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 立
02 樹勢	06 やや強
03 枝の長さ	07 長
04 枝の太さ	06 やや太
05 枝の色	03 黒褐
06 節間長	04 やや短
07 皮目の数	03 少
08 皮目の大きさ	05 中
09 枝の毛じの粗密	07 密
10 短果枝の多少	03 少
11 葉芽の先端の形	01 鋭
12 葉芽の着き方	01 密着
13 腋花芽の数	03 少
14 花芽の大きさ	05 中
15 花芽の形	04 卵形
16 花芽のりん片の色	01 褐
17 どん葉の色	03 褐

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
蒼月

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 どん葉の毛じの有無	09 有
19 どん葉の毛じの粗密	03 粗
20 葉身の形	03 卵形
21 葉身の先端の形	02 鋭形
22 葉身の基部の形	03 丸形
23 葉身の鋸歯の形	03 円鋸歯状
24 葉身の長さ	06 やや長
25 葉身の幅	04 やや狭
26 葉柄の長さ	03 短
27 葉柄の長さ／葉身の長さの比	03 小
28 花序の花の数	05 中
29 つぼみの色	02 淡桃
30 花弁の主な色	01 白
31 花弁の大きさ	06 やや大
32 花弁の形	03 卵形
33 花弁の切れ込みの数	05 中
34 花弁の数	03 6～7枚以下

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
蒼月

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 小花柄の毛じの粗密	05 中
36 雄ずいの数	07 多
37 やくの赤色の濃淡	01 淡
38 花粉の有無	09 有
39 果実の形	02 円形
40 梗あいの深さ	03 浅
41 梗あいの幅	05 中
42 がくあいの深さ	04 やや浅
43 がくあいの幅	06 やや広
44 がく片の宿存の強弱	03 弱
45 果実の大きさ	05 中
46 果皮の色	02 黄緑
47 果点の大きさ	03 小
48 果点の粗密	05 中
49 果面の粗滑（赤なし品種に限る）	
50 果面のさびの多少（青なし品種に限る）	05 中
51 果柄の長さ	05 中

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
蒼月

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 0 8 6 9 号
52 果柄の太さ	07 太	
53 肉梗の有無	09 有	
54 果芯の形	04 円心臓形	
55 果芯の大きさ	03 小	
56 心室の数	06 やや多	
57 果肉の色	02 黄白	
58 果肉の硬さ	03 軟	
59 果肉の粗密	07 密	
60 果肉の切り口の褐変の強弱	05 中	
61 果実の甘味	06 やや高	
62 果実の酸味	03 低	
63 果実の渋味	01 無	
64 果汁の多少	07 多	
65 種子の大きさ	05 中	
66 種子の形	01 卵形	
67 種子の数	07 多	
68 ほう芽始期	04 やや早	

蒼月

第 3 0 8 6 9 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30870号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sorghum Moench リュウオウワセ (リュウワセ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「リュウオウワセ」は、対照品種「夏太郎」と比較して、出穂期がやや早であること、草丈が極高であること、穂の長さがやや長であること、穎の色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「華青葉」と比較して、草丈が極高であること、穂の長さがやや長であること、穎の色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高井智之 桂真昭 我有満 山下浩 上床修弘 波多野哲也 松岡誠 荒川明 木
村貴志 徳永毅 小柴太一 米田淳一

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ICSA264」を母系、「JNK-1」を父系とする交雑品種である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 幼苗の子葉しょうのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
03 分けつ数	01 無又は極少
04 葉身の緑色の濃淡	03 中
05 葉の中肋の色	03 淡緑
06 葉の中肋の変色の範囲	01 無又は極小
07 出穂期	04 やや早
08 穎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
09 柱頭のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
10 柱頭の色	02 淡黄
11 柱頭の長さ	02 短
12 小花の長さ	07 長
13 自家稔性	03 高
14 開花終期の穎の色	01 淡緑
15 開花終期の穂の粒着の粗密	05 中
16 護穎の芒の長さ	01 無又は極短
17 葯の色	04 橙赤

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 草丈	
19 草丈2	04 極高
20 稈の直径	06 やや大
21 稈の節間の着色の有無	01 無
22 葉身の長さ	07 長
23 葉身の幅	06 やや広
24 穂の長さ	06 やや長
25 穂首の長さ	07 長
26 穂の分枝の長さ	05 中
27 穂の粗密	06 やや密
28 穂の最大幅の位置	03 中
29 穎の色	02 淡黄
30 穎の長さ	05 中
31 子実の色	07 淡褐
32 子実の色2	
33 子実の千粒重	06 やや重
34 正面から見た子実の形	02 広楕円形

リュウオウワセ

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30870号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30871号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. ハナチカラ (ハチカラ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ハナチカラ」は、対照品種「夏黄金」と比較して、護穎の肩部の幅がやや狭であること、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド無しであること、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド5+10であること等で区別性が認められる。対照品種「ナンプコムギ」と比較して、草丈が中であること、穂の形が紡錘状であること、穂の長さがやや長であること、稈の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「シラネコムギ」と比較して、芒の有無が短芒有りであること、穂の先端の芒の長さが短であること、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド5+10であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

田淵秀樹 前島秀和 丸山泰 細野哲 中村和弘 牛山智彦 谷口岳志

7 出願公表の年月日 令和3年2月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ハナマンテン」に「ゆきちから」を交配し、選抜したものである。

Triticum aestivum L.
ハナチカラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 子葉しょうのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 草姿	07 半ほふく
03 反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度	05 中
04 出穂期	04 やや早
05 止め葉の葉しょうの白粉の強弱	05 中
06 止め葉の白粉の強弱	06 やや強
07 穂の白粉の強弱	06 やや強
08 穂首の白粉の強弱	05 中
09 草丈	05 中
10 穂首直下の節間の髓の厚さ	01 無又は極薄
11 穂の形	05 紡錘状
12 粒着密度	05 中
13 穂の長さ	06 やや長
14 芒の有無	02 短芒有り
15 穂の先端の芒の長さ	03 短
16 穂の色	02 着色
17 穂軸の先端凸部表面の毛の多少	02 かなり少

Triticum aestivum L.
ハナチカラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 護穎の肩部の幅	04 やや狭
19 護穎の肩部の形	07 上がる
20 護穎の嘴の長さ	03 短
21 護穎の嘴の形	03 やや曲がる
22 護穎の内側の毛の多少	01 極少
23 原麦粒の色	02 赤
24 原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡	03 淡
25 まき性	01 秋まき型
26 Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	03 バンド無し
27 Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	03 バンド7+9
28 Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	04 バンド5+10
29 稈の長さ	04 やや短
30 ふの色	04 褐
31 粒の形	03 中
32 千粒重	06 やや大
33 うるち・もちの別	01 うるち
34 成熟期	04 やや早

Triticum aestivum L.
ハナチカラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 粒質	02 中間質

1 品種登録の番号及び年月日 第30872号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. しろゆたか (シユタカ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「しろゆたか」は、対照品種「シラネコムギ」と比較して、護穎の肩部の幅が中であること、護穎の嘴の形がやや曲がるであること、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド2.2+12であること等で区別性が認められる。対照品種「キヌヒメ」と比較して、出穂期がやや早であること、穂首の白粉の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「フウセツ」と比較して、出穂期がやや早であること、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド2.2+12であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

田淵秀樹 前島秀和 丸山泰 細野哲 中村和弘

7 出願公表の年月日 令和3年2月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

(「キヌヒメ」×「きたほなみ」)に「キヌヒメ」を交配し、選抜したものである。

Triticum aestivum L.
しろゆたか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 子葉しょうのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 草姿	07 半ほふく
03 反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度	05 中
04 出穂期	04 やや早
05 止め葉の葉しょうの白粉の強弱	05 中
06 止め葉の白粉の強弱	04 やや弱
07 穂の白粉の強弱	05 中
08 穂首の白粉の強弱	05 中
09 草丈	05 中
10 穂首直下の節間の髓の厚さ	01 無又は極薄
11 穂の形	05 紡錘状
12 粒着密度	05 中
13 穂の長さ	05 中
14 芒の有無	03 長芒有り
15 穂の先端の芒の長さ	05 中
16 穂の色	02 着色
17 穂軸の先端凸部表面の毛の多少	02 かなり少

Triticum aestivum L.

しろゆたか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 護穎の肩部の幅	05 中
19 護穎の肩部の形	05 水平
20 護穎の嘴の長さ	04 やや短
21 護穎の嘴の形	03 やや曲がる
22 護穎の内側の毛の多少	01 極少
23 原麦粒の色	02 赤
24 原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡	03 淡
25 まき性	01 秋まき型
26 Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	03 バンド無し
27 Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	02 バンド7+8
28 Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	05 バンド2.2+12
29 稈の長さ	03 短
30 ふの色	04 褐
31 粒の形	03 中
32 千粒重	06 やや大
33 うるち・もちの別	01 うるち
34 成熟期	04 やや早

Triticum aestivum L.

しろゆたか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 粒質	02 中間質

1 品種登録の番号及び年月日 第30873号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. 春よ恋St (ハルヨイSt)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「春よ恋St」は、対照品種「春よ恋」と比較して、しょう葉のアントシアニン着色の強弱が中であること、グルテニン組成：Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド無しであること、グルテニン組成：Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド7+8であること等で区別性が認められる。対照品種「はるきらり」と比較して、護穎の肩部の幅がやや広であること、護穎の肩部の形が水平であること、千粒重がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「農林61号」と比較して、しょう葉のアントシアニン着色の強弱が中であること、穂の色が白であること、護穎の肩部の形が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクレン農業協同組合連合会
北海道札幌市中央区北四条西1丁目3番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中由紀 竹之内悠 太田宇香 帛田淳史 筒井一郎 徳久麗奈 田中亨 高松清史 井田悠太

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「春よ恋」の交配系統どうしを交配し、選抜したものである。

Triticum aestivum L.
春よ恋St

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	02 赤
02 種子のフェノール反応による着色の濃淡	06 やや濃
03 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	05 中
04 草姿	03 半立
05 反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度	08 かなり高
06 止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱	02 中
07 出穂期	05 中
08 止め葉の葉しょうの白粉の強弱	03 弱
09 止め葉の白粉の強弱	03 弱
10 穂の白粉の強弱	03 弱
11 穂首の白粉の強弱	03 弱
12 護穎の外面の毛の有無	01 無
13 草丈	05 中
14 穂首節直下の節間の髓の厚さ	01 薄
15 粒着密度	04 やや粗
16 穂の長さ	06 やや長
17 芒の有無	03 長芒有り

Triticum aestivum L.
春よ恋St

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 穂の先端の芒の長さ	07 長
19 穂の色	01 白
20 穂の形	05 紡錘状
21 穂軸の先端凸部表面の毛	01 無又は極小
22 護穎の肩部の幅	06 やや広
23 護穎の肩部の形	05 水平
24 護穎の嘴の長さ	09 極長
25 護穎の嘴の形	01 直
26 護穎の内側の毛	01 極小
27 まき性	03 春まき型
28 グルテニン組成：Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	03 バンド無し
29 グルテニン組成：Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	02 バンド7+8
30 グルテニン組成：Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	04 バンド5+10
31 稈の長さ	05 中
32 桴の色	02 黄
33 粒の形	04 狭楕円
34 千粒重	06 やや大

Triticum aestivum L.
春よ恋St

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 うるち・もちの別 36 成熟期 37 粒質	01 うるち
	05 中
	03 硝子質

1 品種登録の番号及び年月日 第30874号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. Sunaya 9551

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunaya 9551」は、対照品種「クォーツXP レッドアイ」と比較して、葉身の表面の色が濃緑であること、花冠の目の直径がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「トスカーナ スカーレットウィズアイ」と比較して、花冠の目の直径がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 令和5年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Verbena L.
Sunaya 9551

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 株の幅	04 やや小
03 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
04 葉身の長さ	05 中
05 葉身の幅	04 やや狭
06 葉身の形	04 卵形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉身の切れ込みの型	
09 葉身の周縁の形	02 歯状
10 葉身の表面の色	04 濃緑
11 葉身の表面のアントシアニンの着色の有無	01 無
12 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	
13 葉柄の長さ	03 短
14 花序の直径	06 やや大
15 花序の形	01 広卵形
16 花らいの色	RHSカラーチャート 46A
17 花型	01 一重

Verbena L.
Sunaya 9551

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30874号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠裂片の重なり	02 接する
19 花冠の直径	06 やや大
20 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
21 がくのアントシアニン着色の部位	
22 花筒の長さ	07 長
23 花筒の突出した毛の先端の色	02 淡緑黄
24 花冠裂片の縦断面の曲がり	02 直
25 花冠裂片の周縁の波打ちの強弱	03 弱
26 花冠の色数	01 1
27 花冠の模様	01 均一
28 花冠の色の分布（ぼかしの品種に限る）	
29 花冠の主な色	RHSカラーチャート 45B
30 花冠の二次色	
31 花冠の目の有無	09 有
32 花冠の目の直径	04 やや小
33 花冠の目の色	01 緑白
34 花冠の色の変化	03 無変化

1 品種登録の番号及び年月日 第30875号 令和7年3月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Vitis L. サニーハート (サニハート)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サニーハート」は、対照品種「安芸クイーン」と比較して、成熟始期がやや晩であること、果粒の形1が球形であること等で区別性が認められる。対照品種「赤嶺」と比較して、成葉の上裂刻の深さがやや浅であること、果粒の形1が球形であること、果実の香りがマスカットであること等で区別性が認められる。対照品種「コトピー」と比較して、成葉の上裂刻の深さがやや浅であること、果粒の形1が球形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
齋藤寿広 佐藤明彦 河野淳 尾上典之 三谷宣仁 東暁史 伴雄介 山田昌彦
上野俊人 白石美樹夫 清水健雄 松崎隆介 中島育子 上野豪俊 伊藤隆男 土
師岳 千秋祐也

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「シャインマスカット」を交配し、選抜したものである。

Vitis L.
サニーハート

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 ほう芽期	04 やや早
02 幼しょうの先端の葉の開度	04 開く
03 幼しょうの先端の綿毛の密度	09 極密
04 幼しょうの先端の綿毛のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
05 幼しょうの先端の絨毛の密度	01 無又は極粗
06 若葉の表面の色	02 緑
07 若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度	09 極密
08 若葉裏面の主脈上の絨毛の密度	01 無又は極粗
09 新しょうの向き	03 斜上
10 新しょうの節間の上面の色	02 赤と緑
11 新しょうの節間の下面の色	01 緑
12 新しょうの節の上面の色	02 赤と緑
13 新しょうの節の下面の色	01 緑
14 新しょうの節間の絨毛の密度	01 無又は極粗
15 新しょうの巻きひげの長さ	05 中
16 花穂の長さ	05 中
17 花性	03 両性

Vitis L.
サニーハート

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 成葉の大きさ	06 やや大
19 成葉の形	02 くさび形
20 成葉の表面の凹凸の強弱	07 強
21 成葉の裂片数	03 5
22 成葉の上裂刻の深さ	04 やや浅
23 成葉の上裂片の重なり（裂刻のある品種に限る。）	01 開く
24 成葉の葉柄側裂刻の重なり	04 わずかに開く
25 成葉の鋸歯の長さ	04 やや短
26 成葉の鋸歯の長さ／基部幅	04 やや小
27 成葉の鋸歯の形	02 両側直線形
28 成葉表面の主脈のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
29 成葉裏面の主脈間の綿毛の密度	07 密
30 成葉裏面の主脈上の絨毛の密度	01 無又は極粗
31 成葉の主脈に対する葉柄の長さ	01 短い
32 成熟始期	06 やや晩
33 果房の大きさ	06 やや大
34 果房の着粒密度	03 粗

Vitis L.
サニーハート

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 穂梗の長さ	07 長
36 穂梗の色	03 淡紅
37 果粒の大きさ	08 かなり大
38 果粒の形1	02 球形
39 果粒の形2	
40 果皮の色	06 赤
41 果粉の多少	07 多
42 脱粒の難易	02 中
43 果皮の厚さ	04 やや薄
44 果皮と果肉の分離性	03 難
45 果肉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
46 果肉の硬さ	02 中
47 肉質	03 崩壊性
48 果汁の甘味	07 高
49 果汁の多少	03 多
50 果実の香り	02 マスカット
51 種子の有無	03 有

Vitis L.
サニーハート

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 熟しょうの色 53 花振るいの多少	02 橙褐
	05 中