

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30877号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. ピーチロリポップ (ピーチロリポップ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ピーチロリポップ」は、対照品種「スラッシュローズ」と比較して、舌状花の反りが外曲であること、舌状花の色数が3以上であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
久保仁一
埼玉県鴻巣市広田3862-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
久保仁一
- 7 出願公表の年月日 令和3年6月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「スラッシュローズ」の変異株でる。

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
ピーチロリポップ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 立型
02 草丈	06 やや高
03 分枝の粗密	03 粗
04 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉の長さ	04 やや短
06 葉の幅	04 やや狭
07 葉の形	03 III型
08 葉柄の長さ	07 長
09 葉の周縁の鋸歯の形	03 深鋭鋸歯
10 葉の周縁の鋸歯の粗密	02 かなり粗
11 葉の表面の色	02 緑
12 葉片の長さ	04 やや短
13 葉片の幅	02 かなり狭
14 葉片の欠刻の深さ	07 深
15 花柄の長さ	04 やや短
16 花型	02 半八重
17 頭花の直径	01 極小

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
ピーチロリポップ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の数（一重品種を除く。）	02 かなり少
19 舌状花の向き	02 水平
20 舌状花の形	04 広線形
21 舌状花の反り	03 外曲
22 舌状花の長さ	02 かなり短
23 舌状花の幅	03 狭
24 舌状花の色数	03 3 以上
25 舌状花の表面の色の分布状態	03 爪斑、07 底部濃色、08 基部
26 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 69B
27 舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）	RHSカラーチャート 64B(爪斑；底部濃色)；155C(基部)
28 舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート 73C
29 花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）	04 やや小
30 花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）	02 黄
31 花盤の複色の有無（一重品種及び半八重品種に限る。）	09 有
32 花盤の複色の色（一重品種及び半八重品種に限る。）	RHSカラーチャート 34B
33 丁字状花の色（丁字状品種に限る。）	
34 花の中心部の色（八重品種及びポンポン咲品種に限る。）	

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
ピーチロリポップ

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 8 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の香りの有無 36 開花期（秋植） 37 開花期（夏植）	01 無
	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30878号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. Bonmad 1653

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bonmad 1653」は、対照品種「Bonmadmerlo」と比較して、葉の周縁の鋸歯の粗密が粗であること、舌状花の表面の主な色が60Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Bonmad 11277」と比較して、舌状花の表面の主な色が60Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名
Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 令和4年3月1日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
Bonmad 1653

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 丸型
02 草丈	04 やや低
03 分枝の粗密	05 中
04 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉の長さ	03 短
06 葉の幅	05 中
07 葉の形	03 III型
08 葉柄の長さ	06 やや長
09 葉の周縁の鋸歯の形	04 深鈍鋸歯
10 葉の周縁の鋸歯の粗密	03 粗
11 葉の表面の色	02 緑
12 葉片の長さ	03 短
13 葉片の幅	02 かなり狭
14 葉片の欠刻の深さ	07 深
15 花柄の長さ	03 短
16 花型	03 丁字状
17 頭花の直径	02 かなり小

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
Bonmad 1653

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の数（一重品種を除く。）	01 極少
19 舌状花の向き	01 斜上
20 舌状花の形	04 広線形
21 舌状花の反り	02 平
22 舌状花の長さ	03 短
23 舌状花の幅	04 やや狭
24 舌状花の色数	02 2
25 舌状花の表面の色の分布状態	08 基部
26 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 60B
27 舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）	RHSカラーチャート 155C
28 舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート 70C
29 花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）	08 かなり大
30 花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）	
31 花盤の複色の有無（一重品種及び半八重品種に限る。）	
32 花盤の複色の色（一重品種及び半八重品種に限る。）	
33 丁字状花の色（丁字状品種に限る。）	RHSカラーチャート 60D
34 花の中心部の色（八重品種及びポンポン咲品種に限る。）	

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
Bonmad 1653

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 8 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の香りの有無 36 開花期（秋植） 37 開花期（夏植）	01 無
	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第30879号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. レディフレア (レディフレア)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「レディフレア」は、対照品種「レディマイス」と比較して、葉片の欠刻の深さがかなり深であること、丁字状花の色（丁字状品種に限る。）が69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Bonmadpisu」と比較して、草丈が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県

静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武藤貴大 勝岡弘幸

7 出願公表の年月日 令和4年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
レディフレア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 立型
02 草丈	05 中
03 分枝の粗密	04 やや粗
04 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
05 葉の長さ	03 短
06 葉の幅	04 やや狭
07 葉の形	03 III型
08 葉柄の長さ	05 中
09 葉の周縁の鋸歯の形	04 深鈍鋸歯
10 葉の周縁の鋸歯の粗密	03 粗
11 葉の表面の色	03 暗緑
12 葉片の長さ	04 やや短
13 葉片の幅	03 狭
14 葉片の欠刻の深さ	08 かなり深
15 花柄の長さ	03 短
16 花型	03 丁字状
17 頭花の直径	02 かなり小

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.

レディフレア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の数（一重品種を除く。）	01 極少
19 舌状花の向き	02 水平
20 舌状花の形	01 線形
21 舌状花の反り	02 平
22 舌状花の長さ	03 短
23 舌状花の幅	03 狭
24 舌状花の色数	01 1
25 舌状花の表面の色の分布状態	01 均一
26 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155B
27 舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）	
28 舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
29 花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）	09 極大
30 花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）	
31 花盤の複色の有無（一重品種及び半八重品種に限る。）	
32 花盤の複色の色（一重品種及び半八重品種に限る。）	
33 丁字状花の色（丁字状品種に限る。）	RHSカラーチャート 69D
34 花の中心部の色（八重品種及びポンポン咲品種に限る。）	

レディフレア

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

01 無

04 やや早

(特性記録部323-12頁)

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30880号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. スイングレモネード (スイングレモネード)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「スイングレモネード」は、対照品種「DARGY31」と比較して、草丈が中であること、舌状花の向きが水平であること、舌状花の形が線形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
勝岡弘幸
- 7 出願公表の年月日 令和4年2月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ムーンライト」に出願者所有の黄色系の小輪一重を交配し、選抜したものである。

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
スイングレモネード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 立型
02 草丈	05 中
03 分枝の粗密	04 やや粗
04 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉の長さ	03 短
06 葉の幅	05 中
07 葉の形	05 V型
08 葉柄の長さ	05 中
09 葉の周縁の鋸歯の形	04 深鈍鋸歯
10 葉の周縁の鋸歯の粗密	05 中
11 葉の表面の色	03 暗緑
12 葉片の長さ	05 中
13 葉片の幅	04 やや狭
14 葉片の欠刻の深さ	07 深
15 花柄の長さ	04 やや短
16 花型	02 半八重
17 頭花の直径	04 やや小

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
スイングレモネード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の数（一重品種を除く。）	02 かなり少
19 舌状花の向き	02 水平
20 舌状花の形	01 線形
21 舌状花の反り	02 平
22 舌状花の長さ	04 やや短
23 舌状花の幅	04 やや狭
24 舌状花の色数	01 1
25 舌状花の表面の色の分布状態	01 均一
26 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 2C
27 舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）	
28 舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート 4D
29 花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）	05 中
30 花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）	02 黄
31 花盤の複色の有無（一重品種及び半八重品種に限る。）	01 無
32 花盤の複色の色（一重品種及び半八重品種に限る。）	
33 丁字状花の色（丁字状品種に限る。）	
34 花の中心部の色（八重品種及びポンポン咲品種に限る。）	

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
スイングレモネード

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 8 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の香りの有無 36 開花期（秋植） 37 開花期（夏植）	09 有
	03 早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30881号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. スノーフレア (スノーフレア)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「スノーフレア」は、対照品種「ティンク」と比較して、舌状花の向きが水平であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
勝岡弘幸
- 7 出願公表の年月日 令和4年2月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「リトルブーケ」を交配し、選抜したものである。

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
スノーフレア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 立型
02 草丈	04 やや低
03 分枝の粗密	05 中
04 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉の長さ	02 かなり短
06 葉の幅	04 やや狭
07 葉の形	03 III型
08 葉柄の長さ	04 やや短
09 葉の周縁の鋸歯の形	04 深鈍鋸歯
10 葉の周縁の鋸歯の粗密	03 粗
11 葉の表面の色	03 暗緑
12 葉片の長さ	03 短
13 葉片の幅	03 狭
14 葉片の欠刻の深さ	07 深
15 花柄の長さ	04 やや短
16 花型	03 丁字状
17 頭花の直径	01 極小

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
スノーフレア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の数（一重品種を除く。）	01 極少
19 舌状花の向き	02 水平
20 舌状花の形	04 広線形
21 舌状花の反り	02 平
22 舌状花の長さ	02 かなり短
23 舌状花の幅	03 狭
24 舌状花の色数	01 1
25 舌状花の表面の色の分布状態	01 均一
26 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
27 舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）	
28 舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
29 花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）	07 大
30 花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）	
31 花盤の複色の有無（一重品種及び半八重品種に限る。）	
32 花盤の複色の色（一重品種及び半八重品種に限る。）	
33 丁字状花の色（丁字状品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155D;4D(先端部)
34 花の中心部の色（八重品種及びポンポン咲品種に限る。）	

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
スノーフレア

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 8 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の香りの有無 36 開花期（秋植） 37 開花期（夏植）	01 無
	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第30882号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. Bonmad 1651

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bonmad 1651」は、対照品種「Bonmadmage」と比較して、舌状花の表面の主な色がN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Bonmadrosepi」と比較して、茎のアントシアニン着色の有無が有であること、舌状花の表面の色の分布状態が基部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名
Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
Bonmad 1651

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 丸型
02 草丈	03 低
03 分枝の粗密	06 やや密
04 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
05 葉の長さ	03 短
06 葉の幅	04 やや狭
07 葉の形	03 III型
08 葉柄の長さ	04 やや短
09 葉の周縁の鋸歯の形	04 深鈍鋸歯
10 葉の周縁の鋸歯の粗密	04 やや粗
11 葉の表面の色	02 緑
12 葉片の長さ	04 やや短
13 葉片の幅	03 狭
14 葉片の欠刻の深さ	06 やや深
15 花柄の長さ	02 かなり短
16 花型	02 半八重
17 頭花の直径	02 かなり小

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
Bonmad 1651

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の数（一重品種を除く。）	02 かなり少
19 舌状花の向き	02 水平
20 舌状花の形	04 広線形
21 舌状花の反り	02 平
22 舌状花の長さ	03 短
23 舌状花の幅	04 やや狭
24 舌状花の色数	02 2
25 舌状花の表面の色の分布状態	08 基部
26 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N74B
27 舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155D
28 舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート 72D
29 花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）	05 中
30 花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）	04 赤
31 花盤の複色の有無（一重品種及び半八重品種に限る。）	01 無
32 花盤の複色の色（一重品種及び半八重品種に限る。）	
33 丁字状花の色（丁字状品種に限る。）	
34 花の中心部の色（八重品種及びポンポン咲品種に限る。）	

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
Bonmad 1651

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 8 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の香りの有無 36 開花期（秋植） 37 開花期（夏植）	01 無
	02 かなり早

1 品種登録の番号及び年月日 第30883号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. x Rhodanthemum (Vogt) B. H. Wilcox
et al. ビジューマム ローズクオーツ (ビジュマム ローズクオーツ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ビジューマム ローズクオーツ」は、対照品種「HESUN20」と比較して、舌状花の反りが外曲であること、舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）がN74Aであること、花盤の複色の有無（一重品種及び半八重品種に限る。）が無であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonmadrosepi」と比較して、舌状花の反りが外曲であること、舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県
静岡県静岡市葵区迫手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武藤貴大 勝岡弘幸

7 出願公表の年月日 令和4年5月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のマーガレット種の育成系統に品種名称不明のローダンセマム種を交配後に胚珠培養を行い、選抜したものである。

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. x Rhodanthemum (Vogt) B. H. Wilcox et al.
 ビジューマム ローズクオーツ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 丸型
02 草丈	04 やや低
03 分枝の粗密	05 中
04 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
05 葉の長さ	03 短
06 葉の幅	04 やや狭
07 葉の形	03 III型
08 葉柄の長さ	08 かなり長
09 葉の周縁の鋸歯の形	04 深鈍鋸歯
10 葉の周縁の鋸歯の粗密	05 中
11 葉の表面の色	02 緑
12 葉片の長さ	03 短
13 葉片の幅	03 狭
14 葉片の欠刻の深さ	05 中
15 花柄の長さ	04 やや短
16 花型	02 半八重
17 頭花の直径	02 かなり小

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の数（一重品種を除く。）	02 かなり少
19 舌状花の向き	01 斜上
20 舌状花の形	04 広線形
21 舌状花の反り	03 外曲
22 舌状花の長さ	03 短
23 舌状花の幅	04 やや狭
24 舌状花の色数	02 2
25 舌状花の表面の色の分布状態	08 基部
26 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N74C
27 舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）	RHSカラーチャート N74A
28 舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート N74D
29 花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）	04 やや小
30 花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）	05 黄茶
31 花盤の複色の有無（一重品種及び半八重品種に限る。）	01 無
32 花盤の複色の色（一重品種及び半八重品種に限る。）	
33 丁字状花の色（丁字状品種に限る。）	
34 花の中心部の色（八重品種及びポンポン咲品種に限る。）	

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. x Rhodanthemum (Vogt) B. H. Wilcox et al.
 ビジューマム ローズクオーツ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30883号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花の香りの有無 36 開花期（秋植） 37 開花期（夏植）	01 無
	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30884号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Begonia L. メモリーズ (メモリーズ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「メモリーズ」は、対照品種「ラブミーモア」と比較して、雄花の外花弁の表面の中央部の色が65Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
佐々木公輔
岩手県一関市花泉町花泉字日吉29
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐々木公輔
- 7 出願公表の年月日 令和4年6月7日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ラブミー」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30884号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物のタイプ	06 ローレイン型
02 草姿	02 斜上
03 草丈	05 中
04 分枝の数	01 極少
05 茎の長さ	05 中
06 茎の太さ	03 細
07 茎の基部の型	01 直
08 茎の主な色	05 赤緑
09 茎の斑点の有無	09 有
10 茎の節部のアントシアニン着色の有無	01 無
11 第一花房の着生節位（種子繁殖性品種に限る。）	
12 第一花房の着生節位（栄養繁殖性品種に限る。）	03 少
13 茎の毛の粗密	03 粗
14 ランナーの有無	01 無
15 むかごの有無	01 無
16 葉の型	01 単葉
17 葉の長さ	03 短

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30884号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の幅	06 やや広
19 葉身の形(単葉の品種に限る。)	08 腎臓形
20 葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)	02 葉縁
21 葉身の基部の形(単葉の品種に限る。)	01 大きく開く
22 葉身の先端部の形	03 鈍形
23 葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)	01 無又は極浅
24 葉身の周縁の欠刻の形	03 重複鋸歯状
25 葉身の周縁の欠刻の深さ	05 中
26 葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)	03 弱
27 葉身の表面の色数	01 1色
28 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート 137A
29 葉身の表面の模様の有無	01 無
30 葉身の表面の主な模様の型	
31 葉身の表面の二次の模様の型	
32 葉身の表面の主な模様の色	
33 葉身の表面の二次の模様の色	
34 葉身の表面の主脈の色	RHSカラーチャート 144B

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30884号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の表面の葉底の色	RHSカラーチャート 59D
36 葉身の表面の毛の有無	01 無
37 葉身の表面の毛の色	
38 葉身の凹凸の強弱	02 かなり弱
39 葉身の裏面の主な色	01 淡緑
40 葉柄の色	01 淡緑
41 花房の向き	02 横向き
42 花柄の長さ	03 短
43 花柄の分枝の回数	02 中
44 雄花の花型	02 4弁花
45 雄花の花弁の数（半八重及び八重品種に限る。）	
46 雄花の直径	04 やや小
47 雄花の花弁の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
48 雄花の外花弁の形	05 円形
49 雄花の外花弁の表面の模様の種類	01 模様なし
50 雄花の外花弁の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 65A
51 雄花の外花弁の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 65C

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30884号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 雄花の外花卉の裏面の毛状突起の有無	01 無
53 雄花の外花卉の裏面の毛状突起の色	
54 雄花の内花卉の表面の模様の種類（2弁花を除く。）	01 模様なし
55 雄花の内花卉の表面の周縁部の色（2弁花を除く。）	RHSカラーチャート 65B
56 雄花の内花卉の表面の中央部の色（2弁花を除く。）	RHSカラーチャート 65B
57 やくの色（八重品種を除く。）	01 黄
58 子房の長さ	03 短
59 子房の幅	04 やや狭
60 子房の中央部の色	02 淡緑
61 子房の翼の色	02 淡緑
62 花の香りの有無	01 無
63 開花習性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30885号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Begonia x hiemalis Fotsch BKPBEBO
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「BKPBEBO」は、対照品種「USAmiM」と比較して、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、葉身の中ろくの長さがやや短であること、葉身の基部の裂片の重なりが閉じるであること等で区別性が認められる。対照品種「BKPBECRM」と比較して、葉身の周縁の欠刻の形が重複鋸歯状であること、ほう葉の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「BKPBEVR」と比較して、葉身の幅がやや狭であること、ほう葉の大きさが小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Beekenkamp Plants B.V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Annie Cornelia Beekenkamp
- 7 出願公表の年月日 令和4年1月20日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に出願者所有のB. secotrataの系統を交配し、選抜したものである。

Begonia x hiemalis Fotsch
BKPBEBO

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30885号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 株の幅	05 中
03 葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
04 葉身の中ろくの長さ	04 やや短
05 葉身の幅	04 やや狭
06 葉身の表面の色	03 濃緑
07 葉身の裏面の色	04 赤と緑
08 葉身の基部の裂片の重なり	05 閉じる
09 葉身の先端部の角度	03 鋭角
10 葉身の周縁の欠刻の形	02 重複鋸歯状
11 葉身の周縁の欠刻の深さ	05 中
12 葉身の周縁の波打ちの強弱	07 強
13 ほう葉の大きさ	03 小
14 ほう葉の色	02 赤と緑
15 花型	02 八重
16 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
17 花の長さ	05 中

Begonia x hiemalis Fotsch
BKPBEBO

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30885号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	06 やや広
19 花の色数	01 1
20 外花卉の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N45A
21 外花卉の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 46B
22 外花卉の周縁の欠刻の深さ	01 無又は極浅
23 内花卉の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N45A
24 内花卉の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 46C
25 内花卉の裏面の周縁部の色	RHSカラーチャート N45C
26 内花卉の裏面の中央部の色	RHSカラーチャート 46C
27 内花卉の周縁の欠刻の深さ	01 無又は極浅
28 内花卉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第30886号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch BKPBERP

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「BKPBERP」は、対照品種「バーミリオン ホットピンク」と比較して、ほう葉の大きさが小であること、外花卉の表面の周縁部の色が54Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ベルセコ」と比較して、葉身の中ろくの長さがやや短であること、外花卉の表面の中央部の色が55Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.

Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「BKPBEEFR」の変異株である。

Begonia x hiemalis Fotsch
BKPBERP

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30886号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 株の幅	05 中
03 葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
04 葉身の中ろくの長さ	04 やや短
05 葉身の幅	04 やや狭
06 葉身の表面の色	03 濃緑
07 葉身の裏面の色	04 赤と緑
08 葉身の基部の裂片の重なり	05 閉じる
09 葉身の先端部の角度	03 鋭角
10 葉身の周縁の欠刻の形	03 鈍鋸歯状
11 葉身の周縁の欠刻の深さ	05 中
12 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
13 ほう葉の大きさ	03 小
14 ほう葉の色	02 赤と緑
15 花型	02 八重
16 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
17 花の長さ	05 中

Begonia x hiemalis Fotsch
BKPBERP

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30886号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	06 やや広
19 花の色数	01 1
20 外花卉の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート 54A
21 外花卉の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 55B
22 外花卉の周縁の欠刻の深さ	01 無又は極浅
23 内花卉の表面の周縁部の色	RHSカラーチャート N57D
24 内花卉の表面の中央部の色	RHSカラーチャート 63C
25 内花卉の裏面の周縁部の色	RHSカラーチャート N57D
26 内花卉の裏面の中央部の色	RHSカラーチャート 65A
27 内花卉の周縁の欠刻の深さ	01 無又は極浅
28 内花卉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第30887号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFEVID1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFEVID1」は、対照品種「DELIFORTUNE」と比較して、葉の長さ／幅が中であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「DEKONCIA」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、頭花の花柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	04 平形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 4D
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	03 小
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	06 やや密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	02 基部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	05 中
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFEVID1

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30887号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30888号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. DLFALVE5

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFALVE5」は、対照品種「円舞カンマ」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、頭花の舌状花の形の数が3以上であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFALVE5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	05 中
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	04 やや少
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 145A
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	03 小
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	03 3 以上
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	03 さじ状
43 頭花の舌状花の三次的な形	04 管状
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	07 先端部1/4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	05 よじれ
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	07 先端部3/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	06 やや強
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
59 舌状花の長さ	06 やや長
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 145D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 145C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 145C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 145C;149A(先端部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	04 やや少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFALVE5

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30888号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30889号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFCIPR3

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFCIPR3」は、対照品種「DLFTAZA12」と比較して、舌状花の表面の主な色が75Cであること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が75Dであること等で区別性が認められる。対照品種「DLFCELI3」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 186D
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	06 やや大
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	06 やや密
40 頭花の舌状花の形の数	02 2
41 頭花の舌状花の主要な形	03 さじ状
42 頭花の舌状花の二次的な形	04 管状
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	09 極長
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	02 扁円形
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
59 舌状花の長さ	09 極長
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	08 かなり高
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 75C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 77C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	04 やや少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFCIPR3

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30889号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30890号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 秀芳栄光 (シュホウエイコウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「秀芳栄光」は、対照品種「精の枕」と比較して、舌状花の表面の主な色が2Aであること等で区別性が認められる。対照品種「精の光彩」と比較して、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の表面の主な色が2Aであること等で区別性が認められる。対照品種「精興光陽」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の10月咲黄色系輪菊系統に、10月咲黄色系輪菊の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.

秀芳栄光

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 8 9 0 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	05 中
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃

Chrysanthemum L.
秀芳栄光

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 9A
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	05 中
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

Chrysanthemum L.
秀芳栄光

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	04 やや低
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	06 やや密
40 頭花の舌状花の形の数	03 3 以上
41 頭花の舌状花の主要な形	02 舟底状
42 頭花の舌状花の二次的な形	03 さじ状
43 頭花の舌状花の三次的な形	04 管状
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	09 極長
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	04 三角形
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	05 中
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 先端部1/2
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	07 長
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	06 やや高
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 2A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 3C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 6A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 7D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
秀芳栄光

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	02 かなり少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

秀芳榮光

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質

1 品種登録の番号及び年月日 第30891号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 秀芳の結 (シュウホウノユイ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「秀芳の結」は、対照品種「精の律」と比較して、頭花の舌状花の形の数が3以上であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること等で区別性が認められる。対照品種「笑の華」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の表面の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「芳園絵巻」に10月咲紅色系輪菊の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
秀芳の結

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	04 やや低
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 186B
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	04 やや小
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	03 3 以上
41 頭花の舌状花の主要な形	02 舟底状
42 頭花の舌状花の二次的な形	03 さじ状
43 頭花の舌状花の三次的な形	04 管状
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	03 短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 先端部1/2
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
59 舌状花の長さ	06 やや長
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N74D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート N74D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN74A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75A
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	04 やや少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

秀芳の結

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）

06 やや斜下

105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞
ぎくに限る）

106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の觀賞
ぎくに限る）

107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）

108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）

109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）

110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）

1 品種登録の番号及び年月日 第30892号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 秀芳の丘 (シュウホウノカ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「秀芳の丘」は、対照品種「精興こうみょう」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「精興の旅」と比較して、舌状花の先端の形が突起状であること、舌状花の表面の主な色が1Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「秋月夜」に10月咲黄色系輪菊の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
秀芳の丘

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	04 やや低
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	01 無又は極小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃

Chrysanthemum L.
秀芳の丘

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 6A
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	05 中
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

Chrysanthemum L.

秀芳の丘

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	08 かなり密
40 頭花の舌状花の形の数	03 3 以上
41 頭花の舌状花の主要な形	02 舟底状
42 頭花の舌状花の二次的な形	03 さじ状
43 頭花の舌状花の三次的な形	04 管状
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	04 やや短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	03 強い凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	07 先端部1/4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	04 やや弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
59 舌状花の長さ	07 長
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 1A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 2D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 2A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 4C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	04 やや少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

秀芳の丘

第30892号

06 やや斜下

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30893号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. シュースターライト (シュースターライト)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「シュースターライト」は、対照品種「DELIESTRELLA」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の一次欠刻の深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「夢の煌めき白」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一
- 7 出願公表の年月日 令和4年7月26日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の10月咲白緑色デコラ咲スプレー系統に、10月咲白系スプレー品種の混合花粉を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	03 低
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	01 無又は極小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	03 短
13 葉の一次欠刻の深さ	05 中
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	07 多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 154D
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	04 やや小
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）		04 やや低
36 頭花の花柄の長さ		03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）		
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）		
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）		07 密
40 頭花の舌状花の形の数		01 1
41 頭花の舌状花の主要な形		03 さじ状
42 頭花の舌状花の二次的な形		
43 頭花の舌状花の三次的な形		
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）		
45 舌状花の表面の状態		03 キール
46 舌状花のキールの数		02 2
47 舌状花の花筒の長さ		08 かなり長
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）		05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2		
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）		05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）		07 先端部1/4

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30893号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	04 三角形
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	07 長
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	08 深い切込み
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30893号
69 舌状花の表面の三次色		
70 舌状花の表面の三次色の分布		
71 舌状花の表面の三次色の分布2		
72 舌状花の表面の三次色の型		
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する	
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D	
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 157D;154B(先端)	
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 157D;154B(先端)	
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）		
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）		
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）		
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）		
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）		
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2		
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）		
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）		
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）		

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	04 やや少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
シュースターライト

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30893号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30894号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. シューリニア (シュリーニア)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「シューリニア」は、対照品種「太陽のマライカ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがかなり深であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイプリンス」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがかなり深であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤淳一
- 7 出願公表の年月日 令和4年7月26日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の10月咲白色スプレー品種に、10月咲白色系スプレー品種の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
シューリニア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30894号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	07 多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	08 かなり深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート NN155C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	02 基部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	02 かなり弱
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	04 やや円錐状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

シューリニア

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30894号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30895号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFBERI1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFBERI1」は、対照品種「セイプリンス」と比較して、たく葉の大きさが小であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイルキア」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFBERI1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	05 中
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 155C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	02 基部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	05 強いドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFBERI1

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30895号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30896号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFBLAK3

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFBLAK3」は、対照品種「セイオペラノヴァ」と比較して、舌状花の幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIBONBON」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、舌状花の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「DEKDORIAN PINK」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の裏面の色が76Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	05 中
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 180D
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	02 かなり小
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	03 低
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	08 かなり密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	03 短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 69C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 76D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 73D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 69D;75C(先端)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	04 やや少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFBLAK3

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30896号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30897号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFTAZA1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFTAZA1」は、対照品種「伊都の鼓」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の裏面の色がNN155D;N78C(至る所)であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFTAZA12」と比較して、舌状花の表面の主な色がNN155Dであること、舌状花の裏面の色がNN155D;N78C(至る所)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFTAZA10」の変異株である。

Chrysanthemum L.
DLFTAZA1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	05 中
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 64A;157D(至る所)
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	05 中
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	07 密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	04 管状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	09 極長
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	04 三角形
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 先端部1/2
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
59 舌状花の長さ	08 かなり長
60 舌状花の幅	02 かなり狭
61 舌状花の長さ／幅	08 かなり高
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 77C
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	04 至る所
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D;N78C(至る所)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 157D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 157C;150C(先端)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	05 中
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFTAZA1

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30897号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30898号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFSHAR12

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFSHAR12」は、対照品種「弓戸フーミン」と比較して、葉の長さ／幅がやや低であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「セイダール」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の表面の主な色が60Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	05 水平
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	05 中
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 187B;149B(先端部)
30 頭花の型	04 露心する八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	06 やや多
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	07 先端部1/4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	03 3以上
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 60B
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート NN155C
66 舌状花の表面の二次色の分布	02 先端部1/4
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	RHSカラーチャート 144D
70 舌状花の表面の三次色の分布	01 先端
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	01 一様又はほぼ一様
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 72D;NN155C(先端部);144C(先端)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 59B;NN155D(先端部);150A(先端)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 64A;NN155D(先端部);150A(先端)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFSHAR12

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30898号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30899号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. DLFYIN10
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「DLFYIN10」は、対照品種「DLFYIN3」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の表面の主な色が50Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セイノトサーモン」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Arie Gerard Post
- 7 出願公表の年月日 令和4年10月17日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「DLFYIN1」の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 58A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	02 かなり低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	02 基部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 50D
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 3D
66 舌状花の表面の二次色の分布	08 基部
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75C;NN74D(先端部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 55D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75D;NN74D(先端部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	07 大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	09 有
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	09 極大
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	RHSカラーチャート 200B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 8 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFYIN10

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30899号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30900号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. DLFYIN7

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFYIN7」は、対照品種「太陽のリナ」と比較して、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）がアネモネであること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
「DLFYIN1」の変異株である。

Chrysanthemum L.
DLFYIN7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	03 狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 61A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	02 アネモネ
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	02 かなり低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	02 かなり少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN74B
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75B;NN74B(先端部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN74B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75B;NN74B(先端部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	03 小
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	07 大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート 200A
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート NN74D
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	05 花弁状
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	03 短
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート N74D;NN155C(二次色)
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFYIN7

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30900号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30901号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFPULI1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFPULI1」は、対照品種「DELIRADOST」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がやや濃であること、頭花の舌状花の形の数が1であること等で区別性が認められる。対照品種「Forest Aroma」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること等で区別性が認められる。対照品種「セイセレナイト」と比較して、舌状花の縦断面の形状が外反であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFPULI1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	05 中
14 葉の裂片縁部の重なり	01 広がる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	04 やや少
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート 155A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	02 アネモネ
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	07 長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	05 中
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	07 大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート 145A
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	03 ロート形
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	04 やや短
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D;154D(二次色)
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFPULI1

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30901号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30902号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFHONE3

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFHONE3」は、対照品種「DEKALJONKA」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の一次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。対照品種「ドーリーピンク」と比較して、たく葉の大きさが中であること、頭花の高さ（摘らいたもの）がかなり高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 49D
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	05 中
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	08 かなり高
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	06 やや密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	05 中
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 先端部1/2
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	04 やや弱
59 舌状花の長さ	09 極長
60 舌状花の幅	06 やや広
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 69D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート N155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 69D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N155B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	07 8.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	05 中
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFHONE3

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30902号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30903号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFCOUT3

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFCOUT3」は、対照品種「花秀芳」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、舌状花の内花卉の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「精興花香」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の内花卉の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 186B
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	05 中
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	08 かなり長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	06 やや密
40 頭花の舌状花の形の数	02 2
41 頭花の舌状花の主要な形	03 さじ状
42 頭花の舌状花の二次的な形	04 管状
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	07 長
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	03 強い凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	02 扁円形
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 先端部1/2
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	04 やや弱
59 舌状花の長さ	07 長
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	07 高
62 舌状花の先端の形	04 窪む
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 71C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	02 著しく異なる
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 77D;155A(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN74A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 69D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	04 やや少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFCOUT3

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30903号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30904号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFMARR6

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFMARR6」は、対照品種「DELICROS」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、舌状花の内花卉の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が3C;173D(縁部)であること等で区別性が認められる。対照品種「セイソウルレッド」と比較して、舌状花の長さが中であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 173A
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	03 小
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	08 かなり密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	02 舟底状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	04 曲りくねる
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	07 先端部3/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	04 やや弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	01 内曲
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 42B
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 173D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 42A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 3C;173D(縁部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	06 やや多
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFMARR6

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30904号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30905号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. セイファセットイエロー (セイファセットイエロー)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「セイファセットイエロー」は、対照品種「フェリーチェマムキエ」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「チェルキー イエロー」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数がやや少であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
「セイファセット」に放射線を照射して得られた変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	03 狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	01 広がる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	04 やや少
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	03 円筒形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 5A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	02 アネモネ
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	03 少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	07 先端部1/4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	04 やや弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 弱
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 2A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 5C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 2A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 5C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	08 かなり大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート N144B
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート 7A
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	03 ロート形
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	04 やや短
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート 5A
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	03 6.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイファセットイエロー

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30905号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30906号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFDICH2

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFDICH2」は、対照品種「Fitcelebrate」と比較して、たく葉の大きさが小であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のマイキ」と比較して、たく葉の大きさが小であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFVIBE2」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	05 中
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 5A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	06 やや高

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 2A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 7D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 2A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 7D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFDICH2

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30906号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30907号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFMARA2

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFMARA2」は、対照品種「FISPLAMEA」と比較して、舌状花の表面の主な色が4Dであること、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）が5Aであること等で区別性が認められる。対照品種「セイロケットイエロー」と比較して、葉の一次欠刻の深さが浅であること、舌状花の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFMARA1」の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	03 狭
11 葉の長さ／幅	07 高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	03 浅
14 葉の裂片縁部の重なり	01 広がる
15 葉の基部の形	01 鋭形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	03 少
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	03 浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 3A
30 頭花の型	02 一重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	02 アネモネ
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	02 かなり低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	02 2
41 頭花の舌状花の主要な形	04 管状
42 頭花の舌状花の二次的な形	03 さじ状
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	08 かなり長
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	02 扁円形
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	02 かなり狭
61 舌状花の長さ／幅	07 高
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 4D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 4D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	08 かなり大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート 144D
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート 5A
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	02 管状
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	04 やや短
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート 8C
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	02 6週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFMARA2

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30907号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30908号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 琉1RT-35 (リュウ1RT-35)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「琉1RT-35」は、対照品種「精しょうま」と比較して、たく葉の大きさが大であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「セイエルザ」と比較して、葉の長さ／幅が中であること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県農業協同組合
沖縄県那覇市壺川2-9-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
徳元清春

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「琉の結」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	07 大
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	03 斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	05 中
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート NN155C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	02 内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	03 基部3/4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 先端部1/2
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 弱
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	05 中
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

琉1RT-35

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30908号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30909号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. リゼ風車 (リゼフウシャ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「リゼ風車」は、対照品種「明かざぐるま」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の裏面の色が75C;NN155D(基部)であること等で区別性が認められる。対照品種「巴かざぐるま」と比較して、舌状花の表面の主な色が61Aであること、舌状花の裏面の色が75C;NN155D(基部)であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久
- 7 出願公表の年月日 令和5年1月17日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の桃白色スプーンシングル系統に10月咲風車系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
リゼ風車

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	04 やや低
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
リゼ風車

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	03 斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 71A
30 頭花の型	02 一重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	05 中

Chrysanthemum L.
リゼ風車

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	03 さじ状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	02 かなり斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	06 やや長
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	04 三角形
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 61A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	02 著しく異なる
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75C;NN155D(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	02 平
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
リゼ風車

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	03 6.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
リゼ風車

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第30910号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. セイヌーボチェリーピンク (セイヌーボ^セチェリー^リピンク)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「セイヌーボチェリーピンク」は、対照品種「DELIROSSANO DARK」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「セイネルヴァ」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

「セイヌーボ」に放射線を照射して得られた変異株である。

Chrysanthemum L.
セイヌーボチェリーピンク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	01 無又は極小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	01 広がる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	04 やや少
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	03 浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	05 中
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	04 やや少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 71B
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

Chrysanthemum L.
セイヌーボチェリーピンク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	04 やや粗
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	02 内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	02 基部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	05 中
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 75A
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 75C
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	01 縁部
68 舌状花の表面の二次色の型	02 ぼかし

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 75C;75A(先端部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN74D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 69D;NN74C(先端)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
セイヌーボチェリーピンク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイヌーボチェリーピンク

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30910号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30911号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. セイカブレラオレンジ (セイカブレラオレンジ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「セイカブレラオレンジ」は、対照品種「DELIROSSANO ORANGE」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIPALADOV」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の表面の主な色が162Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久 杉原善治

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
「セイカブレラ」の変異株である。

Chrysanthemum L.
セイカブレラオレンジ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	01 無又は極小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	06 やや広
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート N34C
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	02 かなり小
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	07 密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	02 基部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	01 内曲
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 弱
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 162B
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート N170C;4D(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 161B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 173D;3D(基部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	04 やや少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイカブレオレンジ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30911号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30912号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. セイリリーク (セイリーク)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「セイリリーク」は、対照品種「カローネ」と比較して、たく葉の大きさが中であること、頭花の直径（摘らいしたもの）がやや小であること、舌状花の長さが長であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久
- 7 出願公表の年月日 令和5年1月17日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の紅白色シングル系統にデコラ系シングル系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイリリーク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	07 高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	05 中
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	02 鈍形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	07 多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 183A;154B(先端部)
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	04 やや小
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

Chrysanthemum L.
セイリリーク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	06 やや密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	06 外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	07 先端部1/4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	01 内曲
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	02 かなり弱
59 舌状花の長さ	07 長
60 舌状花の幅	06 やや広
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N45A
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 2A
66 舌状花の表面の二次色の分布	02 先端部1/4
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート N170D;185C(中央部の縦線);1C(先端部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 46A;2A(先端部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 181B;1A(先端部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	05 中
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

セイリリーク

第 3 0 9 1 2 号

1 品種登録の番号及び年月日 第30913号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. セイラポルタ (セイポルタ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「セイラポルタ」は、対照品種「セイミノザ」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の白色系ポンポン咲き育成系統に、ポンポン咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイラポルタ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	06 やや大
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡

Chrysanthemum L.
セイラポルタ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 150D
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	02 かなり小
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	04 やや低
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	08 かなり密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	02 舟底状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	03 強い凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	02 内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	03 基部3/4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 155A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 155A
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	04 やや少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

セイラポルタ

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30913号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30914号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. Geumbitnuli

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Geumbitnuli」は、対照品種「精興の旅」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「秀芳の丘」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、舌状花の先端の形が窪むであること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rural Development Administration
300, Nongsaengmyeong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 54875,
Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jung, Jae A Kwon, Oh Keun Ahn, Myung Suk Song, Hyun Young

7 出願公表の年月日 令和5年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
Geumbitnuli

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	01 無又は極小
07 葉柄の向き	02 かなり斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	07 長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	04 やや浅
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	03 強
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 9A
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	06 やや大
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	

Chrysanthemum L.
Geumbitnuli

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	07 高
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	07 密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	03 さじ状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	04 やや短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	05 中
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05 先端部1/2
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	08 かなり長
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	06 やや高
62 舌状花の先端の形	04 窪む
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 5C
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 5C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 3B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 4A
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	06 やや多
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Geumbitnuli

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30914号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30915号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. KBH03

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KBH03」は、対照品種「フラウ フジヨ」と比較して、葉身の形が円形であること、装飾花のがく片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「チボリ」と比較して、茎の皮目の大きさが大であること、葉身の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

未来アグリ株式会社
愛知県長久手市山越606番地
久保田哲也
群馬県伊勢崎市国定町1-141-42

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田哲也

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
KBH03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	02 円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
KBH03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	01 粗
34 花序の装飾花の数	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	06 やや大
36 装飾花のがく片の数	01 3～4
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	06 やや長
40 装飾花のがく片の幅	08 かなり広
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	02 弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

Hydrangea L.
KBH03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート N78B (低pH区;N87B)
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート NN155C
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	03 小
57 装飾花の小花柄の色	03 桃
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30916号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ハニーウェーブ (ハニーウェーブ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ハニーウェーブ」は、対照品種「レモンウェーブ」と比較して、葉身の主な色が濃緑であること、葉身の二次色が黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
矢澤光一
埼玉県三郷市高州2-390-1-408
鈴木祐司
埼玉県川口市木曽呂364-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
矢澤光一 鈴木祐司
- 7 出願公表の年月日 令和元年6月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「レモンウェーブ」の変異株である。

Hydrangea L.
ハニーウェーブ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	06 やや長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
ハニーウェーブ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	09 有
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	03 黄
24 葉身の光沢	03 強
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	02 かなり低
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	01 一列
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	02 かなり少

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
ハニーウェーブ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 92C (低pH区;97C)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	06 紫 (低pH区;青紫)
58 両性花の花弁の色	06 淡紫 (低pH区;青)
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30917号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. スターリットジュエル (スターリットジュエル)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「スターリットジュエル」は、対照品種「モナリザ」と比較して、葉縁の鋸歯の深さが極深であること、葉身のしわが強であること、装飾花のがく片の二次色の型が不規則であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社川與園芸
愛知県田原市小中山町北浜新田8番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名
川口隆徳

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「スターリットスカイ」の変異株である。

Hydrangea L.
スターリットジュエル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	05 極深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	04 強
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	07 多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	06 やや広
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	02 中
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

Hydrangea L.
スターリットジュエル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 96D (低pH区;96B)
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート 97D (低pH区;101D)
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	03 不規則
56 装飾花のがく片の二次色の割合	03 小
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白 (低pH区;淡青)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30918号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 越南300号 (エツナン300コウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「越南300号」は、対照品種「あきさかり」と比較して、外穎先端の色が褐であること、胚乳のアミロース含量が9型であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや短であること、外穎先端の色が褐であること、胚乳のアミロース含量が9型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福井県
福井県福井市大手3丁目17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

富田桂 小林麻子 町田芳恵 林猛 田野井真 中岡史裕 清水豊弘 両角悠作
酒井究 渡辺和夫

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「越のかおり」に「あきさかり」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
越南300号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	
14 葉身の幅	
15 初期の止め葉の姿勢	03 半立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
越南300号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	06 やや晩
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	04 やや短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	04 やや短
31 穂数	06 やや多
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	03 褐
34 芒の分布	02 上1/4のみ

Oryza sativa L.
越南300号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	03 褐
38 後期の芒の色	03 褐
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	06 やや晩
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
越南300号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	05 中
54 粳の長さ	05 中
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	09 9型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	03 低崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
越南300号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	06 やや難
71 耐倒伏性	06 やや強
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pii
74 葉いもちほ場抵抗性	05 中
75 穂いもちほ場抵抗性	04 やや弱
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	04 やや弱
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	01 日本水稻型(+)
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	05 中
85 着粒密度	

1 品種登録の番号及び年月日 第30919号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pentas Benth. PEZZ0021

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「PEZZ0021」は、対照品種「ポラリス」と比較して、花冠裂片の向きが斜上であること、柱頭の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「F1グラフティ20/20 ホワイト」と比較して、花冠裂片の向きが斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名
Jaemin Lee

7 出願公表の年月日 令和5年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Pentas Benth.
PEZZ0021

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	03 低
03 茎の節間長	04 やや短
04 茎の緑色の濃淡	03 淡
05 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の形	01 卵形
09 葉身の緑色の濃淡	07 濃
10 葉身の毛の粗密	06 やや密
11 葉身の波打の強弱	04 やや弱
12 花序の花の数	07 多
13 花序の長径	08 かなり大
14 花序の短径	08 かなり大
15 花序の高さ	09 極高
16 花序の上部の形	02 丸
17 花型	01 一重

Pentas Benth.
PEZZ0021

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠の直径	04 やや小
19 花筒の長さ	04 やや短
20 花筒の色	RHSカラーチャート 157C
21 花喉部の内面の毛の色	01 白
22 花冠裂片の向き	01 斜上
23 花冠裂片の長さ	05 中
24 花冠裂片の幅	05 中
25 花冠裂片の形	01 卵形
26 花冠裂片の表面の色数	01 1
27 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155B
28 花冠裂片の表面の二次色（単色品種を除く。）	
29 花冠裂片の表面の二次色の分布（単色品種を除く。）	
30 やくの花喉部上部に対する位置	03 下位
31 花粉の色	01 白
32 花柱の長さ	05 中
33 柱頭の大きさ	09 極大
34 柱頭の色	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第30920号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord. MHTW2

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MHTW2」は、対照品種「ティアズ オブ ザ ウィッチ」と比較して、舌状花の向きが水平であること、花盤の色がN89Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社モリヒロ園芸
香川県観音寺市高屋町942

6 登録品種の育成をした者の氏名
森川裕介

7 出願公表の年月日 令和3年3月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統に「ティアズ オブ ザ ウィッチ」を交配し、選抜したものである。

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 I 型
02 草丈	03 低
03 一次側枝の数	03 中
04 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
05 茎のアントシアニン着色の強弱	
06 葉身の長さ	04 やや短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の表面の緑色の濃淡	04 やや濃
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の切れ込み	03 中
11 葉身の鋸歯の形	01 鋭形
12 葉身の周縁の波打ち	03 中
13 葉身の裏面のアントシアニン着色	01 無又は極弱
14 葉身の裏面のアントシアニン着色の色	
15 葉身の裏面の毛	03 中
16 葉身の基部の形	03 III型
17 葉身の先端の形	02 鋭形

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	02 やや短
19 葉柄の翼の有無	01 無
20 花序の幅	04 やや狭
21 花序の高さ	04 やや低
22 花序の上部の形	02 丸形
23 頭花の型	01 一重
24 頭花の直径	07 大
25 頭花の舌状花の数	03 中
26 舌状花の向き	02 水平
27 舌状花の長さ	05 中
28 舌状花の幅	02 中
29 舌状花の形	02 長楕円形
30 舌状花の横断面の形	02 平形
31 舌状花の先端の切れ込みの有無	09 有
32 舌状花の先端の形	02 丸形
33 舌状花の色数	02 2色
34 舌状花の主な色	RHSカラーチャート 68C

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花の二次色	RHSカラーチャート N89A
36 舌状花の二次色の分布	02 先端部1/4
37 舌状花の二次色の型	02 ぼかし
38 舌状花の三次色	
39 舌状花の三次色の分布	
40 舌状花の三次色の型	
41 花盤の直径	03 中
42 花盤の色	RHSカラーチャート N89B
43 総ほう片の反り	03 反転

1 品種登録の番号及び年月日 第30921号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord. MHTW4

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MHTW4」は、対照品種「ティアズ オブ ザ ウィッチ」と比較して、草姿がⅡ型であること、舌状花の向きが水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社モリヒロ園芸
香川県観音寺市高屋町942

6 登録品種の育成をした者の氏名
森川裕介

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ティアズ オブ ザ ウィッチ」の変異株である。

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 II型
02 草丈	05 中
03 一次側枝の数	03 中
04 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
05 茎のアントシアニン着色の強弱	
06 葉身の長さ	04 やや短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の表面の緑色の濃淡	04 やや濃
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の切れ込み	03 中
11 葉身の鋸歯の形	01 鋭形
12 葉身の周縁の波打ち	03 中
13 葉身の裏面のアントシアニン着色	01 無又は極弱
14 葉身の裏面のアントシアニン着色の色	
15 葉身の裏面の毛	03 中
16 葉身の基部の形	03 III型
17 葉身の先端の形	02 鋭形

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	03 中
19 葉柄の翼の有無	01 無
20 花序の幅	04 やや狭
21 花序の高さ	04 やや低
22 花序の上部の形	02 丸形
23 頭花の型	01 一重
24 頭花の直径	07 大
25 頭花の舌状花の数	02 少
26 舌状花の向き	02 水平
27 舌状花の長さ	05 中
28 舌状花の幅	02 中
29 舌状花の形	02 長楕円形
30 舌状花の横断面の形	02 平形
31 舌状花の先端の切れ込みの有無	09 有
32 舌状花の先端の形	02 丸形
33 舌状花の色数	02 2色
34 舌状花の主な色	RHSカラーチャート 94A

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花の二次色	RHSカラーチャート 67D
36 舌状花の二次色の分布	05 基部1/4
37 舌状花の二次色の型	02 ぼかし
38 舌状花の三次色	
39 舌状花の三次色の分布	
40 舌状花の三次色の型	
41 花盤の直径	03 中
42 花盤の色	RHSカラーチャート N89B
43 総ほう片の反り	03 反転

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30922号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord. MHTW5
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MHTW5」は、対照品種「ティアズ オブ ザ ウィッチ」と比較して、葉身の鋸歯の形が鋭形であること、舌状花の先端の形が平形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社モリヒロ園芸
香川県観音寺市高屋町942
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
森川裕介
- 7 出願公表の年月日 令和3年3月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ティアズ オブ ザ ウィッチ」の変異株である。

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 I 型
02 草丈	03 低
03 一次側枝の数	03 中
04 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
05 茎のアントシアニン着色の強弱	
06 葉身の長さ	04 やや短
07 葉身の幅	05 中
08 葉身の表面の緑色の濃淡	03 中
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の切れ込み	01 無又は極浅
11 葉身の鋸歯の形	01 鋭形
12 葉身の周縁の波打ち	03 中
13 葉身の裏面のアントシアニン着色	01 無又は極弱
14 葉身の裏面のアントシアニン着色の色	
15 葉身の裏面の毛	03 中
16 葉身の基部の形	03 III型
17 葉身の先端の形	02 鋭形

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	02 やや短
19 葉柄の翼の有無	01 無
20 花序の幅	03 狭
21 花序の高さ	04 やや低
22 花序の上部の形	02 丸形
23 頭花の型	01 一重
24 頭花の直径	07 大
25 頭花の舌状花の数	03 中
26 舌状花の向き	02 水平
27 舌状花の長さ	06 やや長
28 舌状花の幅	02 中
29 舌状花の形	03 楕円形
30 舌状花の横断面の形	02 平形
31 舌状花の先端の切れ込みの有無	09 有
32 舌状花の先端の形	03 平形
33 舌状花の色数	02 2色
34 舌状花の主な色	RHSカラーチャート 93A

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花の二次色	RHSカラーチャート 67D
36 舌状花の二次色の分布	04 基部1/2
37 舌状花の二次色の型	02 ぼかし
38 舌状花の三次色	
39 舌状花の三次色の分布	
40 舌状花の三次色の型	
41 花盤の直径	02 やや小
42 花盤の色	RHSカラーチャート N89B
43 総ほう片の反り	02 やや反る

1 品種登録の番号及び年月日 第30923号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord. MHTW6

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MHTW6」は、対照品種「ティアズ オブ ザ ウィッチ」と比較して、舌状花の向きが水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社モリヒロ園芸
香川県観音寺市高屋町942

6 登録品種の育成をした者の氏名
森川裕介

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統に「ティアズ オブ ザ ウィッチ」を交配し、選抜したものである。

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW6

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 I 型
02 草丈	03 低
03 一次側枝の数	03 中
04 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
05 茎のアントシアニン着色の強弱	
06 葉身の長さ	04 やや短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の表面の緑色の濃淡	03 中
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の切れ込み	03 中
11 葉身の鋸歯の形	02 鈍形
12 葉身の周縁の波打ち	03 中
13 葉身の裏面のアントシアニン着色	01 無又は極弱
14 葉身の裏面のアントシアニン着色の色	
15 葉身の裏面の毛	03 中
16 葉身の基部の形	03 III型
17 葉身の先端の形	02 鋭形

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW6

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	02 やや短
19 葉柄の翼の有無	01 無
20 花序の幅	04 やや狭
21 花序の高さ	05 中
22 花序の上部の形	02 丸形
23 頭花の型	01 一重
24 頭花の直径	07 大
25 頭花の舌状花の数	02 少
26 舌状花の向き	02 水平
27 舌状花の長さ	05 中
28 舌状花の幅	02 中
29 舌状花の形	01 倒卵形
30 舌状花の横断面の形	03 凸形
31 舌状花の先端の切れ込みの有無	09 有
32 舌状花の先端の形	02 丸形
33 舌状花の色数	02 2色
34 舌状花の主な色	RHSカラーチャート N89A

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW6

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花の二次色	RHSカラーチャート 73A
36 舌状花の二次色の分布	04 基部1/2
37 舌状花の二次色の型	02 ぼかし
38 舌状花の三次色	
39 舌状花の三次色の分布	
40 舌状花の三次色の型	
41 花盤の直径	03 中
42 花盤の色	RHSカラーチャート N89D
43 総ほう片の反り	02 やや反る

1 品種登録の番号及び年月日 第30924号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord. 四季彩2022-1S (シサイ2022-1S)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「四季彩2022-1S」は、対照品種「レッドピクシー」と比較して、舌状花の主な色がNN78Aであること、花盤の色がN82Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

前川直人

香川県三豊市高瀬町比地2632-2番地

増田佳紀

兵庫県加西市繁昌町2306番地

渡部宗定

愛媛県東温市見奈良340-5

小野光一

岡山県玉野市南七区37

6 登録品種の育成をした者の氏名

前川直人 増田佳紀 渡部宗定 小野光一

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
四季彩2022-1S

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 II型
02 草丈	02 かなり低
03 一次側枝の数	03 中
04 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
05 茎のアントシアニン着色の強弱	03 強
06 葉身の長さ	02 かなり短
07 葉身の幅	02 かなり狭
08 葉身の表面の緑色の濃淡	04 やや濃
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の切れ込み	03 中
11 葉身の鋸歯の形	02 鈍形
12 葉身の周縁の波打ち	02 弱
13 葉身の裏面のアントシアニン着色	01 無又は極弱
14 葉身の裏面のアントシアニン着色の色	
15 葉身の裏面の毛	03 中
16 葉身の基部の形	02 II型
17 葉身の先端の形	02 鋭形

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
四季彩2022-1S

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	02 やや短
19 葉柄の翼の有無	01 無
20 花序の幅	02 かなり狭
21 花序の高さ	02 かなり低
22 花序の上部の形	02 丸形
23 頭花の型	01 一重
24 頭花の直径	03 小
25 頭花の舌状花の数	02 少
26 舌状花の向き	01 斜上
27 舌状花の長さ	02 かなり短
28 舌状花の幅	01 挟
29 舌状花の形	01 倒卵形
30 舌状花の横断面の形	01 凹形
31 舌状花の先端の切れ込みの有無	09 有
32 舌状花の先端の形	02 丸形
33 舌状花の色数	02 2色
34 舌状花の主な色	RHSカラーチャート NN78A

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
 四季彩2022-1S

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花の二次色	RHSカラーチャート N155A
36 舌状花の二次色の分布	05 基部1/4
37 舌状花の二次色の型	02 ぼかし
38 舌状花の三次色	
39 舌状花の三次色の分布	
40 舌状花の三次色の型	
41 花盤の直径	02 やや小
42 花盤の色	RHSカラーチャート N82D
43 総ほう片の反り	02 やや反る

1 品種登録の番号及び年月日 第30925号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord. 四季彩2022-2S (シサイ2022-2S)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「四季彩2022-2S」は、対照品種「サンセネレ」と比較して、花序の幅が狭であること、頭花の直径が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
前川直人
香川県三豊市高瀬町比地2632-2番地
増田佳紀
兵庫県加西市繁昌町2306番地
渡部宗定
愛媛県東温市見奈良340-5
小野光一
岡山県玉野市南七区37

6 登録品種の育成をした者の氏名
前川直人 増田佳紀 渡部宗定 小野光一

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
四季彩2022-2S

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 II型
02 草丈	03 低
03 一次側枝の数	04 多
04 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
05 茎のアントシアニン着色の強弱	03 強
06 葉身の長さ	02 かなり短
07 葉身の幅	01 極狭
08 葉身の表面の緑色の濃淡	03 中
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の切れ込み	03 中
11 葉身の鋸歯の形	02 鈍形
12 葉身の周縁の波打ち	01 無又は極弱
13 葉身の裏面のアントシアニン着色	01 無又は極弱
14 葉身の裏面のアントシアニン着色の色	
15 葉身の裏面の毛	03 中
16 葉身の基部の形	01 I型
17 葉身の先端の形	02 鋭形

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
四季彩2022-2S

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	02 やや短
19 葉柄の翼の有無	01 無
20 花序の幅	03 狭
21 花序の高さ	03 低
22 花序の上部の形	02 丸形
23 頭花の型	01 一重
24 頭花の直径	03 小
25 頭花の舌状花の数	02 少
26 舌状花の向き	01 斜上
27 舌状花の長さ	02 かなり短
28 舌状花の幅	02 中
29 舌状花の形	01 倒卵形
30 舌状花の横断面の形	02 平形
31 舌状花の先端の切れ込みの有無	09 有
32 舌状花の先端の形	03 平形
33 舌状花の色数	01 1色
34 舌状花の主な色	RHSカラーチャート NN78A

四季彩2022-2S

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質

重要な形質に係る特性

43 総ほう片の反り

03 反転

1 品種登録の番号及び年月日 第30926号 令和7年4月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord. 四季彩2022-3 (シサイ2022-3)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「四季彩2022-3」は、対照品種「ベネチア ピンク ウイズ リング」と比較して、草姿がⅡ型であること、舌状花の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
前川直人
香川県三豊市高瀬町比地2632-2番地
増田佳紀
兵庫県加西市繁昌町2306番地
渡部宗定
愛媛県東温市見奈良340-5
小野光一
岡山県玉野市南七区37

6 登録品種の育成をした者の氏名
前川直人 増田佳紀 渡部宗定 小野光一

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
四季彩2022-3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 II型
02 草丈	05 中
03 一次側枝の数	04 多
04 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
05 茎のアントシアニン着色の強弱	02 中
06 葉身の長さ	02 かなり短
07 葉身の幅	02 かなり狭
08 葉身の表面の緑色の濃淡	04 やや濃
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の切れ込み	03 中
11 葉身の鋸歯の形	02 鈍形
12 葉身の周縁の波打ち	03 中
13 葉身の裏面のアントシアニン着色	01 無又は極弱
14 葉身の裏面のアントシアニン着色の色	
15 葉身の裏面の毛	04 密
16 葉身の基部の形	02 II型
17 葉身の先端の形	02 鋭形

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
四季彩2022-3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	02 やや短
19 葉柄の翼の有無	09 有
20 花序の幅	04 やや狭
21 花序の高さ	04 やや低
22 花序の上部の形	02 丸形
23 頭花の型	01 一重
24 頭花の直径	05 中
25 頭花の舌状花の数	02 少
26 舌状花の向き	02 水平
27 舌状花の長さ	04 やや短
28 舌状花の幅	02 中
29 舌状花の形	03 楕円形
30 舌状花の横断面の形	02 平形
31 舌状花の先端の切れ込みの有無	09 有
32 舌状花の先端の形	02 丸形
33 舌状花の色数	02 2色
34 舌状花の主な色	RHSカラーチャート N80C

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
 四季彩2022-3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花の二次色	RHSカラーチャート NN155D
36 舌状花の二次色の分布	05 基部1/4
37 舌状花の二次色の型	01 一様又はほぼ一様
38 舌状花の三次色	
39 舌状花の三次色の分布	
40 舌状花の三次色の型	
41 花盤の直径	02 やや小
42 花盤の色	RHSカラーチャート N82D
43 総ほう片の反り	03 反転

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30927号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord. 四季彩2022-4 (シサイ2022-4)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「四季彩2022-4」は、対照品種「ベネチア ピンク ウイズ リング」と比較して、草姿がⅡ型であること、頭花の直径がかなり大であること、舌状花の色数が1色であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
前川直人
香川県三豊市高瀬町比地2632-2番地
増田佳紀
兵庫県加西市繁昌町2306番地
渡部宗定
愛媛県東温市見奈良340-5
小野光一
岡山県玉野市南七区37
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
前川直人 増田佳紀 渡部宗定 小野光一
- 7 出願公表の年月日 令和4年7月26日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
四季彩2022-4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 II型
02 草丈	05 中
03 一次側枝の数	04 多
04 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
05 茎のアントシアニン着色の強弱	
06 葉身の長さ	02 かなり短
07 葉身の幅	03 狭
08 葉身の表面の緑色の濃淡	04 やや濃
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の切れ込み	03 中
11 葉身の鋸歯の形	02 鈍形
12 葉身の周縁の波打ち	04 強
13 葉身の裏面のアントシアニン着色	01 無又は極弱
14 葉身の裏面のアントシアニン着色の色	
15 葉身の裏面の毛	04 密
16 葉身の基部の形	02 II型
17 葉身の先端の形	02 鋭形

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
四季彩2022-4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	02 やや短
19 葉柄の翼の有無	01 無
20 花序の幅	04 やや狭
21 花序の高さ	03 低
22 花序の上部の形	01 平形
23 頭花の型	01 一重
24 頭花の直径	08 かなり大
25 頭花の舌状花の数	02 少
26 舌状花の向き	01 斜上
27 舌状花の長さ	06 やや長
28 舌状花の幅	02 中
29 舌状花の形	03 楕円形
30 舌状花の横断面の形	02 平形
31 舌状花の先端の切れ込みの有無	09 有
32 舌状花の先端の形	02 丸形
33 舌状花の色数	01 1色
34 舌状花の主な色	RHSカラーチャート 73D

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
 四季彩2022-4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花の二次色	
36 舌状花の二次色の分布	
37 舌状花の二次色の型	
38 舌状花の三次色	
39 舌状花の三次色の分布	
40 舌状花の三次色の型	
41 花盤の直径	02 やや小
42 花盤の色	RHSカラーチャート 77B
43 総ほう片の反り	03 反転

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30928号 令和7年4月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord. MHS05
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MHS05」は、対照品種「MHS03」と比較して、葉身の裏面のアントシアニン着色が強であること、舌状花の主な色が61Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
森川裕介
香川県観音寺市高屋町1287番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
森川裕介
- 7 出願公表の年月日 令和4年8月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「カーニバル」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHS05

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 I 型
02 草丈	02 かなり低
03 一次側枝の数	02 少
04 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
05 茎のアントシアニン着色の強弱	03 強
06 葉身の長さ	04 やや短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の表面の緑色の濃淡	05 濃
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の切れ込み	04 深
11 葉身の鋸歯の形	03 円形
12 葉身の周縁の波打ち	04 強
13 葉身の裏面のアントシアニン着色	04 強
14 葉身の裏面のアントシアニン着色の色	02 紫
15 葉身の裏面の毛	02 粗
16 葉身の基部の形	03 III型
17 葉身の先端の形	02 鋭形

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHS05

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	02 やや短
19 葉柄の翼の有無	01 無
20 花序の幅	03 狭
21 花序の高さ	03 低
22 花序の上部の形	02 丸形
23 頭花の型	01 一重
24 頭花の直径	05 中
25 頭花の舌状花の数	03 中
26 舌状花の向き	02 水平
27 舌状花の長さ	04 やや短
28 舌状花の幅	02 中
29 舌状花の形	01 倒卵形、04 さじ状形
30 舌状花の横断面の形	02 平形
31 舌状花の先端の切れ込みの有無	09 有
32 舌状花の先端の形	02 丸形
33 舌状花の色数	01 1色
34 舌状花の主な色	RHSカラーチャート 61A

Pericallis x hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHS05

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 9 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花の二次色	
36 舌状花の二次色の分布	
37 舌状花の二次色の型	
38 舌状花の三次色	
39 舌状花の三次色の分布	
40 舌状花の三次色の型	
41 花盤の直径	03 中
42 花盤の色	RHSカラーチャート N79A
43 総ほう片の反り	03 反転