

1 品種登録の番号及び年月日 第31032号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. カラトラバ (カラトラバ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「カラトラバ」は、対照品種「スプリング ヘッドグラス」と比較して、抽
だい始期がやや晩であることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名
鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎 金子陽弘

7 出願公表の年月日 令和元年9月5日

8 登録品種の育成の経過の概要
「スプリング ヘッドグラス」に「クイック」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
カトラバ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
カトラバ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	05 中
24 葉の凹凸の大きさ	05 中
25 葉の周縁部の波打ち	04 やや弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	04 やや浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
カトラバ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	06 やや晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
カラトラバ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31033号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. カルピンテーロ (カルピンテーロ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「カルピンテーロ」は、対照品種「ウオームグリーングラス」と比較して、根腐病菌レース2抵抗性がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「KA-2430」と比較して、葉の厚さが中であること、外葉の色の濃淡がやや濃であること等で区別性が認められる。対照品種「アーリーインパルス」と比較して、外葉の色の濃淡がやや濃であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がやや粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎 金子陽弘 大和佑未

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ウオームグリーングラス」に「グリーンリーフ2号」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
カルピンテーロ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	09 極大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	03 小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	05 中

Lactuca sativa L.
カルピンテロー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	04 やや短
20 葉の幅	05 中
21 葉柄の基部の幅	03 狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	04 円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	06 やや濃
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	05 中
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
カルピンテロー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	06 やや強
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	04 やや粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	03 弱
43 収穫期	03 早
44 抽だい始期	06 やや晩
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	02 かなり弱

Lactuca sativa L.
カルピンテーロ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31034号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. 清水グリーン003 (シズグリーン003)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「清水グリーン003」は、対照品種「LE-293-2」と比較して、葉の凹凸の強弱がやや強であること、葉の凹凸の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKLET010」と比較して、葉の凹凸の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ファイン」と比較して、葉の凹凸の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
清水種苗株式会社
長野県長野市大字鶴賀字上千歳町1139

6 登録品種の育成をした者の氏名
桜井亨

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
清水グリーン003

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	07 大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	07 固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	04 やや小
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	05 中
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
清水グリーン003

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	06 やや強
34 葉の凹凸の大きさ	03 小

Lactuca sativa L.
清水グリーン003

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	05 中
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	06 やや大
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	06 やや晩
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
清水グリーン003

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31035号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. TLE567

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TLE567」は、対照品種「SAKLET012」と比較して、葉の形が狭扁円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ロジック」と比較して、葉の幅が広であること、球のしまりが中であること等で区別性が認められる。対照品種「KAY-012」と比較して、葉の周縁部の切れ込みの深さがかなり浅であること、葉の周縁部の切れ込みの粗密が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
岡田有平 石田了 千葉潤一

7 出願公表の年月日 令和2年5月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TLE567

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	04 やや水平
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	04 狭扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
TLE567

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	07 広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	03 弱
24 葉の凹凸の大きさ	05 中
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	02 かなり浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	05 中
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	05 中
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
TLE567

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	(球腐敗により未調査)
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	(球腐敗により未調査)
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
TLE567

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31036号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. TLE579

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TLE579」は、対照品種「KA-1230B」と比較して、葉の凹凸の強弱が強であること、葉の凹凸の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「キュアレッド1号」と比較して、葉の凹凸の強弱が強であること、葉の凹凸の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
岡田有平 喜多村直人 石田了 千葉潤一

7 出願公表の年月日 令和2年5月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
「TLE524」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TLE579

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	09 極大
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	09 有
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	03 小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	04 やや少

Lactuca sativa L.
TLE579

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	04 やや短
20 葉の幅	05 中
21 葉柄の基部の幅	03 狭
22 葉の厚さ	04 やや薄
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	07 倒卵形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	04 赤味
27 外葉の色の濃淡	06 やや濃
28 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
29 葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
30 葉のアントシアニンの分布	01 局在
31 葉のアントシアニン分布の種類	01 拡散のみ
32 葉の光沢の強弱	06 やや強
33 葉の凹凸の強弱	07 強
34 葉の凹凸の大きさ	06 やや大

Lactuca sativa L.
TLE579

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	07 強
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	06 やや密
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	03 早
44 抽だい始期	05 中
45 開花期の草丈	06 やや高
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
TLE579

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31037号 令和7年7月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. リコグリーンガラス (リコグリーンガラス)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「リコグリーンガラス」は、対照品種「MKS-L144」と比較して、葉の凹凸の強弱が強であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ノーチップ」と比較して、葉の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「コールドグリーンガラス」と比較して、葉の凹凸の強弱が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎 金子陽弘 大和佑未
- 7 出願公表の年月日 令和2年7月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ウオームグリーンガラス」に「ホットグリーンガラス」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
リコグリーングラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	07 大
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	04 やや小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	04 やや少

Lactuca sativa L.
リコグリーングラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	05 中
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	04 円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	06 やや濃
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	07 強
34 葉の凹凸の大きさ	04 やや小

Lactuca sativa L.
リコグリーングラス

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31037号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	07 強
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	05 中
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	06 やや大
42 腋芽の発生の強弱	03 弱
43 収穫期	03 早
44 抽だい始期	04 やや早
45 開花期の草丈	06 やや高
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
リコグリーングラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31038号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TENDITA

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「TENDITA」は、対照品種「TLE487」と比較して、葉の長さがやや短であること、葉の凹凸が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「コスタリカ4号」と比較して、葉の長さがやや短であること、葉の凹凸が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Burgemeester Crezeelaan 40, 2678KX De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

K. Reinink

7 出願公表の年月日 令和2年8月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TENDITA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	02 かなり小
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	03 小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	09 極多
07 葉の姿勢	01 立
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	02 倒卵形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
TENDITA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	06 やや強
20 葉の長さ	04 やや短
21 葉の幅	03 狭
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	01 無又は極弱
24 葉の凹凸の大きさ	03 小
25 葉の周縁部の波打ち	01 無又は極弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	01 円鋸歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	01 極粗
30 葉脈の型	01 非扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
TENDITA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	
44 ベと病レースB1:16EU抵抗性	
45 ベと病レースB1:17EU抵抗性	
46 ベと病レースB1:20EU抵抗性	
47 ベと病レースB1:21EU抵抗性	
48 ベと病レースB1:22EU抵抗性	
49 ベと病レースB1:23EU抵抗性	
50 ベと病レースB1:24EU抵抗性	
51 ベと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
TENDITA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31039号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TLE580

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「TLE580」は、対照品種「エクセルヘッドグラス」と比較して、葉の周縁部の切れ込みの粗密が粗であること、球のしまりが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイヤモンドヘッドグラス」と比較して、葉の周縁部の切れ込みの深さが浅であること、球のしまりが中であること等で区別性が認められる。対照品種「プラノ」と比較して、葉の凹凸が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡田有平 新井真琴 喜多村直人 北吉朗 石田了

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TLE580

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	07 大
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
TLE580

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	02 薄
23 葉の凹凸	03 弱
24 葉の凹凸の大きさ	05 中
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	05 中
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
TLE580

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	
44 ベと病レースB1:16EU抵抗性	
45 ベと病レースB1:17EU抵抗性	
46 ベと病レースB1:20EU抵抗性	
47 ベと病レースB1:21EU抵抗性	
48 ベと病レースB1:22EU抵抗性	
49 ベと病レースB1:23EU抵抗性	
50 ベと病レースB1:24EU抵抗性	
51 ベと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
TLE580

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31040号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TEXLE17617

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「TEXLE17617」は、対照品種「ツララ」と比較して、葉の凹凸が中であること、球のしまりがかなり固いであること等で区別性が認められる。対照品種「SUBENAS」と比較して、葉の形が扁円形であること、球のしまりがかなり固いであること等で区別性が認められる。対照品種「スプリング ヘッドグラス」と比較して、葉の凹凸の大きさがやや大であること、球のしまりがかなり固いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡田有平 新井真琴 喜多村直人 北吉朗 石田了

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TEXLE17617

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	04 やや小
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
TEXLE17617

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	05 中
24 葉の凹凸の大きさ	06 やや大
25 葉の周縁部の波打ち	04 やや弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	08 かなり固い
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
TEXLE17617

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	
44 ベと病レースB1:16EU抵抗性	
45 ベと病レースB1:17EU抵抗性	
46 ベと病レースB1:20EU抵抗性	
47 ベと病レースB1:21EU抵抗性	
48 ベと病レースB1:22EU抵抗性	
49 ベと病レースB1:23EU抵抗性	
50 ベと病レースB1:24EU抵抗性	
51 ベと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
TEXLE17617

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31041号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. SHIRANE SKY

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SHIRANE SKY」は、対照品種「キュアレッド1号」と比較して、葉のアントシアニン着色の強弱がかなり強であること、葉の凹凸の強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「KA-1230B」と比較して、葉のアントシアニン着色の強弱がかなり強であること、葉の凹凸の強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Burgemeester Crezeelaan 40, 2678KX De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

K. Reinink

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
SHIRANE SKY

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	08 かなり大
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	09 有
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	03 小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	05 中

Lactuca sativa L.
SHIRANE SKY

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	04 やや短
20 葉の幅	04 やや狭
21 葉柄の基部の幅	03 狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	07 倒卵形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	04 赤味
27 外葉の色の濃淡	07 濃
28 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
29 葉のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
30 葉のアントシアニンの分布	01 局在
31 葉のアントシアニン分布の種類	01 拡散のみ
32 葉の光沢の強弱	06 やや強
33 葉の凹凸の強弱	08 かなり強
34 葉の凹凸の大きさ	06 やや大

Lactuca sativa L.
SHIRANE SKY

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	07 強
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	05 中
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	03 早
44 抽だい始期	05 中
45 開花期の草丈	04 やや低
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
SHIRANE SKY

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31042号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ガナルヘッドグラス (ガナルヘッドグラス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ガナルヘッドグラス」は、対照品種「レガシー」と比較して、葉の形が扁円形であること等で区別性が認められる。対照品種「KA-1226」と比較して、球の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「TLE451」と比較して、葉の凹凸がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎 金子陽弘 大和佑未

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ステディ」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ガナルヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	03 狭楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
ガナルヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	07 広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	02 かなり弱
24 葉の凹凸の大きさ	07 大
25 葉の周縁部の波打ち	04 やや弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	04 やや浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	05 中
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	05 中
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
ガナルヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	06 やや晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
ガナルヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31043号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. アストログリーングラス (アストログリーングラス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「アストログリーングラス」は、対照品種「キュアグリーン1号」と比較して、葉の凹凸が中であること、葉の周縁部の波打ちが強であること等で区別性が認められる。対照品種「ホットグリーングラス」と比較して、葉の凹凸が中であること等で区別性が認められる。対照品種「スペンサー」と比較して、葉の形が狭扁円形であること、葉の凹凸が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎 金子陽弘 大和佑未

7 出願公表の年月日 令和3年2月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ホットグリーングラス」に「晩抽ムッター」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
アストログリーングラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	01 広楕円形
04 株の幅	03 小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	04 やや少
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	04 狭扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	05 外曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
アストログリーングラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	05 中
22 葉の厚さ	02 薄
23 葉の凹凸	05 中
24 葉の凹凸の大きさ	03 小
25 葉の周縁部の波打ち	07 強
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	07 密
30 葉脈の型	02 やや扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	02 細

Lactuca sativa L.
アストログリーングラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	05 中
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 ベと病レースB1:16EU抵抗性	
45 ベと病レースB1:17EU抵抗性	
46 ベと病レースB1:20EU抵抗性	
47 ベと病レースB1:21EU抵抗性	
48 ベと病レースB1:22EU抵抗性	
49 ベと病レースB1:23EU抵抗性	
50 ベと病レースB1:24EU抵抗性	
51 ベと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
アストログリーングラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31044号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. SAKLET020

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKLET020」は、対照品種「TLE505」と比較して、葉の形が広倒角卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「TLE437」と比較して、球のしまりがやや固いであること等で区別性が認められる。対照品種「SAKLET006」と比較して、葉の形が広倒角卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中康夫 西川盾士

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
SAKLET020

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	04 やや小
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	01 広倒角卵形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
SAKLET020

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	02 かなり弱
24 葉の凹凸の大きさ	05 中
25 葉の周縁部の波打ち	02 かなり弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	04 やや小
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
SAKLET020

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	06 やや晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
SAKLET020

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31045号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. 咲八姫（サキヒメ）

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「咲八姫」は、対照品種「ピュアホルン」と比較して、花型が八重であること等で区別性が認められる。対照品種「マイウェディング」と比較して、花被の形（小花柄を除く。）がらっぱであること、花被片の蜜腺に接する部分の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今給黎征郎 吉水竜次

7 出願公表の年月日 平成31年4月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ピュアホルン」どうしを交配し、選抜したものである。

Lilium L.
咲八姫

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	04 やや低
02 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
03 葉の数	04 やや少
04 葉序	02 螺旋
05 葉の長さ	06 やや長
06 葉の幅	04 やや狭
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
09 葉の横断面の形	02 V字型
10 つぼみの主な色	03 黄緑
11 つぼみの主な色2	
12 花序の型	02 散形花序及び総状花序
13 花序の花数	03 少
14 花序の毛の強弱	01 無又は極弱
15 花型	03 八重
16 花被の向き（小花柄を除く。）	02 斜上
17 花被の形（小花柄を除く。）	01 らっぱ

Lilium L.
咲八姫

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の香り	02 中
19 花被片の長さ	05 中
20 花被片の幅	05 中
21 花被片の肋状組織の強弱	03 強
22 花被片の周縁の波打ちの強弱	03 弱
23 花被片の周縁の波打ちの型	03 粗のみ
24 花被片の外反の強弱	03 弱
25 花被片の中央部の主な色	RHSカラーチャート NN155D
26 花被片の基部の主な色	RHSカラーチャート NN155C
27 花被片の蜜腺に接する部分の色	01 白
28 花被片の蜜腺に接する部分の色2	
29 花被片の先端部分の主な色	RHSカラーチャート NN155D
30 花被片の縁部の主な色	RHSカラーチャート NN155D
31 花被片の外面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
32 花被片の蜜腺の色	03 黄緑
33 花被片の蜜腺の色2	
34 花被片の乳頭突起又は斑点の数	01 無又は極少

Lilium L.
咲八姫

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花被片の乳頭突起又は斑点の範囲の大きさ	01 無又は極小
36 花被片の乳頭突起又は斑点の色	
37 雄ずいの長さ	07 長
38 花糸の主な色	03 黄緑
39 花糸の主な色2	
40 やくの色	01 橙黄
41 花粉の色	02 黄
42 花柱の主な色	03 黄緑
43 花柱の主な色2	
44 柱頭の色	02 灰緑
45 開花期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第31046号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Malus Mill. CIVG198

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「CIVG198」は、対照品種「陽光」と比較して、果実の大きさがやや小であること、果皮のしま模様の明瞭度が無であること等で区別性が認められる。対照品種「紅玉」と比較して、果実の長さ／幅がかなり大であること、果点の数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「秋映」と比較して、葉身の長さ／幅がやや小であること、果実の長さ／幅がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
C. I. V. -CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI-Societa consortile a r.l.
Strada statale Romea Km 116-Localita Boattone, Fraz. San Giuseppe 44020
Comacchio FE, Italy

6 登録品種の育成をした者の氏名
Michelangelo Leis Alessio Martinelli Francesco Tagliani Gianfranco
Castagnoli

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Gala」に「Liberty」を交配し、選抜したものである。

Malus Mill.
CIVG198

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	05 中
02 樹の型	02 分枝型
03 樹姿（分枝型品種に限る。）	02 開張
04 結実の型	02 短果枝及び長果枝
05 枝の太さ	04 やや細
06 節間長	05 中
07 枝の色	04 褐
08 枝の毛じの粗密	03 粗
09 皮目の多少	04 やや少
10 葉身の向き	02 水平
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の長さ／幅	04 やや小
14 葉身の緑色の濃淡	05 中
15 葉身の周縁の鋸歯の形	03 鋭鋸歯1
16 葉身の裏面の毛じの粗密	03 密
17 葉柄の長さ	06 やや長

Malus Mill.
CIVG198

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄のアントシアニン着色の広がり	05 中
19 つぼみの色	04 濃桃
20 花の大きさ	05 中
21 花弁の重なり	03 重なる
22 花柱の位置	02 同等
23 幼果のアントシアニン着色の広がり	07 大
24 果実の大きさ	04 やや小
25 果実の長さ	05 中
26 果実の幅	01 極小
27 果実の長さ／幅	08 かなり大
28 果実の形	05 楕円形
29 果実の角張りの強弱	01 無又は弱
30 果実の王冠の強弱	01 無又は弱
31 果実のがくの開閉	03 小
32 果実のがくの長さ	06 やや長
33 果粉の多少	02 中
34 果皮のろう質の多少	01 無又は少

Malus Mill.
CIVG198

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果面の粗滑	03 滑
36 果皮の地色	03 黄
37 果皮を被う色の面積	09 極大
38 果皮を被う色	03 赤
39 果皮を被う色の濃淡	08 かなり濃
40 果皮を被う色の型	06 全面着色と斑点状着色
41 果皮のしまの幅	
42 果皮のしま模様の明瞭度	01 無
43 梗あ周辺のさびの量	01 無又は小
44 果実側面のさびの量	01 無又は小
45 がくあ周辺のさびの量	01 無又は小
46 果点の数	03 少
47 果点の大きさ	06 やや大
48 スカーフスキンの多少	03 少
49 果柄の長さ	05 中
50 果柄の太さ	07 太
51 梗あの深さ	04 やや浅

Malus Mill.
CIVG198

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 梗あの幅	03 狭
53 がくあの深さ	03 浅
54 がくあの幅	03 狭
55 果肉の硬さ	08 かなり硬
56 果肉の色	02 黄白
57 果実の甘味	03 低
58 果実の酸味	05 中
59 果実の蜜の多少	02 かなり少
60 果心の形	05 広楕円形
61 果実の子室の型	03 広く開く
62 開花始期	05 中
63 収穫期	05 中
64 斑点落葉病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31047号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Momordica charantia L. 沖農 G 7 (杓ノ G 7)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「沖農 G 7」は、対照品種「沖農G6」と比較して、雄花の着生の多少が少であること等で区別性が認められる。対照品種「ゴーヤチャン」と比較して、果実の肩部の形が円であること、果実のこぶ状突起の多少が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名
谷合直樹 宮城徳道 新里仁克 田仲かおる 中村朝子 平田雅輝

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Momordica charantia L.

冲農 G 7

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 0 4 7 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸の緑色の濃淡	05 中
02 主づるの節間長	03 短
03 主づるの太さ	06 やや太
04 側枝数	06 やや多
05 葉身の大きさ	05 中
06 葉身の緑色の濃淡	07 濃
07 葉身裂片の長さ／幅	01 小
08 葉身裂片の先端部の形	03 円
09 葉身裂片の数	02 7裂片
10 葉身の切れ込みの深さ	07 深
11 葉柄の長さ	05 中
12 主枝第1雌花の着生節位	03 少
13 子房の長さ	03 短
14 雄花の着生の多少	03 少
15 柱頭の緑色の濃淡	07 濃
16 果実の長さ	04 やや短
17 果実の太さ	07 大

Momordica charantia L.

沖農 G 7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の縦断面の形	03 紡錘形
19 果実の果皮色	03 緑
20 果実の肩部の形	03 円
21 果実の尻部の形	01 鋭
22 果実のこぶ状突起の多少	07 多
23 果実のこぶ状突起の大きさ	03 小
24 果実のこぶ状突起の先端部の形	03 円
25 果実のこぶ状突起のとげの有無	01 無
26 果実の条状突起の長さ	03 短
27 果実の完熟期の果皮の色	02 橙
28 果実の苦味の有無	09 有
29 果実の苦味の強弱	04 やや弱
30 種子の大きさ	05 中
31 種皮の褐色の濃淡	05 中
32 種皮の稜の突起の大小	05 中
33 着果習性	02 中間型
34 完熟期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第31048号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nephrolepis exaltata (L.) Schott カーテンフェン (カーテンフェン)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「カーテンフェン」は、対照品種「ポストニエンシス」と比較して、草丈がやや高であること、葉身の長さが長であること、葉身の中軸の色が褐であること等で区別性が認められる。対照品種「テディ ジュニア」と比較して、葉身の長さが長であること、葉身の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

エイカク株式会社
東京都中央区京橋一丁目16番10号

6 登録品種の育成をした者の氏名

KO SONAN

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のオーストラリア在来系統から選抜したものである。

Nephrolepis exaltata (L.) Schott
カーテンフェン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	03 下垂
02 草丈	06 やや高
03 株幅	07 広
04 葉型	01 単羽状複葉
05 葉身の長さ	07 長
06 葉身の幅	06 やや広
07 葉身の形	02 披針形
08 葉身の表面の色	03 緑
09 葉身の裏面の色	03 緑
10 葉身の中軸の色	05 褐
11 葉身の硬さ	03 中
12 葉身の光沢の強弱	03 中
13 葉身の斑の有無	01 無
14 葉柄の長さ	05 中
15 葉柄の太さ	03 中
16 葉柄の色	06 濃褐
17 羽片の長さ	04 やや長

Nephrolepis exaltata (L.) Schott
カーテンフェン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 羽片の幅 19 羽片の形 20 羽片の着生角度 21 羽片の縁の波打ちの強弱 22 羽片の縁の鋸歯の粗密 23 羽片の縁の鋸歯の深さ 24 幼芽の軸の緑色の強弱	03 中
	03 長三角形
	01 無又は極小
	03 中
	03 中
	02 浅
	05 濃

1 品種登録の番号及び年月日 第31049号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ocimum basilicum L. PL4

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「PL4」は、対照品種「ドルチェフレスカ」と比較して、草丈がやや高であること、葉身の横断面の形が凸面であること等で区別性が認められる。対照品種「TSGI-207」と比較して、花茎の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Genesis Seeds Ltd.
Ashalim, M.P. Ramat Negev, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名
Arnon Brand

7 出願公表の年月日 令和3年9月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Ocimum basilicum L.
PL4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 直立
02 草丈	06 やや高
03 分枝性	03 粗
04 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
05 茎のアントシアニン着色の強弱	
06 茎の毛の有無	01 無
07 花茎の数	01 1個
08 葉身の形	03 楕円形
09 葉身の長さ	06 やや長
10 葉身の幅	06 やや広
11 葉身の表面のアントシアニン着色の有無	01 無
12 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	
13 葉身の表面のアントシアニン分布の程度	
14 葉身の緑色の濃淡（アントシアニン着色のない品種に限る。）	05 中
15 葉身の光沢の強弱	05 中
16 葉の凹凸の強弱	03 弱
17 葉身の横断面の形	01 凸面

Ocimum basilicum L.
PL4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の周縁部の鋸歯の有無	09 有
19 葉身の周縁部の鋸歯の深さ	03 浅
20 葉身の周縁部の波打ちの強弱	01 無又は極弱
21 葉柄の長さ	06 やや長
22 花茎の平均節間長	04 やや短
23 花茎の長さ	03 短
24 ほう葉の毛の有無	09 有
25 花冠の色	01 白
26 花柱の色	01 白
27 開花期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31050号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ocimum basilicum L. PROSPERA 1

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「PROSPERA 1」は、対照品種「エレオノーラ」と比較して、花茎の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「ジェノベーゼ」と比較して、葉の凹凸の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Genesis Seeds Ltd.
Ashalim, M.P. Ramat Negev, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名
Arnon Brand

7 出願公表の年月日 令和3年12月9日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Ocimum basilicum L.
PROSPERA 1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 直立
02 草丈	07 高
03 分枝性	03 粗
04 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
05 茎のアントシアニン着色の強弱	
06 茎の毛の有無	01 無
07 花茎の数	01 1個
08 葉身の形	03 楕円形
09 葉身の長さ	05 中
10 葉身の幅	04 やや狭
11 葉身の表面のアントシアニン着色の有無	01 無
12 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	
13 葉身の表面のアントシアニン分布の程度	
14 葉身の緑色の濃淡（アントシアニン着色のない品種に限る。）	05 中
15 葉身の光沢の強弱	05 中
16 葉の凹凸の強弱	03 弱
17 葉身の横断面の形	01 凸面

Ocimum basilicum L.
PROSPERA 1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の周縁部の鋸歯の有無	09 有
19 葉身の周縁部の鋸歯の深さ	03 浅
20 葉身の周縁部の波打ちの強弱	01 無又は極弱
21 葉柄の長さ	05 中
22 花茎の平均節間長	06 やや長
23 花茎の長さ	07 長
24 ほう葉の毛の有無	09 有
25 花冠の色	01 白
26 花柱の色	01 白
27 開花期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31051号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Perilla L. 豊の光早生 (ユタカノヒカリセ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「豊の光早生」は、対照品種「ゆたかのひかり」と比較して、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆたかのひかり」と比較して、葉身の裏面の紫色の濃淡が極淡であること、葉身の周縁部の切れ込みの型が鋸歯状であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
豊橋温室園芸農業協同組合
愛知県豊橋市高洲町字小島103番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
酒井保 高橋典男 佐藤恭章

7 出願公表の年月日 令和3年3月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ゆたかのひかり」から選抜し、固定したものである。

Perilla L.
豊の光早生

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色	07 強
02 幼苗の色	01 緑
03 植物体の高さ	04 やや短
04 側枝の数	05 中
05 茎の断面の形	03 四角
06 茎の毛	05 中
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の形	02 卵形
10 葉身の横断面の形	05 平
11 葉身の表面の色	02 緑
12 葉身の表面の色の濃淡	07 濃
13 葉身の光沢の強弱	05 中
14 葉身の裏面の色	02 紫
15 葉身の裏面の紫色の濃淡	01 極淡
16 葉身の山脈状の凹凸の強弱	05 中
17 葉身の水ほう状の凹凸の強弱	03 弱

Perilla L.
豊の光早生

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の周縁部の波打ちの強弱	03 弱
19 葉身の周縁部の切れ込みの型	02 鋸歯状
20 葉身の周縁部の切れ込みの密度	07 密
21 葉身の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
22 葉身の周縁部の小型鋸歯	01 無又は極少
23 葉柄の長さ	03 短
24 花穂の位置	02 主に頂部
25 花穂の数	03 少
26 花穂の長さ	05 中
27 小花の型	01 一重
28 小花の大きさ	03 小
29 小花の色	02 赤紫
30 小花の赤紫色の濃淡	05 中
31 がくの大きさ	06 やや大
32 がくのアントシアニン着色	03 弱
33 苞の大きさ	05 中
34 開花期	05 中

Perilla L.
豊の光早生

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 0 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 種子の大きさ 36 種子の色 37 乾燥種子の重さ	05 中
	05 茶
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31052号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Perilla L. 宝香4号（ホコウ4ゴウ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「宝香4号」は、対照品種「下阿達」と比較して、小花の赤紫色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「per-001」と比較して、葉身の長さが中であること、葉身の幅がやや広であること、葉身の山脈状の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
三島食品株式会社
広島県広島市中区南吉島2丁目1番53号

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋裕昭

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
「赤紫蘇在来系統」から選抜し、固定したものである。

Perilla L.
宝香4号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色	07 強
02 幼苗の色	02 赤紫
03 植物体の高さ	06 やや長
04 側枝の数	05 中
05 茎の断面の形	02 稜形
06 茎の毛	04 やや粗
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	06 やや広
09 葉身の形	02 卵形
10 葉身の横断面の形	05 平
11 葉身の表面の色	04 紫
12 葉身の表面の色の濃淡	07 濃
13 葉身の光沢の強弱	05 中
14 葉身の裏面の色	02 紫
15 葉身の裏面の紫色の濃淡	07 濃
16 葉身の山脈状の凹凸の強弱	05 中
17 葉身の水ほう状の凹凸の強弱	01 極弱

Perilla L.
宝香4号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の周縁部の波打ちの強弱	03 弱
19 葉身の周縁部の切れ込みの型	02 鋸歯状
20 葉身の周縁部の切れ込みの密度	06 やや密
21 葉身の周縁部の切れ込みの深さ	04 やや浅
22 葉身の周縁部の小型鋸歯	01 無又は極少
23 葉柄の長さ	04 やや短
24 花穂の位置	02 主に頂部
25 花穂の数	03 少
26 花穂の長さ	05 中
27 小花の型	01 一重
28 小花の大きさ	03 小
29 小花の色	02 赤紫
30 小花の赤紫色の濃淡	07 濃
31 がくの大きさ	05 中
32 がくのアントシアニン着色	05 中
33 苞の大きさ	05 中
34 開花期	06 やや晩

Perilla L.
宝香4号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 種子の大きさ 36 種子の色 37 乾燥種子の重さ	05 中
	05 茶
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31053号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart Nonsitnal

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Nonsitnal」は、対照品種「斑入りカムチャツカ」と比較して、葉の形が広倒卵形であること、葉の鋸歯の大きさが中であること、がくのアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Hortech, Inc.
14109 Cleveland St. Spring Lake, Michigan 49456, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Norberto Miguel Roma

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Gold Carpet」の変異株である。

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
Nonsitnal

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝性	02 少
02 草姿	02 開張
03 冬期の草丈	02 低
04 草丈	03 低
05 冬期の株の幅	01 極狭
06 株の幅	04 やや狭
07 冬期の茎の長さ	02 短
08 茎の長さ	03 短
09 冬期の茎の太さ	01 極細
10 茎の太さ	05 中
11 冬期の茎の色	07 赤紫
12 茎の色	02 淡緑
13 越冬芽の有無	01 無
14 越冬芽の展葉の早晩	
15 冬期の葉の数	03 中
16 葉の数	05 中
17 葉の向き	01 上向き

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
Nonsitnal

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 冬期の葉の長さ	01 極短
19 葉の長さ	03 短
20 冬期の葉の幅	01 極狭
21 葉の幅	03 狭
22 冬期の葉の厚さ	01 極薄
23 葉の厚さ	03 中
24 冬期の葉の形	05 広倒卵形
25 葉の形	05 広倒卵形
26 冬期の葉の基部の形	02 鋭形
27 葉の基部の形	01 くさび形
28 葉の先端部の形	03 円形
29 葉の横断面の反り	01 内曲
30 葉の縦断面の反り	03 外曲
31 冬期の葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
32 冬期の葉のアントシアニン分布	
33 冬期の葉の主な色	03 緑
34 葉の主な色	02 淡緑

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
Nonsitnal

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉の斑の有無	09 有
36 葉の斑の色	03 淡黄
37 葉の斑の模様	04 外斑
38 葉の鋸歯の形	01 円鋸歯状
39 葉の鋸歯の大きさ	03 中
40 葉の鋸歯の分布	02 1 / 3 から 2 / 3
41 花序の長さ	02 かなり短
42 花序の幅	02 かなり狭
43 花の直径	01 小
44 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
45 花冠裂片の長さ	01 短
46 花冠裂片の幅	02 中
47 花冠裂片の形	03 披針形
48 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 4A
49 やくの色	04 赤
50 開花期	09 極晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31054号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart オウミ シマ5号 (オウミ シマ5ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「オウミ シマ5号」は、対照品種「オウミ シマ3号」と比較して、花序の長さがかなり長であること、花序の幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「キリンソウ(常緑ほふく)」と比較して、株の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「オウミ シマ2号」と比較して、草姿が開張であること、花序の長さがかなり長であること、花序の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿田良男
滋賀県守山市吉身7丁目2-29

6 登録品種の育成をした者の氏名

鹿田良男

7 出願公表の年月日 令和2年5月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有のタケシマキリンソウ（在来系統）の変異株である。

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
オウミ シマ5号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝性	04 多
02 草姿	02 開張
03 冬期の草丈	03 中
04 草丈	04 やや低
05 冬期の株の幅	04 広
06 株の幅	04 やや狭
07 冬期の茎の長さ	04 長
08 茎の長さ	03 短
09 冬期の茎の太さ	02 細
10 茎の太さ	04 やや細
11 冬期の茎の色	02 淡緑
12 茎の色	03 緑
13 越冬芽の有無	01 無
14 越冬芽の展葉の早晩	
15 冬期の葉の数	03 中
16 葉の数	04 やや少
17 葉の向き	01 上向き

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
オウミ シマ5号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 冬期の葉の長さ	02 短
19 葉の長さ	04 やや短
20 冬期の葉の幅	01 極狭
21 葉の幅	02 かなり狭
22 冬期の葉の厚さ	01 極薄
23 葉の厚さ	03 中
24 冬期の葉の形	05 広倒卵形
25 葉の形	06 倒卵形
26 冬期の葉の基部の形	02 鋭形
27 葉の基部の形	01 くさび形
28 葉の先端部の形	01 鋭形
29 葉の横断面の反り	01 内曲
30 葉の縦断面の反り	02 平
31 冬期の葉のアントシアニン着色の強弱	04 強
32 冬期の葉のアントシアニン分布	02 先端部
33 冬期の葉の主な色	03 緑
34 葉の主な色	03 緑

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
オウミ シマ5号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉の斑の有無	01 無
36 葉の斑の色	
37 葉の斑の模様	
38 葉の鋸歯の形	02 鋸歯状
39 葉の鋸歯の大きさ	03 中
40 葉の鋸歯の分布	02 1 / 3 から 2 / 3
41 花序の長さ	08 かなり長
42 花序の幅	05 中
43 花の直径	01 小
44 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
45 花冠裂片の長さ	02 中
46 花冠裂片の幅	02 中
47 花冠裂片の形	03 披針形
48 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 5A
49 やくの色	04 赤
50 開花期	04 やや早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31055号 令和7年7月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart オウミ シマ6号 (オウミ シマ6ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「オウミ シマ6号」は、対照品種「オウミ シマ2号」と比較して、草丈が中であること、花序の長さがやや長であること、花序の幅がやや広であること等で区別性が認められる。対照品種「オウミ シマ5号」と比較して、株の幅がやや広であること、葉の鋸歯の大きさが小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鹿田良男
滋賀県守山市吉身7丁目2-29
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
鹿田良男
- 7 出願公表の年月日 令和2年5月18日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のタケシマキリンソウ（在来系統）の変異株である。

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
オウミ シマ6号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝性	04 多
02 草姿	03 ほふく
03 冬期の草丈	03 中
04 草丈	05 中
05 冬期の株の幅	05 極広
06 株の幅	06 やや広
07 冬期の茎の長さ	05 極長
08 茎の長さ	04 やや短
09 冬期の茎の太さ	02 細
10 茎の太さ	04 やや細
11 冬期の茎の色	02 淡緑
12 茎の色	03 緑
13 越冬芽の有無	01 無
14 越冬芽の展葉の早晩	
15 冬期の葉の数	03 中
16 葉の数	04 やや少
17 葉の向き	01 上向き

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
オウミ シマ6号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 冬期の葉の長さ	02 短
19 葉の長さ	03 短
20 冬期の葉の幅	01 極狭
21 葉の幅	01 極狭
22 冬期の葉の厚さ	02 薄
23 葉の厚さ	03 中
24 冬期の葉の形	05 広倒卵形
25 葉の形	07 狭倒卵形
26 冬期の葉の基部の形	02 鋭形
27 葉の基部の形	01 くさび形
28 葉の先端部の形	02 鈍形
29 葉の横断面の反り	01 内曲
30 葉の縦断面の反り	02 平
31 冬期の葉のアントシアニン着色の強弱	04 強
32 冬期の葉のアントシアニン分布	01 周縁部
33 冬期の葉の主な色	03 緑
34 葉の主な色	03 緑

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
オウミ シマ6号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉の斑の有無	01 無
36 葉の斑の色	
37 葉の斑の模様	
38 葉の鋸歯の形	01 円鋸歯状
39 葉の鋸歯の大きさ	02 小
40 葉の鋸歯の分布	02 1／3から2／3
41 花序の長さ	06 やや長
42 花序の幅	06 やや広
43 花の直径	02 中
44 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
45 花冠裂片の長さ	02 中
46 花冠裂片の幅	02 中
47 花冠裂片の形	03 披針形
48 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 9A
49 やくの色	03 橙
50 開花期	04 やや早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31056号 令和7年7月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart オウミ シマ8号 (オウミ シマ8コウ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「オウミ シマ8号」は、対照品種「オウミ シマ2号」と比較して、葉の縦断面の反りが外曲であること、花序の幅がやや広であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鹿田良男
滋賀県守山市吉身7丁目2-29
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
鹿田良男
- 7 出願公表の年月日 令和2年7月9日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のタケシマキリンソウ（在来系統）の変異株である。

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
オウミ シマ8号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝性	03 中
02 草姿	02 開張
03 冬期の草丈	03 中
04 草丈	04 やや低
05 冬期の株の幅	04 広
06 株の幅	05 中
07 冬期の茎の長さ	04 長
08 茎の長さ	03 短
09 冬期の茎の太さ	01 極細
10 茎の太さ	04 やや細
11 冬期の茎の色	02 淡緑
12 茎の色	03 緑
13 越冬芽の有無	01 無
14 越冬芽の展葉の早晩	
15 冬期の葉の数	03 中
16 葉の数	04 やや少
17 葉の向き	01 上向き

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
オウミ シマ8号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 冬期の葉の長さ	02 短
19 葉の長さ	03 短
20 冬期の葉の幅	01 極狭
21 葉の幅	01 極狭
22 冬期の葉の厚さ	02 薄
23 葉の厚さ	02 薄
24 冬期の葉の形	05 広倒卵形
25 葉の形	07 狭倒卵形
26 冬期の葉の基部の形	02 鋭形
27 葉の基部の形	02 鋭形
28 葉の先端部の形	01 鋭形
29 葉の横断面の反り	01 内曲
30 葉の縦断面の反り	03 外曲
31 冬期の葉のアントシアニン着色の強弱	03 中
32 冬期の葉のアントシアニン分布	02 先端部
33 冬期の葉の主な色	03 緑
34 葉の主な色	03 緑

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
オウミ シマ8号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉の斑の有無	01 無
36 葉の斑の色	
37 葉の斑の模様	
38 葉の鋸歯の形	02 鋸歯状
39 葉の鋸歯の大きさ	03 中
40 葉の鋸歯の分布	02 1 / 3 から 2 / 3
41 花序の長さ	07 長
42 花序の幅	06 やや広
43 花の直径	02 中
44 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
45 花冠裂片の長さ	02 中
46 花冠裂片の幅	02 中
47 花冠裂片の形	03 披針形
48 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 5A
49 やくの色	04 赤
50 開花期	04 やや早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31057号 令和7年7月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart 四季彩 4 (シサイ 4)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「四季彩 4」は、対照品種「トットリフジタ1号」と比較して、葉の形が楕円形であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「タケシマキリンソウ(グリーンマーケット)」と比較して、葉の形が楕円形であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山下律正
岡山県津山市北園町43番地7
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山下律正
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のタケシマキリンソウ（在来系統）を化学変異剤処理した育成系統から選抜したものである。

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
四季彩 4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝性	03 中
02 草姿	01 直立
03 冬期の草丈	03 中
04 草丈	06 やや高
05 冬期の株の幅	02 狭
06 株の幅	06 やや広
07 冬期の茎の長さ	03 中
08 茎の長さ	06 やや長
09 冬期の茎の太さ	02 細
10 茎の太さ	06 やや太
11 冬期の茎の色	01 黄緑
12 茎の色	03 緑
13 越冬芽の有無	01 無
14 越冬芽の展葉の早晩	
15 冬期の葉の数	04 多
16 葉の数	04 やや少
17 葉の向き	01 上向き

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
四季彩 4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 冬期の葉の長さ	02 短
19 葉の長さ	04 やや短
20 冬期の葉の幅	01 極狭
21 葉の幅	04 やや狭
22 冬期の葉の厚さ	02 薄
23 葉の厚さ	02 薄
24 冬期の葉の形	05 広倒卵形
25 葉の形	03 楕円形
26 冬期の葉の基部の形	02 鋭形
27 葉の基部の形	02 鋭形
28 葉の先端部の形	02 鈍形
29 葉の横断面の反り	01 内曲
30 葉の縦断面の反り	02 平
31 冬期の葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
32 冬期の葉のアントシアニン分布	02 先端部
33 冬期の葉の主な色	03 緑
34 葉の主な色	04 濃緑

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart
四季彩 4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉の斑の有無	01 無
36 葉の斑の色	
37 葉の斑の模様	
38 葉の鋸歯の形	01 円鋸歯状
39 葉の鋸歯の大きさ	03 中
40 葉の鋸歯の分布	02 1／3 から 2／3
41 花序の長さ	05 中
42 花序の幅	06 やや広
43 花の直径	02 中
44 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
45 花冠裂片の長さ	02 中
46 花冠裂片の幅	02 中
47 花冠裂片の形	03 披針形
48 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 6A
49 やくの色	01 黄
50 開花期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第31058号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pisum sativum L. TRI-814

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「TRI-814」は、対照品種「TRI-4024」と比較して、種子の1000粒重がやや重であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆうさや」と比較して、種子の斑紋の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トキタ種苗株式会社
埼玉県さいたま市見沼区中川1069

6 登録品種の育成をした者の氏名

時田巖 関口祥平

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ゆうさや」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Pisum sativum L.
TRI-814

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿・草丈	06 やや高性
02 分枝型	01 下位分枝型
03 分枝数	05 中
04 節間長	05 やや長
05 小葉の大きさ	03 小
06 小葉の形状	03 偏楕円形
07 小葉先端の形状	02 丸味形
08 小葉数	03 3対
09 托葉の大きさ	04 やや小
10 托葉の形状	03 不正楕円形
11 托葉先端の形状	04 中
12 托葉の雲紋	09 有
13 葉色	05 緑
14 葉のろう質	03 少
15 茎の太さ	05 中
16 茎葉の色素発生	03 少
17 花の大きさ	06 やや大

Pisum sativum L.
TRI-814

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花色	07 濃赤
19 花房の花数	04 2花混性多
20 初花房の節位	01 極低
21 莢の長さ	05 中
22 莢の幅	05 中程度
23 莢先端の形	05 中間形
24 莢のそり	01 そらない
25 莢の曲り（莢用種）	01 板状
26 莢の緑色度	05 緑
27 莢の色素発生	01 発生しない
28 莢のろう質	09 有
29 莢の筋の有無	01 無
30 莢の硬化	
31 莢の光沢	
32 莢のぼうしゅ（膨種）の発生	01 無
33 莢の重さ（莢用種）	04 やや軽
34 莢の重さ（青実用種に限る）	

Pisum sativum L.
TRI-814

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 莢の子座数（青実用種に限る）	
36 莢の離脱の難易	
37 青実の着粒密度（青実用種に限る）	
38 青実の大きさ（青実用種に限る）	
39 青実の100粒重（青実用種に限る）	
40 青実の形状（青実用種に限る）	
41 青実の緑色度（青実用種に限る）	
42 青実の歩どまり（青実用種に限る）	
43 青実の比重（青実用種に限る）	
44 種子の大きさ	07 大
45 種子の1000粒重	06 やや重
46 種子のしわ	05 中間型
47 種子の形状	01 球形
48 種子の地色	02 緑色
49 種子の斑紋の有無	09 有
50 種子の斑紋の色	02 茶色
51 種子の目の色	03 その他（淡茶）

Pisum sativum L.
TRI-814

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 用途	01 莢用
53 開花期	03 早
54 成熟期（青実用種）	
55 越冬性	06 やや高い
56 収穫の早晩性	04 やや早生
57 耐寒性	
58 耐倒伏性	
59 収穫量	
60 甘味（莢・青実用）	
61 風味（莢・青実用）	
62 うどんこ病抵抗性	
63 虫害抵抗性	
64 種皮のかたさ	
65 種皮の厚さ	
66 緑色度	
67 色素定着性	
68 糖度	

Pisum sativum L.
TRI-814

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 0 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 香気	

1 品種登録の番号及び年月日 第31059号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. *culta* (Mak.) Nakai
天空のしずく (テンクノシズク)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「天空のしずく」は、対照品種「豊水」と比較して、枝の色が緑茶であること、皮目の大きさが小であること、がく片の宿存の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「南水」と比較して、果実の形が円形であること、果実の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

山近龍浩 伊藤正 小川秀和 船橋徹郎 小仁所邦彦 鈴木剛伸 前島勤

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「日の出」に「南水」を交配し、選抜したものである。

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
 天空のしずく

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張
02 樹勢	05 中
03 枝の長さ	06 やや長
04 枝の太さ	05 中
05 枝の色	01 緑茶
06 節間長	05 中
07 皮目の数	03 少
08 皮目の大きさ	03 小
09 枝の毛じの粗密	05 中
10 短果枝の多少	05 中
11 葉芽の先端の形	02 やや円
12 葉芽の着き方	02 やや突出
13 腋花芽の数	07 多
14 花芽の大きさ	06 やや大
15 花芽の形	02 楕円形
16 花芽のりん片の色	01 褐
17 どん葉の色	04 赤褐

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
 天空のしずく

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 どん葉の毛じの有無	09 有
19 どん葉の毛じの粗密	03 粗
20 葉身の形	03 卵形
21 葉身の先端の形	01 尖形
22 葉身の基部の形	03 丸形
23 葉身の鋸歯の形	01 鋸歯状
24 葉身の長さ	04 やや短
25 葉身の幅	02 かなり狭
26 葉柄の長さ	03 短
27 葉柄の長さ／葉身の長さの比	04 やや小
28 花序の花の数	04 やや少
29 つぼみの色	01 白
30 花弁の主な色	01 白
31 花弁の大きさ	06 やや大
32 花弁の形	03 卵形
33 花弁の切れ込みの数	03 少
34 花弁の数	02 5～6枚以下

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
 天空のしずく

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 小花柄の毛じの粗密	05 中
36 雄ずいの数	04 やや少
37 やくの赤色の濃淡	01 淡
38 花粉の有無	09 有
39 果実の形	02 円形
40 梗あいの深さ	05 中
41 梗あいの幅	06 やや広
42 がくあいの深さ	04 やや浅
43 がくあいの幅	05 中
44 がく片の宿存の強弱	07 強
45 果実の大きさ	07 大
46 果皮の色	03 黄褐
47 果点の大きさ	05 中
48 果点の粗密	06 やや密
49 果面の粗滑（赤なし品種に限る）	05 中
50 果面のさびの多少（青なし品種に限る）	
51 果柄の長さ	03 短

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
 天空のしずく

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果柄の太さ	05 中
53 肉梗の有無	01 無
54 果芯の形	02 短紡錘形
55 果芯の大きさ	04 やや小
56 心室の数	05 中
57 果肉の色	01 白
58 果肉の硬さ	03 軟
59 果肉の粗密	07 密
60 果肉の切り口の褐変の強弱	05 中
61 果実の甘味	09 極高
62 果実の酸味	04 やや低
63 果実の渋味	01 無
64 果汁の多少	07 多
65 種子の大きさ	05 中
66 種子の形	01 卵形
67 種子の数	07 多
68 ほう芽始期	05 中

天空のしずく

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31059号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31060号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Raphanus sativus L. 南九 ホワイトNo.2号 (ナンキュ ホワイトNo.2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「南九 ホワイトNo.2号」は、対照品種「耐病総太り」と比較して、成葉の数（Nタイプ品種に限る。）がやや多であること、収穫期が（Nタイプ）晩であること等で区別性が認められる。対照品種「関白SP」と比較して、成葉の数（Nタイプ品種に限る。）がやや多であること、葉身の小葉の粗密が粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

学校法人南九州学園
宮崎県宮崎市霧島5丁目1-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

陳蘭庄

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「米良大根」の系統から、集団選抜法により選抜したものである。

Raphanus sativus L.
南九 ホワイトNo.2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 倍数性（Nタイプ品種に限る。）	02 二倍体
02 葉群着生部の幅（Nタイプ品種に限る。）	04 やや狭
03 葉群着生部の幅（Sタイプ品種に限る。）	
04 成葉の数（Nタイプ品種に限る。）	06 やや多
05 葉の姿勢	01 直立
06 葉の長さ（Nタイプ品種に限る。）	04 やや短
07 葉の長さ（Sタイプ品種に限る。）	
08 葉の幅（Nタイプ品種に限る。）	06 やや広
09 葉身の先端の形	02 鈍形
10 葉身の色	03 緑
11 葉身の切れ込み	03 浅
12 葉身の小葉の数	05 中
13 葉身の小葉の粗密	02 粗
14 葉柄のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉柄のアントシアニン着色部の大きさ（葉柄のアントシアニン着色が無又は極弱の品種を除く。）	
16 ダイコンの土壌中の位置（Nタイプ品種に限る。）	05 中
17 ダイコンの長さ（Nタイプ品種に限る。）	06 やや長

Raphanus sativus L.
南九 ホワイトNo.2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 ダイコンの長さ（Sタイプ品種に限る。）	
19 ダイコンの直径（Nタイプ品種に限る。）	07 大
20 ダイコンの直径（Sタイプ品種に限る。）	
21 ダイコンの重さ（Nタイプ品種に限る。）	07 大
22 ダイコンの形	05 長方形
23 ダイコンの形.	
24 ダイコンの肩の形	04 切形
25 ダイコンの先端の形	03 鈍形
26 ダイコンの表皮の色数	02 2色
27 ダイコンの葉側の表皮の色	03 淡緑
28 ダイコンの葉側の表皮の色.	
29 ダイコンの表皮の赤色模様の有無（Nタイプ品種に限る。）	01 無
30 ダイコンの表皮の白色の大きさ（ダイコンの表皮の色数が2色以上の品種に限る。）	05 中
31 ダイコンの表面の隆起（Nタイプ品種に限る。）	01 無又は弱
32 ダイコンの肉の主な色	02 不透明な白
33 ダイコンの肉の二次色	01 無
34 根の色	01 白

Raphanus sativus L.
南九 ホワイトNo.2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 根の色. 36 収穫期 37 ダイコンの空洞 38 雄性不稔性	
	07 (Nタイプ)晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31061号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Raphanus sativus L. WD8531

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「WD8531」は、対照品種「サラホワイト」と比較して、葉の姿勢が水平であること、葉の長さ（Nタイプ品種に限る。）が短であること等で区別性が認められる。対照品種「悠白」と比較して、葉の姿勢が水平であること、葉身の小葉の数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社渡辺採種場

宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷109番地

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤政樹 加治誠 柿崎智博 石田正彦 小原隆由 吹野伸子 板橋悦子

7 出願公表の年月日 令和4年1月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「名取理想」種子親系統由来の出願者所有系統を母系、「名取理想」花粉親系統由来の出願者所有系統を父系とする交雑品種である。

Raphanus sativus L.
WD8531

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 倍数性（Nタイプ品種に限る。）	02 二倍体
02 葉群着生部の幅（Nタイプ品種に限る。）	03 狭
03 葉群着生部の幅（Sタイプ品種に限る。）	
04 成葉の数（Nタイプ品種に限る。）	06 やや多
05 葉の姿勢	05 水平
06 葉の長さ（Nタイプ品種に限る。）	03 短
07 葉の長さ（Sタイプ品種に限る。）	
08 葉の幅（Nタイプ品種に限る。）	05 中
09 葉身の先端の形	02 鈍形
10 葉身の色	03 緑
11 葉身の切れ込み	03 浅
12 葉身の小葉の数	05 中
13 葉身の小葉の粗密	04 密
14 葉柄のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉柄のアントシアニン着色部の大きさ（葉柄のアントシアニン着色が無又は極弱の品種を除く。）	
16 ダイコンの土壌中の位置（Nタイプ品種に限る。）	05 中
17 ダイコンの長さ（Nタイプ品種に限る。）	06 やや長

Raphanus sativus L.
WD8531

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 ダイコンの長さ（Sタイプ品種に限る。）	
19 ダイコンの直径（Nタイプ品種に限る。）	06 やや大
20 ダイコンの直径（Sタイプ品種に限る。）	
21 ダイコンの重さ（Nタイプ品種に限る。）	06 やや大
22 ダイコンの形	04 針形
23 ダイコンの形.	
24 ダイコンの肩の形	04 切形
25 ダイコンの先端の形	04 丸形
26 ダイコンの表皮の色数	01 1色
27 ダイコンの葉側の表皮の色	01 白
28 ダイコンの葉側の表皮の色.	
29 ダイコンの表皮の赤色模様の有無（Nタイプ品種に限る。）	01 無
30 ダイコンの表皮の白色の大きさ（ダイコンの表皮の色数が2色以上の品種に限る。）	
31 ダイコンの表面の隆起（Nタイプ品種に限る。）	01 無又は弱
32 ダイコンの肉の主な色	02 不透明な白
33 ダイコンの肉の二次色	01 無
34 根の色	01 白

Raphanus sativus L.
WD8531

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 根の色. 36 収穫期 37 ダイコンの空洞 38 雄性不稔性	
	06 (Nタイプ)中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31062号 令和7年7月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Raphanus sativus L. サンロキア (サロキア)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サンロキア」は、対照品種「セントルージュ」と比較して、ダイコンの肉の主な色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「紫師舞」と比較して、葉の姿勢がやや直立であること、ダイコンの表皮の色数が1色であること、ダイコンの肉の主な色が紫であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社
大阪府豊中市三和町1丁目1番11号
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大野友道 柴原靖 今井雅志 石田正迪 小原隆由 石田正彦 柿崎智博 板橋悦子 吹野伸子
- 7 出願公表の年月日 令和4年3月14日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「セントルージュ」種子親系統由来の出願者所有系統を母系、「セントルージュ」花粉親系統由来の出願者所有系統を父系とする交雑品種である。

Raphanus sativus L.
サンロキア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 倍数性（Nタイプ品種に限る。）	02 二倍体
02 葉群着生部の幅（Nタイプ品種に限る。）	05 中
03 葉群着生部の幅（Sタイプ品種に限る。）	
04 成葉の数（Nタイプ品種に限る。）	04 やや少
05 葉の姿勢	02 やや直立
06 葉の長さ（Nタイプ品種に限る。）	05 中
07 葉の長さ（Sタイプ品種に限る。）	
08 葉の幅（Nタイプ品種に限る。）	05 中
09 葉身の先端の形	02 鈍形
10 葉身の色	03 緑
11 葉身の切れ込み	02 かなり浅
12 葉身の小葉の数	06 やや多
13 葉身の小葉の粗密	03 中
14 葉柄のアントシアニン着色	09 極強
15 葉柄のアントシアニン着色部の大きさ（葉柄のアントシアニン着色が無又は極弱の品種を除く。）	03 大
16 ダイコンの土壌中の位置（Nタイプ品種に限る。）	05 中
17 ダイコンの長さ（Nタイプ品種に限る。）	01 極短

Raphanus sativus L.
サンロキア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 ダイコンの長さ（Sタイプ品種に限る。）	
19 ダイコンの直径（Nタイプ品種に限る。）	06 やや大
20 ダイコンの直径（Sタイプ品種に限る。）	
21 ダイコンの重さ（Nタイプ品種に限る。）	04 やや小
22 ダイコンの形	
23 ダイコンの形.	02 倒卵形
24 ダイコンの肩の形	01 鋭形
25 ダイコンの先端の形	03 鈍形
26 ダイコンの表皮の色数	01 1色
27 ダイコンの葉側の表皮の色	
28 ダイコンの葉側の表皮の色.	01 紫
29 ダイコンの表皮の赤色模様の有無（Nタイプ品種に限る。）	01 無
30 ダイコンの表皮の白色の大きさ（ダイコンの表皮の色数が2色以上の品種に限る。）	
31 ダイコンの表面の隆起（Nタイプ品種に限る。）	01 無又は弱
32 ダイコンの肉の主な色	05 紫
33 ダイコンの肉の二次色	02 白
34 根の色	

Raphanus sativus L.
サンロキア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 根の色. 36 収穫期 37 ダイコンの空洞 38 雄性不稔性	01 紫
	07 (Nタイプ)晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31063号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhodanthemum (Vogt) B. H. Wilcox et al. クレールアルバ (クレールアルバ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「クレールアルバ」は、対照品種「クレールピーチ」と比較して、舌状花の向きが斜上であること、舌状花の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県
岐阜県岐阜市藪田南二丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大原藍 小枝剛

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「エルフピンク」に「カタナンチェ」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 直立
02 草丈	03 低
03 株の幅	02 かなり狭
04 茎の太さ	08 かなり太
05 節間長	01 極短
06 節数	05 中
07 一次分枝の数	04 やや少
08 葉の長さ	05 中
09 葉の幅	04 やや狭
10 葉の色	02 灰緑
11 葉片の幅	03 狭
12 葉の表面の毛の密度	07 密
13 花の直径	05 中
14 花盤の直径	03 小
15 花盤の主な色	RHSカラーチャート 183A
16 舌状花の向き	01 斜上
17 舌状花の数	04 やや少

Rhodanthemum (Vogt) B. H. Wilcox et al.
クレールアルバ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 0 6 3 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の形 19 舌状花の長さ 20 舌状花の幅 21 舌状花の表面の主な色 22 舌状花の表面の二次色（複色品種に限る。） 23 舌状花の裏面の主な色 24 舌状花の裏面の二次色（複色品種に限る。） 25 花粉の有無 26 開花始期	01 舌状
	08 かなり長
	03 狭
	RHSカラーチャート N155C
	RHSカラーチャート 60C(先端)
	RHSカラーチャート 155C
	RHSカラーチャート 64B(先端・中央条)
	09 有
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31064号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhodanthemum (Vogt) B. H. Wilcox et al. クレールスター (クレールスター)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「クレールスター」は、対照品種「スワンクリーム」と比較して、舌状花の長さがやや長であること、舌状花の裏面の二次色（複色品種に限る。）が4D（周縁）であること等で区別性が認められる。対照品種「レトロクラッカー」と比較して、葉の長さがやや短であること、舌状花の裏面の主な色が184Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県
岐阜県岐阜市藪田南二丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大原藍 小枝剛

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「カタナンチェ」に「クレールピーチ」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 直立
02 草丈	01 極低
03 株の幅	01 極狭
04 茎の太さ	08 かなり太
05 節間長	01 極短
06 節数	05 中
07 一次分枝の数	03 少
08 葉の長さ	04 やや短
09 葉の幅	02 かなり狭
10 葉の色	03 穏緑
11 葉片の幅	02 かなり狭
12 葉の表面の毛の密度	05 中
13 花の直径	04 やや小
14 花盤の直径	03 小
15 花盤の主な色	RHSカラーチャート 7A
16 舌状花の向き	01 斜上
17 舌状花の数	04 やや少

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の形	01 舌状
19 舌状花の長さ	06 やや長
20 舌状花の幅	04 やや狭
21 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 4D
22 舌状花の表面の二次色（複色品種に限る。）	RHSカラーチャート 183C(先端・基部)
23 舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート 184C
24 舌状花の裏面の二次色（複色品種に限る。）	RHSカラーチャート 4D（周縁）
25 花粉の有無	09 有
26 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31065号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhododendron L. ROBLEZ

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ROBLEZ」は、対照品種「紅姉妹」と比較して、成葉の表面の色が緑であること、花冠裂片の表面の主な色が53Bであること等で区別性が認められる。対照品種「アンブローシャス」と比較して、花冠裂片の裏面の主な色が53Bであること、花冠裂片の花喉部の斑点の色が187Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Robert Edward Lee

52063 Ridgecrest Drive, Independence, LA, 70443-0000, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Robert Edward Lee

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Red Slipper」に「Arabesk」を交配し、選抜したものである。

Rhododendron L.
ROBLEZ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の持続性	03 常緑
02 樹姿	02 叢生
03 つぼみの形	05 楕円形
04 新葉のろう質粉の多少	01 無又は極少
05 新葉の色	03 緑
06 新葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 成葉の表面の色	03 緑
08 成葉の裏面の色	02 淡緑
09 成葉の斑の有無	01 無
10 成葉の斑の模様	
11 成葉の斑の色	
12 成葉の長さ	03 短
13 成葉の幅	03 狭
14 成葉の形	06 倒卵形
15 成葉の表面の毛じの粗密	03 中
16 成葉の横断面の形	05 平
17 成葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 一花序当たりの着花数	03 少
19 花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）	
20 小花柄の長さ	03 短
21 小花柄の色	04 赤緑
22 がくの有無	09 有
23 がく片の長さ	05 中
24 花の形	02 開いた漏斗形
25 花の形2	
26 花の直径	05 中
27 花の香りの強弱	01 無又は極弱
28 花型	02 半八重
29 花冠裂片の数（八重品種に限る。）	
30 花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱	03 弱
31 花冠裂片の表面の色数	01 1
32 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート 53B
33 花冠裂片の表面の二次色	
34 花冠裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 53B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠裂片の表面の二次色の分布	
36 花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度	05 中
37 花冠裂片の花喉部の斑点の型	02 スポットの集合
38 花冠裂片の花喉部の斑点の色	RHSカラーチャート 187A
39 花冠裂片の花喉部の色の濃淡	02 同色
40 やくの色	04 赤
41 雌ずいの長さ	07 長
42 柱頭の色	04 赤
43 開花始期	04 やや早
44 成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）	03 緑
45 成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）	02 淡緑
46 成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）	02 かなり短
47 成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）	02 かなり狭
48 成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）	06 倒卵形
49 成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）	04 やや密
50 成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）	05 平
51 成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）	04 やや弱

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31066号 令和7年7月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. MKS-T830
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MKS-T830」は、対照品種「TTM019」と比較して、果実の縦断面の形が円形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ヴィルモランみかど株式会社
千葉県千葉市緑区大野台一丁目4番11号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
森口克己
- 7 出願公表の年月日 平成30年10月25日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
MKS-T830

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無（種子繁殖性品種に限る。）	09 有
02 草姿	02 無限伸育型
03 草丈（無限伸育型品種に限る。）	05 中
04 主茎の花房の数（有限伸育型品種に限る。）	
05 茎のアントシアニンの着色	05 中
06 節間長（無限伸育型品種に限る。）	05 中
07 葉の着生角度	07 下垂
08 葉の長さ	06 やや長
09 葉の幅	05 中
10 葉型	02 2回羽状
11 小葉の大きさ	05 中
12 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
13 葉の光沢の強弱	05 中
14 葉の膨らみ	05 中
15 小葉の着生角度	05 水平
16 花房の形	01 単一
17 花の色	01 黄

Solanum lycopersicum L.
MKS-T830

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花柱の毛の有無	09 有
19 果柄の離層の有無	09 有
20 小果柄の長さ（果柄の離層ありの品種に限る。）	02 かなり短
21 幼果の果肩部の緑色の有無	09 有
22 幼果の果肩部の緑色部の大きさ	06 やや大
23 幼果の果肩部の緑色の濃淡	06 やや濃
24 幼果の果色（果肩部を除く）の緑色の濃淡	03 淡
25 幼果の緑色縞模様の有無	01 無
26 果実の大きさ	02 かなり小
27 果実の長さ／直径	04 やや小
28 果実の縦断面の形	03 円形
29 果実の縦断面の形2	
30 果肩部のひだの強弱	01 無又は極弱
31 こうあ部のくぼみ	03 弱
32 へた落ちの大きさ	02 かなり小
33 花落ちの大きさ	01 極小
34 果頂部の形	03 平滑

Solanum lycopersicum L.
MKS-T830

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 芯の大きさ	03 小
36 果肉の厚さ	04 やや薄
37 子室数	01 2のみ
38 果実の色	05 赤
39 果肉の色	05 赤
40 果実の表皮の光沢	02 中
41 果実の表皮の色	02 黄色
42 果実の硬さ	07 硬
43 棚持ちの長さ	08 かなり長
44 開花の早晩	02 かなり早
45 成熟の早晩	02 かなり早
46 糖度（可溶性固形物含量）	07 高
47 酸度	05 中
48 全固形物量	
49 スクロース含有量の有無	
50 リコペン含有量	
51 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
MKS-T830

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 半身萎凋病抵抗性	
53 萎凋病レース 1 抵抗性	
54 萎凋病レース 2 抵抗性	
55 萎凋病レース 3 抵抗性	
56 根腐萎凋病抵抗性	
57 葉かび病レース 0 抵抗性	
58 トマトモザイクウイルス系統0抵抗性	
59 トマトモザイクウイルス系統1抵抗性	
60 トマトモザイクウイルス系統2抵抗性	
61 疫病抵抗性	
62 斑点病抵抗性	
63 青枯病抵抗性	
64 黄化葉巻病（TYLCV）イスラエル系統抵抗性	
65 黄化葉巻病（TYLCV）マイルド系統抵抗性	
66 かいよう病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31067号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. FS010-A

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「FS010-A」は、対照品種「TTM019」と比較して、棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）がかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「BELIDO」と比較して、葉の緑色の強さがやや濃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福井シード株式会社
福井県福井市開発5丁目2004番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
前田博和

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	(ポット苗で入手したことから評価せず。形質39、40も同様。)
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱 (心止まり品種に限る)	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長 (普通品種に限る)	05 中
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	05 中
08 葉幅	04 やや狭
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	05 中
11 葉の緑色の強さ	06 やや濃
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	03 短

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31067号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	02 かなり小
19 果径比（縦／横）	04 やや小
20 縦断面の果形	03 球形
21 果肩部のひだ	01 無又は極弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	03 弱
24 へた落ちの大きさ	02 かなり小
25 花落ちの大きさ	01 極小
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	03 小
29 果肉の厚さ	04 やや薄
30 子室数	01 2のみ
31 幼果期の果肩部の緑色	09 有
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	06 やや大
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	05 中
34 幼果期の果色	05 中

Solanum lycopersicum L.
FS010-A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	05 赤
37 果実の硬さ	07 硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	08 かなり長
39 開花の早晩	
40 成熟の早晩	
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	08 かなり高
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
FS010-A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
FS010-A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 T S W V抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31068号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. FS27-7

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「FS27-7」は、対照品種「ティティ」と比較して、棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）が中であること、糖度（可溶性固形物含量）がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「鈴姫」と比較して、糖度（可溶性固形物含量）がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「キャロルクイーン」と比較して、子室数が2又は3であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福井シード株式会社
福井県福井市開発5丁目2004番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
前田博和

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要
「華ロイヤル」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	(ポット苗で入手したことから評価せず。形質39、40も同様。)
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱 (心止まり品種に限る)	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長 (普通品種に限る)	05 中
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	05 中
08 葉幅	04 やや狭
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	05 中
11 葉の緑色の強さ	06 やや濃
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	03 短

Solanum lycopersicum L.
FS27-7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	03 小
19 果径比（縦／横）	04 やや小
20 縦断面の果形	03 球形
21 果肩部のひだ	01 無又は極弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	03 弱
24 へた落ちの大きさ	03 小
25 花落ちの大きさ	01 極小
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	03 小
29 果肉の厚さ	04 やや薄
30 子室数	02 2又は3
31 幼果期の果肩部の緑色	09 有
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	06 やや大
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	05 中
34 幼果期の果色	05 中

Solanum lycopersicum L.
FS27-7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	05 赤
37 果実の硬さ	07 硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	05 中
39 開花の早晩	
40 成熟の早晩	
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	08 かなり高
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
FS27-7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
FS27-7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 T S W V 抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis) 菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31069号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. MKS-T834

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MKS-T834」は、対照品種「サンチェリーピュア」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の強さが淡であること等で区別性が認められる。対照品種「キャロルクイーン」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の強さが淡であること、棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）がかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ヴィルモランみかど株式会社
千葉県千葉市緑区大野台一丁目4番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

森口克己

7 出願公表の年月日 令和元年9月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
MKS-T834

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	05 中
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	05 中
08 葉幅	05 中
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	05 中
11 葉の緑色の強さ	05 中
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	02 かなり短

Solanum lycopersicum L.
MKS-T834

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	02 かなり小
19 果径比（縦／横）	04 やや小
20 縦断面の果形	03 球形
21 果肩部のひだ	01 無又は極弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	02 かなり弱
24 へた落ちの大きさ	02 かなり小
25 花落ちの大きさ	01 極小
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	03 小
29 果肉の厚さ	04 やや薄
30 子室数	01 2のみ
31 幼果期の果肩部の緑色	09 有
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	06 やや大
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	03 淡
34 幼果期の果色	05 中

Solanum lycopersicum L.
MKS-T834

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	05 赤
37 果実の硬さ	07 硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	08 かなり長
39 開花の早晩	01 極早
40 成熟の早晩	02 かなり早
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	08 かなり高
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
MKS-T834

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
MKS-T834

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 TSWV抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31070号 令和7年7月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. KGM195
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KGM195」は、対照品種「KGM131」と比較して、サツマイモネコブセンチュウ抵抗性が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
市川雅敏 ト滋慶
- 7 出願公表の年月日 令和元年10月28日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
KGM195

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無（種子繁殖性品種に限る。）	09 有
02 草姿	02 無限伸育型
03 草丈（無限伸育型品種に限る。）	06 やや高
04 主茎の花房の数（有限伸育型品種に限る。）	
05 茎のアントシアニンの着色	05 中
06 節間長（無限伸育型品種に限る。）	04 やや短
07 葉の着生角度	07 下垂
08 葉の長さ	04 やや短
09 葉の幅	04 やや狭
10 葉型	02 2回羽状
11 小葉の大きさ	05 中
12 葉の緑色の濃淡	05 中
13 葉の光沢の強弱	05 中
14 葉の膨らみ	05 中
15 小葉の着生角度	05 水平
16 花房の形	01 単一
17 花の色	01 黄

Solanum lycopersicum L.
KGM195

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花柱の毛の有無	09 有
19 果柄の離層の有無	09 有
20 小果柄の長さ（果柄の離層ありの品種に限る。）	02 かなり短
21 幼果の果肩部の緑色の有無	01 無
22 幼果の果肩部の緑色部の大きさ	
23 幼果の果肩部の緑色の濃淡	
24 幼果の果色（果肩部を除く）の緑色の濃淡	03 淡
25 幼果の緑色縞模様の有無	01 無
26 果実の大きさ	02 かなり小
27 果実の長さ／直径	04 やや小
28 果実の縦断面の形	03 円形
29 果実の縦断面の形2	
30 果肩部のひだの強弱	01 無又は極弱
31 こうあ部のくぼみ	03 弱
32 へた落ちの大きさ	02 かなり小
33 花落ちの大きさ	01 極小
34 果頂部の形	03 平滑

Solanum lycopersicum L.
KGM195

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31070号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 芯の大きさ	03 小
36 果肉の厚さ	04 やや薄
37 子室数	01 2のみ
38 果実の色	05 赤
39 果肉の色	05 赤
40 果実の表皮の光沢	02 中
41 果実の表皮の色	02 黄色
42 果実の硬さ	07 硬
43 棚持ちの長さ	08 かなり長
44 開花の早晩	02 かなり早
45 成熟の早晩	02 かなり早
46 糖度（可溶性固形物含量）	07 高
47 酸度	06 やや高
48 全固形物量	
49 スクロース含有量の有無	
50 リコペン含有量	
51 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	09 有

Solanum lycopersicum L.
KGM195

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 半身萎凋病抵抗性	
53 萎凋病レース 1 抵抗性	
54 萎凋病レース 2 抵抗性	
55 萎凋病レース 3 抵抗性	
56 根腐萎凋病抵抗性	
57 葉かび病レース 0 抵抗性	
58 トマトモザイクウイルス系統0抵抗性	
59 トマトモザイクウイルス系統1抵抗性	
60 トマトモザイクウイルス系統2抵抗性	
61 疫病抵抗性	
62 斑点病抵抗性	
63 青枯病抵抗性	
64 黄化葉巻病（TYLCV）イスラエル系統抵抗性	
65 黄化葉巻病（TYLCV）マイルド系統抵抗性	
66 かいよう病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31071号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. KGM196

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KGM196」は、対照品種「レッドマンマ」と比較して、開花の早晩がやや遅であること、成熟の早晩が中であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM141」と比較して、子室数が4・5又は6であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名
市川雅敏 ト滋慶

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
KGM196

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	06 やや長
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	05 中
08 葉幅	06 やや広
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	06 やや大
11 葉の緑色の強さ	06 やや濃
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	03 短

Solanum lycopersicum L.
KGM196

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	04 やや小
19 果径比（縦／横）	02 かなり小
20 縦断面の果形	02 やや扁平
21 果肩部のひだ	02 かなり弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	04 やや弱
24 へた落ちの大きさ	03 小
25 花落ちの大きさ	04 やや小
26 果頂部の形	02 僅かにくぼむ
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	04 やや小
29 果肉の厚さ	05 中
30 子室数	04 4・5又は6
31 幼果期の果肩部の緑色	01 無
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	
34 幼果期の果色	06 やや濃

Solanum lycopersicum L.
KGM196

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	05 赤
37 果実の硬さ	06 やや硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	07 長
39 開花の早晩	06 やや晩
40 成熟の早晩	05 中
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	06 やや高
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
KGM196

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
KGM196

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 T S W V抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31072号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. KGM191

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KGM191」は、対照品種「KGM031」と比較して、果肩部のひだが無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM102」と比較して、果肩部のひだが無又は極弱であること、開花の早晚が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名
松下航

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
KGM191

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	01 心止まり
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	04 やや弱
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	04 やや短
08 葉幅	03 狭
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	04 やや小
11 葉の緑色の強さ	05 中
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	01 無
17 果柄の長さ	

Solanum lycopersicum L.
KGM191

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31072号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	04 やや小
19 果径比（縦／横）	04 やや小
20 縦断面の果形	03 球形
21 果肩部のひだ	01 無又は極弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	03 弱
24 へた落ちの大きさ	03 小
25 花落ちの大きさ	03 小
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	02 かなり小
29 果肉の厚さ	05 中
30 子室数	02 2又は3
31 幼果期の果肩部の緑色	01 無
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	
34 幼果期の果色	05 中

Solanum lycopersicum L.
KGM191

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	05 赤
37 果実の硬さ	07 硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	
39 開花の早晩	01 極早
40 成熟の早晩	03 早
41 節間長（心止まり品種に限る）	03 短
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	04 やや低
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
KGM191

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
KGM191

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 T S W V 抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis) 菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31073号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. ベースアップ (ベースアップ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ベースアップ」は、対照品種「スパイク-ネオ」と比較して、果頂部の形が平滑であること、幼果期の果肩部の緑色の大きさが小であること、幼果期の果肩部の緑色の強さがやや淡であること等で区別性が認められる。対照品種「スパイク」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
愛三種苗株式会社
愛知県清須市助七東山中93
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
牛島弘貴 今西俊介

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
ベースアップ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	06 やや長
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	05 中
08 葉幅	05 中
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	06 やや大
11 葉の緑色の強さ	05 中
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	04 やや短

Solanum lycopersicum L.
ベースアップ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	04 やや小
19 果径比（縦／横）	03 小
20 縦断面の果形	02 やや扁平
21 果肩部のひだ	03 弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	03 弱
24 へた落ちの大きさ	03 小
25 花落ちの大きさ	03 小
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	04 やや小
29 果肉の厚さ	05 中
30 子室数	02 2又は3
31 幼果期の果肩部の緑色	09 有
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	03 小
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	04 やや淡
34 幼果期の果色	05 中

Solanum lycopersicum L.
ベースアップ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	05 赤
37 果実の硬さ	06 やや硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	
39 開花の早晩	05 中
40 成熟の早晩	05 中
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	06 やや高
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
ベースアップ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
ベースアップ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 T S W V抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31074号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. effacerTOM010

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「effacerTOM010」は、対照品種「BELID0」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の強さがやや濃であること等で区別性が認められる。対照品種「サンチェリーピュア」と比較して、開花の早晚がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「TTM019」と比較して、こうあ部のくぼみがかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

effacer合同会社
岡山県玉野市槌ヶ原2458番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

福元隆浩

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

「effacerTOM005」に「サンチェリー250」を交配し、選抜したものである。

Solanum lycopersicum L.
effacerTOM010

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	05 中
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	05 中
08 葉幅	04 やや狭
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	05 中
11 葉の緑色の強さ	06 やや濃
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	03 短

Solanum lycopersicum L.
effacerTOM010

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	02 かなり小
19 果径比（縦／横）	03 小
20 縦断面の果形	02 やや扁平
21 果肩部のひだ	01 無又は極弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	02 かなり弱
24 へた落ちの大きさ	02 かなり小
25 花落ちの大きさ	01 極小
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	03 小
29 果肉の厚さ	04 やや薄
30 子室数	02 2又は3
31 幼果期の果肩部の緑色	09 有
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	06 やや大
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	06 やや濃
34 幼果期の果色	05 中

Solanum lycopersicum L.
effacerTOM010

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	05 赤
37 果実の硬さ	07 硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	06 やや長
39 開花の早晩	02 かなり早
40 成熟の早晩	02 かなり早
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	07 高
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
effacerTOM010

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
effacerTOM010

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 T S W V抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31075号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. 湘南ポモロンレッド35R (ショナンポモロンレッド35R)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「湘南ポモロンレッド35R」は、対照品種「KGM062」と比較して、縦断面の果形が腰高球であること、果実表皮の色が無色であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM071」と比較して、縦断面の果形が腰高球であること、果実表皮の色が無色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

神奈川県

神奈川県横浜市中区日本大通1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

西野奈々子 藤代岳雄

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
湘南ボロンレッド35R

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	05 中
06 葉の着生角度	06 やや下垂
07 葉長	06 やや長
08 葉幅	05 中
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	04 やや小
11 葉の緑色の強さ	06 やや濃
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	04 やや短

Solanum lycopersicum L.
湘南がモロンレッド35R

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	04 やや小
19 果径比（縦／横）	07 大
20 縦断面の果形	04 腰高球
21 果肩部のひだ	01 無又は極弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	02 かなり弱
24 へた落ちの大きさ	03 小
25 花落ちの大きさ	02 かなり小
26 果頂部の形	04 僅かに突出
27 果実表皮の色	01 無色
28 果実の心の大きさ	03 小
29 果肉の厚さ	05 中
30 子室数	02 2又は3
31 幼果期の果肩部の緑色	09 有
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	06 やや大
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	06 やや濃
34 幼果期の果色	06 やや濃

Solanum lycopersicum L.
湘南ポモロンレッド35R

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	05 赤
37 果実の硬さ	05 中
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	08 かなり長
39 開花の早晩	04 やや早
40 成熟の早晩	04 やや早
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	06 やや高
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
湘南がモロンレッド35R

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

湘南ポモロンレッド35R

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31075号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31076号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. 湘南ポモロンゴールドG4 (ショナンポモロンゴールドG4)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「湘南ポモロンゴールドG4」は、対照品種「クックゴールド」と比較して、小葉の着生角度が上向きであること、果径比（縦／横）が極大であること等で区別性が認められる。対照品種「オレンジなつめっ娘」と比較して、果径比（縦／横）が極大であること、幼果期の果肩部の緑色が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

神奈川県

神奈川県横浜市中区日本大通1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

西野奈々子 藤代岳雄

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Solanum lycopersicum L.
湘南ボロンゴールドG4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	05 中
06 葉の着生角度	03 上向き
07 葉長	05 中
08 葉幅	04 やや狭
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	04 やや小
11 葉の緑色の強さ	07 濃
12 小葉の着生角度	03 上向き
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	02 オレンジ
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	04 やや短

Solanum lycopersicum L.
湘南がモロンゴールドG4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	04 やや小
19 果径比（縦／横）	09 極大
20 縦断面の果形	06 長円筒形
21 果肩部のひだ	03 弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	02 かなり弱
24 へた落ちの大きさ	03 小
25 花落ちの大きさ	02 かなり小
26 果頂部の形	05 突出
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	02 かなり小
29 果肉の厚さ	05 中
30 子室数	02 2又は3
31 幼果期の果肩部の緑色	01 無
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	
34 幼果期の果色	06 やや濃

Solanum lycopersicum L.
湘南ポモロنگゴールドG4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	03 オレンジ
36 完熟期の果肉色	03 オレンジ
37 果実の硬さ	05 中
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	08 かなり長
39 開花の早晩	04 やや早
40 成熟の早晩	04 やや早
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	05 中
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
湘南ポモロングゴールドG4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
湘南ポモロンゴールドG4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 TSWV抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31077号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. ASO-855

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ASO-855」は、対照品種「華の鈴」と比較して、葉の緑色の強さが淡であること等で区別性が認められる。対照品種「華クインアール」と比較して、葉の緑色の強さが淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
愛三種苗株式会社
愛知県清須市助七東山中93

6 登録品種の育成をした者の氏名
平野晃生

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
ASO-855

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	04 やや短
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	05 中
08 葉幅	04 やや狭
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	04 やや小
11 葉の緑色の強さ	03 淡
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	04 やや短

Solanum lycopersicum L.
ASO-855

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	03 小
19 果径比（縦／横）	03 小
20 縦断面の果形	03 球形
21 果肩部のひだ	02 かなり弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	03 弱
24 へた落ちの大きさ	03 小
25 花落ちの大きさ	03 小
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	03 小
29 果肉の厚さ	04 やや薄
30 子室数	02 2又は3
31 幼果期の果肩部の緑色	01 無
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	
34 幼果期の果色	04 やや淡

Solanum lycopersicum L.
ASO-855

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	05 赤
37 果実の硬さ	06 やや硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	04 やや短
39 開花の早晩	03 早
40 成熟の早晩	03 早
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	07 高
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
ASO-855

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
ASO-855

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 TSWV抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31078号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. KGM197

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KGM197」は、対照品種「DR736TM」と比較して、葉の緑色の強さがやや淡であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM102」と比較して、葉幅が狭であること、葉の緑色の強さがやや淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名
松下航

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
KGM197

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	01 心止まり
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	05 中
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	04 やや短
08 葉幅	03 狭
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	04 やや小
11 葉の緑色の強さ	04 やや淡
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	02 オレンジ
16 果柄の離層	01 無
17 果柄の長さ	

Solanum lycopersicum L.
KGM197

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	04 やや小
19 果径比（縦／横）	05 中
20 縦断面の果形	04 腰高球
21 果肩部のひだ	03 弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	03 弱
24 へた落ちの大きさ	03 小
25 花落ちの大きさ	03 小
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	03 小
29 果肉の厚さ	05 中
30 子室数	02 2又は3
31 幼果期の果肩部の緑色	01 無
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	
34 幼果期の果色	04 やや淡

Solanum lycopersicum L.
KGM197

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	05 赤
37 果実の硬さ	07 硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	
39 開花の早晩	02 かなり早
40 成熟の早晩	04 やや早
41 節間長（心止まり品種に限る）	03 短
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	05 中
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
KGM197

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
KGM197

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 T S W V抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31079号 令和7年7月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. IC-T-020Y
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IC-T-020Y」は、対照品種「オレンジなつめっ娘」と比較して、果径比（縦／横）が極大であること、縦断面の果形が長円筒形であること等で区別性が認められる。対照品種「BAMBELO」と比較して、果径比（縦／横）が極大であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
井上石灰工業株式会社
高知県南国市稲生3163番地1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
戸梶佐紀
- 7 出願公表の年月日 令和2年6月2日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「IC-T-010Y」の実生から選抜したものである。

Solanum lycopersicum L.
IC-T-020Y

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	04 やや短
06 葉の着生角度	06 やや下垂
07 葉長	05 中
08 葉幅	03 狭
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	03 小
11 葉の緑色の強さ	05 中
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	02 混合
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	04 やや短

Solanum lycopersicum L.
IC-T-020Y

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	03 小
19 果径比（縦／横）	09 極大
20 縦断面の果形	06 長円筒形
21 果肩部のひだ	01 無又は極弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	02 かなり弱
24 へた落ちの大きさ	02 かなり小
25 花落ちの大きさ	01 極小
26 果頂部の形	04 僅かに突出
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	02 かなり小
29 果肉の厚さ	04 やや薄
30 子室数	02 2又は3
31 幼果期の果肩部の緑色	09 有
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	05 中
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	06 やや濃
34 幼果期の果色	05 中

Solanum lycopersicum L.
IC-T-020Y

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	02 黄
36 完熟期の果肉色	02 黄
37 果実の硬さ	07 硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	05 中
39 開花の早晩	03 早
40 成熟の早晩	03 早
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	06 やや高
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
IC-T-020Y

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
IC-T-020Y

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 T S W V抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31080号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. effacerTOM024

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「effacerTOM024」は、対照品種「KGM011」と比較して、果実表皮の色が無色であること、子室数が6又は7以上であること等で区別性が認められる。対照品種「りんか409」と比較して、糖度（可溶性固形物含量）がやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
effacer合同会社
岡山県玉野市槌ヶ原2458番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
福元隆浩

7 出願公表の年月日 令和2年7月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統に「桃太郎」を交配し、選抜したものである。

Solanum lycopersicum L.
effacerTOM024

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	05 中
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	05 中
08 葉幅	05 中
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	05 中
11 葉の緑色の強さ	05 中
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	04 やや短

Solanum lycopersicum L.
effacerTOM024

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	07 大
19 果径比（縦／横）	03 小
20 縦断面の果形	02 やや扁平
21 果肩部のひだ	05 中
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	05 中
24 へた落ちの大きさ	05 中
25 花落ちの大きさ	05 中
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	01 無色
28 果実の心の大きさ	05 中
29 果肉の厚さ	05 中
30 子室数	05 6又は7以上
31 幼果期の果肩部の緑色	09 有
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	05 中
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	05 中
34 幼果期の果色	05 中

Solanum lycopersicum L.
effacerTOM024

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	04 ピンク
37 果実の硬さ	06 やや硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	04 やや短
39 開花の早晩	05 中
40 成熟の早晩	05 中
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	04 やや低
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
effacerTOM024

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
effacerTOM024

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 T S W V抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31081号 令和7年7月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum melongena L. 山本ファーム2号 (ヤマトファーム2ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「山本ファーム2号」は、対照品種「トーホク ジャンボ1号」と比較して、葉身の凹凸の強弱が中であること、へた下のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「紫宝」と比較して、葉身の凹凸の強弱が中であること、へた下のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山本ファーム有限会社
山梨県甲州市塩山千野4221番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山本正
- 7 出願公表の年月日 令和3年3月26日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「大黒なす」の変異株である。

Solanum melongena L.
山本ファーム2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	07 強
03 草姿	01 立性
04 草丈	06 やや高
05 第一花着生節の子葉からの長さ	05 中
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎のアントシアニン着色の強弱	05 中
08 茎の毛じの粗密	05 中
09 茎のとげの有無	09 有
10 葉身の大きさ	08 かなり大
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
12 葉身の凹凸の強弱	05 中
13 葉身のとげの有無	09 有
14 葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）	05 中
15 葉身の色の数（観賞用品種に限る。）	
16 葉身の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の二次色（観賞用品種に限る。）	

Solanum melongena L.
山本ファーム2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の三次色（観賞用品種に限る。）	
19 花の数	01 1 から 3
20 花の大きさ	05 中
21 花の紫色の濃淡	05 中
22 果実の長さ	04 やや短
23 果実の直径	08 かなり大
24 果実の長さ／直径	02 かなり小
25 果実の形	03 倒卵形
26 果実の花こん部の大きさ	07 大
27 果実の先端の形	04 とがる
28 果実の花こん部のへこみの深さ	02 かなり浅
29 果実の曲がりの強弱（円筒形の品種に限る。）	
30 収穫時の果皮の主な色	03 紫
31 果皮の主な色の濃淡（果皮色が紫色又は緑色の品種に限る。）	06 やや濃
32 果実の光沢の強弱	05 中
33 果実の斑紋の有無	01 無
34 果実の条斑の有無	01 無

Solanum melongena L.

山本ファーム2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の条斑の明瞭度	
36 果実の条斑の粗密	
37 果実の肋の凹凸の強弱	03 弱
38 果柄の長さ	06 やや長
39 へた下のアントシアニン着色の有無	01 無
40 へた下のアントシアニン着色の強弱	
41 へたの大きさ	06 やや大
42 へたのアントシアニン着色の有無	09 有
43 へたのアントシアニン着色の強弱	05 中
44 へたのとげの多少	03 少
45 へたの縦じわの強弱	05 中
46 果肉の色	01 白
47 成熟時の果皮の色	04 褐色
48 開花始期	05 中
49 完熟期	07 晩
50 単為結果性	01 無

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31082号 令和7年7月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Vicia faba L. いろどり小町 (イトドリコマチ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「いろどり小町」は、対照品種「仁徳一寸」と比較して、茎のアントシアニンの着色の有無が無であること、翼弁のメラニン斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
森川泰夫
鹿児島県指宿市西方4988番地2
森川かおり
鹿児島県指宿市西方4988番地2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
森川泰夫 森川かおり
- 7 出願公表の年月日 令和2年10月7日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の「陵西一寸」の選抜系統の変異株である。

Vicia faba L.
いろどり小町

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子のタンニンの有無	01 無
02 伸育型	02 中間型
03 草丈	05 中
04 茎の数	05 中
05 主茎の地際から最も低い開花節までの節数	05 中
06 茎のアントシアニンの着色の有無	01 無
07 葉の緑色の灰色化の有無	01 無
08 葉の緑色の濃淡	05 中
09 小葉の長さ	05 中
10 小葉の幅	05 中
11 小葉の最大幅の位置	02 中央部
12 頂小葉の主脈に沿った曲折の強弱	03 弱
13 花序の花の数	05 中
14 開花期	05 中
15 花の長さ	06 やや長
16 翼弁のメラニン斑点の有無	01 無
17 翼弁のメラニン斑点の色	

Vicia faba L.
 いろどり小町

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 旗弁のメラニン斑点の有無	01 無
19 旗弁のアントシアニン着色の有無	01 無
20 旗弁のアントシアニン着色部の割合	
21 さやの数	03 少
22 さやの着生の向き	05 水平
23 さやの長さ	05 中
24 さやの幅	07 広
25 さやの曲がりの強弱	02 かなり弱
26 さやの緑色の濃淡	05 中
27 さやの胚珠数	05 中
28 乾燥種子の縦断面の形	02 楕円形
29 乾燥種子の横断面の形	01 狭楕円形
30 乾燥種子の重量	06 やや重
31 乾燥種子の種皮の色	02 緑
32 乾燥種子のへその着色の有無	09 有
33 さやの発育の早晩	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31083号 令和7年7月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Zinnia L. SAKZIN021

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKZIN021」は、対照品種「SAKZIN008」と比較して、舌状花の重ねの程度が八重であること、花卉の地色がN25Bであること等で区別性が認められる。対照品種「TZ963」と比較して、茎のアントシアニン発色の有無が有であること、花卉の地色がN25Bであること等で区別性が認められる。対照品種「TZ958」と比較して、茎のアントシアニン発色の有無が有であること、舌状花の重ねの程度が八重であること、花卉の地色がN25Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤智博

7 出願公表の年月日 令和5年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Zinnia L.
SAKZIN021

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株のひろがり	05 中
02 草丈	05 中
03 茎の太さ	03 細
04 茎のアントシアニン発色の有無	09 有
05 茎の毛の有無	09 有
06 1次側枝数	07 多
07 2次側枝数	07 多
08 側枝の角度	07 広
09 節間長	03 短
10 葉序	01 対生
11 葉形（葉身長／葉幅比）	05 中間
12 葉身長	05 中
13 葉身幅	03 狭
14 葉色	05 中
15 葉身基部のアントシアニン発色の有無	01 無
16 葉身基部のアントシアニン発色の程度	
17 葉の光沢	03 弱

Zinnia L.
SAKZIN021

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の厚さ	05 中
19 葉の毛の多少	05 中
20 たく葉の有無	01 無
21 たく葉の形	
22 花房の形	03 凹型
23 花弁のよじれ	01 平常平弁
24 花の直径	03 小
25 花の厚み	05 中
26 舌状花の重ねの程度	03 八重
27 舌状花数	03 少
28 管状花部の大きさ	05 中
29 管状花数	05 中
30 弁化した管状花の形	(弁化した管状花なし)
31 管状花の大きさ	05 中
32 舌状花の全形	03 広線形
33 舌状花先端の形	02 浅い切れ込み型
34 花弁の長さ	05 中

Zinnia L.
SAKZIN021

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の幅	05 中
36 複色の数	01 単色
37 複色の種類（複色品種のみ）	
38 基部着色の大きさ（同心円状複色品種のみ）	
39 花弁の地色	RHSカラーチャート N25B
40 花弁基部の色（同心円状複色品種のみ）	
41 花弁先端部の色（同心円状複色品種のみ）	
42 花弁条斑部の色（縞・斑状複色品種のみ）	
43 花盤の色	RHSカラーチャート 23B
44 花たくの形	02 円すい形
45 花たくの長さ	03 短
46 総ほうの形	05 中
47 花首の長さ	05 中
48 花首の太さ	03 細
49 初開花期	05 中