

1 品種登録の番号及び年月日 第31196号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. Docalalnaorze

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Docalalnaorze」は、対照品種「カリタスティック パンプキンスパイ
ス」と比較して、葉の先端の形が狭鋭形であること、花の喉部の主な色が45Aであるこ
と等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Dummen Group B.V.
Oudecampsweg 35C, 2678NN De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Arjan Koot

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Docalalnaorze

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	05 中
06 葉の先端の形	01 狭鋭形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	06 やや広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	03 中
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 45A
17 花の喉部の主な色の大きさ	06 やや大

Calibrachoa Cerv.
Docalalnaorze

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	04 星形
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 28A
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N30B
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 30C
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	01 突形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12A
29 花筒の内面の脈	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31197号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. INCALPOCYE

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「INCALPOCYE」は、対照品種「INCALGOYEL」と比較して、花の主な色が5Cであること、開花初期の花の主な色が7Dであること等で区別性が認められる。対照品種「カリタスティック ゴールド」と比較して、花の主な色が5Cであること、花筒の内面の主な色が7Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 令和5年4月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうし交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
INCALPOCYE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	05 中
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	06 やや広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	01 無又は極弱
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	01 無又は極小

Calibrachoa Cerv.
INCALPOCYE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 5C
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 7D
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 5D
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 7A
29 花筒の内面の脈	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31198号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. INCALPOCDP

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「INCALPOCDP」は、対照品種「INCALUPINK」と比較して、花の幅が中であること、花の喉部の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「カリーピンクウィズダークアイ」と比較して、開花初期の花の主な色がN74Aであること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 令和5年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	04 濃緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	05 中
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	01 無又は極弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 61B
17 花の喉部の主な色の大きさ	03 小

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート N74A
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N74A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N74A
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12A
29 花筒の内面の脈	02 弱

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31199号 令和7年8月28日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. INCALCOWHI
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「INCALCOWHI」は、対照品種「Docalalnawhi 22」と比較して、花の切れ込みが中であること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKCAL108」と比較して、葉の長さが短であること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Birgit Hofmann
- 7 出願公表の年月日 令和5年2月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
INCALCOWHI

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	03 短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	05 中
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	01 無又は極弱
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	01 無又は極小

Calibrachoa Cerv.
INCALCOWHI

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	01 突形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 7A
29 花筒の内面の脈	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 2 0 0 号 令和 7 年 8 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. WNCALSBDBLCR23

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「WNCALSBDBLCR23」は、対照品種「USCAL76602」と比較して、花の脈が中であること、花の主な色がN57Cであること等で区別性が認められる。対照品種「カメレオン ダブルデザートローズ」と比較して、花の主な色がN57Cであること、生育期間中の花色の変化が無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
WinGen, L. L. C.
6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
坂寄潮

7 出願公表の年月日 令和 5 年 4 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要
「カリビアーナ ダブル ピンクスター」に育成者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
WNCALSBDBLCR23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	04 濃緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	02 八重
13 花の幅	04 やや狭
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	03 中
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	01 無又は極小

Calibrachoa Cerv.
WNCALSBDBLCR23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	02 小
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート N57C
22 花の二次色	RHSカラーチャート 158D
23 花の二次色の分布	05 花冠裂片の縁部
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N57C
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N57C
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	01 突形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 7A
29 花筒の内面の脈	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31201号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. WNCALSBHY23

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「WNCALSBHY23」は、対照品種「カリバスケッ ト サニーサイドImp」と比較して、花の喉部の主な色の大きさがやや大であること、開花初期の花の主な色が157Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
WinGen, L. L. C.
6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Brent Barnes

7 出願公表の年月日 令和5年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
WNCALSBHY23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	06 やや高
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	06 やや広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	08 かなり広
14 花の切れ込み	04 強
15 花の脈	01 無又は極弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 5C
17 花の喉部の主な色の大きさ	06 やや大

Calibrachoa Cerv.
WNCALSBHY23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 157C
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	01 突形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 13A
29 花筒の内面の脈	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31202号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. WNCALSBPL23

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「WNCALSBPL23」は、対照品種「イチゴミルク」と比較して、花の幅がやや狭であること、花の主な色が73Aであること等で区別性が認められる。対照品種「カメレオン ダブルティックルピンク」と比較して、葉の長さがやや長であること、開花後期の花の主な色がN75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
WinGen, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
坂寄潮

7 出願公表の年月日 令和5年4月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統に「INCALUDARE」を交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
WNCALSBPL23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	07 広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	04 濃緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	02 狭
12 花型	02 八重
13 花の幅	04 やや狭
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 61A
17 花の喉部の主な色の大きさ	04 やや小

Calibrachoa Cerv.
WNCALSBPL23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	04 星形
19 花の喉部の斑紋	05 極大
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート 73A
22 花の二次色	RHSカラーチャート NN155C
23 花の二次色の分布	06 不規則
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 1D
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N75B
26 生育期間中の花色の変化	03 強
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 13A
29 花筒の内面の脈	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31203号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. Sunca1 691

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunca1 691」は、対照品種「カリタスティック ブライトレッド」と比較して、葉の長さが極長であること、花の脈が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunbel 871」と比較して、葉の長さが極長であること、花の幅がかなり広いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名
山田将弘

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 691

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	07 高
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	09 極長
05 葉の幅	08 かなり広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	04 長
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	08 かなり広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	01 無又は極小

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 691

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート N45A
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 53A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N45A
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 7A
29 花筒の内面の脈	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31204号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. Sunca1 694

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunca1 694」は、対照品種「INCALGOYEL」と比較して、葉の長さが長であること、花筒の内面の主な色が13Aであること等で区別性が認められる。対照品種「カリタスティック ゴールド」と比較して、花の幅が広であること、花の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名
山田将弘

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 694

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	07 長
05 葉の幅	07 広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	07 広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	01 無又は極小

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 694

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 6A
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 5A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 6B
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 13A
29 花筒の内面の脈	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 2 0 5 号 令和 7 年 8 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. KLECA18155

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KLECA18155」は、対照品種「USCAL83901」と比較して、開花後期の花の主な色が53Dであること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。対照品種「ウノ ダブル レッド」と比較して、花の幅がやや広であること、花の主な色が53Cであること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Anita Stover

7 出願公表の年月日 令和 5 年 8 月 1 0 日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「Aloha Kona Cherry」を交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
KLECA18155

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	04 長
11 がく片の幅	03 中
12 花型	02 八重
13 花の幅	06 やや広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	04 強
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	02 かなり小

Calibrachoa Cerv.
KLECA18155

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 53C
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 53A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 53D
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	01 突形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12A
29 花筒の内面の脈	03 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31206号 令和7年8月28日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST060
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKAST060」は、対照品種「SAKAST046」と比較して、頭花の直径がやや大であること、頭花の高さがやや高であること、外側の舌状花の表面の主な色が72Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤智博
- 7 出願公表の年月日 令和5年3月20日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31206号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 株幅	03 狭
03 一次側枝の数	04 やや少
04 二次側枝の数	03 少
05 一次側枝の発生位置	02 全体にわたる
06 節数	05 中
07 茎のアントシアニンの着色	02 弱
08 一次側枝の長さ	05 中
09 一次側枝の主茎に対する角度	02 やや小
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉身の長さ	03 短
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の長さ／幅	03 低
14 葉身の緑色の濃淡	02 中
15 頭花の型	03 八重
16 舌状花の数	06 やや多
17 頭花の直径	06 やや大

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頭花の高さ	06 やや高
19 外側の舌状花の長さ	04 やや短
20 外側の舌状花の幅	06 やや広
21 外側の舌状花の長さ／幅	03 低
22 外側の舌状花の形	01 舌状
23 外側の舌状花の縦断面の湾曲	01 内曲（外曲(先端部)）
24 外側の舌状花の横断面の形	01 凹形
25 外側の舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 72D
26 外側の舌状花の表面の二次色	
27 外側の舌状花の表面の二次色の分布	01 無
28 外側の舌状花の裏面の主な色	RHSカラーチャート N74C
29 内側の舌状花の形（八重品種に限る。）	01 舌状
30 内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）	01 内曲（外曲(先端部)）
31 内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）	01 凹形
32 内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）	RHSカラーチャート 72D
33 内側の舌状花の表面の二次色（八重品種に限る。）	
34 内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）	01 無

SAKAST060

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31206号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31207号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFLUTI2

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFLUTI2」は、対照品種「レミダス」と比較して、草丈がかなり高であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「Fitcelebrate」と比較して、舌状花の先端の形が歯状であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がやや円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイシャルム」と比較して、舌状花の先端の形が歯状であること、花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	02 かなり少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 6B
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	05 中
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 4A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 3C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 4A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 3C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	08 かなり大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	04 やや円錐状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFLUTI2

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31207号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 2 0 8 号 令和 7 年 8 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFAMAM1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFAMAM1」は、対照品種「DLFCAP01」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）が145Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ザンムガッバーナ」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「Forest Aroma」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和 5 年 3 月 3 0 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFAMAM1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	01 無又は極小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	02 平行
15 葉の基部の形	02 鈍形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	04 やや浅
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート NN155C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	02 アネモネ
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	06 やや大
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	05 中
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	02 基部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	08 かなり大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート 145C
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	03 ロート形
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	05 中
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFAMAM1

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31208号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31209号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFTURT5

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFTURT5」は、対照品種「セイフリルグリーン」と比較して、舌状花の表面の主な色が145Dであること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が大であること等で区別性が認められる。対照品種「セイノトイエロー」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和5年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFTURT5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	03 狭
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	06 やや深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	05 中
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 150A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	02 かなり低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	01 極少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	05 中
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	02 内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	02 基部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	04 やや弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	02 かなり狭
61 舌状花の長さ／幅	05 中
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 145D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 145C;157C(縁部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 145D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 145C;157C(縁部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	07 大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFTURT5

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31209号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31210号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFVESP3

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFVESP3」は、対照品種「精あさずみ」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、葉の長さ／幅がやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「Fitsasha」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の主な色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「モゼシェリー」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること、舌状花の表面の主な色が70Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	07 大
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 64A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	03 少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	06 やや多
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05 水平
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 70B
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 77D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 70B;NN155D(基部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 75A;NN155D(基部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	06 黄橙
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFVESP3

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31210号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31211号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. DLFCAMP12

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFCAMP12」は、対照品種「コイミリオン」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。対照品種「FICHRVCLASSI」と比較して、花盤の断面の形（ダイジー型の品種に限る）がややドーム状であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	03 褐
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	03 淡

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	07 多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート N74C
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	04 やや低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	01 基部1/4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	01 内曲
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	04 やや弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	01 尖る
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N74D
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 69D
66 舌状花の表面の二次色の分布	02 先端部1/4
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	02 ぼかし

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 84C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N74D;69D(先端部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 84C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

DLFCAMP12

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31211号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31212号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 太陽のレイナ (タイヨルナ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「太陽のレイナ」は、対照品種「セイエリン」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。対照品種「セイマジ」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
久保田篤 樋口健太

7 出願公表の年月日 令和5年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「太陽のウリズンピーチ」を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
太陽のレイナ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31212号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	01 無又は極小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	07 長
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	06 やや広
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 75B
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31212号
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）		
36 頭花の花柄の長さ	02	かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02	かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04	やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）		
40 頭花の舌状花の形の数	01	1
41 頭花の舌状花の主要な形	01	舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形		
43 頭花の舌状花の三次的な形		
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	05	水平
45 舌状花の表面の状態	02	うね状
46 舌状花のキールの数		
47 舌状花の花筒の長さ	01	極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06	平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2		
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04	平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）		

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 76D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 69D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 76D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 69D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31212号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

太陽のレイナ

第3 1 2 1 2号

03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第31213号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 太陽のレイカ (タイヨウレカ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「太陽のレイカ」は、対照品種「セイエルナ」と比較して、葉の長さ／幅がやや低であること、葉の基部の形が凹形であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6.5週間であること等で区別性が認められる。対照品種「セイフェンディ」と比較して、舌状花の裏面の色がN155Bであること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6.5週間であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFILVIA」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
久保田篤 樋口健太

7 出願公表の年月日 令和5年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「太陽のウリズンピーチ」を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.

太陽のレイカ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	03 淡

Chrysanthemum L.

太陽のレイカ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31213号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	07 多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	08 かなり深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	03 円筒形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	05 中
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 73D
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

Chrysanthemum L.

太陽のレイカ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.

太陽のレイカ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	05 中
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	05 歯状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 69D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.

太陽のレイカ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート N155B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 69D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N155B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

太陽のレイカ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31213号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	03 6.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

太陽のレイカ

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質

1 品種登録の番号及び年月日 第31214号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. スプレーアイチ秋2号 (スプレーアイチ秋2号)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「スプレーアイチ秋2号」は、対照品種「セイメリタ」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「SKE160-5132」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、花盤の断面の形（ダイジー型の品種に限る）がややドーム状であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。対照品種「弓戸セレモ」と比較して、舌状花の幅がやや広であること、花盤の断面の形（ダイジー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名
山内友梨佳 奥村義秀 長谷川徹 植村真也 春山純平 石原元浩 二村幹雄 渡
邊孝政 平松裕邦 近藤敬典

7 出願公表の年月日 令和5年10月5日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
スプレーアイチ秋2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	06 やや多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	02 深いドーム形
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	04 やや狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	04 やや小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	02 かなり斜上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしいの外面の色	RHSカラーチャート NN155D
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	05 中
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	05 中

Chrysanthemum L.
スプレーアイチ秋2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03 先端部1/4
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02 かなり弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	05 中
60 舌状花の幅	06 やや広
61 舌状花の長さ／幅	03 低
62 舌状花の先端の形	02 丸
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート NN155D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	08 かなり大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晚性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
スプレーアイチ秋2号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31214号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31215号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cuphea linarioides Cham. & Schltdl. アサノマK (アサマK)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「アサノマK」は、対照品種「クフェア リナリオイデス(在来系統)」と比較して、茎の先端部の色が184Cであること、葉の表面の主な色がNN137Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社麻野間園芸
愛知県北設楽郡設楽町西納庫字駒ヶ原177

6 登録品種の育成をした者の氏名
麻野間達矢

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Cuphea linarioides Cham. & Schltdl.
アサノマK

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	該当なし
02 植物体の大きさ	草丈が17.7cm(±1.2)、株の幅が45.7cm(±4.0)
03 茎の形状	側枝の数が10.6本(±1.5)
04 茎の大きさ	茎の長さが27.5cm(±2.3)、茎の太さが0.7mm(±0.1)
05 茎の色彩	茎の先端部の色が184C、茎の中間部の色が173C
06 葉の形状	葉の形が卵形
07 葉の大きさ	葉の長さが7.7mm(±0.5)、葉の幅が3.8mm(±0.1)、葉の長さ／幅が2.1(±0.1)
08 葉の色彩	葉の表面の主な色がNN137B
09 花の形状	該当なし
10 花の大きさ	花の縦径が10.3mm(±0.5)、花の横径が12.1mm(±0.8)、花の縦径／横径が0.9(±0.1)
11 花の色彩	RHSカラーチャート 上部花弁の表面の主な色が77C、下部花弁の表面の主な色がN78B
12 果実の形状	該当なし
13 果実の大きさ	該当なし
14 果実の色彩	該当なし
15 種子の形状	該当なし
16 種子の大きさ	該当なし
17 種子の色彩	該当なし

Cuphea linarioides Cham. & Schltdl.
アサノマK

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 根の形状 19 根の大きさ 20 根の色彩 21 開花特性 22 品質特性	該当なし
	該当なし
	該当なし
	該当なし
	該当なし

1 品種登録の番号及び年月日 第31216号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. ソフィアフレッシュ (ソフィアフレッシュ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ソフィアフレッシュ」は、対照品種「ショパンの調べ」と比較して、花の幅がやや広であること、リップのくさびの色が47Aであること等で区別性が認められる。対照品種「恋の玉手箱」と比較して、花の幅がやや広であること、リップのくさびの色が47Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信

7 出願公表の年月日 令和6年2月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小
04 葉の先端と垂線に対する角度	03 小
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	05 中
07 ギ球茎の縦断面の形	04 卵形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	05 中
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	03 狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	01 平形
17 葉の欠刻の有無	01 無

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31216号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	05 中
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	05 中
32 花の幅	06 やや広
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	06 やや長

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31216号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	08 かなり広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	06 やや長
42 ラテラルセパルの幅	08 かなり広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
48 セパルの色数	03 3
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 145C
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 144B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	09 有
53 セパルの斑点の大きさ	04 やや小
54 セパルの斑点の色	RHSカラーチャート 182B
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 144B
59 ペタルの長さ	06 やや長
60 ペタルの幅	07 広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 III型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	06 やや強
66 ペタルの色数	03 3
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 145C
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 144C
70 ペタルの斑点の有無	09 有
71 ペタルの斑点の大きさ	01 極小、04 やや小
72 ペタルの斑点の色	RHSカラーチャート 182B
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 144C
77 リップの長さ	08 かなり長
78 リップの幅	08 かなり広
79 リップの正面の形	02 正三角形
80 リップの縦断面の形	05 V型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	05 中
84 リップの周縁の波打ちの強弱	05 中
85 リップの色数	03 3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 4D
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 8C
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	03 小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 47A
92 リップのくさびの有無	09 有
93 リップのくさびの色	RHSカラーチャート 47A
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 150D
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 150C
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 185C
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 4D

Cymbidium Sw.
ソフィアフレッシュ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	02 初冬咲

1 品種登録の番号及び年月日 第31217号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 聖なる夜 (セイヤル)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「聖なる夜」は、対照品種「ソフィアフレッシュ」と比較して、リップの斑点の色が172Aであること、ずい柱の先端の色がN170Bであること等で区別性が認められる。対照品種「風立ちぬ」と比較して、リップの斑点の色が172Aであること、ずい柱の先端の色がN170Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信

7 出願公表の年月日 令和6年5月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
「潮騒のメモリー」に「風立ちぬ」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	01 かなり上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	03 小
04 葉の先端と垂線に対する角度	02 かなり小
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	05 中
07 ギ球茎の縦断面の形	04 卵形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	04 やや狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	01 平形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.
聖なる夜

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31217号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	03 弱
19 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	06 やや多
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	06 やや太
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	05 中
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31217号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	08 かなり広
36 ドーサルセパルの正面の形	05 倒卵形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	08 かなり広
43 ラテラルセパルの正面の形	05 倒卵形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
48 セパルの色数	03 3
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 144D
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート N144C

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	09 有
53 セパルの斑点の大きさ	03 小
54 セパルの斑点の色	RHSカラーチャート 181A
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	01 無
58 セパルの条線の色	
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	07 広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 III型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	05 中
66 ペタルの色数	03 3
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 144D
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 144C
70 ペタルの斑点の有無	09 有
71 ペタルの斑点の大きさ	04 やや小
72 ペタルの斑点の色	RHSカラーチャート 181A
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	01 無
76 ペタルの条線の色	
77 リップの長さ	08 かなり長
78 リップの幅	07 広
79 リップの正面の形	02 正三角形
80 リップの縦断面の形	04 IV型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
85 リップの色数	03 3

Cymbidium Sw.
聖なる夜

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 9C
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 163B
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	01 極小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 172A
92 リップのくさびの有無	09 有
93 リップのくさびの色	RHSカラーチャート 172A
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 161C
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート N170B
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 183B
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 5D

Cymbidium Sw.
聖なる夜

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 2 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	03 冬咲

1 品種登録の番号及び年月日 第31218号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dactylis glomerata L. わせじまん (ワセジマン)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「わせじまん」は、対照品種「はるねみどり」と比較して、葉の緑色の濃淡がやや淡であること、出穂期の茎数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「ワセミドリ」と比較して、春の草勢がかなり強であること、葉の緑色の濃淡がやや淡であること、出穂期の茎数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤森雅博 秋山征夫 久保田明人 上山泰史 山田敏彦 田瀬和浩 眞田康治 田村健一 高山光男 谷津英樹 横山寛

7 出願公表の年月日 令和3年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の基礎集団を母材として、5回循環選抜を行って育成したものである。

Dactylis glomerata L.
わせじまん

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31218号
01 倍数性	04 四倍体	
02 春の草勢	08 かなり強	
03 秋の草勢	06 やや強	
04 出穂期の草姿	03 半直立	
05 最長稈の長さ	07 長	
06 上部の節間長	05 中	
07 葉の緑色の濃淡	04 やや淡	
08 春化前の分けつ期の葉の密度	05 中	
09 止め葉の長さ	05 中	
10 止め葉の幅	07 広	
11 穂の長さ	07 長	
12 春化前の出穂性	01 無又は極弱	
13 春化後に出穂期	03 早	
14 出穂期の茎数	07 多	
15 越冬性	05 中	
16 すじ葉枯病抵抗性	05 中	
17 うどんこ病抵抗性		

Dactylis glomerata L.
わせじまん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 雪腐大粒菌核病抵抗性 19 雪腐黒色小粒菌核病抵抗性	
	07 強

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 2 1 9 号 令和 7 年 8 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dahlia Cav. PLANOV021
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「PLANOV021」は、対照品種「BKDAMGE」と比較して、葉の型が主に 1 回羽状複葉であること、舌状花の表面の主な色が 45A であること等で区別性が認められる。対照品種「DANITTEN」と比較して、舌状花の表面の主な色が 45A であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Maïke Boxriker
- 7 出願公表の年月日 令和 4 年 1 月 2 0 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dahlia Cav.
PLANOV021

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	03 低
03 茎の色	01 緑
04 葉の型	03 主に1回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	01 無又は弱
06 葉の長さ	04 やや短
07 葉の幅	04 やや狭
08 葉の長さ／幅	05 中
09 葉の色	02 緑
10 葉の光沢の強弱	05 中
11 葉の表面のしわの強弱	01 平滑又は極弱
12 葉の葉脈の凹凸	01 凹
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	04 やや短
15 小葉の幅	03 狭
16 小葉の基部の形	01 鋭形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	02 かなり少

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	06 やや深
19 花柄の長さ	05 中
20 花柄の色	01 緑
21 葉群に対する頭花の位置	03 葉群のやや上
22 頭花の向き	03 半直立
23 頭花の型	03 露心する八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	02 かなり小
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	04 やや低
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	04 やや少
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	
31 舌状花の長さ	02 かなり短
32 舌状花の幅	04 やや狭
33 舌状花の長さ／幅	02 かなり低
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03 3 以上
36 舌状花の中間部の横断面の形	04 中程度の内曲
37 舌状花の中間部の横断面の形2	
38 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	
39 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。） 2	
40 舌状花の周縁部の巻き方	04 平（巻かない）
41 舌状花の周縁が巻く部分の位置	
42 舌状花の縦断面の形	01 内曲
43 舌状花の縦方向の湾曲する位置	02 先端部から1/2
44 舌状花の湾曲の強弱	03 弱
45 舌状花のねじれの強弱	01 無又は極弱
46 舌状花の先端の形	02 丸状
47 舌状花の表面の色数	02 2
48 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 45A
49 舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 1A
50 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	02 先端部1/4
51 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。） 2	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	01 一様又はほぼ一様
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。） 2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の変化	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31220号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dahlia Cav. エターニティピーチ (エターニティピーチ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「エターニティピーチ」は、対照品種「エターニティロマンス」と比較して、舌状花の表面の色数が3以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
小野崎隆 藤本卓生 東未来

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dahlia Cav.
エターニティピーチ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	07 高
03 茎の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
04 葉の型	02 単葉及び1回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	01 無又は弱
06 葉の長さ	04 やや短
07 葉の幅	06 やや広
08 葉の長さ／幅	02 かなり低
09 葉の色	02 緑
10 葉の光沢の強弱	04 やや弱
11 葉の表面のしわの強弱	01 平滑又は極弱
12 葉の葉脈の凹凸	02 平
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	07 長
15 小葉の幅	08 かなり広
16 小葉の基部の形	02 鈍形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	05 中

Dahlia Cav.
エターニティピーチ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	02 かなり浅
19 花柄の長さ	07 長
20 花柄の色	03 赤褐
21 葉群に対する頭花の位置	03 葉群のやや上
22 頭花の向き	01 直立
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	04 やや小
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	09 極高
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	07 密
31 舌状花の長さ	04 やや短
32 舌状花の幅	05 中
33 舌状花の長さ／幅	04 やや低
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	02 2
36 舌状花の中間部の横断面の形	06 平
37 舌状花の中間部の横断面の形2	
38 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	
39 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）2	
40 舌状花の周縁部の巻き方	04 平（巻かない）
41 舌状花の周縁が巻く部分の位置	
42 舌状花の縦断面の形	02 平
43 舌状花の縦方向の湾曲する位置	
44 舌状花の湾曲の強弱	
45 舌状花のねじれの強弱	01 無又は極弱
46 舌状花の先端の形	01 尖り状
47 舌状花の表面の色数	03 3以上
48 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N74C
49 舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N155B
50 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	
51 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）2	04 全体

Dahlia Cav.
エターニティピーチ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	03 不明瞭な条
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 13B
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	08 基部
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。） 2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	01 一様又はほぼ一様
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の変化	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31221号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dahlia Cav. エターニティシャイン (エターニティシャイン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「エターニティシャイン」は、対照品種「マーメイド」と比較して、頭花の向きが半直立であること、舌状花の表面の主な色がN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エターニティロマンス」と比較して、舌状花の先端の形が丸状であること、舌状花の表面の主な色がN74Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
小野崎隆 藤本卓生 東未来

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
「NAMAHAGEキュート」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Dahlia Cav.
エターニティシャイン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	07 高
03 茎の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
04 葉の型	03 主に1回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	01 無又は弱
06 葉の長さ	04 やや短
07 葉の幅	07 広
08 葉の長さ／幅	01 極低
09 葉の色	02 緑
10 葉の光沢の強弱	04 やや弱
11 葉の表面のしわの強弱	01 平滑又は極弱
12 葉の葉脈の凹凸	02 平
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	09 極長
15 小葉の幅	09 極広
16 小葉の基部の形	02 鈍形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	03 少

Dahlia Cav.
エターニティシャイン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	03 浅
19 花柄の長さ	07 長
20 花柄の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
21 葉群に対する頭花の位置	03 葉群のやや上
22 頭花の向き	03 半直立
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	05 中
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	07 高
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	07 密
31 舌状花の長さ	04 やや短
32 舌状花の幅	06 やや広
33 舌状花の長さ／幅	02 かなり低
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03 3 以上
36 舌状花の中間部の横断面の形	05 弱く内曲
37 舌状花の中間部の横断面の形2	
38 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	
39 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）2	
40 舌状花の周縁部の巻き方	04 平（巻かない）
41 舌状花の周縁が巻く部分の位置	
42 舌状花の縦断面の形	02 平
43 舌状花の縦方向の湾曲する位置	
44 舌状花の湾曲の強弱	
45 舌状花のねじれの強弱	01 無又は極弱
46 舌状花の先端の形	02 丸状
47 舌状花の表面の色数	01 1
48 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N74B
49 舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
50 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	
51 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）2	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。） 2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の変化	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31222号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. MYDAH030

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MYDAH030」は、対照品種「ムーンストーン」と比較して、舌状花の先端の形が丸状であること、舌状花の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。対照品種「ローズクォーツ」と比較して、花柄の色が緑であること、葉群に対する頭花の位置が葉群と同等であること、舌状花の表面の主な色がN80Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀 坂口公敏 秋元徹

7 出願公表の年月日 令和5年6月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ムーンストーン」の自然交雑実生から選抜したものである。

Dahlia Cav.
MYDAH030

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	05 中
03 茎の色	01 緑
04 葉の型	03 主に1回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	02 中
06 葉の長さ	06 やや長
07 葉の幅	06 やや広
08 葉の長さ／幅	04 やや低
09 葉の色	03 濃緑
10 葉の光沢の強弱	03 弱
11 葉の表面のしわの強弱	02 弱
12 葉の葉脈の凹凸	02 平
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	08 かなり長
15 小葉の幅	05 中
16 小葉の基部の形	02 鈍形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	05 中

Dahlia Cav.
MYDAH030

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	04 やや浅
19 花柄の長さ	09 極長
20 花柄の色	01 緑
21 葉群に対する頭花の位置	02 葉群と同等
22 頭花の向き	01 直立
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	05 中
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	03 低
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	06 やや密
31 舌状花の長さ	03 短
32 舌状花の幅	05 中
33 舌状花の長さ／幅	03 低
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

Dahlia Cav.
MYDAH030

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03 3 以上
36 舌状花の中間部の横断面の形	05 弱く内曲
37 舌状花の中間部の横断面の形2	
38 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	
39 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）2	
40 舌状花の周縁部の巻き方	04 平（巻かない）
41 舌状花の周縁が巻く部分の位置	
42 舌状花の縦断面の形	03 外反
43 舌状花の縦方向の湾曲する位置	02 先端部から1/2
44 舌状花の湾曲の強弱	02 かなり弱
45 舌状花のねじれの強弱	01 無又は極弱
46 舌状花の先端の形	02 丸状
47 舌状花の表面の色数	01 1
48 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート N80C
49 舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
50 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	
51 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）2	

Dahlia Cav.
MYDAH030

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。） 2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の变化	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31223号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dahlia Cav. 千葉大PMRホワイト (チハダ PMRホワイト)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「千葉大PMRホワイト」は、対照品種「MYDAH006」と比較して、葉の型が主に2回羽状複葉であること、舌状花の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「彩雪」と比較して、葉の型が主に2回羽状複葉であること、舌状花の幅がやや狭であること、舌状花の先端の形が浅い切れ込み状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号

6 登録品種の育成をした者の氏名
三吉一光 出口亜由美

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dahlia Cav.
千葉大PMRホワイト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	06 やや高
03 茎の色	01 緑
04 葉の型	05 主に2回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	01 無又は弱
06 葉の長さ	07 長
07 葉の幅	07 広
08 葉の長さ／幅	04 やや低
09 葉の色	02 緑
10 葉の光沢の強弱	03 弱
11 葉の表面のしわの強弱	02 弱
12 葉の葉脈の凹凸	02 平
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	05 中
15 小葉の幅	03 狭
16 小葉の基部の形	02 鈍形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	04 やや少

Dahlia Cav.
千葉大PMRホワイト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	03 浅
19 花柄の長さ	07 長
20 花柄の色	01 緑
21 葉群に対する頭花の位置	02 葉群と同等
22 頭花の向き	03 半直立
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	06 やや大
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	03 低
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	06 やや密
31 舌状花の長さ	04 やや短
32 舌状花の幅	04 やや狭
33 舌状花の長さ／幅	05 中
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

Dahlia Cav.
千葉大PMRホワイト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03 3 以上
36 舌状花の中間部の横断面の形	07 弱く外曲
37 舌状花の中間部の横断面の形2	
38 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	
39 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。） 2	
40 舌状花の周縁部の巻き方	04 平（巻かない）
41 舌状花の周縁が巻く部分の位置	
42 舌状花の縦断面の形	02 平
43 舌状花の縦方向の湾曲する位置	
44 舌状花の湾曲の強弱	
45 舌状花のねじれの強弱	02 弱又は中
46 舌状花の先端の形	06 浅い切れ込み状
47 舌状花の表面の色数	01 1
48 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155B
49 舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
50 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	
51 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。） 2	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。） 2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の変化	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31224号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dahlia Cav. 千葉大PMRマゼンタ (チハダ IPMRマゼンタ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「千葉大PMRマゼンタ」は、対照品種「エターニティトーチ」と比較して、葉の型が主に2回羽状複葉であること、舌状花の表面の色数が3以上であること等で区別性が認められる。対照品種「NAMAHAJE マジック」と比較して、葉の型が主に2回羽状複葉であること、舌状花の先端の形が浅い切れ込み状であること、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号

6 登録品種の育成をした者の氏名
三吉一光 出口亜由美

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dahlia Cav.
千葉大PMRマゼンタ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	06 やや高
03 茎の色	01 緑
04 葉の型	05 主に2回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	01 無又は弱
06 葉の長さ	08 かなり長
07 葉の幅	09 極広
08 葉の長さ／幅	02 かなり低
09 葉の色	03 濃緑
10 葉の光沢の強弱	03 弱
11 葉の表面のしわの強弱	01 平滑又は極弱
12 葉の葉脈の凹凸	02 平
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	05 中
15 小葉の幅	05 中
16 小葉の基部の形	02 鈍形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	04 やや少

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	06 やや深
19 花柄の長さ	08 かなり長
20 花柄の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
21 葉群に対する頭花の位置	03 葉群のやや上
22 頭花の向き	01 直立
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	06 やや大
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	03 低
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	05 中
31 舌状花の長さ	05 中
32 舌状花の幅	06 やや広
33 舌状花の長さ／幅	04 やや低
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03 3 以上
36 舌状花の中間部の横断面の形	05 弱く内曲
37 舌状花の中間部の横断面の形2	
38 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	06 平
39 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）2	
40 舌状花の周縁部の巻き方	04 平（巻かない）
41 舌状花の周縁が巻く部分の位置	
42 舌状花の縦断面の形	02 平
43 舌状花の縦方向の湾曲する位置	
44 舌状花の湾曲の強弱	
45 舌状花のねじれの強弱	01 無又は極弱
46 舌状花の先端の形	06 浅い切れ込み状
47 舌状花の表面の色数	03 3 以上
48 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 72A
49 舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 45B
50 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	07 基部1/4
51 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）2	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	01 一様又はほぼ一様
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 4A
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	08 基部
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。） 2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	01 一様又はほぼ一様
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。） 2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の変化	01 無又は弱

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31225号 令和7年8月28日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. テルノジャック (テルノジャック)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「テルノジャック」は、対照品種「パーフェクトグリーン」と比較して、葉身の幅が広であること、葉身の模様の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
伊藤輝則
愛知県弥富市富島1丁目92番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
伊藤輝則
- 7 出願公表の年月日 令和5年6月8日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「テルノシャングリラ」の変異株である。

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
テルノジャック

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	07 長
02 茎の太さ	06 やや太
03 茎の色数	01 1
04 茎の主な色	RHSカラーチャート 137A
05 茎の二次色	
06 茎の毛の有無	01 無
07 節間長	07 長
08 葉身の長さ	06 やや長
09 葉身の幅	07 広
10 葉身の厚さ	05 中
11 葉身の形	01 広卵形
12 葉身の先端部の形	02 鋭尖形
13 葉身の基部の形	03 心形
14 葉身の切れ込みの有無	01 無
15 葉身のしわの有無	01 無
16 葉身の裏面の突起の有無	01 無
17 葉身の模様の有無	09 有

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.

テルノジャック

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の模様	01 掃け込み
19 葉身の掃け込みの大きさ	01 小
20 葉身の色数	02 2
21 葉身の主な色	RHSカラーチャート 137A
22 葉身の二次色	RHSカラーチャート N144B
23 葉身の三次色	
24 葉身の四次色	
25 葉柄の長さ	07 長
26 葉柄の主な色	RHSカラーチャート 144A
27 株の基部の葉における葉身の主な色	RHSカラーチャート 137A
28 株の基部の葉における葉身の二次色（二次色のある品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第31226号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gomphrena L. SAKGOM007

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKGOM007」は、対照品種「SAKGOM006」と比較して、茎の太さがかなり細であること、葉身の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「ラスベガス パープル」と比較して、草丈がやや低であること、葉の表面の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
大橋恵一郎

7 出願公表の年月日 令和5年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31226号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 株幅	04 やや狭
04 茎の長さ	03 短
05 茎の太さ	02 かなり細
06 茎の色	05 濃紅
07 茎の毛の多少	07 多
08 一次分枝数	04 やや少
09 節間長	03 短
10 葉全体の形	01 広線形
11 葉の先端部の形	02 鈍形
12 葉身の長さ	03 短
13 葉身の幅	04 やや狭
14 葉の表面の色	05 緑
15 葉の表面のアントシアニンの着色の程度	02 かなり弱
16 葉の表面の光沢の有無	09 有
17 葉の表面の毛の多少	05 中

Gomphrena L.
SAKGOM007

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の有無と長さ	01 無又は極短
19 苞葉の形	04 卵形
20 苞葉の長さ	04 やや短
21 苞葉の幅	05 中
22 頭花の形	03 球体
23 頭花の長さ	03 短
24 頭花の幅	03 狭
25 茎頂に着生する頭花数	02 2個
26 頭花の色	RHSカラーチャート N78A
27 花首の長さ	04 やや短
28 花首の太さ	03 細
29 花首の強さの程度	05 中
30 開花の早晩性	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31227号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gomphrena L. SAKGOM008

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKGOM008」は、対照品種「SAKGOM002」と比較して、草丈がやや低であること、葉身の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「ラスベガスホワイト」と比較して、株幅がやや狭であること、茎の太さが極細であること等で区別性が認められる。対照品種「バディーホワイト」と比較して、茎の太さが極細であること、葉身の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
大橋恵一郎

7 出願公表の年月日 令和5年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 株幅	04 やや狭
04 茎の長さ	03 短
05 茎の太さ	01 極細
06 茎の色	05 濃紅
07 茎の毛の多少	07 多
08 一次分枝数	03 少
09 節間長	03 短
10 葉全体の形	03 倒披針形
11 葉の先端部の形	02 鈍形
12 葉身の長さ	03 短
13 葉身の幅	04 やや狭
14 葉の表面の色	05 緑
15 葉の表面のアントシアニンの着色の程度	02 かなり弱
16 葉の表面の光沢の有無	09 有
17 葉の表面の毛の多少	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31227号	
重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の有無と長さ	02 かなり短
19 苞葉の形	04 卵形
20 苞葉の長さ	04 やや短
21 苞葉の幅	05 中
22 頭花の形	03 球体
23 頭花の長さ	03 短
24 頭花の幅	03 狭
25 茎頂に着生する頭花数	02 2個
26 頭花の色	RHSカラーチャート 155C
27 花首の長さ	04 やや短
28 花首の太さ	04 やや細
29 花首の強さの程度	05 中
30 開花の早晩性	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第31228号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gomphrena L. SAKGOM009

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKGOM009」は、対照品種「バディーピンク」と比較して、苞葉の形が披針形であること、頭花の色が54Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクベリル」と比較して、草丈が中であること、葉身の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
大橋恵一郎

7 出願公表の年月日 令和5年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31228号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 中間
02 草丈	05 中
03 株幅	05 中
04 茎の長さ	04 やや短
05 茎の太さ	01 極細
06 茎の色	05 濃紅
07 茎の毛の多少	07 多
08 一次分枝数	03 少
09 節間長	03 短
10 葉全体の形	01 広線形
11 葉の先端部の形	02 鈍形
12 葉身の長さ	04 やや短
13 葉身の幅	04 やや狭
14 葉の表面の色	04 やや淡緑
15 葉の表面のアントシアニンの着色の程度	03 弱
16 葉の表面の光沢の有無	09 有
17 葉の表面の毛の多少	05 中

Gomphrena L.
SAKGOM009

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の有無と長さ	04 やや短
19 苞葉の形	01 披針形
20 苞葉の長さ	06 やや長
21 苞葉の幅	05 中
22 頭花の形	03 球体
23 頭花の長さ	03 短
24 頭花の幅	03 狭
25 茎頂に着生する頭花数	02 2個
26 頭花の色	RHSカラーチャート 54C
27 花首の長さ	05 中
28 花首の太さ	04 やや細
29 花首の強さの程度	05 中
30 開花の早晩性	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31229号 令和7年8月28日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hebe Comm. ex Juss. MARKSTRIPE
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「MARKSTRIPE」は、対照品種「ヘーベ バリエガータ」と比較して、枝の節間のアントシアニンの着色がやや強であること、花冠裂片の表面の色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Heartbreaker」と比較して、新しょうの枝の色が緑褐であること、葉身の三次色の分布が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社フジ フローラ
東京都港区南青山2丁目22番14-802号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Heather Godsmark
- 7 出願公表の年月日 令和4年6月7日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「White Heather」の変異株である。

Hebe Comm. ex Juss.
MARKSTRIPE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張
02 樹高	04 やや低
03 葉の粗密	07 密
04 幼しょうのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
05 幼しょうの毛の有無	09 有
06 幼しょうの毛の粗密	02 粗
07 新しょうの枝の色	04 緑褐
08 枝の節間長	02 かなり短
09 枝の節間のアントシアニンの着色	06 やや強
10 葉芽の隙間の有無	01 無
11 葉柄の有無	01 無
12 葉柄の長さ	
13 葉の着生角度	04 水平
14 葉身の長さ	04 やや短
15 葉身の幅	03 狭
16 葉身の長さ／幅	07 大
17 葉身の形	03 長楕円形

Hebe Comm. ex Juss.
MARKSTRIPE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の最大幅の位置	02 中央部
19 葉身の先端の形	02 鋭形
20 葉身の横断面の形	02 平
21 葉身の周縁の鋸歯の有無	01 無
22 葉身の主な色	RHSカラーチャート NN137A
23 葉身の二次色の分布	03 周縁部
24 葉身の二次色	RHSカラーチャート 10C
25 葉身の二次色の面積	03 小
26 葉身の三次色の分布	01 無
27 葉身の三次色	
28 葉身の光沢	02 弱
29 葉身のろう質	01 無又は極弱
30 花序の着生位置	03 腋生
31 花序の形	01 三角形
32 花序の長さ	03 短
33 花序の幅	03 狭
34 花序の花の粗密	05 中

MARKSTRIPE

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第3 1 2 2 9号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31230号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Helianthus L. SAKSUN008

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKSUN008」は、対照品種「サンリッチ オレンジ50」と比較して、葉の鋸歯の粗密が中であること、葉の葉耳の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「サマーサンリッチ オレンジ45」と比較して、葉の鋸歯の粗密が中であること、葉の先端の形が狭三角形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
中川雅博

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	07 強
03 葉の大きさ	04 やや小
04 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
05 葉の表面の凹凸の強弱	05 中
06 葉の鋸歯の粗密	05 中
07 葉の横断面の形	02 やや内曲
08 葉の先端の形	03 狭三角形
09 葉の葉耳の大きさ	07 大
10 葉の翼の発達の強弱	01 無又は極弱
11 葉の最下位側脈の角度	02 直角又はほぼ直角
12 葉柄の基部に対する葉身先端の位置	07 高
13 茎の先端の毛の粗密	03 粗
14 開花期	01 極早
15 花型	01 一重
16 舌状花の粗密	06 やや密
17 舌状花の形	03 広卵形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の形状	01 平
19 舌状花の長さ	04 やや短
20 舌状花の主な色	04 橙黄
21 筒状花の色	01 黄
22 筒状花の柱頭のアントシアニン着色の有無	09 有
23 筒状花の柱頭のアントシアニン着色の強弱	07 強
24 筒状花の花粉の有無	01 無
25 ほう葉の形	03 円形
26 ほう葉の先端の長さ	04 やや短
27 ほう葉の外面の緑色の濃淡	05 中
28 ほう葉の頭花に対する抱えの強さ	03 強く抱える
29 草丈	02 かなり低
30 分枝の有無	09 有
31 株の分枝の型（栽培条件による分枝を除く）	02 主として基部
32 主茎頂花に対する最上側枝の頂花の位置	01 低
33 頭花の向き	02 斜上
34 頭花の直径	03 小

SAKSUN008

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 2 3 0 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31231号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum vulgare L. きぬもち二条 (キヌモチジョウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「きぬもち二条」は、対照品種「くすもち二条」と比較して、穂発芽性がやや難であること、穀粒のプロアントシアニジンの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「はるか二条」と比較して、うるち・もちの別がもちであること、穀粒硬度がやや硬であること、穀粒のプロアントシアニジンの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「しらゆり二条」と比較して、うるち・もちの別がもちであること、 β グルカン含量がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

平将人 中村和弘 渡邊美貴子 中田克 松中仁 境哲文 杉田知彦 塔野岡卓司
西尾善太 河田尚之 荒木均 藤田雅也 八田浩一 久保堅司

7 出願公表の年月日 令和3年2月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「キラリモチ」に「はるか二条」を交配した後代に「はるか二条」を2回戻し交配してから、選抜した品種である。

Hordeum vulgare L.

きぬもち二条

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 稈の長さ	03 短
03 葉しょうの毛の有無	01 無
04 止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱	03 弱
05 植物体の反曲した止め葉の多少	01 無又は極少
06 止め葉の葉しょう表面のろう質の多少	05 中
07 出穂期	03 早
08 芒の先端のアントシアニン着色の強弱	03 弱
09 開閉花受粉性	02 閉花受粉性
10 穂のろう質の多少	03 少
11 穂の向き	01 立
12 草丈	04 やや短
13 穂の条数	01 2
14 穂の形	03 先細
15 穂の粒着の粗密	06 やや密
16 穂の長さ	06 やや長
17 芒の長さ	07 長

Hordeum vulgare L.

きぬもち二条

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 穂軸の長さ	
19 穂軸の曲がりの強弱	01 無又は極弱
20 穂の不稔小穂の発育	02 完全発育
21 不稔小穂の向き	02 平行からやや先広
22 穀粒に比べた中央小穂の芒を含む護穎の長さ	02 等
23 穀粒の小穂軸の毛の型	02 長
24 穀粒のふの有無	09 有
25 穀粒の外穎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
26 穀粒の外穎背面内側面の脈沿いの突起の多少	01 無又は極少
27 穀粒の縦溝の毛の有無	01 無
28 穀粒のりん皮の着き方	02 抱え
29 穀粒の糊粉層の色	01 白色
30 うるち・もちの別	02 もち
31 穂発芽性	06 やや難
32 千粒重(原麦粒)	06 やや大
33 まき性	03 春まき性
34 穀粒硬度	06 やや硬

Hordeum vulgare L.

きぬもち二条

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 麦芽エキスの多少（ビール用品種に限る。）	
36 コールバツハ数（ビール用品種に限る。）	
37 ジアスターゼ力（ビール用品種に限る。）	
38 穀粒のプロアントシアニジンの有無	01 無
39 穀粒のリポキシゲナーゼ（lox）活性の有無	
40 β グルカン含量	06 やや多
41 D-ホルデインのHor-3座の遺伝子の発現	
42 C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現1	
43 C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現2	
44 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現1	
45 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現2	
46 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現3	

1 品種登録の番号及び年月日 第31232号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. オルパダンヘッドグラス (オルパダンヘッドグラス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「オルパダンヘッドグラス」は、対照品種「シスコ」と比較して、球の縦断面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「サリナス88」と比較して、球の縦断面の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎 金子陽弘 大和佑未

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「バンパーヘッドグラス」に「ゼニトルダー」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
オルパダンヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	04 やや小
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
オルパダンヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	02 かなり弱
24 葉の凹凸の大きさ	07 大
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	05 中
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	04 やや小
32 球の縦断面の形	03 円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
オルパダンヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	06 やや晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
オルパダンヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31233号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TLE585

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「TLE585」は、対照品種「レガシー」と比較して、葉の形が扁円形であること等で区別性が認められる。対照品種「クラウドブレイク」と比較して、葉の形が扁円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡田有平 新井真琴 喜多村直人 石田了

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TLE585

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	06 やや大
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
TLE585

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	06 やや長
21 葉の幅	07 広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	02 かなり弱
24 葉の凹凸の大きさ	07 大
25 葉の周縁部の波打ち	04 やや弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	04 やや浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	04 やや緩い
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
TLE585

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	06 やや晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
TLE585

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31234号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. JUDALINAS

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「JUDALINAS」は、対照品種「LL-1014」と比較して、葉の周縁部の切れ込みの粗密が粗であること等で区別性が認められる。対照品種「オータム ヘッドグラス」と比較して、球のしまりが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Burgemeester Crezeelaan 40, 2678KX De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johan Schut

7 出願公表の年月日 令和4年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
JUDALINAS

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
JUDALINAS

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	07 広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	06 やや強
24 葉の凹凸の大きさ	03 小
25 葉の周縁部の波打ち	04 やや弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	05 中
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	05 中
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
JUDALINAS

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	06 やや晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
JUDALINAS

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31235号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ウインダヘッドグラス (ウインダヘッドグラス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ウインダヘッドグラス」は、対照品種「オルパダンヘッドグラス」と比較して、子葉の大きさがやや大であること、球の縦断面の形が扁円形であること等で区別性が認められる。対照品種「TLE495」と比較して、葉の周縁部の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎 金子陽弘 大和佑未

7 出願公表の年月日 令和4年3月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「バンパーヘッドグラス」に「ゼニトルダー」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ウインダヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	01 広倒角卵形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
ウインダヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	06 やや長
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	02 かなり弱
24 葉の凹凸の大きさ	07 大
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	05 中
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
ウインダヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	06 やや晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
ウインダヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31236号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ティロール (ティール)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ティロール」は、対照品種「アーリーインパルス」と比較して、株の幅が小であること、葉の凹凸の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「ノーチップ」と比較して、葉の凹凸がやや弱であること、葉の周縁部の波打ちがやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nelly Guerineau

7 出願公表の年月日 令和4年5月6日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ティロール

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	01 広楕円形
04 株の幅	03 小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	04 やや少
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	03 平
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.

ティロール

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 2 3 6 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	04 やや短
21 葉の幅	05 中
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	04 やや弱
24 葉の凹凸の大きさ	04 やや小
25 葉の周縁部の波打ち	06 やや強
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	02 かなり浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	05 中
30 葉脈の型	02 やや扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	02 細

Lactuca sativa L.
ティロール

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	04 やや早
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.

ティローレ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 2 3 6 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31237号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. KAY-016

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KAY-016」は、対照品種「グランディヘッドグラス」と比較して、葉の形が扁円形であること、葉の凹凸がやや弱であること、球のしまりがやや固いであること等で区別性が認められる。対照品種「ツララ」と比較して、葉の形が扁円形であること、葉の凹凸がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小川 斎

7 出願公表の年月日 令和4年6月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
KAY-016

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
KAY-016

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	07 広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	04 やや弱
24 葉の凹凸の大きさ	04 やや小
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	04 やや粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	04 太

Lactuca sativa L.
KAY-016

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	05 中
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 ベと病レースB1:16EU抵抗性	
45 ベと病レースB1:17EU抵抗性	
46 ベと病レースB1:20EU抵抗性	
47 ベと病レースB1:21EU抵抗性	
48 ベと病レースB1:22EU抵抗性	
49 ベと病レースB1:23EU抵抗性	
50 ベと病レースB1:24EU抵抗性	
51 ベと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
KAY-016

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31238号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. UC-201

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「UC-201」は、対照品種「TLE579」と比較して、葉の周縁部の切れ込みの粗密がやや密であること、帯化の発生が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「KA-1230B」と比較して、葉の形が広倒角卵形であること、帯化の発生が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

横浜植木株式会社
神奈川県横浜市南区唐沢15番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石井謙一 片岡善仁

7 出願公表の年月日 令和4年6月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「キュアルージュ(UC-052)」に「ディープパープル」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
UC-201

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	01 広楕円形
04 株の幅	04 やや小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	06 やや多
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	01 広倒角卵形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	07 強
15 葉のアントシアニンの色相	03 茶
16 葉のアントシアニン着色の面積	03 小
17 葉の色	02 黄緑

Lactuca sativa L.
UC-201

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	06 やや強
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	05 中
22 葉の厚さ	02 薄
23 葉の凹凸	07 強
24 葉の凹凸の大きさ	03 小
25 葉の周縁部の波打ち	07 強
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	02 かなり浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	06 やや密
30 葉脈の型	02 やや扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	02 細

Lactuca sativa L.
UC-201

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	04 やや早
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	03 弱
44 ベと病レースB1:16EU抵抗性	
45 ベと病レースB1:17EU抵抗性	
46 ベと病レースB1:20EU抵抗性	
47 ベと病レースB1:21EU抵抗性	
48 ベと病レースB1:22EU抵抗性	
49 ベと病レースB1:23EU抵抗性	
50 ベと病レースB1:24EU抵抗性	
51 ベと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
UC-201

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31239号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ウィキィリーフW (ウィキィーフW)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ウィキィリーフW」は、対照品種「ハンサムグリーン」と比較して、葉の周縁部の切れ込みの粗密が密であること、抽だい始期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ノルディス」と比較して、腋芽の発生が強であること、帯化の発生が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社吉野家ホールディングス
東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村哲 丸尾達

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ウィキリーフW

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	03 小
03 子葉の形	03 狭楕円形
04 株の幅	03 小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	04 やや少
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	03 少
09 葉の形	
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	
12 葉の縦断面	
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
ウィキリーフW

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	07 濃
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	03 短
21 葉の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	05 極厚
23 葉の凹凸	01 無又は極弱
24 葉の凹凸の大きさ	01 極小
25 葉の周縁部の波打ち	07 強
26 葉の周縁部の切れ込みの型	05 三重歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	07 深
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	05 中
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	07 密
30 葉脈の型	02 やや扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	02 細

Lactuca sativa L.
ウィキィリーフW

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	05 中
42 腋芽の発生	03 強
43 帯化の発生	05 中
44 ベと病レースB1:16EU抵抗性	
45 ベと病レースB1:17EU抵抗性	
46 ベと病レースB1:20EU抵抗性	
47 ベと病レースB1:21EU抵抗性	
48 ベと病レースB1:22EU抵抗性	
49 ベと病レースB1:23EU抵抗性	
50 ベと病レースB1:24EU抵抗性	
51 ベと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
ウィキリーフW

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31240号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ユニレッドW (ユニレットW)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ユニレッドW」は、対照品種「MULTIRED 3」と比較して、葉のアントシアニン着色の面積がやや小であること、葉の周縁部の切れ込みの粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「MULTIRED 80」と比較して、葉のアントシアニン着色の面積がやや小であること、葉の周縁部の切れ込みの粗密が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社吉野家ホールディングス
東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村哲 丸尾達

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ユニレッドW

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	01 広楕円形
04 株の幅	02 かなり小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	04 やや少
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	04 やや少
09 葉の形	
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	
12 葉の縦断面	
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	09 極強
15 葉のアントシアニンの色相	03 茶
16 葉のアントシアニン着色の面積	04 やや小
17 葉の色	02 黄緑

Lactuca sativa L.
ユニレッドW

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	06 やや強
20 葉の長さ	03 短
21 葉の幅	05 中
22 葉の厚さ	02 薄
23 葉の凹凸	01 無又は極弱
24 葉の凹凸の大きさ	01 極小
25 葉の周縁部の波打ち	06 やや強
26 葉の周縁部の切れ込みの型	05 三重歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	07 深
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	03 浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	05 中
30 葉脈の型	02 やや扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	01 極細

Lactuca sativa L.
ユニレッドW

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	05 中
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	(株腐敗により未評価)
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
ユニレッドW

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31241号 令和7年8月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium multiflorum Lam. ssp. *italicum* (A. Br.) Volkart Kyushu 1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Kyushu 1」は、対照品種「さちあおば」と比較して、出穂期の株幅が中であること、止め葉の幅がやや広であること等で区別性が認められる。対照品種「ヤヨイワセ」と比較して、穂の小穂の数が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「ハナミワセ」と比較して、止め葉の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒川明 桂真昭 我有満 高井智之 山下浩 上床修弘 波多野哲也 松岡誠 木村貴志

7 出願公表の年月日 平成29年8月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「山育185号」及び「山系32号」との交配後代から、集団選抜及び母系選抜により育成されたものである。

Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart
Kyushu 1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 倍数性	02 二倍体
02 種子の千粒重	05 中
03 春化前の草姿	05 中間
04 葉の長さ	03 短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 春化後の株幅	04 やや狭
08 春化後の草姿	04 半直立～中間
09 春化後の草高	05 中
10 春化前の出穂性	
11 春化後の出穂期	01 極早
12 出穂期の草高	04 やや低
13 出穂期の株幅	05 中
14 止め葉の長さ	05 中
15 止め葉の幅	06 やや広
16 止め葉の長さ／幅	04 やや小
17 最長稈の長さ	03 短

Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart
Kyushu 1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 上部の節間長	04 やや短
19 穂の長さ	03 短
20 穂の小穂の数	01 極少
21 穂の粗密	04 やや粗
22 穂の基部の小穂の包穎の長さ	05 中
23 穂の基部の小穂の長さ	05 中
24 けい光反応性	
25 雄性不稔性	01 無
26 硝酸態窒素の濃度	
27 耐倒伏性	04 やや弱
28 冠さび病抵抗性	
29 いもち病抵抗性	