

1 品種登録の番号及び年月日 第31820号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chlorophytum saundersiae (Baker) Nordal STARLIGHT

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「STARLIGHT」は、対照品種「シャムオリヅルラン」と比較して、葉の長さがかなり長であること、葉の斑の主な色の分布が中肋部と周縁部の間であること、花茎の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Ian Desmond Lief
12 Duiker Drive Outer West 3626 Durban, South Africa

6 登録品種の育成をした者の氏名
Ian Desmond Lief

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のC. saundersiae (在来系統) の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 株の基部の形	01 扁平
03 葉の長さ	08 かなり長
04 葉の幅	02 かなり狭
05 葉の長さ／幅	07 大
06 葉の湾曲の位置	02 先端部
07 葉の湾曲の強弱	01 極弱
08 葉の横断面の形	02 やや凹
09 葉の色数	02 2
10 葉の地色	03 濃緑
11 葉の斑の主な色	03 黄緑
12 葉の斑の主な色の分布	02 中肋部と周縁部の間
13 葉の斑の二次色	
14 葉柄の有無	01 無
15 葉柄の色	
16 花茎の長さ	07 長
17 花茎の主な色	01 緑

Chlorophytum saundersiae (Baker) Nordal
STARLIGHT

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 8 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の屈曲の有無 19 花茎の翼の有無 20 花茎の子株形成の有無 21 花柄の色 22 花の直径 23 花の主な色 24 やくの色	01 無
	09 有
	01 無
	03 淡橙
	02 小
	01 白
	02 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第31821号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. SAKCAR115

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKCAR115」は、対照品種「SAKCAR102」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、花卉の主な色が45Bであること、柱頭の色が白に赤ぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修

7 出願公表の年月日 令和5年11月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR115

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	03 低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	04 やや狭
16 葉の巻き	03 反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR115

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	04 長
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	04 やや短
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR115

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	02 やや鋭尖
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 45B
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR115

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31822号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. ステラルビー (ステラビー)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ステラルビー」は、対照品種「グランルージュ」と比較して、花卉の切れ込みの深さが浅であること、子房の表面が平滑であること等で区別性が認められる。対照品種「ミアモーレ」と比較して、花卉の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
田邊航平 斎藤貴文 高橋睦宏 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和5年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「SAKCAR102」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
ステラルビー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	03 低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
ステラルビー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	03 鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	02 弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	01 裂片の周縁

Dianthus caryophyllus L.
ステラルビー

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31822号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	02 やや鋭尖
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	02 かなり低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	03 やや凸
43 花弁の主な形	01 タイプ1
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 46C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
ステラルビー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31823号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. ティーパーティー (ティーパーティー)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ティーパーティー」は、対照品種「ミルキーリップ」と比較して、植物体の粗密が密であること、花の位置が同じあるいはわずかに上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
田邊航平 斎藤貴文 高橋睦宏 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和5年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「スイートジュエル」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.

ティーパーティー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	03 低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	04 やや狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.

ティーパーティー

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 8 2 3 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.

ティーパーティー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	02 やや鋭尖
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート N57D
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 69C

Dianthus caryophyllus L.
ティーパーティー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	04 広
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	01 卵形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	05 桃
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31824号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. ムーンティアラ (ムンティアラ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ムーンティアラ」は、対照品種「ルミナリア」と比較して、花卉の主な形がタイプ1であること、子房の表面が平滑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
田邊航平 斎藤貴文 高橋睦宏 横藤陽

7 出願公表の年月日 令和5年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
ムーンティアラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	03 低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
ムーンティアラ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31824号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
ムーンティアラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	02 やや鋭尖
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	02 かなり低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	03 狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 154D
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート NN155C

Dianthus caryophyllus L.
ムーンティアラ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31824号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	02 狭
53 花弁の条の多少	02 少
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31825号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ひなあられ (ヒアラル)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ひなあられ」は、対照品種「スイートジュエル」と比較して、葉の巻きが強い反曲であること、花卉の主な色が61Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社

北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

田邊航平 横藤陽 斎藤貴文 高橋睦宏 山口博康 八木雅史

7 出願公表の年月日 令和6年1月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
ひなあられ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	03 低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	03 短
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	05 中
16 葉の巻き	04 強い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
ひなあられ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	03 鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
ひなあられ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31825号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	01 タイプ1
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 61D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
ひなあられ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31826号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 福島ST14号（フクシマST14コウリ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「福島ST14号」は、対照品種「かおり野」と比較して、葉の表面の色が濃緑であること、第1番果と第2番果の果形の差が大であること、果実の空洞が無又は小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福島県
福島県福島市杉妻町2番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名
秋葉未歩 宮下聡美

7 出願公表の年月日 令和4年6月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
「かおり野」に「とちおとめ」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
福島ST14号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	08 かなり大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	09 極大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

Fragaria L.
福島ST14号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	08 かなり長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	05 中
22 花の数	05 中
23 果柄の長さ	08 かなり長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	03 大
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	02 やや横長
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
福島ST14号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	06 やや大
36 果実の縦横比	05 かなり縦長
37 果実の形	04 卵円形
38 第1番果と第2番果の果形の差	07 大
39 果皮の色	05 橙赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	02 弱
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがくの大きさ	04 やや大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
福島ST14号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	02 かなり早
57 果実の成熟期	03 早
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	09 極高
60 酸度	05 中
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31827号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. MYFRA022

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYFRA022」は、対照品種「章姫」と比較して、葉柄の長さが中であること、果心の色が淡赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
谷村風泰 江澤祥太

7 出願公表の年月日 令和4年7月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
MYFRA022

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	05 中
03 草勢	05 中
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	06 やや大
10 葉の表面の色	03 緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	07 大
15 頂小葉の縦横比	03 縦長
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	05 中
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花の数	05 中
23 果柄の長さ	08 かなり長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	01 離れる
27 花冠に対するがく片の大きさ	03 大
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
MYFRA022

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	04 やや小
36 果実の縦横比	05 かなり縦長
37 果実の形	04 卵円形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	02 落ち込み中
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	03 下向き
50 果径に対するがくの大きさ	04 やや大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
MYFRA022

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ 53 果肉の色 54 果心の色 55 果実の空洞 56 開花始期 57 果実の成熟期 58 季性 59 可溶性固形物含量 60 酸度 61 休眠性 62 炭そ病抵抗性 63 萎黄病抵抗性	07 硬
	03 橙赤
	02 淡赤
	01 無又は小
	04 やや早
	06 やや晩
	01 一季成り
	07 高
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31828号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. MYFRA023

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYFRA023」は、対照品種「章姫」と比較して、果心の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「MYFRA022」と比較して、葉の表面の色が濃緑であること、たく葉のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
谷村風泰 江澤祥太

7 出願公表の年月日 令和4年7月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
MYFRA023

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	04 やや粗
03 草勢	04 やや弱
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	05 中
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	06 やや大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	02 鈍角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	04 やや短
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	03 弱
22 花の数	02 かなり少
23 果柄の長さ	06 やや長
24 小果柄の毛じの向き	01 上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	01 離れる
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
MYFRA023

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	03 小
36 果実の縦横比	05 かなり縦長
37 果実の形	04 卵円形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがくの大きさ	04 やや大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
MYFRA023

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	05 赤
54 果心の色	03 赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	03 早
57 果実の成熟期	06 やや晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	07 高
60 酸度	06 やや高
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31829号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. MYFRA024

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYFRA024」は、対照品種「三重母本1号」と比較して、葉の表面の色が濃緑であること、たく葉のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「紀の香」と比較して、葉の表面の色が濃緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
谷村風泰 江澤祥太

7 出願公表の年月日 令和4年7月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
MYFRA024

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	06 やや強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	03 強
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	03 円形
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
MYFRA024

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	06 やや長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花の数	04 やや少
23 果柄の長さ	07 長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	02 接する
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
MYFRA024

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	06 やや大
36 果実の縦横比	03 同等
37 果実の形	04 卵円形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがくの大きさ	03 同等
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
MYFRA024

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	07 硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	02 中
56 開花始期	03 早
57 果実の成熟期	06 やや晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	08 かなり高
60 酸度	04 やや低
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31830号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. MYFRA025

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYFRA025」は、対照品種「章姫」と比較して、花卉の重なりが重なるであること、果心の色が淡赤であること等で区別性が認められる。対照品種「福島ST14号」と比較して、第1番果と第2番果の果形の差が小であること、果実のがくの着生位置が隆起であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
谷村風泰 江澤祥太

7 出願公表の年月日 令和4年7月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
MYFRA025

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	07 密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	08 かなり大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	09 極大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
MYFRA025

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	07 長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花の数	04 やや少
23 果柄の長さ	08 かなり長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	03 大
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
MYFRA025

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	05 中
36 果実の縦横比	05 かなり縦長
37 果実の形	04 卵円形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	03 狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	02 落ち込み中
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	02 弱
48 果実のがくの着生位置	03 隆起
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがくの大きさ	05 大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
MYFRA025

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	05 中
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	02 かなり早
57 果実の成熟期	02 かなり早
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	07 高
60 酸度	03 低
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31831号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. KS-27

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KS-27」は、対照品種「紅ほっぺ」と比較して、果実の形が卵円形であること等で区別性が認められる。対照品種「カレンベリー」と比較して、葉の大きさがかなり大であること、果実のがく片の付き方が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「兵庫I-3号」と比較して、葉の大きさがかなり大であること、葉柄の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

篠原茂幸

千葉県安房郡鋸南町元名1109

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂幸

7 出願公表の年月日 令和4年8月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「紅ほっぺ」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
KS-27

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	05 中
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	09 極多
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	08 かなり大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	03 縦長
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	08 かなり長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花の数	03 少
23 果柄の長さ	08 かなり長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	01 離れる
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
KS-27

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	05 中
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	04 卵円形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	02 弱
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがくの大きさ	03 同等
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
KS-27

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	08 かなり硬
53 果肉の色	02 淡桃
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	04 やや早
57 果実の成熟期	06 やや晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	09 極高
60 酸度	05 中
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31832号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. ASK1-1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ASK1-1」は、対照品種「サマープリンセス」と比較して、ランナーの数が中であること、第1番果と第2番果の果形の差が大であること等で区別性が認められる。対照品種「ペチカ」と比較して、頂小葉の大きさが大であること、たく葉のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

堀井勇司

長野県安曇野市堀金烏川4847

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀井勇司

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「サマープリンセス」に「とよのか」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
ASK1-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	05 中
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	06 やや大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	07 大
15 頂小葉の縦横比	03 縦長
16 頂小葉の基部の形	02 鈍角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
ASK1-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	05 中
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花の数	05 中
23 果柄の長さ	05 中
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	05 中
26 花弁の重なり	01 離れる
27 花冠に対するがく片の大きさ	03 大
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
ASK1-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	05 中
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	07 大
39 果皮の色	05 橙赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	01 無又は極狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	02 落ち込み中
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがくの大きさ	04 やや大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
ASK1-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	02 淡桃
54 果心の色	01 白
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	02 かなり早
57 果実の成熟期	02 かなり早
58 季性	04 四季成り
59 可溶性固形物含量	08 かなり高
60 酸度	04 やや低
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31833号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 佳凜 (カリソ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「佳凜」は、対照品種「ティンカーベリー」と比較して、ランナーの数が少
であること、頂小葉の基部の形が鈍角であること等で区別性が認められる。対照品種
「BA1203H」と比較して、ランナーの数が少であること、たく葉のアントシアニン着色
の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
PineHillGroup株式会社
香川県さぬき市鴨部4789番地2
川人新一
香川県仲多度郡まんのう町帆山756-3

6 登録品種の育成をした者の氏名
松岡奨治 川人新一

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
佳凜

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 葉の粗密	05 中
03 草勢	05 中
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	03 少
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	06 やや大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	06 やや大
15 頂小葉の縦横比	03 縦長
16 頂小葉の基部の形	02 鈍角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
佳凜

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	04 やや短
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
22 花の数	06 やや多
23 果柄の長さ	05 中
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	01 離れる
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
佳凜

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	06 やや大
36 果実の縦横比	03 同等
37 果実の形	03 心臓形
38 第1番果と第2番果の果形の差	07 大
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	01 無又は極狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	01 陥入
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがくの大きさ	03 同等
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
佳凛

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	05 中
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	03 早
57 果実の成熟期	02 かなり早
58 季性	04 四季成り
59 可溶性固形物含量	06 やや高
60 酸度	03 低
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31834号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. そらみのり (ソミリ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「そらみのり」は、対照品種「フクユタカ」と比較して、裂きょうの難易が難であること、種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無が有であること、子実のへその色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「サチユタカA1号」と比較して、茎の長さがやや長であること、種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無が有であること、開花始期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

大木信彦 高橋将一 河野雄飛 高橋幹

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「九州148号」に「Santee」を交配して選抜した品種である。

Glycine max (L.) Merr.

そらみのり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	05 中
03 伸育型	01 有限
04 側枝の数	06 やや多
05 草姿	02 直立～斜上
06 茎の毛じの色	01 灰白
07 茎の長さ	06 やや長
08 茎の節数	05 中
09 葉の表面の凹凸の強弱	03 弱
10 小葉の数	01 3枚葉
11 側小葉の形	03 鋭先卵形
12 側小葉の大きさ	05 中
13 葉の緑色の濃淡	07 濃
14 花の色	02 紫
15 最下着きょう節位の高さ	05 中
16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）	
17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）	

Glycine max (L.) Merr.

そらみのり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）	
19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）	
20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）	
21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）	
22 さやの数	06 やや多
23 裂きょうの難易	07 難
24 熟さやの色の濃淡	03 淡
25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）	06 やや大
26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）	
27 子実の形	01 球
28 種皮の色数	01 1色
29 種皮の地色	01 黄白
30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	09 有
32 子実のへその色	02 黄
33 胎座残の色	01 種皮と同じ
34 子実の子葉の色	01 黄

Glycine max (L.) Merr.
 そらみのり

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31834号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 開花始期	06 やや晩
36 成熟期	06 やや晩
37 生態型	03 秋大豆型
38 粗タンパク含有率	06 やや高
39 7Sタンパク質サブユニットの有無	08 全有
40 リボキシゲナーゼアイソザイムの有無	08 全有
41 ヘソ周辺の着色抵抗性	
42 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A系統)	03 抵抗性
43 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A2系統)	01 感受性 (モザイク)
44 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (B系統)	03 抵抗性
45 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (C系統)	01 感受性 (モザイク)
46 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (D系統)	01 感受性 (モザイク)
47 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (E系統)	02 感受性 (ネクロシス)
48 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース1)	
49 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース3)	
50 ハスモンヨトウ抵抗性 (抗生性)	
51 ハスモンヨトウ抵抗性 (非選好性)	

Glycine max (L.) Merr.
そらみのり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 葉焼病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31835号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gypsophila L. MYGYP029

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYGYP029」は、対照品種「アルタイル」と比較して、葉の長さがやや長であること、花卉の数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中敦

7 出願公表の年月日 令和5年10月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統のミツバチ交配による実生より選抜したものである。

Gypsophila L.
MYGYP029

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の基部の分枝の有無	09 有
02 草姿	02 中間
03 草丈	05 中
04 茎の節数	05 中
05 節間長	06 やや長
06 茎の太さ	05 中
07 茎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
08 茎の色	02 淡緑
09 葉の形	01 狭楕円形
10 葉の長さ	06 やや長
11 葉の幅	06 やや広
12 葉の長さ／幅	02 細長
13 葉の縦方向の反りの強弱	02 外曲
14 葉の横断面の形	02 やや凹
15 葉の先端部の向き	01 内曲
16 葉の表面の色	02 緑
17 花序の毛の有無	01 無

Gypsophila L.
MYGYP029

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の着生位置	02 ほとんどが上部
19 花序の上部の形	02 ドーム形
20 花序の主茎に対する側枝の角度	05 中
21 花序の側枝の曲りの強弱	03 弱
22 一茎当たりの花の総数	04 やや少
23 花型	02 八重
24 花の直径	05 中
25 花弁の数	07 多
26 花の上部の形	02 凸形
27 やくの有無	09 有
28 小花柄の長さ	02 中
29 花弁の縦方向の湾曲	07 やや外曲
30 花弁の先端の形	01 切形
31 花弁の色数	01 1色
32 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155C
33 花弁の二次色	
34 がく裂片の数	02 6～9枚

Gypsophila L.
MYGYP029

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくのアントシアニン着色の強弱 36 がくの縦断面の形 37 がく裂片の大きさ 38 開花始期	02 中
	03 切形
	06 やや大
	06 やや晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 8 3 6 号 令和 8 年 8 月 2 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gypsophila L. KLEGP23023
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「KLEGP23023」は、対照品種「PEARLGINA」と比較して、花序の上部の形がドーム形であること、がくの縦断面の形が切形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Selecta Cut Flowers S.A.
Av Beniamino Farina, 135, 1, Mercat Flor I Planta, Vilassar de Mar, CP
08340, Spain
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Ulrich Lohmuller
- 7 出願公表の年月日 令和 6 年 6 月 1 7 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gypsophila L.
KLEGP23023

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の基部の分枝の有無	09 有
02 草姿	02 中間
03 草丈	06 やや高
04 茎の節数	07 多
05 節間長	05 中
06 茎の太さ	06 やや太
07 茎のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
08 茎の色	03 緑
09 葉の形	01 狭楕円形
10 葉の長さ	07 長
11 葉の幅	06 やや広
12 葉の長さ／幅	02 細長
13 葉の縦方向の反りの強弱	01 無又はわずかに外曲
14 葉の横断面の形	02 やや凹
15 葉の先端部の向き	02 直
16 葉の表面の色	02 緑
17 花序の毛の有無	09 有

Gypsophila L.
KLEGP23023

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の着生位置	02 ほとんどが上部
19 花序の上部の形	02 ドーム形
20 花序の主茎に対する側枝の角度	05 中
21 花序の側枝の曲りの強弱	05 中
22 一茎当たりの花の総数	05 中
23 花型	02 八重
24 花の直径	04 やや小
25 花弁の数	07 多
26 花の上部の形	02 凸形
27 やくの有無	09 有
28 小花柄の長さ	02 中
29 花弁の縦方向の湾曲	05 平
30 花弁の先端の形	01 切形
31 花弁の色数	01 1色
32 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155C
33 花弁の二次色	
34 がく裂片の数	01 5枚

Gypsophila L.
KLEGP23023

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくのアントシアニン着色の強弱 36 がくの縦断面の形 37 がく裂片の大きさ 38 開花始期	02 中
	03 切形
	04 やや小
	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31837号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gypsophila L. MYGYP039

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYGYP039」は、対照品種「DGY39992」と比較して、葉の横断面の形がやや凹であること等で区別性が認められる。対照品種「PEARLGINA」と比較して、葉の幅が極広であること、がくの縦断面の形が切形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
山本京太朗 田中敦

7 出願公表の年月日 令和6年5月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統のミツバチ交配による実生より選抜したものである。

Gypsophila L.
MYGYP039

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の基部の分枝の有無	09 有
02 草姿	02 中間
03 草丈	06 やや高
04 茎の節数	07 多
05 節間長	05 中
06 茎の太さ	05 中
07 茎のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
08 茎の色	02 淡緑
09 葉の形	02 楕円形
10 葉の長さ	06 やや長
11 葉の幅	09 極広
12 葉の長さ／幅	02 細長
13 葉の縦方向の反りの強弱	02 外曲
14 葉の横断面の形	02 やや凹
15 葉の先端部の向き	01 内曲
16 葉の表面の色	02 緑
17 花序の毛の有無	01 無

Gypsophila L.
MYGYP039

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の着生位置	02 ほとんどが上部
19 花序の上部の形	02 ドーム形
20 花序の主茎に対する側枝の角度	05 中
21 花序の側枝の曲りの強弱	03 弱
22 一茎当たりの花の総数	04 やや少
23 花型	02 八重
24 花の直径	04 やや小
25 花弁の数	07 多
26 花の上部の形	02 凸形
27 やくの有無	09 有
28 小花柄の長さ	02 中
29 花弁の縦方向の湾曲	07 やや外曲
30 花弁の先端の形	01 切形
31 花弁の色数	01 1色
32 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155C
33 花弁の二次色	
34 がく裂片の数	02 6～9枚

Gypsophila L.
MYGYP039

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくのアントシアニン着色の強弱 36 がくの縦断面の形 37 がく裂片の大きさ 38 開花始期	02 中
	03 切形
	05 中
	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31838号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gypsophila L. MYGYP040

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYGYP040」は、対照品種「MYGYP004」と比較して、葉の縦方向の反りの強弱が外曲であること、がく裂片の数が5枚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中敦

7 出願公表の年月日 令和6年4月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統のミツバチ交配による交雑実生から選抜したものである。

Gypsophila L.
MYGYP040

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の基部の分枝の有無	09 有
02 草姿	02 中間
03 草丈	05 中
04 茎の節数	05 中
05 節間長	05 中
06 茎の太さ	06 やや太
07 茎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
08 茎の色	02 淡緑
09 葉の形	01 狭楕円形
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	07 広
12 葉の長さ／幅	02 細長
13 葉の縦方向の反りの強弱	02 外曲
14 葉の横断面の形	02 やや凹
15 葉の先端部の向き	03 外曲
16 葉の表面の色	02 緑
17 花序の毛の有無	01 無

Gypsophila L.
MYGYP040

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の着生位置	02 ほとんどが上部
19 花序の上部の形	02 ドーム形
20 花序の主茎に対する側枝の角度	05 中
21 花序の側枝の曲りの強弱	03 弱
22 一茎当たりの花の総数	03 少
23 花型	02 八重
24 花の直径	05 中
25 花弁の数	07 多
26 花の上部の形	02 凸形
27 やくの有無	09 有
28 小花柄の長さ	02 中
29 花弁の縦方向の湾曲	07 やや外曲
30 花弁の先端の形	01 切形
31 花弁の色数	01 1色
32 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155C
33 花弁の二次色	
34 がく裂片の数	01 5枚

Gypsophila L.
MYGYP040

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくのアントシアニン着色の強弱 36 がくの縦断面の形 37 がく裂片の大きさ 38 開花始期	02 中
	03 切形
	04 やや小
	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31839号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. Tatakoto

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Tatakoto」は、対照品種「ハロウィンスウィート」と比較して、葉身の裂片の数が5であること、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさがかなり大であること、葉柄のアントシアニンの着色が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beotronics Ltd

Oldtown, Stoneyford, Co, Kilkenny R95 T384, Republic of Ireland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Don Labonte

7 出願公表の年月日 令和4年7月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育種系統種どうしを交配し、選抜したものである。

Ipomoea batatas (L.) Lam.
Tatakoto

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	04 やや開張
02 茎の一次側枝の長さ	03 短
03 節間長	04 やや短
04 茎の太さ	05 中
05 茎のアントシアニンの着色	04 強
06 茎の先端のアントシアニンの着色	02 弱
07 節のアントシアニンの着色	04 強
08 茎の先端の毛の粗密	03 中
09 葉身の大きさ	06 やや大
10 葉身の裂片の数	03 5
11 葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）	
12 葉身の裂片の深さ	05 中
13 葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）	03 灰緑
14 葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート NN137B
15 葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）	01 無
16 葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）	

Ipomoea batatas (L.) Lam.
Tatakoto

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート 191B
19 葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）	02 弱
20 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ	08 かなり大
21 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 葉身の蜜腺のアントシアニンの着色	07 強
23 新葉の表面の主な色	05 淡紫
24 新葉の裏面の主な色	05 淡紫
25 葉柄のアントシアニンの着色	09 極強
26 葉柄の長さ	08 かなり長
27 花冠の直径	06 やや大
28 花冠の色	RHSカラーチャート 76D
29 塊根の形	02 楕円形
30 塊根の長さ／幅	05 中
31 塊根の数	04 やや少
32 塊根の大きさ	06 やや大
33 塊根の直径に対する皮層の厚さ	04 やや薄
34 塊根の表皮の主な色	08 紫赤

Ipomoea batatas (L.) Lam.
Tatakoto

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊根の表皮の主な色 (2)	
36 塊根の表皮の二次色	01 無
37 塊根の肉の主な色	04 橙
38 塊根の肉の主な色の濃淡	02 中
39 塊根の肉の二次色	
40 塊根の目の深さ	01 浅
41 蒸しいものの肉の色	09 橙
42 蒸しいものの肉の色 (2)	
43 でん粉の歩留	
44 黒斑病抵抗性	
45 つる割病抵抗性	
46 ネコブセンチュウ抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31840号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. LA17-120

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「LA17-120」は、対照品種「パープルスイートロード」と比較して、葉身の裂片の数が5であること、葉柄のアントシアニンの着色が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「アヤマラ サキ」と比較して、葉身の裂片の数が5であること、新葉の表面の主な色が淡緑であること、葉柄のアントシアニンの着色が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beotanics Ltd

Oldtown, Stoneyford, Co, Kilkenny R95 T384, Republic of Ireland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Don Labonte

7 出願公表の年月日 令和4年9月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育種系統種どうしを交配し、選抜したものである。

Ipomoea batatas (L.) Lam.
LA17-120

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31840号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	04 やや開張
02 茎の一次側枝の長さ	05 中
03 節間長	05 中
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎のアントシアニンの着色	04 強
06 茎の先端のアントシアニンの着色	02 弱
07 節のアントシアニンの着色	04 強
08 茎の先端の毛の粗密	03 中
09 葉身の大きさ	04 やや小
10 葉身の裂片の数	03 5
11 葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）	
12 葉身の裂片の深さ	08 かなり深
13 葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）	02 緑
14 葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート 137C
15 葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）	01 無
16 葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）	

Ipomoea batatas (L.) Lam.
LA17-120

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート 191B
19 葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）	01 無又は極弱
20 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ	06 やや大
21 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
22 葉身の蜜腺のアントシアニンの着色	07 強
23 新葉の表面の主な色	02 淡緑
24 新葉の裏面の主な色	02 淡緑
25 葉柄のアントシアニンの着色	09 極強
26 葉柄の長さ	04 やや短
27 花冠の直径	05 中
28 花冠の色	RHSカラーチャート 76D
29 塊根の形	04 長方形
30 塊根の長さ／幅	08 かなり細
31 塊根の数	04 やや少
32 塊根の大きさ	06 やや大
33 塊根の直径に対する皮層の厚さ	03 薄
34 塊根の表皮の主な色	08 紫赤

Ipomoea batatas (L.) Lam.
LA17-120

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊根の表皮の主な色 (2)	
36 塊根の表皮の二次色	01 無
37 塊根の肉の主な色	05 紫
38 塊根の肉の主な色の濃淡	02 中
39 塊根の肉の二次色	
40 塊根の目の深さ	02 中
41 蒸しいものの肉の色	
42 蒸しいものの肉の色 (2)	02 紫
43 でん粉の歩留	
44 黒斑病抵抗性	
45 つる割病抵抗性	
46 ネコブセンチュウ抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31841号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. Manihi

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Manihi」は、対照品種「タマアカネ」と比較して、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「農林ジェイレッド」と比較して、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさが極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beotanics Ltd

Oldtown, Stoneyford, Co, Kilkenny R95 T384, Republic of Ireland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Don Labonte

7 出願公表の年月日 令和4年7月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育種系統種どうしを交配し、選抜したものである。

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Manihi

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 8 4 1 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	04 やや開張
02 茎の一次側枝の長さ	04 やや短
03 節間長	05 中
04 茎の太さ	05 中
05 茎のアントシアニンの着色	04 強
06 茎の先端のアントシアニンの着色	03 中
07 節のアントシアニンの着色	04 強
08 茎の先端の毛の粗密	03 中
09 葉身の大きさ	05 中
10 葉身の裂片の数	04 7
11 葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）	
12 葉身の裂片の深さ	05 中
13 葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）	03 灰緑
14 葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート NN137B
15 葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）	01 無
16 葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）	

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Manihi

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 8 4 1 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート N187B
19 葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）	02 弱
20 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ	09 極大
21 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱	09 極強
22 葉身の蜜腺のアントシアニンの着色	07 強
23 新葉の表面の主な色	08 淡褐
24 新葉の裏面の主な色	08 淡褐
25 葉柄のアントシアニンの着色	09 極強
26 葉柄の長さ	08 かなり長
27 花冠の直径	05 中
28 花冠の色	RHSカラーチャート 76C
29 塊根の形	02 楕円形
30 塊根の長さ／幅	04 やや太
31 塊根の数	09 極多
32 塊根の大きさ	04 やや小
33 塊根の直径に対する皮層の厚さ	04 やや薄
34 塊根の表皮の主な色	04 橙

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Manihi

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 8 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊根の表皮の主な色 (2)	
36 塊根の表皮の二次色	01 無
37 塊根の肉の主な色	04 橙
38 塊根の肉の主な色の濃淡	02 中
39 塊根の肉の二次色	
40 塊根の目の深さ	01 浅
41 蒸しいものの肉の色	09 橙
42 蒸しいものの肉の色 (2)	
43 でん粉の歩留	
44 黒斑病抵抗性	
45 つる割病抵抗性	
46 ネコブセンチュウ抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31842号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. Makatea

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Makatea」は、対照品種「ベニオトメ」と比較して、葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）が150Cであること、塊根の表皮の主な色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「農林ジェイレッド」と比較して、葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）が150Cであること、蒸しいもの肉の色（2）が淡紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beotanics Ltd

Oldtown, Stoneyford, Co, Kilkenny R95 T384, Republic of Ireland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Don Labonte

7 出願公表の年月日 令和4年7月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育種系統種と「Marguerite」の交配種に育成者所有の育種系統種を交配し、選抜したものである。

Ipomoea batatas (L.) Lam.
Makatea

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 開張
02 茎の一次側枝の長さ	09 極長
03 節間長	09 極長
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎のアントシアニンの着色	02 弱
06 茎の先端のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
07 節のアントシアニンの着色	02 弱
08 茎の先端の毛の粗密	03 中
09 葉身の大きさ	03 小
10 葉身の裂片の数	02 3
11 葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）	
12 葉身の裂片の深さ	02 かなり浅
13 葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）	01 黄緑
14 葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート 150C
15 葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）	01 無
16 葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）	

Ipomoea batatas (L.) Lam.
Makatea

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート 144D
19 葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）	01 無又は極弱
20 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ	06 やや大
21 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱	05 中
22 葉身の蜜腺のアントシアニンの着色	03 弱
23 新葉の表面の主な色	01 黄緑
24 新葉の裏面の主な色	01 黄緑
25 葉柄のアントシアニンの着色	04 やや弱
26 葉柄の長さ	03 短
27 花冠の直径	（開花しなかったため評価せず, No. 28について同様）
28 花冠の色	
29 塊根の形	01 倒卵形
30 塊根の長さ／幅	04 やや太
31 塊根の数	05 中
32 塊根の大きさ	03 小
33 塊根の直径に対する皮層の厚さ	04 やや薄
34 塊根の表皮の主な色	06 桃

Ipomoea batatas (L.) Lam.
Makatea

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊根の表皮の主な色 (2)	
36 塊根の表皮の二次色	01 無
37 塊根の肉の主な色	05 紫
38 塊根の肉の主な色の濃淡	01 淡
39 塊根の肉の二次色	02 黄白
40 塊根の目の深さ	01 浅
41 蒸しいものの肉の色	
42 蒸しいものの肉の色 (2)	01 淡紫
43 でん粉の歩留	
44 黒斑病抵抗性	
45 つる割病抵抗性	
46 ネコブセンチュウ抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31843号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Malus Mill. MATILDA

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MATILDA」は、対照品種「Cripps pink」と比較して、果皮を被う色の面積がかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「ふじ」と比較して、葉身の長さが長であること、果実の大きさがやや小であること、果皮を被う色の型が全面着色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
TALLAWANG INVESTMENTS PTY LTD
186 Roberts Road, Main Ridge, Victoria, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名
Michael Staples Jennifer Staples

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Cripps pink」の枝変わりである。

Malus Mill.
MATILDA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	05 中
02 樹の型	02 分枝型
03 樹姿（分枝型品種に限る。）	02 開張
04 結実の型	02 短果枝及び長果枝
05 枝の太さ	06 やや太
06 節間長	03 短
07 枝の色	02 赤褐
08 枝の毛じの粗密	03 粗
09 皮目の多少	05 中
10 葉身の向き	01 上向
11 葉身の長さ	07 長
12 葉身の幅	07 広
13 葉身の長さ／幅	06 やや大
14 葉身の緑色の濃淡	05 中
15 葉身の周縁の鋸歯の形	03 鋭鋸歯1
16 葉身の裏面の毛じの粗密	02 中
17 葉柄の長さ	05 中

Malus Mill.
MATILDA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄のアントシアニン着色の広がり	05 中
19 つぼみの色	04 濃桃
20 花の大きさ	06 やや大
21 花弁の重なり	02 中間
22 花柱の位置	02 同等
23 幼果のアントシアニン着色の広がり	03 小
24 果実の大きさ	04 やや小
25 果実の長さ	04 やや短
26 果実の幅	03 小
27 果実の長さ／幅	06 やや大
28 果実の形	04 円筒形
29 果実の角張りの強弱	01 無又は弱
30 果実の王冠の強弱	01 無又は弱
31 果実のがくの開閉	03 小
32 果実のがくの長さ	06 やや長
33 果粉の多少	01 無又は少
34 果皮のろう質の多少	01 無又は少

Malus Mill.
MATILDA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果面の粗滑	03 滑
36 果皮の地色	05 黄緑
37 果皮を被う色の面積	08 かなり大
38 果皮を被う色	03 赤
39 果皮を被う色の濃淡	06 やや濃
40 果皮を被う色の型	01 全面着色
41 果皮のしまの幅	(しま無)
42 果皮のしま模様の明瞭度	01 無
43 梗あ周辺のさびの量	01 無又は小
44 果実側面のさびの量	01 無又は小
45 がくあ周辺のさびの量	01 無又は小
46 果点の数	06 やや多
47 果点の大きさ	05 中
48 スカーフスキンの多少	01 無
49 果柄の長さ	06 やや長
50 果柄の太さ	06 やや太
51 梗あの深さ	07 深

Malus Mill.
MATILDA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 梗あの幅	05 中
53 がくあの深さ	06 やや深
54 がくあの幅	05 中
55 果肉の硬さ	08 かなり硬
56 果肉の色	02 黄白
57 果実の甘味	08 かなり高
58 果実の酸味	08 かなり高
59 果実の蜜の多少	01 無又は極少
60 果心の形	04 円錐形
61 果実の子室の型	01 閉又はわずかに開く
62 開花始期	04 やや早
63 収穫期	07 晩
64 斑点落葉病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31844号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. しなの やっちゃん (シノ ヤッちゃん)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「しなの やっちゃん」は、対照品種「こうみつ」と比較して、つぼみの色が淡桃であること、果実の王冠の強弱が無又は弱であること、果点の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「シナノホッペ」と比較して、葉身の長さ／幅がかなり大であること、幼果のアントシアニン着色の広がりがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

荒井康行

長野県上高井郡小布施町大字大島124

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒井康行

7 出願公表の年月日 令和2年7月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「こうみつ」の自然交配実生から選抜したものである。

Malus Mill.

しなの やっちゃん

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 8 4 4 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	05 中
02 樹の型	02 分枝型
03 樹姿（分枝型品種に限る。）	02 開張
04 結実の型	02 短果枝及び長果枝
05 枝の太さ	06 やや太
06 節間長	04 やや短
07 枝の色	04 褐
08 枝の毛じの粗密	05 中
09 皮目の多少	07 多
10 葉身の向き	02 水平
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	03 狭
13 葉身の長さ／幅	08 かなり大
14 葉身の緑色の濃淡	05 中
15 葉身の周縁の鋸歯の形	03 鋭鋸歯1
16 葉身の裏面の毛じの粗密	02 中
17 葉柄の長さ	06 やや長

Malus Mill.

しなの やっちゃん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄のアントシアニン着色の広がり	01 極小
19 つぼみの色	03 淡桃
20 花の大きさ	05 中
21 花弁の重なり	02 中間
22 花柱の位置	01 下位
23 幼果のアントシアニン着色の広がり	04 やや小
24 果実の大きさ	05 中
25 果実の長さ	05 中
26 果実の幅	05 中
27 果実の長さ／幅	05 中
28 果実の形	06 球形
29 果実の角張りの強弱	01 無又は弱
30 果実の王冠の強弱	01 無又は弱
31 果実のがくの開閉	05 中
32 果実のがくの長さ	05 中
33 果粉の多少	02 中
34 果皮のろう質の多少	01 無又は少

Malus Mill.

しなの やっちゃん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果面の粗滑	07 粗
36 果皮の地色	05 黄緑
37 果皮を被う色の面積	07 大
38 果皮を被う色	04 紫紅
39 果皮を被う色の濃淡	07 濃
40 果皮を被う色の型	01 全面着色
41 果皮のしまの幅	(しま無)
42 果皮のしま模様の明瞭度	01 無
43 梗あ周辺のさびの量	02 中
44 果実側面のさびの量	01 無又は小
45 がくあ周辺のさびの量	01 無又は小
46 果点の数	05 中
47 果点の大きさ	08 かなり大
48 スカーフスキンの多少	06 やや多
49 果柄の長さ	06 やや長
50 果柄の太さ	06 やや太
51 梗あの深さ	04 やや浅

Malus Mill.

しなの やっちゃん

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 梗あ幅	06 やや広
53 がくあ深さ	04 やや浅
54 がくあ幅	05 中
55 果肉の硬さ	05 中
56 果肉の色	02 黄白
57 果実の甘味	07 高
58 果実の酸味	02 かなり低
59 果実の蜜の多少	05 中
60 果心の形	03 平円形
61 果実の子室の型	01 閉又はわずかに開く
62 開花始期	05 中
63 収穫期	07 晩
64 斑点落葉病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31845号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. リオ (リオ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「リオ」は、対照品種「ふじ」と比較して、つぼみの色が濃桃であること、幼果のアントシアニン着色の広がりの中であること、果実の子室の型が閉又はわずかに開くであること等で区別性が認められる。対照品種「こうみつ」と比較して、幼果のアントシアニン着色の広がりの中であること、果実の王冠の強弱が無又は弱であること、果皮を被う色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

荒井康行

長野県上高井郡小布施町大字大島124

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒井康行

7 出願公表の年月日 令和2年7月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「こうみつ」の自然交配実生から選抜したものである。

Malus Mill.
リオ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	05 中
02 樹の型	02 分枝型
03 樹姿（分枝型品種に限る。）	02 開張
04 結実の型	02 短果枝及び長果枝
05 枝の太さ	06 やや太
06 節間長	04 やや短
07 枝の色	04 褐
08 枝の毛じの粗密	06 やや密
09 皮目の多少	05 中
10 葉身の向き	01 上向
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の長さ／幅	06 やや大
14 葉身の緑色の濃淡	05 中
15 葉身の周縁の鋸歯の形	02 複鈍鋸歯
16 葉身の裏面の毛じの粗密	02 中
17 葉柄の長さ	02 かなり短

Malus Mill.
リオ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄のアントシアニン着色の広がり	03 小
19 つぼみの色	04 濃桃
20 花の大きさ	06 やや大
21 花弁の重なり	02 中間
22 花柱の位置	02 同等
23 幼果のアントシアニン着色の広がり	05 中
24 果実の大きさ	04 やや小
25 果実の長さ	04 やや短
26 果実の幅	03 小
27 果実の長さ／幅	05 中
28 果実の形	07 扁円形
29 果実の角張りの強弱	01 無又は弱
30 果実の王冠の強弱	01 無又は弱
31 果実のがくの開閉	01 極小
32 果実のがくの長さ	05 中
33 果粉の多少	02 中
34 果皮のろう質の多少	01 無又は少

Malus Mill.

リオ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果面の粗滑	03 滑
36 果皮の地色	03 黄
37 果皮を被う色の面積	07 大
38 果皮を被う色	03 赤
39 果皮を被う色の濃淡	06 やや濃
40 果皮を被う色の型	02 不明瞭なしま模様を伴った全面着色
41 果皮のしまの幅	03 狭
42 果皮のしま模様の明瞭度	03 弱
43 梗あ周辺のさびの量	02 中
44 果実側面のさびの量	01 無又は小
45 がくあ周辺のさびの量	01 無又は小
46 果点の数	04 やや少
47 果点の大きさ	04 やや小
48 スカーフスキンの多少	05 中
49 果柄の長さ	06 やや長
50 果柄の太さ	06 やや太
51 梗あの深さ	03 浅

Malus Mill.
リオ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 梗あの幅	05 中
53 がくあの深さ	05 中
54 がくあの幅	04 やや狭
55 果肉の硬さ	05 中
56 果肉の色	02 黄白
57 果実の甘味	07 高
58 果実の酸味	05 中
59 果実の蜜の多少	03 少
60 果心の形	03 平円形
61 果実の子室の型	01 閉又はわずかに開く
62 開花始期	06 やや晩
63 収穫期	08 かなり晩
64 斑点落葉病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31846号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. ミズホチカラ環1号 (ミズホチカラ環1号)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ミズホチカラ環1号」は、対照品種「ミズホチカラ」と比較して、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。対照品種「あきまさり」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、胚乳のアミロース含量が6型であること、耐倒伏性が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
黒木慎 田村克徳 片岡知守 中西愛 竹内善信 佐藤宏之 田村泰章 石川覚
安部匡

7 出願公表の年月日 令和4年8月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ミズホチカラ」に「コシヒカリ環1号」を交配し、「ミズホチカラ」を戻し交配したものである。

Oryza sativa L.
ミズホチカラ環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	06 やや広
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	01 立
17 稈の向き	01 立

Oryza sativa L.
ミズホチカラ環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	06 やや晩
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	07 太
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	03 短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	06 やや長
31 穂数	03 少
32 芒の有無	01 無
33 初期の芒の色	
34 芒の分布	

Oryza sativa L.
ミズホチカラ環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	07 穂軸の一部も概ね抽出
44 成熟期	08 かなり晩
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	02 黄金色
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
ミズホチカラ環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	06 やや大
54 粳の長さ	06 やや長
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	06 やや大
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	06 やや広
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	06 6 型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	04 低崩壊～中間
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
ミズホチカラ環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	04 やや易
71 耐倒伏性	09 極強
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pib, Pi20
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	01 極低
84 高温登熟性	
85 着粒密度	07 密

Oryza sativa L.
ミズホチカラ環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 87 セシウム吸収性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31847号 令和8年8月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum tuberosum L. AGアルデシュ (AGアルデシュ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「AGアルデシュ」は、対照品種「コナユタカ」と比較して、植物体の草姿がやや直立であること、茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「コナヒメ」と比較して、植物体の草高が高であること、塊茎の肉色が明黄であること、上いもの平均重がかなり重であること等で区別性が認められる。対照品種「トヨシロ」と比較して、植物体の草高が高であること、枯ちよう期が中であること、塊茎の肉色が明黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Agrico U.A.

Duit 15, 8305BB Emmeloord, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

S. Allefs

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「STAYER」に「AR 02-2139」を交配し、選抜したものである。

Solanum tuberosum L.

AGアルデシュ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 8 4 7 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 幼芽の大きさ	07 大
02 幼芽の形	03 円錐形
03 幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱	05 中
04 幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合	03 高
05 幼芽の基部の毛の多少	06 やや多
06 幼芽の頂部の基部に対する大きさ	05 中
07 幼芽の頂部の型	03 中間
08 幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
09 幼芽の頂部の毛の多少	07 多
10 幼芽の根端の数	05 中
11 幼芽の側枝の長さ	05 中
12 植物体の草型	02 中間型
13 植物体の草姿	05 やや直立
14 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
15 複葉の大きさ	05 中
16 小葉の重なり	03 中間
17 二次小葉の出現度	05 中

Solanum tuberosum L.
AGアルデシュ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 複葉の緑色の濃淡	07 濃
19 複葉の表面の中肋のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
20 第二側小葉の長幅比	03 狭
21 頂小葉と側小葉の合着の出現率	01 無又は極低
22 花芽のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 植物体の草高	07 高
24 花の数	06 やや多
25 花房の大きさ	07 大
26 花柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
27 花冠の大きさ	06 やや大
28 花冠内面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
29 花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合	01 無又は低
30 花冠内面のアントシアニン着色の広がり	01 無又は極小
31 やくの色	05 黄橙
32 早期肥大性	03 中
33 枯ちょう期	05 中
34 塊茎の形	02 短卵形

Solanum tuberosum L.

AGアルデシュ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 8 4 7 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊茎の目の数	04 多
36 塊茎の目の深さ	04 やや浅
37 塊茎の皮色	01 淡ベージュ
38 塊茎の目の基部の色	01 白
39 塊茎の表皮のネット	03 少
40 塊茎の肉色	03 明黄
41 塊茎の光反応による皮のアントシアニン着色の強弱（皮色が淡ベージュ及び黄の品種に限る。）	04 やや弱
42 休眠期間	
43 上いも重	05 中
44 上いも数	04 やや少
45 上いもの平均重	08 かなり重
46 肉質	05 粉
47 ジャガイモシストセンチュウ抵抗性	