

ボローニア属

(*Boronia* Sm.)

本審査基準は重要な形質を定める最新の告示を反映しておりません。

出願等にあたっては、最新の重要な形質をご確認ください。(以下 HP の植物区分ごとの特性表参照。

→https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/sinsa_kijun_jp.html)

なお、それぞれの重要な形質に対する定義等は変更されております。

3. ポローニア特性審査基準（案）

（1）特性審査基準

※は特性の記述上不可欠と考えられる形質

重要な形質	形質	定義	調査方法	状態又は区分	階級	標準品種名	備考
樹姿	*1. 樹姿	開花盛期における樹体全体の草姿	観察 (図1)	立性 開張 ほふく その他	1 2 3 9	リップスティック チャンドレリ	
樹高	*2. 樹高	開花盛期における地際から植物体最頂部までの高さ	測定 単位 c m	低 中 高	3 5 7	チャンドレリ リップスティック	
枝の太さ	*3. 枝の太さ	開花盛期における最長開花茎の茎長中央部の節間中央の茎径	測定 単位 mm	細 中 太	3 5 7	リップスティック	
枝の色	*4. 枝の色	開花盛期における草丈の1/2部の開花枝の節間中央の色	観察	淡緑 緑 濃緑 淡褐 褐 濃褐 その他	1 2 3 4 5 6 9	リップスティック	
	5. 地際部の枝の色	開花盛期における開花枝の地際の色	観察	淡緑 緑 濃緑 淡褐 褐 濃褐 その他	1 2 3 4 5 6 9	ルテア チャンドレリ (ピンナータ)	
分枝性	*6. 分枝数	開花盛期における前年枝の分枝数	観察	少 中 多	3 5 7	ピンクパンサー リップスティック チャンドレリ	
	7. 分枝の発生位置	開花盛期における前年枝の分枝の発生位置	観察 (図2)	分枝の発生無 主に上部 主に中央部 主に下部 上部と下部 全体	1 2 3 4 5 6	リップスティック チャンドレリ	
	8. 分枝の長さ	主茎または最長茎の最長第1次分枝の長さ	測定 単位 c m	短 中 長	3 5 7	リップスティック チャンドレリ	
節間長	*9. 節間長	開花盛期における主茎または最長茎の草丈の1/2付近の節間長	測定 単位 mm	短 中 長	3 5 7	ルテア リップスティック (ピンナータ)	
葉形	*10. 単葉、複葉の別	単葉、複葉の別	観察	単葉 複葉	1 2	リップスティック チャンドレリ	
	*11. 小葉の枚数	小葉の枚数	測定 単位 枚	3枚 5～7枚 9枚以上	1 2 3	チャンドレリ ピンクパンサー (ピンナータ)	複葉の場合に限る。代表的な小葉の枚数。

注) 標準品種名欄の括弧で示したものは原種である（以下同じ）。

重要な形質	形質	定義	調査方法	状態又は区分	階級	標準品種名	備考
葉形	*12. 葉の形	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の形	観察 (図3)	針形 線形 披針形 橢円形 卵形 倒披針形 へら形 その他	1 2 3 4 5 6 7 9	チャンドレリ リップスティック ピンクパッション 2 ピンクパッション 1	複葉の場合は小葉を観察する
	13. 葉身先端の形	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の葉身先端の形	観察 (図4)	鋭形 鈍形 円形	3 5 7	リップスティック ピンクパッション 1	複葉の場合は小葉を観察する
	14. 葉身基部の形	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の葉身基部の形	観察 (図5)	鋭形 鈍形 円形	3 5 7	リップスティック ピンクパッション 2	複葉の場合は小葉を観察する
	15. 葉身の湾曲の有無と程度	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の葉身の湾曲の程度	観察	無 軽 中 重	1 3 5 7	ピンクパンサー チャンドレリ	複葉の場合は小葉を観察する
	16. 葉縁の形	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の葉縁の形	観察 (図6)	全縁 単鋸歯 重鋸歯 その他	1 2 3 9	リップスティック	複葉の場合は小葉を観察する
葉の大きさ	*17. 葉身長(I)	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の葉身長	測定 単位mm (図7)	短 中 長	3 5 7	ピンクパッション 1 リップスティック	単葉の場合に限る
	*18. 葉身長(II)	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の葉身長	測定 単位mm (図7)	短 中 長	3 5 7	チャンドレリ ピンクパンサー	複葉の場合に限る
	*19. 葉身幅(I)	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の葉身幅	測定 単位mm (図7)	狭 中 広	3 5 7	リップスティック ピンクパッション 2	単葉の場合に限る
	*20. 葉身幅(II)	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の葉身幅	測定 単位mm (図7)	狭 中 広	3 5 7	チャンドレリ ピンクパンサー	複葉の場合に限る
	*21. 小葉の葉身長	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の小葉の葉身長	測定 単位mm (図7)	短 中 長	3 5 7	チャンドレリ ピンクパンサー	複葉の場合に限る
	*22. 小葉の葉身幅	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の小葉の葉身幅	測定 単位mm (図7)	狭 中 広	3 5 7	チャンドレリ ピンクパンサー	複葉の場合に限る
葉色	*23. 葉の表面の色	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の表面の色	観察	淡緑 緑 濃緑	3 5 7	ピンクパンサー チャンドレリ	
	24. 葉の斑の有無	葉の斑の有無	観察	無 斑入り	1 2	ピンクパンサー	

重要な形質	形質	定義	調査方法	状態又は区分	階級	標準品種名	備考
	25. 葉の光沢の有無と程度	開花盛期における草丈の1/2付近の成葉の表面の光沢の有無と程度	観察	無 少 中 多	1 3 5 7	ピンクパンサー (ピンナータ) リップスティック ピンクパッション 1	
	26. 葉のアントシアニンの有無と程度	開花盛期における草丈の1/2付近の成葉の表面のアントシアニンの有無と程度	観察	無 少 中 多	1 3 5 7	リップスティック	
葉の毛の多少	*27. 葉表面の毛の有無と多少	開花盛期における草丈の1/2付近の葉の表面の毛の有無と多少。	観察	無 少 中 多	1 3 5 7	リップスティック	
葉柄の長さ	*28. 葉軸基部の長さ	開花盛期における草丈の1/2付近の複葉の葉軸基部の長さ	測定 単位mm (図7)	短 中 長	3 5 7	チャンドレリ ピンクパンサー	複葉の場合に限る
(葉の香り)	*29. 葉の香り	成葉の葉の香りの有無と程度	官能	無 弱 中 強	1 3 5 7	チャンドレリ リップスティック	
花房の形	*30. 花房形成の有無	花房形成の有無	観察	花房を形成しない 花房を形成	1 2	チャンドレリ (ピンナータ)	
	*31. 花房の直径	花房の直径	測定 単位mm (図8)	小 中 大	3 5 7	ピンクパッション 1 (ピンナータ)	花房を形成する場合に限る
	*32. 花房の高さ	花房の高さ	測定 単位mm (図8)	低 中 高	3 5 7	ピンクパッション 1 (ピンナータ)	花房を形成する場合に限る
	*33. 花の着生位置	主茎または最長茎の花の着生位置	観察	主に先端 中央部 全体 その他	1 2 3 9	ピンクパッション 1 ピンクパンサー チャンドレリ	
	*34. 花の着生密度	主茎または最長茎の花の着生密度	観察	疎 中 密	3 5 7	ピンクパッション 1 ピンクパンサー チャンドレリ	
花の向き	*35. 花の向き	開花盛期の花の向き	観察	上 横 下	3 5 7	(ピンナータ) リップスティック チャンドレリ	
花形	*36. 花形	開花直後の花の形	観察 (図9)	壺形 鐘形 盃形 その他	1 2 3 9	チャンドレリ ピンクパンサー (ピンナータ)	
花の大きさ	*37. 花径	開花直後の花径	測定 単位mm (図10)	小 中 大	3 5 7	ルテア リップスティック (ピンナータ)	

重要な 形質	形質	定義	調査方法	状態又は区分	階級	標準品種名	備考
	*38. 花の高さ	開花直後の花の高さ	測定 単位mm (図10)	小 中 大	3 5 7	(ピンナータ) チャンドレリ ピンクパンサー	
花色	*39. 花弁内部の単色、複色の別	開花直後の花色内部の単色、複色の別	観察	単色 複色	1 2		
	*40. 花弁内部の複色のパターン	開花直後の花弁内部の複色のパターン	観察 (図11)	覆輪 条斑 しぼり ぼかし その他	1 2 3 4 9		花弁内部が複色の 場合に限る
	*41. 花弁内部の地色	開花直後の花弁内部の地色	測定 JHSカラーチャートによる				
	*42. 花弁内部の複色の色	開花直後の花弁内部の複色の色	測定 JHSカラーチャートによる				花弁内部が複色の 場合に限る
	*43. 花弁外部の単色、複色の別	開花直後の花色外部の単色、複色の別	観察	単色 複色	1 2		
	*44. 花弁外部の複色のパターン	開花直後の花弁内部の複色のパターン	観察 (図11)	覆輪 条斑 絞り ぼかし その他	1 2 3 4 9		花弁外部が複色の 場合に限る
	*45. 花弁外部の地色	開花直後の花弁外部の地色	測定 JHSカラーチャートによる				
	*46. 花弁外部の複色の色	開花直後の花弁外部の複色の色	測定 JHSカラーチャートによる				花弁外部が複色の 場合に限る
花弁の形	*47. 花弁の形	開花直後の花弁の形	観察 (図12)	線形 ひ針形 楕円形 卵形 倒卵形 へら形 その他	1 2 3 4 5 6 9	リップスティック ピンクパンサー チャンドレリ	
	*48. 花弁の長さ	開花直後の花弁長	測定 単位mm (図13)	短 中 長	3 5 7	ルテア リップスティック	
	*49. 花弁の幅	開花直後の花弁幅	測定 単位mm (図13)	狭 中 広	3 5 7	ピンクパッション2 リップスティック	
	*50. 花弁先端の形	開花直後の花弁先端の形	観察 (図14)	鋭 中 鈍 円	3 5 7 9	リップスティック ピンクパンサー チャンドレリ	

重要な形質	形質	定義	調査方法	状態又は区分	階級	標準品種名	備考
	*51. 花弁の曲がり	開花直後の花弁の曲がり方	観察 (図15)	平 内曲 外曲 中折れ その他	1 2 3 4 9	チャンドレリ (ピンナータ)	
花弁数	*52. 花弁数	花弁数	測定 単位 枚	少 中 多	3 5 7	リップスティック	4枚
(がく筒の色)	*53. がく筒の色	がく筒の色	観察 (図16)	黄緑 緑 濃緑 淡赤味緑 赤 その他	1 2 3 4 5 9	ルテア チャンドレリ リップスティック	
雌雄ずいの形	*54. 雌ずいの形	真上から観察した時の雌ずいの形	観察 (図17)	円形 四角形 星形 その他	1 2 3 9	リップスティック ピンクパンサー チャンドレリ	
雌雄ずいの色	*55. 柱頭の色	花の開花初期の柱頭先端の色	観察 (図16)	白 黄 緑 橙 赤 赤紫 茶 こげ茶 その他	1 2 3 4 5 6 7 8 9	リップスティック ルテア チャンドレリ	
	*56. 葯の色	花の開花初期の葯の色	観察 (図16)	白 黄 緑 橙 赤 赤紫 茶 こげ茶 その他	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(ピンナータ) ルテア ピンクパンサー チャンドレリ	
雌雄ずいの数	*57. 雄ずいの数	雄ずいの数	観察	少 中 多	3 5 7	チャンドレリ リップスティック	4 8
花柄の長さ	*58. 花柄の長さ	花柄の長さ	測定 単位mm (図8)	短 中 長	3 5 7	ピンクパッション 1 ピンクパンサー (ピンナータ)	
一花房のあたりの花数	*59. 一花房の花数		観察	少 中 多	3 5 7	(ピンナータ)	花房を形成する場合に限る
花の香り	*60. 花の香り	花の香りの有無と程度	官能	無 弱 中 強	1 3 5 7	チャンドレリ リップスティック	

重要な 形質	形質	定義	調査方法	状態又は区分	階級	標準品種名	備考
開花期	*61. 開花の早晩性	通常の栽培条件下での 開花の早晩	観察	早 中 晩	3 5 7	チャンドレリ	
耐寒性	*62. 耐寒性	通常の栽培条件下にお ける耐寒性の強弱	観察	弱 中 強	3 5 7		
耐暑性	*63. 耐暑性	通常の栽培条件下にお ける耐暑性の強弱	観察	弱 中 強	3 5 7		
病害抵抗 性	*64. 病害抵抗性	通常の栽培条件下にお ける病害抵抗性の強弱	観察	弱 中 強	3 5 7		
虫害抵抗 性	*65. 虫害抵抗性	通常の栽培条件下にお ける虫害抵抗性の強弱	観察	弱 中 強	3 5 7		

(2) 参考図




図 1. 樹姿(1)

Fig. 1 Plant type(1)




図 2. 分枝の発生位置(7)

Fig. 2. Branching position(7)




図3 葉形(12)

Fig. 3. Leaf shape(12)






図4 葉身先端の形(13)

Fig. 4 Leaf tip(13)




鋭形

acute



鈍形

obtuse



円形

rotundate


図5 葉身基部の形(14)

Fig. 5. Leaf base(14)



全縁

entire



単鋸齒

singly serrated



重鋸齒


double serrated

図6 葉縁の形(16)

Fig. 6. Leaf margin(16)

単葉の場合

simple leaf



複葉の場合

compound leaf




図7 葉身長(17,18)、葉身幅(19,20)、小葉の葉身長(21)、小葉の葉身幅(22)、
葉軸基部の長さ(27)

小葉の葉身長、葉身幅は最大小葉を測定する。

Fig. 7. Leaf length(17,18), leaf width(19,20), leaflet length(21), leaflet width(22),
rachis base length(27),

Measure the largest leaflet for leaflet length and width.




図8 花房の直径(30)、花房の高さ(31)、花柄の長さ(57)

Fig. 8. Diameter of flower cluster(30), height of flower cluster(31),
Length of pedicel(57)




図9 花形(35)

Fig. 9. Floret shape(35)






図10 花径(37)、花の高さ(38)

Fig. 10. Floret diameter(37, floret height(38)




覆輪

Picotee




かすり

Splashed



条斑

Striped



ぼかし

Gradating

図11. 花卉内部の複色のパターン(40)、花卉外部の複色のパターン(44)

Fig.11. Coloring pattern of petal inside(40), coloring pattern of petal outside(44).




図 1 2 花弁の形(47)

Fig. 12. Petal shape(47)




図 1 3 花弁の長さ(48)、花弁の幅(49)

Fig. 13. Petal length(48), petal width(49)




図 1 4 花弁先端の形 (50)

Fig. 14 Petal tip(50)




図 1 5 花弁の曲がり (51)

Fig. 15 Petal curvature(51)






図 16 がく筒の色(53)、柱頭の色(55)、葯の色(56)

Fig.16 Color of calyx tube(53), Color of stigma(55), Color of anthers(56)




円

circular



四角形

tetragonal



星形

tetrastellate

図 1 7 雌ずいの形(54)

Fig. 17 Top view of stigma(54)

(3) 英文翻訳

Table of characteristics
(*: important characteristic)

Characteristics	States	Note	Example variety
*1. Plant type (Fig. 1)	Upright	1	Lipstick Chandleri
	Spreading	2	
	Creeping	3	
	Others	9	
*2. Plant height	Low	3	Chandleri Lipstick
	Medium	5	
	High	7	
*3. Stem diameter	Thin	3	Lipstick
	Medium	5	
	thick	7	
*4. Stem color	Light green	1	Lipstick
	Green	2	
	Dark green	3	
	Light brown	4	
	Brown	5	
	Dark brown	6	
	Others	9	
5. Stem color at the base	Light Green	1	Lutea Chandleri <i>B. pinnata</i>
	Green	2	
	Dark Green	3	
	Light brown	4	
	Brown	5	
	Dark brown	6	
	Others	9	
*6. Number of branches	Few	3	Pink Panther Lipstick Chandleri
	Medium	5	
	Many	7	
7. Branching position (Fig. 2)	None	1	Lipstick Chandleri
	Mainly Upper	2	
	Mainly Central	3	
	Mainly Lower	4	
	Upper and Lower	5	
	Overall	6	
8. Length of branching stems	Short	3	Lipstick Chandleri
	Medium	5	
	Long	7	

Characteristics	States	Note	Example variety
*9.Length of stem internode	Short Medium Long	3 5 7	Lutea Lipstick <i>B. pinnata</i>
*10.Type of leaf blade	Simple Compound	1 2	Lipstick Chandleri
*11.Number of leaflets	3 5 to 7 9 or more	1 2 3	Chandleri Pink Panther <i>B. pinnata</i>
*12.Leaf shape (Fig. 3)	Sublate Linear Lanceolate Elliptical Ovate Oblanceolate Spathulate Others	1 2 3 4 5 6 7 9	Chandleri Lipstick Pink Passion -2 Pink Passion -1
13.Leaf tip (Fig. 4)	Acute Obtuse Rotundate	3 5 7	Lipstick Pink Passion -1
14.Leaf base (Fig. 5)	Acute Obtuse Rotundate	3 5 7	Lipstick Pink Passion -2
15.Curvature of leaflet	None Slight Medium Severe	1 3 5 7	Pink Panther Chandleri
16.Leaf margin (Fig. 6)	Entire Singly serrated Double serrated Others	1 2 3 9	Lipstick
*17.Leaf length(I) (Fig. 7)	Short Medium Long	3 5 7	Pink Passion -1 Lipstick
*18.Leaf length(II) (Fig. 7)	Short Medium Long	3 5 7	Chandleri Pink Panther
*19.Leaf width(I) (Fig. 7)	Narrow Medium Wide	3 5 7	Lipstick Pink Passion -2

Characteristics	States	Note	Example variety
*20. Leaf width(II) (Fig. 7)	Narrow	3	Chandleri
	Medium	5	
	Wide	7	Pink Panther
*21. Leaflet length (Fig. 7)	Short	3	Chandleri
	Medium	5	
	Long	7	Pink Panther
*22. Leaflet width (Fig. 7)	Narrow	3	Chandleri
	Medium	5	Pink Panther
	Wide	7	
*23. Leaf color	Pale green	3	
	Green	5	Pink Panther
	Dark green	7	Chandleri
*24. Leaf variegation	None	1	Pink Panther
	Variegated	2	
25. Leaf glossiness	None	1	Pink Panther
	Slight	3	<i>B. pinnata</i>
	Medium	5	Lipstick
	Severe	7	Pink passion -1
26. Anthocyanin development on leaves	None	1	Lipstick
	Slight	3	
	Medium	5	
	Severe	7	
*27. Leaf hairiness	None	1	Lipstick
	Slight	3	
	Medium	5	
	Severe	7	
28. Length of petiole	Short	3	Chandleri
	Medium	5	
	Long	7	Pink Panther
*29. Foliage scent	None	1	
	Slight	3	
	Medium	5	Chandleri
	Strong	7	Lipstick
*30. Flower type	Without cluster	1	Chandleri
	With cluster	2	<i>B. pinnata</i>
*31. Diameter of flower cluster (Fig. 8)	Small	3	Pink Passion -1
	Medium	5	<i>B. pinnata</i>
	Big	7	

Characteristics	States	Note	Example variety
*32.Length of flower cluster (Fig. 8)	Short	3	Pink Passion -1 <i>B. pinnata</i>
	Medium	5	
	Long	7	
*33.Flowers on stems	Mainly at tips	1	Pink Pssion -1 Pink Panther Chandleri
	Central	2	
	Overall	3	
	Others	9	
*34.Flower density on stems	Sparse	3	Pink Passion -1 Pink Panther Chandleri
	Medium	5	
	Dense	7	
*35.Direction of flowers	Upward	3	<i>B. pinnata</i> Lipstick Chandleri
	Horizontal	5	
	Downward	7	
*36.Shape of flowers (Fig. 9)	Urceolate	1	Chandleri Pink Panther <i>B. pinnata</i>
	Campanulate	2	
	Cup-shaped	3	
	Others	9	
*37.Diameter of flower (Fig. 10)	Narrow	3	Lutea Lipkstick <i>B. pinnata</i>
	Medium	5	
	Wide	7	
*38.Height of flower (Fig. 10)	Low	3	<i>B. pinnata</i> Chandleri Pink Panther
	Medium	5	
	High	7	
*39.Coloring pattern of petal inside	Unicolor	1	
	Multicolor	2	
*40.Pattern of petal inside multicolor (Fig. 11)	Picotee	1	
	Banding	2	
	Speckled	3	
	Gradating	4	
	Others	9	
*41.Ground color of petal inside	JHS Color Chart		
*42.Marking color of petal inside	JHS Color Chart		
*43.Coloring pattern of petal outside	Unicolor	1	
	Multicolor	2	

Characteristics	States	Note	Example variety
*44. Pattern of petal outside multicolor (Fig. 11)	Picotee Splashed Striped Gradating Others	1 2 3 4 9	
*45. Ground color of petal outside	JHS Color Chart		
*46. Marking color of petal outside	JHS Color Chart		
*47. Petal shape (Fig. 12)	Linear Lanceolate Oblong Ovate Obovate Spathulate Others	1 2 3 4 5 6 9	Lipstick Pink Panther Chandleri
*48. Petal length (Fig. 13)	Short Medium Long	3 5 7	Lutea Lipstick
*49. Petal width (Fig. 13)	Narrow Medium Wide	3 5 7	Pink Pssion -2 Lipstick
50. Petal tip (Fig. 14)	Acute Medium Obtuse Rotundate	3 5 7 9	Lipstick Pink Panther Chandleri
*51. Petal curvature (Fig. 15)	None Incurved Outcurved Folded Others	1 2 3 4 9	Chandleri <i>B. pinnata</i>
*52. Number of petals	Few Medium Many	3 5 7	Lipstick

Characteristics	States	Note	Example variety
*53. Color of calyx tube (Fig. 16)	Yellowish Green	1	Lutea
	Green	2	Chandleri
	Dark green	3	
	Pale-reddish green	4	
	Red	5	Lipstick
	Others	9	
*54. Top view of stigma (Fig. 17)	Circular	1	Lipstick
	Tetragonal	2	Pink Panther
	Tetrastellate	3	Chandleri
	Others	9	
*55. Color of stigma (Fig. 16)	White	1	
	Yellow	2	
	Green	3	Lipstick
	Orange	4	Lutea
	Red	5	
	Reddish purple	6	
	Brown	7	
	Dark brown	8	Chandleri
	Others	9	
*56. Color of anthers (Fig. 16)	White	1	
	Yellow	2	<i>B. pinnata</i>
	Green	3	Lutea
	Orange	4	
	Red	5	
	Reddish purple	6	Pink Panther
	Brown	7	
	Dark brown	8	Chandleri
	Others	9	
*57. Number of stamens	Few	3	Chandleri
	Medium	5	Lipstick
	Many	7	
*58. Length of pedicel (Fig. 8)	Short	3	Pink Passion -1
	Medium	5	Pink Panther
	Long	7	<i>B. pinnata</i>
*59. Floret number in flower clusters	Few	3	
	Medium	5	<i>B. pinnata</i>
	Many	7	

Characteristics	States	Note	Example variety
*60. Floral scent	None Weak Medium Strong	1 3 5 7	Chandleri Lipstick
*61. Earliness of flowering	Early Medium Late	3 5 7	Chandleri
*62. Cold hardiness	Weak Medium Strong	3 5 7	
*63. Tolerance to high temperature	Weak Medium Strong	3 5 7	
*64. Disease resistance	Weak Medium Strong	3 5 7	
*65. Pest resistance	Weak Medium Strong	3 5 7	

4. ボローニア特性検定のための栽培試験方法及び標準品種

(1) 栽培試験方法

① 耕種基準

栽培条件	ハウス(温室) 露地で長雨に当てると立枯病が発生しやすいので注意する。
挿し穂	通年可であるが、春期もしくは秋期が適期。 緑枝を5 cm程度に切り、発根促進剤を粉衣して川砂等に挿し穂。
育苗	挿し穂2～3か月後に7.5 cm程度の鉢に鉢上げ。その後、3～4か月後に10～12 cm鉢に鉢上げ。 鉢上げには、弱酸性の腐植質に富み、排水・保水の良好な用土を用いる。
整枝	鉢上げ後、摘心して分枝を促す。最終摘心は8月。
施肥	9月以降に窒素肥料が効いていると着蕾数が極端に減少するので注意する。
温度管理	12月(降霜)までは十分に寒さに当てる。1月から最低気温5℃に加温。 低温に十分に遭遇させないと花芽分化しない。加温開始時期が早かったり、加温温度が高いと蕾が枯死しやすい。

② 供試個体数

1区10株、2反復。
8株調査。

(2) 標準品種

ピンクパッション-1	<i>B. crenulata</i> 'Pink Passion-1'	(4ページ参照)
ピンクパッション-2	<i>B. crenulata</i> 'Pink Passion-2'	(4ページ参照)
リップスティック	<i>B. heterophylla</i> 'Lipstick'	
ピンクパンサー	<i>B. heterophylla</i> 'Pink Panther'	
チャンドレリ	<i>B. megastigma</i> 'Chandleri'	
ルテア	<i>B. megastigma</i> 'Lutea'	
ピンナータ	<i>B. pinnata</i>	