

平成15年度

種 苗 特 性 分 類 調 査 報 告 書

エ リ カ

本審査基準は重要な形質を定める最新の告示を反映
しておりません。

出願等にあたっては、最新の重要な形質をご確認く
ださい。(以下 HP の植物区分ごとの特性表参照。

→[https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/
sinsa_kijun_jp.html](https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/sinsa_kijun_jp.html))

なお、それぞれの重要な形質に対する定義等は変更
されております。



平成17年3月

独立行政法人種苗管理センター

目 次

1. 対象植物の範囲	1
2. 新規植物特性調査の概要	1
3. 特性審査基準(案)	
(1) 特性審査基準(案)	3
(2) 特性審査基準(案) 参考図	5
4. 特性検定のための栽培試験方法	7
5. 参考文献	7
6. 既存品種の特性	
既存品種の特性	8
7. 参考資料(文献調査一覧)	14
8. 参考写真	17

1, 対象植物の範囲

(1) エリカ属 (*Erica* L.) は、つつじ科 (*Ericaceae*) の常緑の低木または亜低木で、まれに小高木で約630種があり、その大部分は南アフリカからヨーロッパにかけて分布し、南アフリカ原産種(ケープヒース)約600種とヨーロッパ原産種(ヨーロッパヒース)約20種がある。また、エリカ属と同様ツツジ科の常緑低木で、カルーナ属、ダボエシア属をあわせて園芸的には「エリカ類」と呼ばれている。このうち、花の形態で筒状を有するエリカ属 (*Erica* L.) とダボエキア属 (*Daboecia cantabrica* L.) の2属を対象とする。

(2) 基準作成時に調査した種は、*Erica sparsa* Klotzsch ex Benth. 「アワユキエリカ」、*Erica formosa* 「スズランエリカ」、*Erica canaliculata* 及び *Erica* cv. である。

2, 新規植物特性調査の概要

(1) 現地調査

① 調査年月日

第1回 平成16年1月8日(木)～平成16年1月9日(金)

② 調査者名(全同行者・所属)

安田勝則	農林水産省生産局種苗課審査官
山口聡	愛媛大学農学部蔬菜花卉学研究室助教授
田中孝一郎	種苗管理センター品種特性審査官

③ 調査場所

田中勝 ビニールハウス内
〒441-3427 愛知県渥美郡田原町大字加治字欠田83番地6

④ 調査品種

Erica Klotzsch ex Sparsa benth. 品種名 「アワユキエリカ」

(2) 栽培調査

① 調査年月 平成平成16年1月19日～2月19日

② 調査者 田中孝一郎 種苗管理センター品種特性審査官

③ 調査場所 茨城県つくば市藤本2-2(種苗管理センター)

④ 調査品種

種 名	品 種 名
<i>Erica formosa</i> Thunb.	スズランエリカ
<i>Erica canaliculata</i> Andrews.	ジャノメエリカ
<i>Erica</i> cv.	カグヤヒメ コットンヒース
<i>Erica cerinthoides</i> P.J.Berews.	ファイヤーヒース
<i>Erica</i> × <i>hiemalis</i> cv.	クリスマスパレード Christmas Parade
<i>Erica colorans</i> Andrews.	ホワイティライト White Delight
<i>Erica</i> × <i>darleyensis</i> f. <i>albiflora</i> d.c.mcclint cv.	ダーリーエンシス(赤) ダーリーエンシス(白)

(3) 調査に当たっての所見及び問題点

①重要な形質について

特性審査基準(案)は、「その他の観賞樹」に基づき作成した。このうち次の形質は、調査項目として取り上げなかった。

ア 取り上げなかった形質

果実の形、果実の大きさ及び果実の色、発芽期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性、虫害抵抗性

イ 取り上げなかった理由

果実の形、果実の大きさ及び果実の色……………果実を利用する植物ではない。

発芽期……………定義や調査方法が未確立である。

落葉性……………定義や調査方法が未確立である。

耐寒性、耐暑性……………定義や調査方法が未確立である。

病害抵抗性虫害抵抗性 ……………定義や調査方法が未確立である。


3. 特性審査基準(案)

(1) 特性審査基準(案)

重要な形質	No.	形質	単位	定義	測定方法	状態または区分	階級	標準品種	備考 (参考値)
樹姿及び樹高	1	樹姿		株全体の形	観察	立型 中間型 開張型 垂生型	1 2 3 4	スズランエリカ、アワユキエリカ カグヤヒメ	
	2	樹高	cm	株の地際部から最頂部までの高さ (以降、調査は開花盛期時)	測定	低 中 高	3 5 7	スズランエリカ	
節間長	3	枝の長さ	cm	生育中庸な当年枝の長さ	測定	短 中 長	3 5 7	アワユキエリカ	
枝の太さ	4	枝の太さ	mm	生育中庸な当年枝の中間部の太さ	測定	細 中 太	3 5 7	スズランエリカ、アワユキエリカ	
枝の色	5	枝の色		生育中庸な当年枝の中間部の色	測定	JHSカラーチャートの色票番号による			
分枝性	6	分枝数	本	生育中庸な当年枝に発生する1次分枝の数	観察	少 中 多 極多	3 5 7 9	スズランエリカ ジャノメエリカ	20 35 50
	7	葉の付き方		葉の付き方 (当年枝の中央部で観察)	観察	互生 対生 3輪生 4輪生 その他	1 2 3 4 9	ダーリエシス(赤・白) アワユキエリカ ファイヤーヒース	枝の上部は、 実形の輪生のため基部～中部で判定)
葉形	8	葉形		株の平均的な大きさの葉の形 (自然体のままで観察)	観察	針形 線形 披針形 長楕円形 卵形 短 中 長	1 2 3 4 5 3 5 7	アワユキエリカ ジャノメエリカ ダーリエシス アワユキエリカ ジャノメエリカ	
	9	葉長	mm	葉の長さ	測定	短 中 長	3 5 7	アワユキエリカ ジャノメエリカ	
葉の大きさ	10	葉色		成葉表面の色	観察	淡緑 緑 濃緑	1 2 3	スズランエリカ アワユキエリカ	
葉の毛の多少	11	葉の毛の有無		葉の表面の毛の有無	観察	無 有	1 9	アワユキエリカ	
	12	葉の毛の生え方		葉の表面の毛の生え方	観察	全体 部分的	1 2	ファイヤーヒース(オレンジ)	
1花房又は1花そう当たりの花数	13	着花の位置		花の着生位置	観察	主枝及び1次分枝 葉腋	1 2 3	ファイヤーヒース アワユキエリカ	
	14	着花の部位		主枝及び分枝の着花部位	観察	先端 上半分 部分的 全体	1 2 3 4	ファイヤーヒース ホワイトデライト ジャノメエリカ	
	15	花房形成の有無		花房形成の有無	観察	無 有	1 9	アワユキエリカ ファイヤーヒース(オレンジ)	
	16	花房当たりの花数		花房当たりの花の数	観察	少 中 多	3 5 7	ファイヤーヒース	
	17	花そう形成の有無		花そう形成の有無	観察	無 有	1 9	アワユキエリカ	
	18	1花そう当たりの花数	個	1花そう当たりの花の数	観察	3個未満 3個 4個以上	1 2 3	ホワイトデライト アワユキエリカ	
	19	花の向き		開花時の花の向き	観察	上向き 斜上 横向き 斜下 下向き	1 2 3 4 5	ホワイトデライト、スズランエリカ ジャノメエリカ	
	20	花筒の形		開花時の花筒部の形 (萼及び花冠裂片を除く花筒全体の形)	観察	I型 II型 III型 IV型 V型 VI型 VII型	1 2 3 4 5 6 7	スズランエリカ ファイヤーヒース ジャノメエリカ ダーリエシス	
花形	21	花冠裂片の形		花冠裂片の形	観察	半円形 三角形 卵形 倒卵形 円形	1 2 3 4 5	アワユキエリカ ホワイトデライト	
	22	萼の形		萼裂片の形	観察	披針形 卵形 倒卵形 楕円形 菱形	1 2 3 4 5	スズランエリカ カグヤヒメ アワユキエリカ	
	23	花の縦径	mm	自然体での花冠の長さ	測定	短 中 長	3 5 7	カグヤヒメ	
花の大きさ	24	花の横径	mm	花冠裂片部の最大径	測定	狭 中 広	3 5 7	スズランエリカ ジャノメエリカ カグヤヒメ	

重要な 形質	No.	形 質 単位	定 義	測定方法	状態または区分	階 級	標 準 品 種	備 考 (参考値)
花 の 大 き さ	25	花筒の縦径	花筒部の最大の縦径	測定	極短 短 中 長 極長	1 3 5 7 9	アワユキエリカ カグヤヒメ	
	26	花筒の横径	花筒部の最大の横径	測定	狭 中 広	3 5 7	スズランエリカ カグヤヒメ ファイヤーヒース(オレンジ)	
	27	花冠裂片の開閉度	花冠先端の裂片の開閉の程度	観察	閉じる 開く 平開	1 2 3	アワユキエリカ スズランエリカ	
	28	花冠裂片の大きさ	花冠裂片の大きさ(縦×横)	調査	小 中 大	3 5 7	ジャノメエリカ	
	29	雌ずいの長さ	花冠の長さで雌ずいの長さとの比較	観察	短 同程度 長	3 5 7	スズランエリカ	
	30	雄ずいの長さ	花冠の長さで雄ずいの長さとの比較	観察	短 同程度 長	3 5 7	スズランエリカ ジャノメエリカ	
	31	花筒部の地色	花筒表面の地色	測定	JHSカラーチャートの 色票番号による			
花 色	32	花筒部の複色の有無	花筒部の複色の有無	観察	無 有	1 9	アワユキエリカ カグヤヒメ	
	33	花筒部の複色の色	花筒部の複色の色	測定	JHSカラーチャートの 色票番号による			
	34	花冠裂片の表面の地色	花冠裂片の表面の地色	測定	JHSカラーチャートの 色票番号による			
	35	花冠裂片の複色の有無	花冠裂片の複色の有無	観察	無 有	1 9	スズランエリカ	
	36	花冠裂片の腹色の色	花冠裂片の腹色の色	測定	JHSカラーチャートの 色票番号による			
	37	柱頭の色	柱頭の色	観察	白 淡緑 茶 紫	1 2 3 4	アワユキエリカ	
	38	萼の色	萼の表面の色	観察	白 淡ピンク 淡紫 淡緑 緑	1 2 3 4 5	スズランエリカ アワユキエリカ	
	39	花柄の色	花柄の基部の色	観察	白 淡緑 淡ピンク 橙 淡紫 紫	1 2 3 4 5 6	スズランエリカ カグヤヒメ アワユキエリカ ジャノメエリカ	
	40	雌雄ずいの色	開花前の葯の色	観察	白 黄 茶 紫赤	1 2 3 4	アワユキエリカ	
	41	苞の着生位置	苞の着生位置 (第1苞の着生位置)	観察 図7	基部に着く 中央部に着く 萼に着く 全体に着く	1 2 3 4	アワユキエリカ ファイヤーヒース ダーリエンシス(白)	
花柄の 長さ	42	花柄長	花柄の長さ	測定	無又は極微 短 中 長 極長	1 3 5 7 9	ファイヤーヒース(オレンジ) アワユキエリカ	
花の香 り	43	花の香り	開花時の花の香り	観察	無 有	1 9	アワユキエリカ	
開 花 期	44	開花期	開花する時期	観察	冬～春咲き種 夏～秋咲き 不定期咲き	1 2 3		
	45	開花の早晩	開花の早晩 (供試株数の半数以上が開花した時期)	観察	早 中 晩	3 5 7		

(2) 特性審査基準(案) 参考図




1. 立型
erect

2. 中間型
semi erect

3. 開張型
spreading

4. 叢生型
bushy

図1 1. 樹姿
fig 1 plant : growth habite




1. 互生
opposite

2. 対生
alternote

3. 3輪生
whorled

4. 4輪生

図2 7. 葉の付き方
fig2 leaf attached



1. 針形
subulate

2. 線形
linear

3. 披針形
lanceolate

4. 長橢円形
oblong

5. 卵形
ovate

図3 8. 葉形
fig 3 leaf shape




図4 20. 花筒の形
fig 4 flower tube of shape



図5 21. 花冠裂片の形
fig 5 petal of shape



図6 22. 萼の形
fig 6 calyx: shape




図7 41. 苞の着生位置
fig 7 bract at arrives position

4 特性調査のための栽培方法

(1)栽培方法

- ①作 型 施設・雨除け鉢栽培。
- ②供 試 種 苗 天挿しの発根2年生苗(無摘心株)
- ③入 手 時 期 9～10月 (矮化剤未使用苗)。
- ④水 管 理 乾燥に弱く、過湿に弱いので、普段の水やりは土の表面が乾いてからたっぷりと与える。
夏場は、暑さで生育が衰えるので水やりは普段よりも少なめに土の表面が乾いてから2日程度の間を置きたっぷりと水を与える。
- ⑤施 肥 1月、8月に1回油粕と骨粉を混ぜたものを株元に与えるか、5～10月の間に液肥を月に1回程度与える。但し、液肥は7月下旬～8月上旬の間は根を傷めるので施肥を中止する。
- ⑥その他管理 無摘心とする。
エリカは弱酸性の土壌を好む為、3月の萌芽時期に株元をピートモスで覆う。
夏期の日射量の多い時期は30%程度の遮光を行う。
- ⑦病虫害対策 病害は特に無く、害虫はカイガラムシとダニに弱いので注意する。

(2)供試個体数 15株

(3)栽培調査上の留意事項

- ①葉の形状は、外側に反る品種が多いが自然体のままで葉形を観察する。

5, 参考文献

- (1) 加藤憲市・(1994)園芸植物大事典第1巻 P 353-360 小学館
- (2) Anthony hulixey(1997)Erica. The Royal Horticultural Society Dictionary of gardening P 435-436 Macmillan referende limited, The stockton press
- (3) 英国王立園芸協会監修 (2003年) A-Z 園芸植物百科辞典 P406-409 誠文堂新光社

6. 既存品種の特性

No.	形 質	単位	アワユキエリカ	スズランエリカ	ジャノメエリカ	カグヤヒメ	ファイヤーヒース (オレンジ)
1	樹姿		1 立性	1 立性	2 中間型	3 開帳性	2 中間型
2	樹高	cm	5 中 35	7 高 54	6 やや高 45	5 中 32	5 中 38
3	枝の長さ	mm	5 中 30	5 中 40	5 中 31	5 中 23	5 中 26
4	枝の太さ	mm	4 やや細 1.2	5 中 2.5	5 中 2.5	5 中 1.8	5 中 1.8
5	枝の色		1918 浅灰茶	1917 淡茶	1917 淡茶	1612 浅茶	1612 浅茶
6	分枝数		7 多 47	3 中 20	7 多 50	2 かなり少 3	2 かなり少 3
7	葉の付き方		3 3輪生	3 3輪生	3 3輪生	3 3輪生	4 4輪生
8	葉形		2 線形	2 線形	4 長楕円形	2 線形	2 線形
9	葉長	mm	3 短 2.5	3 短 2	5 中 6	5 中 6	5 中 6
10	葉色		3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑
11	葉の毛の有無		1 無	1 無	1 無	1 無	9 有
12	葉の毛の生え方						2 部分的
13	着花の位置		2	2	2	2	1
14	着花の部位		1	1	4	1	1
15	花房形成の有無		1 無	1 無	1 無	9 有	9 有
16	花房当たりの花数	個				3 少 4	5 多 1~16
17	花そう形成の有無		9 有	9 有	9 有	1 無	1 無
18	1花そう当たりの花数	個	2 3個 3	1 3個以下 1	2 3個 3		
19	花の向き		3 横向き	3 横向き	4 斜下	4 斜下	4 斜下
20	花筒の形		5 V型	3 III型	5 V型	3 III型	4 IV型
21	花冠裂片の形		1 半円形	1 半円形	1 半円形	1 半円形	1 半円形
22	萼の形		5 菱形	1 被針形	1 被針形	3 倒卵形	1 被針形
23	花の縦径	mm	1 極短 2.3	1 極短 2.3	2 かなり短 3.8	3 短 5.8	7 かなり長 40
24	花の横径	mm	1 極狭 1.5	1 狭 1.7	3 中 3.9	5 広 6.5	5 広 6
25	花筒の縦径	mm	1 極短 1.8	2 かなり短 3	2 かなり短 2.2	3 短 5	8 極長 35
26	花筒の横径	mm	1 極狭 2.1	3 狭 4.3	3 狭 3.9	5 中 6.5	7 広 7
27	花冠の裂片の開閉度		2 開く	3 平開	2 開く	3 平開	3 平開
28	花冠裂片の大きさ		2 かなり小	3 小	3 小	4 やや小	5 中
29	雌ずいの長さ		7 長	3 短	7 長	3 短	5 同程度
30	雄ずいの長さ		5 同程度	3 短	7 長	3 短	3 短
31	花筒部の地色		8203	01 白	白→鮮紫ピンク(移行) 01→8904	8902 淡紫ピンク	0706 鮮橙赤 (濃淡有り)
32	花筒部の複色の有無		1 無	1 無	1 無	9 有	1 無
33	花筒部の複色の色		1 無	1 無	1 無	— 9202 淡紫ピンク	1 無
34	花冠裂片の表面の地色		9713 濃紫ピンク	01 白	01白→8904鮮紫 ピンク	9202 淡紫ピンク	0706 鮮橙赤
35	花冠裂片の複色の有無		1 無	1 無	1 無	1 無	1 無

No.	形質 単位	アワユキエリカ	スズランエリカ	ジャノメエリカ	カグヤヒメ	ファイヤーヒース (オレンジ)
36	花冠裂片の複色の色					
37	柱頭の色	4 紫	4 紫	4 紫	4 紫	4 紫
38	萼の色	3 淡ピンク 8903 紫ピンク	1 白 01 白	1 白 01 白	3 淡ピンク	4 橙 0706 鮮橙赤
39	花柄の色	5 淡紫 9714 紫赤	2 淡緑 3702 隠緑	6 紫 9714 紫赤	3 淡ピンク 0101 ピンク白	
40	雄ずいの色	4 紫赤	4 紫赤	4 紫赤	4 紫赤	4 紫赤
41	苞の着生位置	2 中央部に着く	2 中央部に着く	2 中央部に着く	2 中央部に着く	3 萼に着く
42	花柄長 mm	3 短 2.1	3 短 3.5	3 短 3.5	4 やや短 5	1 無又は極微
43	花の香り	9 有	1 無	1 無	1 無	1 無
44	開花期					
45	開花の早晩					

No.	形 質 単位	ファイヤーヒース (ピンク)	コットンヒース	ホワイトデライト	ダーリーエンシス (赤)	ダーリーエンシス (白)
1	樹姿	2 中間型	2 中間型	1 立性	3 開帳性	3 開帳性
2	樹高 cm	5 中 30	6 やや高 44	7 高 56	3 低 17	3 低 15
3	枝の長さ mm	5 中 26	5 中 2	6 やや長 35	5 中 22	5 中 25
4	枝の太さ mm	5 中 1.8	5 中 2	5 中 2	3 細 1	3 細 1
5	枝の色	1612 浅茶	1614 茶	1612 浅茶	1917 淡茶	1915 浅黄茶
6	分枝数	2 かなり少 3	9 極多 106	8 極多 99	1 無 0	1 無 0
7	葉の付き方	4 4輪生	3 3輪生	4 4輪生	4 4輪生	4 4輪生
8	葉形	2 線形	2 線形	2 線形	2 線形	2 線形
9	葉長 mm	5 中 6	3 短 3	3 短 3	5 中 7	5 中 7
10	葉色	3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑
11	葉の毛の有無	1 無	1 無	9 有 (刺状)	1 無	1 無
12	毛の生え方					
13	着花の位置	1	2	2	2	2
14	着花の部位	1	4	2	4	4
15	花房形成の有無	9 有	1 無	1 無	1 無	1 無
16	花房当たりの花数 個	5 多 6~14				
17	花そう形成の有無	1 無	9 有	9 有	9 有	9 有
18	1花そう当たりの花数 個		2 3個 3	1 3個未満 2	1 3個未満 1	1 3個未満 1
19	花の向き	4 斜下	2 斜上	3 横向き	4 斜下	4 斜下
20	花筒の形	4 IV型	3 III型	2 II型	6 VI型	6 VI型
21	花冠裂片の形	1 半円形	1 半円形	2 三角形	2 三角形	2 三角形
22	萼の形	1 被針形	1 被針形	1 被針形	1 被針形	1 被針形
23	花の縦径 mm	7 かなり長 35	1 極短 2	1 極短 1.8	3 短 5	3 短 6
24	花の横径 mm	5 中 6	3 狭 2	3 狭 4	3 狭 2	3 狭 2
25	花筒の縦径 mm	8 極長 35	1 極短 1	1 極短 1.6	2 かなり短 4	5 中 5
26	花筒の横径 mm	7 大 7	3 狭 2	3 狭 3	5 中 4	3 狭 3
27	花冠の裂片の開閉度	3 平開	1 閉じる	2 開く	2 開く	2 開く
28	花冠裂片の大きさ	5 中	3 小	4 やや小	4 やや小	4 やや小
29	雌薬の長さ	3 短	5 同程度	5 同程度	7 長	7 長
30	雄薬の長さ	3 短	3 短	3 短	7 長	7 長
31	花筒部の地色	9702 淡紫ピンク	01 白	8902 淡紫ピンク	9512 濃紫ピンク	01 白
32	花筒部の複色の有無	1 無	1 無	9 有	1 無	1 無
33	花筒部の複色の色			8904 鮮紫ピンク		
34	花冠裂片の表面の地色	0105 鮮ピンク	01 白	8904 鮮紫ピンク	9512 濃紫ピンク	01 白
35	花冠裂片の複色の有無	1 無	1 無	1 無	1 無	1 無

No.	形 質 単位	ファイヤーヒース (ピンク)	コットンヒース	ホワイトデライト	ダーリーエンシス (赤)	ダーリーエンシス (白)
36	花冠裂片の複色の色					
37	柱頭の色	4 紫	4 紫	4 紫	4 紫	2 淡緑
38	萼の色	3 淡ピンク 0105 鮮ピンク	2 淡緑 3507濃黄緑	2 淡緑 3507濃黄緑	3 紫 9512濃紫ピンク	1 白 01白
39	花柄の色	—	3507濃黄緑	9513隠赤紫	9513隠赤紫	2907濃緑黄
40	雄藥の色	4 紫赤	4 紫赤	4 紫赤	4 紫赤	3 茶
41	苞の着生位置	3 萼に着く	2 中央部に着く	2 中央部に着く	2 中央部に着く	4 全体に着く
42	花柄長 mm	1 無又は極微 0	3 短 2	3 短 2	3 短 3	4 やや短 4
43	花の香り	1 無	1 無	1 無	1 無	1 無
44	開花期					
45	開花の早晩					

7. 参考資料(文献調査一覧)

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
<i>E. arborea</i> L.	直立	低木(6~7m×3m)	針状・暗緑、下面に溝	花形は釣鐘状、香り有、花色は灰色がかった白色、花長が4cm、20~40cmの総状花序	ヨーロッパ南西部 地中海沿岸 アフリカ北部 東アフリカ中央部山地
Albert's Gold 異名 <i>E. ×veitchii</i> 'Albert's Gold' ver. <i>Alpina</i> (変種アルピナ)		2m×80cm	金色	開花しない	
				花色は白、花形は円筒状、総状花序	
Estrella Gold		高さ1.2×幅75cm	ライム緑色、先端黄色	花色は白色	
<i>E. aristata</i> Andr L.		草丈60cm	5~6mm、先端曲、4輪生	花色は白と赤、粘着性有り、ほうの長さ6~8mm、ガクは苞より僅かに長く尖る、花冠は筒状、花の長さ2.5cm、花筒の中部で狭くなり先端は4裂平開咲き、花冠の基部と上部は濃紅色で中部は白色	ケープ地方
<i>E. australis</i> L.	直立	低木(2m×1m)	線形で長さ5mm、暗緑色、下面溝	花形は釣鐘状、花色は紫ピンク~紫紅色、花の長さ9mm、葯僅かに突出、散形花序に似た花序、花序の長さ20cm、開花は3~5月	ポルトガル、スペイン西部、 タンジール
'Mr. Robert'				花色は白色	
'Riverslea'				花色は藤ピンク	
<i>E. baccans</i>	直立	低木(高さ2.5m、幅1m)	海緑色(冬から春は輪生)	花序の長さは2.5cm、花はそれぞれ4個の球形、花色は濃ピンク、花径は6mm、くびれた喉部と竜骨状の濃ピンクのがく片	南アフリカ (西ケープ州)
<i>E. baueri</i> Andr. 異名 <i>E. bowiana</i> lodd.	直立・分枝無	高さ1m	長楕円形、長さ5mm、灰緑色	総状花序、非相称の長いつぼ形、花の長さ15~20mm、花色は桃色又は白、春開花	ケープ地方
<i>E. blandfordia</i> Andr	直立	高さ90cm		花形は壺形又は鐘形、長さ6~7mm、花色は緑色を帯びた黄色、花期は春	ケープ地方
<i>E. blonna</i>	直立	低木(1.2m、幅80cm)	線状被針形、中緑色、下面に溝	花は小枝の先に3個、花形は壺形~卵状円錐形、花は粘着性の明橙色、花の長さ0.9~1.5cm、緑色喉部で裂片のある口部でつままる。花は腋生	南アフリカ (西ケープ州)
<i>E. canaliculata</i> Andr (誤って別種の <i>E. melanthera</i> の名で広く栽培)	直立	低木(2m、幅1.2m)	細い中緑色、下面淡緑、細毛有り	花は前年枝の葉腋に1~2個着花、円錐花序に輪生、花序の長さは30cm、花はカップ形、花色は淡ピンク~白、花径は4mm、白い顎片と暗茶色の葯、開花は11月から春にかけて	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
'Red queen'				花色は濃桃色の枝変わり	
<i>E. carnea</i> L.	ほふく性	低木(20~25cm×55cm)	線状、暗緑色	総状花序の片側のみ花をつける、花序の長さ7cm、花形は壺形、花色は紫ピンク色、花の長さ6~9mm	アルプスアペニン等の山地
'Adrienne Duncan'		幅35cm	銅色	開花は、真冬から春中頃	
'Altadene'		幅35cm	黄色、先端ピンク色と銅色	花色は、藤ピンクから紫ピンク	
'Ann Sparkes'		幅25cm	暗い金色、春には先端が銅色	花色はローズピンクから紫ピンク	
'Barry Sellers'		幅30cm	黄色、冬はオレンジ色	花色は、濃ピンクから鮮紅色	
'Challenger'		15cm~45cm	中緑色から濃緑色	花色は、鮮紅色	
'December red'		15cm~45cm	中緑色から濃緑色	花色は、ピンクから濃ピンクへ	
'Eileen porter'		高さ幅20cm	中緑色から濃緑色	花色は、鮮紅色、ガクはクリーム色	
'Foxhollow'		幅40cm	黄色、先端銅色、厳寒期はオレンジ	花色は、紫ピンク、	
'Golden starlet'		幅40cm	ライム緑色、夏は輝黄色	花色は、白	
'King George'		幅25cm	中緑色から濃緑色	花色は、濃ピンク、初冬開花	
'lesley Sparkes'		幅25cm	中緑色、春には先端がサーモンピン		
'March Seedling'		幅50cm	中緑色から濃緑色	花色は、紫ピンク、	
'Myretoun Ruby'		15cm~45cm	中緑色から濃緑色	花色は、ピンクから藤紫へ	
'Pink Spangles'			鮮緑色	花色はピンク	
'Sunshine Rambler'			鮮黄色		

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
'Snow Queen'				花色は、白	
'Spring Pink'		幅40cm	中緑色から濃緑色	花色は、ピンクから濃ピンクへ	
'Springwood white'		15cm～45cm	明緑色	花色は白	
'Urvillii'		生育旺盛			
'Vivellii' 参照					
'Vivellii'		幅35cm	銅色	花色は、紫ピンクから鮮紅色へ	
'Westwood Yellow'		幅30cm	中緑色から濃緑色	花色は、シェルピンク色	
<i>E. cerintoides</i> L.	直立低木 分枝しない	1.5×1.5m	線状、灰緑色、色々な軟毛	花は枝の頂部にのみ着花。花形は筒状、花色は明赤色が普通で時折ピンク、白。花の長さ2～3.5cm、喉部は僅かにつぼまり、基部は膨らむ、花の直径2～3.5cmの散形花序、開花は冬から春、まれに周年開花する。	南アフリカ、スワジランド
<i>E. chamissonis</i> Klotzsch ex Benth.					
<i>E. ciliaris</i> L.	横に広がる低木	高さ35～60cm、幅50cm	卵形から披針形、腺有り、上面は灰緑色から濃緑色、下面は白	開花は盛夏～秋の中頃まで開花、線状花序7cm、茎の先端に着花。花形は壺形、花色は藤ピンク、花の長さは1cm、開口部がつぼまる	ヨーロッパ
'Aurea'		高さ25cm	淡黄色、冬季は濃色		
'Coefe Castle'		高さ22cm、幅35cm	中緑色、冬は銅色		
'David McClintock'		40×45cm		花の基部は白、開口部が紫色がかった桃色	
'Maweana'				花は大輪、花色が濃紅色	
'Stoborough'				花色は白、花は大輪	
'White wing'		15×45cm		花色は白	
<i>E. cinerea</i> L.	コンパクトな低木		線状形、強く反転、暗緑色	枝の先に4～8個あるいは多数が穂状に着花、花径は壺形、花色は白・ピンク色又は紫、花の長さは最大7mm、開花は夏～初秋、線状花序の長さ5cm	西ヨーロッパ
'Alba Major'		60cm×80cm 30cm×55cm	中緑色	花色は白	
'C. D. Eason'		25cm×50cm		花色は、鮮紅色、	
'Contrast'		50cm×45cm		花色は、赤	
'Eden Valley'		20cm×50cm	中緑色	花色は、濃紫ピンクで基部が白	
'Fiddle's Gold'		25cm×45cm	黄金色から赤色へ移行	花色は、藤ピンク	
'Foxhollow Mahogany'		20cm×50cm		花色は、ルビー赤	
'Glencairn'		30cm×50cm	濃緑色で先端は赤	花色は、鮮紅色	
'Golden drops'			黄色、冬紅葉		
'Golden hue'		35cm×70cm	薄い黄色、冬場は先端オレンジ色	花色は、紫水晶色	
'Hookstone White'		35cm×65cm	上面は中緑色	花色は白色、花序の長さ7～12cm、	
'Janet'		20cm×30cm	明緑色	花色は、シェルピンク色	
'John Eason'			黄色、冬紅葉		
'Knaphill Pink'				花色は、桃色	
'Lime Soda'		35cm×55cm	ライム緑色	花色は、青紫ピンク	
'Pentreath'		30cm×55cm		花色は、赤	
'Pink Ice' 'Pink Lace' 参照	わい性	20cm×35cm	新緑色、冬季と幼時期は銅色	花色は、ローズピンク色	

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
'Puple Beauty'		30cm × 55cm		花色は、濃ピンクがかった紫色	
'Rock Pool'		15cm × 30cm	黄金色、冬季は橙赤色に変化	花序は短い総花序、花序の長さ3cm、花色は藤紫色	
'Romiley'		25cm × 55cm		花色は、鮮紅色	
'Rosabella'		30cm × 60cm		花色は、鮮紅色、花序の長さは7～10cm	
'Rosea'			黄色	花色は、濃橙色	
'Windleblebrooke'		15cm × 45cm	黄金色、冬季橙赤色に変化		
'Yvonne'		35cm × 45cm		花色は、サーモンピンク。花冠は深く切れ込む	
<i>E. colorans</i> Andr	直立低木	高さ70cm		短枝の先端に横向きに着花、全体が長い花穂、花冠は細い筒状、花の長さ15～20mm、喉部はくびれる、花色は白～淡桃色、春に開花	カレンド
<i>E. cruenta</i>	直立	1m × 70cm	線状、濃緑色	総状花序は頂生し輪生する。花径は管状、花色は血赤色、花序の長さ2～2.5cm、開花は春～初	南アフリカ(西ケープ州)
<i>E. curviflora</i>	直立	1.5m × 1m	線状から線状被針形、中緑色	花形は管状形の有毛、花色は赤色、橙、黄、ピンク。花の長さは2～4cm。開口部が朝顔形に開く単性花で稀に3・花の頂生クラスターを作る。1年中開花するが冬から春にかけてが多い。	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
<i>E. × darleyensis</i> Bean (<i>E. Carnea</i> × <i>E. Erigena</i>)	蔓性低木	60cm × 75cm	被針形で中緑色	晩夏から早春にかけて10cmの総状花序を作る、花形は壺形～円筒形、花色は白～ローズピンク、花の長さ5mm	
'Archie graham'		30cm × 60cm		花色はピンク～紫ピンク	
'Arthur Jonson'				花色は淡桃色	
'Darley Dale'		幅55cm	先端クリーム色	花色はシェルピンク、後に濃色へ移行する。	
'Darleyensis', 'Pink perfection', <i>E. Carnea</i> 'Mr Reeves'					
'Darleyensis'		30cm × 60cm			
'Darley Dale' 参照					
'George Rendall'				花色は鮮桃色	
'Ghost Hills'		幅80cm	明淡緑色、春に先端クリーム色		
'Jack H. Brummage'		30cm × 60cm	黄橙色	花色は紫ピンク	
'Jenny porter'			春に先端クリーム色	花色はピンクがかった白	
'J. W. Potter'		25cm × 40cm	濃緑、春は先端赤からクリーム色	花色は紫ピンク	
'Kramer's Rote'			銅緑色	花色は鮮紅色	
'Kramer's Red'					
'Molten Silver'					
'Siberschmelze' 参照					
'Siberschmelze'		35cm × 80cm	春に先端がクリーム色から濃緑、冬は赤みがかかる	花色は白色	
異名 'Molten Silver', 'Silver Beads'					
'Silver Beads'					
'Siberschmelze' 参照					
'White Glow'		25cm × 50cm		花色は白色	
'White Gown', ' <i>E. Carnea</i> 'White glow'					
'White Gown'					
'White Glow' 参照					
'White Perfection'		40cm × 70cm	明緑色	花色は純白	
<i>E. Erigena</i>	直立・低木 良く分枝する	2.5m × 1m	線状(4～8mm)、濃緑	枝先に着花する。開花は冬～春。花形は壺形(5～6mm)～円筒形、萼は暗赤色で花冠より長い、花は甘い香り	アイルランド フランス南西部
'Alba'	矮生			花色は白	
'Brightness'	矮生	高さ・幅50cm	冬は濃緑色、夏期は灰白色がかった緑	開花は春、花色は藤ピンク色	スペイン ポルトガル
'Golden Lady'		30cm × 40cm	黄金色		タンジール

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
'Ilish Lemon' E. x Darleyensis 'Jack H. Brummage' 参照					
'Jack H. Brummage' E. x Darleyensis 'Jack H. Brummage' 参照					
'Mediterrance Sperda' 'Superba' 参照					
'Superba' 異名 'Mediterrance Sperda'		1.8m × 50cm		花色はシェルビク色の後に濃色に移行。春中盤から晩春に開花。	
'W. T. Rackliff'		75cm × 55cm	濃緑色	開花は春、花色は白	
E. formosa Thunb.	低木、多分枝	高さ80cm	楕円形ないし長楕円形、長さ3~4mm	花は小枝の先端に3個着花。花は下向きに咲く、花筒の腹に種のある扁平な蓋形でドウダンツツジに似る。花は長さ5mm、花色は白、開花は春。	南アフリカ(ケープ南部)
E. foliacea Andr.	直立 良く分枝	草丈90cm	針状・短葉(6~10mm)、3稜形	花は小枝の先端(4~6個)、花長(1.5cm)、短い花柄、短いホウ、花色は緑色帯びた淡黄色。花形は長い筒型、花の先端の閉鎖部は極短、春に開花	ケープ
E. grandiflora L. f.	直立低木	高さ1.5m	線状先端形、経てに条線	花は短花柄にホウとガクが付く、花冠の長さ2.5cm、花形は筒状、花の先端4裂、花の裂片は三角の鋭頭、花色は橙赤(変異有り)、黒の筋が目立つ	ケープ
E. glandulosa	低木	60cm × 90cm	明淡緑色、線状先端に腹のある毛が葉や茎にある	花は管状花で長さ4~10mm、花色はピンク色、花数は2~5個、直径1.5cmの花房形成	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
E. gracilis. J. C. Wendl.	直立・低木	長さ・幅50cm	線状、深灰緑色	花は小枝の先端に着花、開花は秋~春、1箇所に4花輪生、花序の長さは1cm、花形は壺形、花色は紅・桃・白の3色、花の長は4mm	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
E. x Biemalis 園芸品種	直立・低木	長さ・幅60cm	線状、明淡緑色	開花は晩秋から冬、花形は管状で長さ1.5cm、花色は白味がかるピンク色、総状花序10cm	
E. halicacaba L.	直立・低木 良く分枝	高さ2m	針状葉長さ1cm	花は茎頂に1~3個、ホウは6mmで卵条鋭頭、舟弁状、がく片はホウより少し大きく1cm、花冠は1.5~2cm、4個密生し4面体となり先尖り、ホウ・がく・か花色は花冠共に淡黄白色で淡褐	ケープ半島
E. hirtiflora Curtis	直立	高さ50cm	長楕円形・軟毛密生	小枝の先に4個ずつ着花、花形は壺形、花色は桃色、開花は春	
E. hybrida 'Irish Lemon' E. stuartii 'Irish Lemon' 参照	開張性の低木	高さ50cm	茎葉に軟毛密生	花は小枝の先に多数着花、花形は広鐘形、花色は明桃色、	ポートエリザベスを中心に
E. holosericea Salisb.	低木	高さ1m		花は短枝の先端に着花、花の向きは下垂、花は鐘形、花の長さ7~10mm、がくは大きく花冠の半分を覆う、花色は濃バラ色、がくは淡桃色	カレドニ、プレスタドル地域
E. infundibuliformis Andr.	直立・低木	高さ90cm		斜上の短枝先端に数個着花、花筒部2cm前後、裂片呈型に閉鎖、花色は桃~白	ケープ北東部
E. lateralis Willd.	直立性	高さ90cm	先形長さ1cm、光沢有り4輪生	花色は桃色(8mm程度)、花形は壺形、花は茎頂または側枝の先端、多数の花が側生するように見え全体が大きな鐘状に見える	ケープのセレスからカレドニまで
E. lusitanica K. Rudolphi 異名 E. codonodes Lindl. (英名: Portuguese heath)	直立・低木	3m × 1m 大きな羽状の枝 若い枝に毛有り	長さ8mm、裏面に浅い溝 革質、線状、中緑色、	開花は冬~春、花は長さ5mmの管状の釣鐘形、花色は白、蕾はピンク色、枝分かれした総状花序、花に芳香有り、萼と花柱は濃橙色	フランス南西部、ポルトガル、スペイン西部
'George Hunt'			茎が明黄色、日除け要		
E. mackiana Bab. 異名: E. Crawfordii, E. Mackaii, E. Mackvana (英名: Mackary's heath)	ややほふく性から直立低木	50cm × 70cm	長楕円状被針形で先端に毛、花面は白	開花は夏~初秋、花の直径1cmの散形花序、花形は壺形、花色は明ピンク、花の長さ7mm、開口部はつぼまる	アイルランド、スペイン
'Dr. Ronald Gray' 異名: E. Tetralix 'Dr. Ronald Gray'		15cm × 35cm	無毛で明緑色	花色は純白	
'Lowsoniana'	矮生			花色は桃色、小さい花	
'Plena' 異名: E. Tetralix 'Plena'		15cm × 40cm		花形は八重、花色は鮮紅色、	
'Shining Light'		25cm × 55cm	灰緑色	花は長さ8mm、花色は白花	
E. mammosa	直立・低木	1.5m × 2m	線状から被針形・濃緑色	開花は春~夏、花は管状、花色は暗赤、橙赤、ピンク、緑、白、花長は1.5~5cm、枝分かれした頂生の総状花序7cm	地中海沿岸東部
E. manipuliiflora 異名、園芸名 E. Verticillata (英名: Whorled heath) subsp. Atbura 'Heaven Scent'	直立からほふく性の低木	1m × 1.1m 幅60cm	線状、先端鋭くとがり中緑色	開花は晩夏~秋、不規則長さ10cmの総状花序、花形は円筒形から釣鐘形、花色はローズピンク色、花の長さ4mm 花の香り有、花色は濃ピンク色、スプレー状、	南アフリカ
E. nana Salisb.	わい性、ほふく ときおり直立	高さ20~25cmまれに50cm 幅1m	線状、中緑色、	E. Foliaceaより長く花冠頂部もひどくびれない長筒形、花は黒色の萼と柱頭が見える、秋に開花、3花輪生、花序は直径2cm、裂片広がり先端緑色	
E. pageana	直立低木	60 × 30cm	線状、中緑色、	開花は晩	
E. pastorsonia Ander. (英名: Mealie heath)	直立・低木 分枝少ない	90cm × 60cm	線状で長さ1cm、中緑色	花は短枝先端、花は横向きに開花、晩冬と早春開花、荒い穂状、長さ8cmの総状花序、花色は濃黄色、花形は管状、長さ1.5~2cm、4花が集合し花序を作る	

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
<i>E. perspicua</i> (英名: Prince of Wales heath)	低木	2m × 1m	灰緑色、線状	花は半透明の管状花、長さ1~2cm、白、ピンクと白、赤と白、紫と白、又は赤、穂状に近い総状花序8cm、開花は初秋~冬	南アフリカ (西ケープ州)
<i>E. peyzia</i>	多分枝、低木		線状、中緑色	春に5cmの総状花序	
<i>E. quadrangularis</i>	低木	60cm × 45cm	線状、中緑色	開花は晩冬~夏、花形はカップ形、長さ2~3mmの花が4花、長さ2cmの花序が輪生、花色は白~ピンクが濃赤に移行	南アフリカ (西ケープ州)
<i>E. plukenetii</i> L.	直立・低木	高さ60cm	細い線形、密生	花は茎上部の葉腋に着花、下垂、花冠基部が膨らんだ筒型(長さ1.5~2cm)、花色は桃色、紫又はオレンジ色を帯びるものや白色も有る。花は、雌・雄しべが花冠から突出する特異な形	ナマカランド西北部、からモセールバイ
<i>E. x Praegeri</i> Ostenf. 異名: <i>E. x Stuartii</i> Linton, <i>E. Tetralix</i> var.	矮生20cm	高さ20cm			
'Connemara'				夏の後半開花、花色は淡桃色	イギリス(コーンウォール)
<i>E. regia</i> Bartl.	低木、斜上		線形長さ10mm	花形は筒型で先が太、喉部くびれ有り太、花色は紅色を基本	
変種 <i>Var. Variegata</i> L. Bolus(園芸種)				花色は花冠の先半分が鮮紅色、基部は白色	
<i>E. scoparia</i>	直立・低木	2m × 1m	線状、濃緑色	花は小さい釣鐘形で緑がかかった褐色、花長最大3mm、穂状に近い総状花序6cm。	フランス南西部、スペイン、 アフリカ北部、カナリー諸島
'Minima'		25cm × 80cm		花色は褐色がかかった緑の花が少数開花。	
<i>E. sessiliflora</i> L. f.	直立・低木 分枝少ない	2m × 1m	線状(5to15mm)、直立、中緑色	花は茎の頂部近く横向きに着生、穂状花序に似た長さ6cmの総状花序、やや下向きに湾曲した筒形の緑がかかった白色、がく裂片は多肉で花後肥大して果実を包む、長さ1.5~3cm、晩夏から春にかけて開花、ガク片は最後に赤くなり密な花房を作り数年間枝に付着する。	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
<i>E. shannonae</i> Andr.	低木、分枝少ない	高さ50cm	線形長さ1.5mm、先尖る	散形花序、花は茎頂に着花、花冠の長さ2.5~3cm、花は壺形で喉部に向かい狭まり先端4裂、花冠裂片は星型に開開、がくは紫紅、花色は光沢のある白で次第に桃色帯びる、花の表面は粘る	南アフリカ
<i>E. sitchensis</i> Klotzsch	直立・低木 小枝が多く、枝に毛が付く	高さ60cm	針状で先が尖る、4輪生	花は小さい、がくは被針形の長さ3mm、花冠は筒状、先端近くがくびれる。花色は紅色で先端が白、白花もある、乾燥に強く花糸が曲がる、小枝の先端に3~4花で大量に着く。	南アフリカ(東ケープ州)
<i>E. sparsa</i> Lodd.	低木、細かく分枝	高さ50cm		花は小枝	ケープからポート・エリザベス
<i>E. speciosa</i>	生育旺盛、直立多分枝、低木	1.2m × 1m	線状、中緑色	穂状花序に似た総状花序(長さ9cm)、花色はピンク色、基部は赤色、長さ2~3cm、白、緑又は黄色の裂片を持つ、3花輪生しまれに単生、開花は早春~初夏	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
<i>E. stricta</i> <i>E. Terminalis</i> 参照					
<i>E. x Stuartii</i> (種間雑種 <i>E. mackaiana</i> × <i>teralix</i>) 異名 <i>E. x praegeri</i> 'Irish lemon' 異名: <i>E. Erigens</i> 'Irish lemon', <i>E. Hybrida</i> 'Irish lemon'	直立・低木	25cm × 50cm	長楕円、灰緑色	花色はピンク色で壺形、開花は夏~秋、散形花序、花の長さ8mm、開口部がつぼまる	アイルランド(ドネガル、コンネマル)
<i>E. subdivaricata</i>	横広がりの低木	50~80cm × 1m	線状、有毛、中緑色	開花は晩春~夏、花色は藤紫 花は4輪生、カップ形、蜂蜜の香り、白花、まれにピンク色を帯びる、長さ4mm、開花は夏から晩秋	南アフリカ (ケープ西部)
<i>E. taxifolia</i> Dryand.	低木、直立性	高さ60cm	広線形でいちい属の葉に似る	花は枝の先端に数個から十数個の散房花序、花の形は壺形、長さ6~7mm、がく裂片が発達し花冠の3分の2の長さ、がく裂片・花冠とも桃色、夏に開花	ケープ
<i>E. terminalis</i> Salisd	直立・低木 多分枝	高さ3m・幅1m	線状、濃緑色の光沢有り	花は枝の先端に長さ7mmの壺形、花色は藤ピンク、散形花序、開花は初夏から夏の中頃、開花後しおれた花は冬中小豆色を呈す	ヨーロッパ、地中海沿岸南西部
<i>E. tetralix</i> L.	わい性、横張り、低木	30cm × 50cm	被針形から線状長楕円形、腺有り、灰緑色裏面は白、十字4輪生	開花は夏の中頃から秋の中頃まで、花は枝先に4~10個以上、花色は薄いピンク色、長さ9mm、開口部がつぼまる壺形の6mm散形花序、花枝は直立し軟毛、	ヨーロッパ北部から西部
'Alba mollis'		20cm × 30cm	銀灰色	花色は純白	
'Con underwood'		高さ25cm		花色は鮮紅色	
'Dr. Ronald Gray' <i>E. mackaiana</i> 'Dr. Ronald Gray' 参照					
'melobury white'			茎葉は白味帯びる	花色は白花	
'Pink star'		20cm × 35cm		花形は星型、花色は藤ピンク	

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
'Plena' <i>E. mackiana</i> 'Plena' 参照					
<i>E. transparent</i> Berzius	小枝多 マット状	高さ70から80cm	葉は短く鈍頭の円柱状	花は小枝の先端に着花、長い花柄を持った花が2～3個垂れて咲く、長さ1.5cm程度の円柱状・花色は淡桃色・先端白・平開咲き	ケープ原産
<i>E. thimifolia</i> J. C. Wendl.			楕円形、少数の腺毛	直立した分枝先端に近い葉腋に数個、花形は壺形、長さ4mm、花色は桃色、葯は黒く花冠より突出	ヨーロッパ北部から西部
<i>E. unbellata</i> (英名: Dwarf Spanish heath)	低木	35～80cm×55cm	線状、灰緑色	開花は晩秋～初夏、花形は釣鐘形から卵形、花色は藤紫色、花長6mm、暗褐色の葯が目立つ	ポルトガル、スペイン西部、タンジール
<i>E. vagans</i> L. (英名: Cornish heath, Wandering heath)	生育旺盛で横に広がる低木、ややほふく性から上に向かう	40～80cm×80cm	線状、濃緑色	花は葉腋に2個ずつ着生、小枝全体が長い花穂、花冠は卵形、長さ4mm、花色はピンク、藤紫又は白、長さ14cmの総状花序、開花は夏の中頃から秋の中頃	アイルランド、英国(コンウォール)、フランス西部、スペイン
'Birch Glow'		30～50cm		花色は濃ローズ、ピンク色	
'Fiddlestone'				花色は濃橙色、長い花穂	
'French White'		40～60cm×60cm		花色は灰白色、花多数	
'Lyonese'		25cm×60cm	明緑色	花色は純白	
'Mrs. D. F. Maxwell'		30cm×45cm		花色は淡紅色	
'St. Keverne'		40cm×45cm		花色は明ピンク	
'Valerie Proudly'		15cm×30cm	明黄緑	花色は白	
'Redensation'				花色は淡紅色	
<i>E. 'Valerie griffiths'</i> 園芸品種	横に広がる低木、	40cm×55cm	線状で黄色、冬は温色の黄金色	花色は薄ピンク色、長さ4mmの釣鐘形、5～10cmの総状花序、開花は夏～初秋	
<i>E. × veitchii</i> (種間雑種 <i>E. arborea</i> × <i>E. Lusitanica</i>)	直立して開く低木	2.2m×65cm	線状、中緑色	開花は晩冬～春、長さ30cmの葉がつく総状花序、花形は4mmの円筒形～球形、花色は白花	
'albert's Gold' <i>E. arborea</i> 'albert's Gold' を参照					
'Ector'		高さ1.9m		花に香り有り、花多数着花	
<i>E. verticillata</i> Berzius	低木	高さ1.5m	葉は短く7～8mm、4～6輪生	花形は管状花、長さ2cm、花色は淡桃色又は藤色、多数固まった総状花序	ケープ半島からカレドン
<i>E. versicolor</i>		3m×1m	線状、中緑色	総状花序に似た長さ3cmの管状花を3輪生、花色は花筒が赤、先端が緑～白色、開花は秋～初冬	南アフリカ(西ケープ州)
<i>E. verticillata</i> <i>E. Manipulifera</i> 参照					
<i>E. vestita</i> Thund	直立・低木	長さ・幅90cm	線状で3稜が有、先端は鋭尖形、6輪生、密集、中緑色	穂状花序に似た長さ3cmの総状花序、花はアーチ状の管状、花色は紅・濃桃・白・黄色、長さ1.5～2cm、開花は春～晩夏、色穂状の花序	南アフリカ(西ケープ州)
<i>E. vulgaris</i> <i>Culluna vulgaris</i> 参照					
<i>E. × watsonii</i> (種間雑種 <i>E. ciliaris</i> × <i>E. Tetralix</i>) (英名: Watson's heath)	横に広がる低木	40cm×85cm	線状、灰色がかった緑色	夏1cmの総状花序、花形は壺形で開口部つぼむ、長さ1cm、花色はピンク色	英国(コンウォール)
'Dawn'			新芽は赤、後に金色に変化	花色は濃ピンク、開花は夏中頃～秋中頃	
<i>E. × williamsii</i> (種間雑種 <i>E. tetralix</i> × <i>E. uagana</i>) 異名: <i>E. × williamsiana</i> (英名: William's heath)	ややほふく性から上向きの低木	75cm×45cm	線状、中緑色、春は先端が明黄色	長さ4cmの総状花序、花の長さ3mm、花形は釣鐘形、花色は藤ピンク色、開花は夏中頃から晩秋	英国(コンウォール)
'P. D. Williams'		長さ30cm	春の新芽の先端金色で夏まで保持		

8. 参考写真



品種名
エリカ ホワイトデイト
Erica colorans Andrews

小枝の先端に着花
花そう形成



品種名
エリカ ファイヤーヒース
Erica cerinthodes

長枝の先端のみ着花
花房形成



品種名
スズランエリカ

小枝の先端に着花
花そう形成



品種名
クリスマスパレード

小枝の先端に着花
花そう形成



品種名
ダーリーエンシス

葉腋に2個ずつ着花



品種名
コットンヒース

枝の先に2～3個の花
花そう形成

○花房……花が房状に群がり咲いているもの。

○花そう……梨の花のように1箇所から数個の花が咲く