

本審査基準は重要な形質を定める最新の告示を反映しておりません。

出願等にあたっては、最新の重要な形質をご確認ください。(以下 HP の植物区分ごとの特性表参照。

→https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/sinsa_kijun_jp.html)

なお、それぞれの重要な形質に対する定義等は変更されております。

特性調査基準

(1) 特性審査基準

※は特性の記述上不可欠と考えられる形質

重要な形質	形 質	定 義	調査方法	状態又は区分	階級	標準品種名	備考
草 型	※1. 草 型	開花時における自然状態で側面から見た植物体の姿	観察 (図-1)	長円形 菱形 逆三角形 平形 つる性形	1 2 3 4 5	アルバオクラタ リトルブライトアイ モーニングミスト ドーンカーペット ツルニチニチソウ	
	※2. 株張り	高さに対する広がり の程度	観察	狭 中 広	3 5 7	アルバオクラタ リトルブライトアイ ドーンカーペット	
草 丈	※3. 草 丈	開花盛期の草丈 地際から最高位ま での高さ	測定 (mm)	低 中 高	3 5 7	ドーンカーペット リトルブライトアイ アルバオクラタ	
茎の太さ	※4. 茎の太さ	開花盛期の主茎地 際部の直径	測定 (mm)	細 中 太	3 5 7	リトルブライトアイ	
茎の色	※5. 茎の色	開花盛期の主茎の 節間中位の色	観察	淡緑 緑 緑褐 淡紫 紫赤	1 2 3 4 5	リトルブランシュ リトルブライトアイ ピンクカーペット 高性ローズ	
分枝数	6. 分枝の発 生位置	主要1次分枝の発 生位置	観察 (図-2)	上位 全体 下位	1 2 3	モーニングミスト リトルブライトアイ	
	※7. 分枝の 多少	1次分枝数の多少 (着花枝を対象)	観察	少 中 多	3 5 7	リトルブライトアイ	
	8. 着らい枝 数の多少	2次分枝数(最長 1次分枝の2次着 花分枝数)	観察	少 中 多	3 5 7	リトルブライトアイ モーニングミスト	
節間長	※9. 節数	一番花の下10cmの 節数	観察	少 中 多	3 5 7	アルバオクラタ リトルブライトアイ ドーンカーペット	
葉形	※10. 葉の形	主茎中央部の葉の 形	観察 (図-3)	線状長楕円 形	1		
				長楕円形	2	リトルブライトアイ	

				楕円形 卵形	3 4		
葉の大きさ	※11. 葉身の長さ	開花時の最大葉の葉身長	測定 (mm)	短 中 長	3 5 7	リトルブライトアイ	
	※12. 葉身の幅	開花時の最大葉の葉身幅	測定 (mm)	狭 中 広	3 5 7	リトルブライトアイ	
葉色	※13. 葉の色	開花時の成葉表面の色	観察	淡緑 緑 濃緑	1 2 3	リトルブライトアイ	
	14. 葉の斑の有無	葉の斑	観察	無 有	1 9	リトルブライトアイ	
	15. 葉の斑の色	葉の斑の色	測定 (RHSカラーチャートによる。)				
	16. 葉の斑の模様	(重複もありうる)	観察	覆輪状 斑点状 モザイク状 その他	1 2 3 9		
葉の毛の有無	※17. 葉の毛の有無	開花時における葉に着生する毛の有無	観察	無 有	1 9	リトルブライトアイ	
葉柄の長さ	※18. 葉柄の長さ	最大葉の葉柄の長さ	測定 (mm)	短 中 長	3 5 7	プリティインピンク リトルブライトアイ	
花形	※19. 花卉の重なり	花卉の重なり程度	観察 (図－4)	離れる 接する わずかに重なる 大きく重なる	1 2 3 4		
花の大きさ	※20. 花の大きさ	開花盛期における花の最大径	測定 (mm) (図－5)	小 中 大	3 5 7	リトルブライトアイ パラソル	
花色	※21. 花の表面の地色	十分展開した花の花卉表面の地色	測定 (RHSカラーチャートによる。)				

※22. 花の目の有無	花の表面の目の有無（目が明瞭に形成されず、花弁基部からぼかし状に広がる場合には、目を無、複色を有とする。）	観察 (図-5)	無 有	1 9	リトルブライトアイ	
23. 花の目の色	十分展開した花の目の色（目が明瞭に形成されず、花弁基部からぼかし状に広がる場合には、複色に記載する。）	測定 (RHSカラーチャートによる。)				
※24. 花の表面の複色の有無	花弁表面の複色の有無（目を除く。）	観察	無 有	1 9		
25. 花の表面の複色	十分展開した花の花弁表面の複色（目を除く。）	測定 (RHSカラーチャートによる。)				
26. 花の表面の複色の分布	花弁表面の複色の分布（目を除く。なお、目が明瞭に形成されず、花弁基部からぼかし状に広がる場合には、基部から先端へのぼかしとする。）	観察 (図-6)	周縁部 基部から先端へのぼかし 先端から基部へのぼかし 部分又は縞 斑点 爪斑	1 2 3 4 5 6		
27. 花の表面の複色の割合	花弁表面の面積に対する複色面積の割合		少 中 多	3 5 7		
28. 花床筒上部の色	花被片合着部の色	観察 (図-5)	白 黄 黄緑 桃 赤 紫	1 2 3 4 5 6		

花卉の形	29. 花卉の形	花卉全体の形	観察 (図-7)	タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ4	1 2 3 4		
	30. 花卉の切れ込みの有無	花卉の切れ込みの有無	観察	無 有	1 9		
	31. 花卉の周縁の波打ちの程度	花卉周縁の波打ちの強弱	観察	平 やや波状 かなり波状	1 2 3		
花卉数	※32. 花卉の数	花冠裂片数	測定 (枚)	5枚 その他	1 9	リトルブライトアイ	
花数	※33. 花の数	開花盛期における最長枝の開花数	観察	少 中 多	3 5 7	リトルブライトアイ モーニングミスト	
花の香り	※34. 花の香り	花の香りの有無	観察	無 有	1 9	リトルブライトアイ	
開花期	※35. 開花期	開花の早晩	観察	早 中 晩	3 5 7	プリティインピンク リトルブライトアイ	
	36. 季咲き性	開花時期	観察	一季咲き 四季咲き	1 2	ツルニチニチソウ リトルブライトアイ	
耐寒性	37. 耐寒性	越冬性の有無	観察	無 有	1 9	リトルブライトアイ ツルニチニチソウ	
耐暑性	※38. 耐暑性	高温期の生育と開花	観察	弱 中 強	3 5 7	リトルブライトアイ	
病害抵抗性	※39. 病害抵抗性	通常栽培条件下における病害抵抗性の強弱	観察	弱 中 強	3 5 7	リトルブライトアイ	
虫害抵抗性	※40. 虫害抵抗性	通常栽培条件下における虫害抵抗性の強弱	観察	弱 中 強	3 5 7	リトルブライトアイ	

(2) 参考図




図-1 1. 草型 (Chara.1 plant : shape)




図-2 6. 分枝の発生位置 (Chara.6 stem : position of primary branches)






図-3 10. 葉の形 (Chara.10 leaf : shape)



図－4 19. 花卉の重なり (Chara.19 flower: arrangement of petals)



図－5 20. 花の大きさ (Chara.20 flower: diameter)

22. 花の目の有無 (Chara.22 flower: eye zone)

28. 花床筒上部の色 (Chara.28 flower: color of receptacle)




図-6 26. 花の表面の複色の分布 (Chara.26 flower: distribution of secondary color)




図-7 29. 花卉の形 (Chara.29 flower : shape of petal)