2025 年 3 月

ベンガルボダイジュ種

Banyan tree

(*Ficus benghalensis* L.)

ベンガルボダイジュ種審査基準

Ⅰ．審査基準の対象（Subject of these Guidelines）

この審査基準は、クワ科（Moraceae）イチジク属（*Ficus* L.）のベンガルボダイジュ種（*Ficus benghalensis* L.）の全ての品種に適用する。

Ⅱ．提出種苗（Material Required）

ⅰ）種苗の形態　　挿し木発根苗

ⅱ）提出時期　　審査当局が指定する時期

ⅲ）数量　　15 個体

ⅳ）提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。

ⅴ）提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

Ⅲ．試験の実施（Conduct of Tests）

ⅰ）栽培条件　　特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。

ⅱ）最低供試個体数　11 個体

ⅲ）栽培期間　　１生育周期

ⅳ）調査方法

調査個体数　　特に指示がない限り､栄養繁殖性品種の場合は植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。

均一性は供試した全ての個体で判定する。

調査時期等　　特に指示がない限り、挿し木後 1 年を過ぎた植物体で調査することとし、生育が盛んになり、葉が十分に展開する夏～初秋の時期に行う。

葉に関する形質は、特に指示がない限り、主茎の着葉部分を三等分した上部に着生する典型的な葉を調査する。

葉身の斑の一次色は最大面積を占める色とし、二次色については 2 番目に大きな面積を占める色とする。面積が同程度の場合は、淡色の斑を斑の一次色とする。

ⅴ）特別な試験　　特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が試験方法等を添えて申告し、審査当局がこれに同意した場合は実施することがある。

Ⅳ．判定基準（Standards for Decisions）

判定は、品種登録出願審査等要領の区別性、均一性及び安定性（DUS）審査のための一般基準に基づくものとする。

なお、均一性の判定について、栄養繁殖性品種においては、母集団標準１％、受容確率 95％を適用し、UPOV の TGP/8 文書の 8.1.10 節の図表５により判定する。供試個体数が 10 の場合、許容される異型個体数は１である。

Ⅴ．グループ分けに使用する形質（Grouping of Varieties）

ⅰ）葉身表面の斑の有無（形質 17）

ⅱ）葉身表面の斑の二次色の有無（形質 21）

Ⅵ．特性表で使用する記号の説明（Legend）

G：グループ分けに使用する形質

(*)：品種記載の国際調和のための必須調査形質

QL：質的形質

QN：量的形質

PQ：擬似の質的形質

(+)：Ⅷに特性表の説明図等を示す

MG：植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録

MS：植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録

VG：植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

VS：植物体あるいは植物体の一部の個々の観察記録

必須形質：原則、必ず評価しなければならない形質であり、選択形質以外の全ての形質のため、特性表の備考欄の記載は省略される。

選択形質：種苗法施行規則第５条第２項に定める出願品種が当該形質によって他の品種と明確に区別されないと出願者が思料する場合に、当該形質に係る特性を願書に記載しないことができる形質。特性表の備考欄に付記される。

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、全ての状態が特性表に記載してある。しかし、５階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、９階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態（State）		階級（Note）
（日本語）	（English）	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の９階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するよう留意する。

状態（State）		階級（Note）
（日本語）	（English）	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

Ⅶ. 特性表（Table of Characteristics）

形質番号	UPOV No.	記号	形質（Characteristics）		定義	調査方法	階級	状態（State）		標準品種（Ex.Var.）	備考
			（日本語）	（English）				（日本語）	（English）		
1		PQ	樹姿	Plant: growth habit	株全体の姿	観察 VG	1 2 3	立性 半直立性 ほふく性	upright semi-upright horizontal		
2		QN	節間長	Plant: length of internode of stem	主茎を三等分した中間部の節間長	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	 ベンガルゴム 	
3		PQ	幹の色	Plant: color of main stem	成熟した幹の色	観察 VG	1 2 3 4	灰緑 淡褐 褐 赤褐	grey green light brown medium brown red brown	ベンガルゴム ベンガレンシスゴールド 	
4		PQ	新しょうの色	Plant: color of terminal part of young stem	枝の先端部の節間の色	観察 VG	1 2 3 4 5 6	淡緑 緑 灰緑 褐緑 灰褐 赤褐	light green medium green grey green brown green grey brown red brown		
5		QN	茎の毛	Stem: pubescence of young stem	未成熟の枝の毛の粗密	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極粗 粗 中 密 極密	absent or very sparse sparse medium dense very dense	 ベンガルゴム	

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
6		PQ	茎の毛の色	Stem: color of pubescence of young stem	未成熟の枝の毛の色(毛のある品種に限る。)	観察 VG	1 2 3 4	白 灰 淡橙 褐	white grey light orange brown	ベンガルゴム	
7		QN	葉身の長さ	Leaf blade: length	葉身の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	ベンガルゴム	
8		QN	葉身の幅	Leaf blade: width	葉身の幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ベンガルゴム	
9		QN	葉身の長さ／幅	Leaf blade: ratio length / width	葉身の幅に対する葉身の長さの比	測定 比 MS	3 5 7	小 中 大	low medium high	ベンガルゴム	
10		QN (+)	葉身の最大幅の位置	Leaf blade: position of broadest part	葉身の最大幅の位置	観察 VG	1 2 3	基部 中間部 先端部	below middle at middle above middle		
11		PQ	葉身の基部の形	Leaf blade: shape of base	葉身の基部の形	観察 VG	1 2 3 4 5 6	漸尖形 鋭形 鈍形 円形 切形 心形	attenuate acute obtuse rounded truncate cordate		

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
12		PQ	葉身の先端部の形	Leaf blade: shape of apex	葉身の先端部の形	観察 VG	1 2 3 4	鋭尖形 鋭形 鈍形 円形	acuminate acute obtuse rounded		
13		QN	葉身の縦断面の形	Leaf blade: shape in longitudinal section	葉身の中央部の縦断面の形	観察 VG	1 2 3	内曲 直 外曲	incurved straight recurved	ベンガルゴム	
14		QN (+)	葉身の横断面の形	Leaf blade: shape in cross section	葉身の中央部の横断面の形	観察 VG	1 2 3	凹 平 凸	concave flat convex		
15		PQ	新葉の葉身表面の色	Young leaf blade: color of upper side	新葉の葉身表面の色	観察 VG		RHS ｶﾗｰﾁｬｰﾄ色票番号による。	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
16		PQ	葉身表面の地色	Leaf blade: ground color of upper side	葉身表面の地色（斑を除く、最も緑色の濃い色）	観察 VG		RHS ｶﾗｰﾁｬｰﾄ色票番号による。	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
17		QL G	葉身表面の斑の有無	Leaf blade: variegation of upper side	葉身表面の斑の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	ベンガルゴム	
18		PQ	葉身表面の斑の一次色	Leaf blade: primary color of variegation of upper side	葉身表面の斑の一次色	観察 VG		RHS ｶﾗｰﾁｬｰﾄ色票番号による。	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
19		PQ (+)	葉身表面の斑の一次色の分布	Leaf blade: distribution of primary color of variegation of upper side	葉身表面の斑の一次色の分布	観察 VG	1 2 3 4	周縁部 中央部 偏在 全体	marginal zone central zone unevenly distributed throughout		
20		PQ (+)	葉身表面の斑の一次色の模様	Leaf blade: pattern of primary color of variegation of upper side	葉身表面の斑の一次色の模様	観察 VG	1 2 3	斑点状 不整形 均一	blotched irregular solid or nearly solid		
21		QL G	葉身表面の斑の二次色の有無	Leaf blade: secondary color of variegation of upper side	葉身表面の斑の二次色の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present		
22		PQ	葉身表面の斑の二次色	Leaf blade: secondary color of variegation of upper side	葉身表面の斑の二次色	観察 VG		RHS ｶﾗｰﾁｬｰﾄ色票番号による。	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
23		PQ (+)	葉身表面の斑の二次色の分布	Leaf blade: distribution of secondary color of variegation of upper side	葉身表面の斑の二次色の分布	観察 VG	1 2 3 4	周縁部 中央部 偏在 全体	marginal zone central zone unevenly distributed throughout		
24		PQ (+)	葉身表面の斑の二次色の模様	Leaf blade: pattern of secondary color of variegation of upper side	葉身表面の斑の二次色の模様	観察 VG	1 2 3	斑点状 不整形 均一	blotched irregular solid or nearly solid		

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
25		PQ	葉身表面の主脈の色	Leaf blade: color of main vein of upper side	葉身表面の主脈の色	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による。	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
26		PQ	葉身裏面の色	Leaf blade: color of lower side	葉身裏面の色	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による。	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
27		QN	葉身裏面の毛	Leaf blade: pubescence of lower side	葉身裏面の毛の粗密	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極粗 粗 中 密 極密	absent or very sparse sparse medium dense very dense	ベンガルゴム	
28		QN (+)	葉身の周縁部の波打ち	Leaf blade: undulation of margin	葉身周縁部の波打ちの強弱	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	ベンガルゴム	
29		PQ	葉身の光沢	Leaf blade: glossiness of upper side	葉身の表面の光沢の強弱	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	ベンガルゴム	
30		QN	葉柄の長さ	Petiole: length	葉柄の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	ベンガルゴム	

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
31		PQ	葉柄の色	Petiole: color	葉柄表面の色	観察 VG	1 2 3 4 5 6	淡緑 緑 濃緑 緑褐 褐 紫褐	light green medium green dark green green brown medium brown purple brown	ベンガルゴム	
32		QN (+)	葉柄のアントシアニンの着色	Petiole: anthocyanin coloration	葉柄表面のアントシアニン着色の強弱	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	ベンガルゴム	
33		QN	葉柄の毛	Petiole: pubescence	葉柄の毛の粗密	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極粗 粗 中 密 極密	absent or very sparse sparse medium dense very dense	ベンガルゴム	

Ⅷ. 特性表の説明（Explanations on the Table of Characteristics）

形質 10　葉身の最大幅の位置　　Char.10　Leaf blade: position of broadest part



1	2	3
基部	中央部	先端部
below middle	at middle	above middle

形質 14　葉身の横断面の形　　Char.14　Leaf blade: shape in cross section



1	2	3
凹	平	凸
concave	flat	convex

形質 19 葉身の斑の一次色の分布

Char. 19 Leaf blade: distribution of primary color of variegation of upper side

形質 23 葉身の斑の二次色の分布

Char. 23 Leaf blade: distribution of secondary color of variegation of upper side



1	2	3	4
周縁部	中央部	偏在	全体
marginal zone	central zone	unevenly distributed	throughout

形質 20 葉身の斑の一次色の模様

Char. 20 Leaf blade: pattern of primary color of variegation of upper side

形質 24 葉身の斑の二次色の模様

Char. 24 Leaf blade: pattern of secondary color of variegation of upper side



1	2	3
斑点状	不整形	均一
blotched	irregular	solid or nearly solid

形質 28 葉身の周縁部の波打ち
Char. 28 Leaf blade: undulation of margin

1
無又は極弱
absent or very weak

4
強
strong

形質 32 葉柄のアントシアニンの着色
Char. 32 Petiole: anthocyanin coloration

1
無又は極弱
absent or very weak

2
弱
weak

3
中
medium

4
強
strong