

令和 7 年 5 月 20 日 第 12 回 野生イノシシ豚熱対策検討会

九州における豚熱対策状況について


農林水産省 消費・安全局動物衛生課
野生動物対策班

佐賀県における野生いのししでの豚熱感染状況

令和 7 年 5 月13日時点
(令和 6 年 5 月30日以降)

佐賀県 陽性事例

事例	捕獲/発見日	場所	分類	詳細	Ct値*
1	2024/5/30	唐津	捕獲	成獣オス 100cm/40kg	30.3
2	6/3	唐津	捕獲	成獣オス 90 cm/25kg	37.9
3	6/5	唐津	捕獲	幼獣メス 35cm/1kg	24.2
4	6/6	唐津	死亡	成獣不明 70cm/10kg	26.4-耳†
5	6/21	玄海	捕獲	成獣オス 90cm/18kg	25.7
6	6/24	玄海	捕獲	成獣メス 70cm/20kg	23.4-耳
7	7/1	唐津	死亡	成獣メス 90cm/25kg	29.0
8	7/5	玄海	捕獲	幼獣メス 50cm/10kg	27.1
9	7/8	唐津	死亡	成獣メス 100cm/50kg	28.3-耳
10	7/13	唐津	捕獲	幼獣オス 40cm/2kg	23.5
11	7/18	玄海	死亡	幼獣メス 40cm/5kg	20.7
12	7/27	玄海	捕獲	幼獣メス 40cm/7kg	34.0
13	8/5	伊万里	死亡	成獣メス 30cm/1.5kg	22.5-耳
14	8/2	玄海	捕獲	幼獣オス 65cm/8kg	33.8
15	8/4	唐津	捕獲	成獣オス 110cm/75kg	38.8
16	8/8	伊万里	捕獲	成獣オス 100cm/40kg	32.9
17	8/16	玄海町	死亡	成獣メス 90cm/40kg	24.3-耳
18	8/30	玄海町	捕獲	成獣メス 90cm/20kg	26.4
19	9/3	伊万里	死亡	成獣オス 60cm/8kg	21.2
20	9/4	唐津	死亡	幼獣メス 40cm/2kg	37-耳
21	9/12	唐津	捕獲	成獣オス 80cm/10kg	30.3
22	9/26	伊万里	死亡	成獣メス 80cm/35kg	26.3-耳
23	10/4	唐津	死亡	成獣メス 50cm/15kg	25-耳
24	10/8	唐津	捕獲	成獣オス 115cm/60kg	29.0
25	10/15	唐津	捕獲	成獣オス 100cm/40kg	38.0
26	10/17	唐津	死亡	成獣メス 100cm/60kg	33.1-耳
27	10/23	唐津	死亡	成獣メス 90cm/40kg	25.2-耳
28	10/28	唐津	捕獲	成獣メス 115cm/40kg	37.4
29	10/29	唐津	捕獲	成獣メス 100cm/40kg	27.0-耳
30	10/28	唐津	捕獲	成獣メス 75cm/15kg	29.8
31	11/4	唐津	死亡	成獣オス 110cm/30kg	25.2-耳
32	11/8	玄海	死亡	成獣オス 80cm/18kg	27.9-耳
33	11/7	唐津	捕獲	成獣メス 100cm/30kg	30.3
34	11/11	唐津	死亡	成獣オス 120cm/60kg	26.6-耳
35	11/14	玄海	捕獲	成獣オス 77cm/15kg	37.2
36	11/14	玄海	捕獲	成獣メス 80cm/20kg	23.6
37	11/19	唐津	死亡	成獣オス 50cm/10kg	24-耳
38	11/29	伊万里	捕獲	成獣メス 100cm/30kg	28.4
39	12/5	唐津	死亡	成獣メス 75cm/45kg	30-耳
40	12/9	唐津	死亡	成獣メス 80cm/20kg	30.2-耳
41	12/10	唐津	死亡	成獣不明 80cm/20kg	34-耳
42	12/16	唐津	捕獲	成獣オス 50cm/20kg	29.0
43	12/23	唐津	死亡	成獣メス 100cm/50kg	32.0-耳
44	12/31	伊万里	捕獲	成獣メス 90cm/30kg	33.0
45	2025/1/7	伊万里	捕獲	成獣メス 73cm/16kg	24.8
46	1/8	唐津	捕獲	成獣オス 120cm/50kg	41.8
47	1/14	唐津	死亡	成獣メス 60cm/30kg	26.0-耳
48	1/14	唐津	死亡	成獣不明 40cm/10kg	25.1-耳
49	1/26	唐津	捕獲	成獣メス 90cm/30kg	23
50	1/26	唐津	捕獲	成獣オス 110cm/35kg	36.0
51	2/3	伊万里	捕獲	成獣メス 70cm/10kg	25.4
52	2/3	唐津	死亡	成獣メス 75cm/20kg	22.3-耳
53	2/7	唐津	死亡	成獣不明 100cm/60kg	27-耳
54	2/13	唐津	捕獲	成獣オス 80cm/13kg	35.7
55	2/17	伊万里	死亡	成獣メス 60cm/10kg	23.9-耳
56	2/21	唐津	捕獲	成獣メス 100cm/60kg	29.9
57	2/21	唐津	捕獲	成獣メス 70cm/10kg	34.1
58	2/25	伊万里	捕獲	成獣メス 95cm/30kg	26.7
59	2/27	唐津	死亡	成獣メス 58cm/15kg	29.9-耳
60	3/5	唐津	捕獲	成獣オス 78cm/17kg	37.2
61	3/10	伊万里	死亡	成獣不明 80cm/20kg	30.5-耳
62	3/11	武雄	死亡	成獣オス 80cm/50kg	24.4-耳
63	3/11	唐津	捕獲	成獣オス 70cm/10kg	26.3
64	3/12	唐津	捕獲	成獣メス 70cm/10kg	37.3
65	3/13	武雄	死亡	成獣メス 100cm/80kg	26.6-耳



橙色円：1か月ごとの感染確認範囲（最小内包円による）

事例	捕獲/発見日	場所	分類	詳細	Ct値*
66	3/13	伊万里	捕獲	成獣メス 110cm/100kg	37.8
67	3/14	唐津	捕獲	成獣オス 70cm/10kg	37
68	3/21	武雄	死亡	成獣メス 90cm/10kg	25.6-耳
69	3/21	武雄	死亡	幼獣オス 70cm/5kg	26.0-耳
70	3/24	唐津	死亡	成獣不明 80cm/20kg	24.4-耳
71	3/25	唐津	死亡	成獣メス 100cm/25kg	29.8-耳
72	3/28	武雄	死亡	成獣メス 90cm/35kg	22.2-耳
73	3/31	伊万里	死亡	成獣不明 100cm/70kg	28.2-耳
74	4/1	大町町	死亡	成獣メス 100cm/40kg	25.2-耳
75	4/10	玄海町	死亡	成獣メス 70cm/25kg	21.1-耳
76	4/14	伊万里	死亡	成獣不明 100cm/45kg	21.0-耳
77	4/14	唐津	死亡	成獣オス 120cm/50kg	23.1-耳
78	4/23	唐津	死亡	成獣メス 100cm/55kg	22.4-耳
79	4/22	武雄	死亡	成獣オス 110cm/60kg	23.1-耳

事例	捕獲/発見日	場所	分類	詳細	Ct値*
80	4/23	武雄	死亡	成獣オス 60cm/30kg	32.2-耳
81	4/24	唐津	死亡	成獣オス 110cm/50kg	18.5-耳
82	4/25	唐津	死亡	成獣オス 115cm/60kg	20.9-耳
83	4/30	多久	死亡	成獣オス 80cm/20kg	23.9-耳
84	5/1	多久	死亡	成獣メス 120cm/50kg	24.3-耳
85	5/9	伊万里	捕獲	成獣メス 98cm/35kg	18.8
86	5/12	武雄	捕獲	成獣メス 60cm/10kg	20.6-耳
87	5/12	唐津	死亡	成獣オス 120cm/45kg	19.8-耳
88	5/12	武雄	死亡	成獣メス 110cm/40kg	21.4-耳

陽性頭数
佐賀県：88頭

【凡例】

成獣オス

成獣メス

幼獣

雌雄不明

死捕

陽性・成獣♂ ● ■

成獣♀ ● ■

その他 ○ □

陰性 ●

< 感染確認範囲の推移 >

※最小内包円の算出による

6月末：2.74 km

7月末：3.32 km

8月末：5.17 km

9月末：5.17 km

10月末：6.36 km

11月末：6.74 km

12月末：10.18 km

1月末：10.18 km

2月末：12.86 km

3月末：17.79km

4月末：19.61km

※Ct値は遺伝子量を表し、小さいほうが遺伝子量が多いことを意味する。

† 耳は検査検体として耳介を用いたことを示す。

長崎県における野生いのししでの豚熱感染状況

令和 7 年 5 月13日時点
(令和 6 年 5 月30日以降)

長崎県 陽性事例

事例	捕獲/発見日	場所	分類	詳細	Ct値*
1	2025/1/21	松浦	捕獲	成獣メス 100cm/40kg	27.0
2	2/2	松浦	捕獲	成獣メス 110cm/50kg	25.9
3	2/10	松浦	捕獲	成獣オス 120cm/60kg	23.7
4	2/14	松浦	死亡	成獣不明 70cm/30kg	34.0-耳
5	3/1	松浦	捕獲	成獣オス 85cm/20kg	28.3
6	3/22	松浦	捕獲	成獣オス 120cm/90kg	32.5
7	4/6	松浦	捕獲	成獣メス 100cm/40kg	-
8	4/17	松浦	死亡	成獣オス 70cm/15kg	25.9-耳
9	4/25	松浦	捕獲	成獣メス 90cm/30kg	25.5
10	4/27	松浦	捕獲	成獣オス 80cm/20kg	23.9
11	5/7	松浦	死亡	成獣メス 70cm/10kg	35.1-耳



陽性頭数
長崎県：11頭

【凡例】

成獣オス

成獣メス

幼獣

雌雄不明

死 捕

陽性・成獣♂ ● ■

成獣♀ ● ■

その他 ○ □

陰性 ●

※Ct値は遺伝子量を表し、小さいほうが遺伝子量が多いことを意味する。

† 耳は検査検体として耳介を用いたことを示す。

橙色円：1か月ごとの感染確認範囲（最小内包円による）

7. 九州各県のサーベイランス実施状況について

- 令和 5 年 9 月の佐賀県の飼養豚での豚熱感染確認を受け、九州各県でサーベイランス強化を依頼。
- 令和 6 年 6 月の佐賀県の野生イノシシの豚熱感染確認を受け、九州各県でサーベイランス強化を依頼。
- 令和 7 年 2 月の長崎県松浦市福島町の野生イノシシで豚熱感染確認を受け、長崎県でサーベイランスの強化を依頼。
- 令和 7 年 4 月の宮崎県都城市の野生イノシシで豚熱感染確認を受け、九州各県でサーベイランス強化を依頼。

都道府県	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総計
福岡県	R 4	27	57	36	64	95	113	85	53	24	33	34	15	636
	R 5		2		3	1	26	69	91	57	13	14		276
	R 6	2	2	7	90	68	56	78	74	43	7	1		428
	R 7	2												2
佐賀県	R 4		1	4	23	30	42	44	56	64	57	28	2	351
	R 5	10	28	18	36	37	119	106	42	40	23	22		481
	R 6	30	35	37	72	66	58	69	91	61	56	80	39	694
	R 7	22	24											46
長崎県	R 4	1	2	10	20	41	35	63	45	37	32	19	10	315
	R 5	4	10	10	20	17	45	116	29	19	19	21	15	325
	R 6	9	9	43	168	92	94	143	110	105	63	80	31	947
	R 7	39	12											51
熊本県	R 4		1	1	36	27	28	28	62	45	31	38	8	305
	R 5		2	15	33	30	27	104	115	48	46	24	5	449
	R 6	1		2	63	56	46	45	58	29	19	9	1	329
	R 7	24	14											38
大分県	R 4	83	12	2	6	26	20	49	24	61	23	8	11	325
	R 5	25	14	6	13	8	69	81	48	67	36	32	14	413
	R 6	18	10	14	53	92	60	122	62	74	51	58	54	668
	R 7	58	4											62
宮崎県	R 4		1	3	3	1	1	3	180	82	39	4	1	318
	R 5	1	35	31	57	13	48	46	67	73	80	21	2	474
	R 6	1	32	54	102	73	67	35	44	67	23	13	4	515
	R 7	18	4											22
鹿児島県	R 4	9	9	60	58	37	33	11	32	16	16	15	9	305
	R 5	2	1	36	38	38	51	73	56	32	39	19	1	386
	R 6	21	54	38	86	53	56	31	45	27	38	7	4	460
	R 7	34	4											38
沖縄県	R 4				1	1	4	5	7	13	21	12	1	65
	R 5	1		34	52	28	61	107	28			1		312
	R 6				3	10	22	89	137	42	5	3	1	312
	R 7													

佐賀県・長崎県・宮崎県における経口ワクチンの散布状況（5月15日時点）

佐賀県：令和6年6月6日 豚熱陽性野生イノシシ初確認 @唐津市

項目	散布日	散布個数	散布戦略
緊急散布①	①R6/6/13・14 ②R6/7/11・12	約3,200個	・陽性個体確認地点を中心に10km圏内に散布 （2km圏内を最重点で散布）
R6後期散布	①R6/11/26～29 ②R6/12/16～27	約10,000個	・15km圏内に散布（合わせてサーベイランスも強化） ・狩猟期の開始（11月）・繁殖期（12月・1月）に対応
緊急散布②	R7/3/11・13	約1,600個	・野生イノシシにおける豚熱感染確認場所が南下したことを踏まえて緊急的に散布
R7前期散布	R7/5/1～16（P）	約10,000個	・佐賀県全域に散布。5月予定のところを前倒して散布実施。 ・333地点（各地点30個）に散布。

長崎県：令和7年2月3日 豚熱陽性野生イノシシ初確認 @松浦市

項目	散布日	散布個数	散布戦略
緊急散布①	①R7/2/13 ②R7/3/26	約1,600個	・松浦市福島町全域に緊急的に散布
緊急散布②	R7/5/1	約330個	・松浦市今福町で陽性個体が確認されたことを受けて緊急的に散布

宮崎県：令和7年4月11日 豚熱陽性野生イノシシ初確認 @都城市

項目	散布日	散布個数	散布戦略
緊急散布①	①R7/4/16・17 ②R7/5/14	① 2,246個 ② 2,080個	・陽性個体確認地点を中心に10km圏内及びその周辺に散布