

※下線赤字部分が訂正箇所です。

（誤）

（正）

147 ページ (3.5)

分析の結果、 <u>PFOA と PFOS とともに、魚介類と藻類、肉類以外の食品群は</u> 定量限界未満の濃度であることがわかりました。また、これら物質の濃度と平成 23 年度国民健康・栄養調査の食品消費量を用いて、各食品群からの平均摂取量を推定したところ、PFOA の摂取に関する寄与率は魚介類が 9 割、PFOS の摂取に関する寄与率は魚介類が 9 割以上であると推定されました。	分析の結果、 <u>魚介類と藻類、肉類以外の食品群は PFOA、PFOS が</u> 定量限界未満の濃度であることがわかりました。また、これら物質の濃度と平成 23 年度国民健康・栄養調査の食品消費量を用いて、各食品群からの平均摂取量を推定したところ、PFOA の摂取に関する寄与率は魚介類が 9 割、PFOS の摂取に関する寄与率は魚介類が 9 割以上であると推定されました。
--	---

148、167 ページ (表 120)

表 1 食品群に含まれるパーフルオロオクタン酸 (PFOA) の分析結果						表 2 食品群に含まれるパーフルオロオクタン酸 (PFOA) の分析結果					
食品群名	調査対象地域数	検出限界 (ng/kg)	定量限界 (ng/kg)	平均値 (ng/kg) (LB)	平均値 (ng/kg) (UB)	食品群名	調査対象地域数	検出限界 (ng/kg)	定量限界 (ng/kg)	平均値 (ng/kg) (LB)	平均値 (ng/kg) (UB)
穀類	4	6-30	15-70	0	14	穀類	4	6-30	15-70	0	14
いも類	1	30	70	0 (注)	30 (注)	いも類	1	30	70	0 (注)	30 (注)
砂糖・甘味料類	1	20	50	0 (注)	20 (注)	砂糖・甘味料類	1	20	50	0 (注)	20 (注)
豆類	4	6-30	15-70	0	14	豆類	4	6-30	15-70	0	14
種実類	4	6-30	15-70	0	14	種実類	4	6-30	15-70	0	14
野菜類	4	6-30	15-70	0	14	野菜類	4	6-30	15-70	0	14
果実類	4	6-30	15-70	0	19	果実類	4	6-30	15-70	0	19
きのこ類	1	30	70	0 (注)	30 (注)	きのこ類	1	30	70	0 (注)	30 (注)
藻類	4	6-30	15-70	36	44	藻類	4	6-30	15-70	36	44
魚介類	4	6-40	15-90	45	69	魚介類	4	6-40	15-90	45	69
肉類	4	6-40	15-90	4	18	肉類	4	6-40	15-90	0	18
卵類	4	6-40	15-90	0	16	卵類	4	6-40	15-90	0	16
乳類	4	8-40	15-90	0	16	乳類	4	8-40	15-90	0	16
油脂類	4	6-40	15-110	0	16	油脂類	4	6-40	15-110	0	16
菓子類	4	9-40	16-90	0	17	菓子類	4	9-40	16-90	0	17
嗜好飲料類	1	20	50	0 (注)	20 (注)	嗜好飲料類	1	20	50	0 (注)	20 (注)
調味料・香辛料類	4	6-40	15-90	0	16	調味料・香辛料類	4	6-40	15-90	0	16
飲料水	1	2	5	0 (注)	2 (注)	飲料水	1	2	5	0 (注)	2 (注)