



魚病被害の内訳（令和元年）

| 被害額の大きい魚種 | 合計<br>生産額<br>(百万円)<br>(A) | 合計推定<br>被害額<br>(百万円)<br>(B) | (B/A) | 被害割合の高い疾病 |                                     |       |                                      |       |                   |       |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------|-------|
|           |                           |                             |       | 1位        | 被害額<br>に占める<br>割合                   | 2位    | 被害額<br>に占める<br>割合                    | 3位    | 被害額<br>に占める<br>割合 |       |
| 1         | ぶり類                       | 128,775                     | 3,750 | 2.9%      | α溶血性レンサ球菌症（Lactococcus garvieae感染症） | 43.8% | 連鎖球菌症（未同定）                           | 23.7% | ノカルジア症            | 14.9% |
| 2         | くろまぐろ                     | 50,600                      | 1,942 | 3.8%      | α溶血性レンサ球菌症（Lactococcus garvieae感染症） | 68.3% | 不明病（原因不明）                            | 13.7% | 連鎖球菌症（未同定）        | 8.6%  |
| 3         | まだい                       | 53,604                      | 1,094 | 2.0%      | エドワジエラ症（パラコロ病以外のエドワジエラ・タルダ感染症）      | 69.7% | ビブリオ病                                | 9.9%  | 不明病（原因不明）         | 5.1%  |
| 4         | うなぎ                       | 74,156                      | 827   | 1.1%      | パラコロ病                               | 36.1% | ウイルス性血管内皮壊死症（鰓うっ血症）                  | 22.9% | 不明病（原因不明）         | 12.9% |
| 5         | ふぐ類（とらふぐ、まふぐ）             | 8,977                       | 611   | 6.8%      | ビブリオ病                               | 29.8% | 粘液胞子虫性やせ病                            | 18.8% | 不明病（原因不明）         | 15.9% |
| 6         | ひらめ                       | 3,058                       | 425   | 13.9%     | エドワジエラ症（パラコロ病以外のエドワジエラ・タルダ感染症）      | 72.2% | 連鎖球菌症（未同定）                           | 21.3% | 脳粘液胞子虫症           | 2.6%  |
| 7         | くるまえばい                    | 7,310                       | 424   | 5.8%      | ビブリオ病                               | 85.8% | ホワイテスポット症 [WSD] ノクルマエビ急性ウイルス血症 [PAV] | 10.1% | 鰓黒病（フサリウム症）       | 4.1%  |
| 8         | あゆ                        | 6,166                       | 329   | 5.3%      | 冷水病（細菌性冷水病） [BCWD]                  | 66.6% | ビブリオ病                                | 9.1%  | 不明病（原因不明）         | 7.6%  |
| 9         | しまあじ                      | 6,786                       | 299   | 4.4%      | 連鎖球菌症（未同定）                          | 62.6% | α溶血性レンサ球菌症（Lactococcus garvieae感染症）  | 30.5% | マダイイリドウイルス病       | 3.2%  |
| 10        | にじます                      | 4,098                       | 231   | 5.6%      | 伝染性造血器壊死症 [IHN]                     | 39.4% | 冷水病（細菌性冷水病） [BCWD]                   | 20.2% | イクチオホヌス症          | 10.3% |


ぶり類



くろまぐろ



まだい



うなぎ

